









30470/c/2
plates (photostats)
in separate volume

630.

630

h.

XI. 2. 6.

I. 6637

ENTOMOLOGIE
und
HELMINTHOLOGIE
des
MENSCHLICHEN KÖRPERS,

oder
Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben
unter den Insekten und Würmern

von
D. JOHANN HEINRICH JÖRDENS

Königl. Preuss. Hofrathe, der Kurfürstl. Maynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt und der
mineralogischen Societät zu Jena Ehrenmitgliede.



Ὁλωα, μάτρει, εἶπεν,
Ὁλωα κάποδ' ὀφείλω.

Anakreon. 91.

ERSTER BAND.

Mit funfzehn colorirten Kupfertafeln.

Hof, bei Gottfried Adolph Grau. 1801.

305193



V o r r e d e.

Man hat sich in unserm, die Entomologie als Lieblings- und Modewissenschaft cultivirenden Zeitalter vorzüglich angelegen seyn lassen, sie auch in praktischer Hinsicht, besonders für den Forstmann zu bearbeiten, und hierdurch eine Menge der Staatsökonomie nützlicher Kenntnisse zu verbreiten. Sonderbar muß es aber scheinen, daß man hierüber aus der Acht gelassen hat, den Vorzug zu würdigen, welchen der menschliche Körper in dieser Rücksicht selbst verdient. Zwar fehlt es nicht an älteren und neueren Schriften, in welchen der Nachtheil, den gewisse Insekten auf die Gesundheit des Menschen zu äußern pflegen, entweder nur gelegentlich berührt, oder besonders erörtert worden ist. Im ganzen aber liefert alles das Wahre und Falsche, welches hin und wieder über diesen Gegenstand zerstreut oder nachlässig in ein scheinbar Ganzes verarbeitet gefunden wird, nur Bruchstücke zu einem systematischen Gebäude, welches Meyer in Beziehung auf die giftigen Insekten schon 1792 aufzuführen begann, aber, leider! unvollendet blieb. So wenig ich mich stark fühle, das zu ersetzen, was dieser bekannte Naturforscher zu wünschen übrig liefs; so wage ich es doch vorliegende Schrift — die Frucht vieljähriger Arbeit — den Kennern und Freunden der Insekten - und Würmerkunde als

einen kleinen Versuch zur Beurtheilung vorzulegen, und sie hierzu durch die Bekanntmachung mit demjenigen, was ich in Beziehung auf Literatur, Plan, beabsichtigten Zweck und Bearbeitung des Ganzen leisten wollte, im Stande zu setzen.

Was die Literatur betrifft, so folgen hier die mir bekannt gewordenen allgemeinen Schriften, welche von der Schädlichkeit und Giftigkeit verschiedener Insekten und Würmer in Beziehung auf den menschlichen Körper handeln, in chronologischer, die einzelne Insekten und Würmer betreffenden aber, unter den ihnen angewiesenen Rubriken in alphabetischer Ordnung.

Lipsstorp, Gustav. Dan. de Animalculis in C. H. genitis. L. B. 1687.

Paullini, Christ. Francisci, Disquisitio curiosa an mors naturalis sit substantia verminosa? Francof. et Lips. 1703. 8. Es kommen in dieser Schrift wahre und erdichtete Insekten, Würmer, Amphibien etc. durch einander vor, welche auf und in dem menschlichen Körper gefunden und als Ursachen besonderer Krankheiten angesehen worden sind. Zugleich sucht der Verfasser durch Beispiele zu beweisen, daß Fliegen, Wespen, Hornisse und andere Insekten, indem sie in den Exkrementen, Geschwüren, Kadavern etc. solcher Personen, die an ansteckenden Krankheiten leiden oder gelitten haben, ihre Nahrung suchen, im Stande sind, durch ihren Stich den angesogenen Krankheitsstoff auf gesunde Personen überzutragen und so die Dysenterie, Pest und andere ansteckende Krankheiten weiter zu verbreiten.

Clerici, Daniel. Historia naturalis et medica latorum Lumbricorum intra Hominem et alia Animalia nascentium. Genevae 1715. 4. c. Tab. aen. Aufser der Beschreibung der wirklich vorhandenen und erdichteten Würmer der damaligen Zeit, geschieht auch hin und wieder solcher Insekten Erwähnung, welche dem menschlichen Körper nachtheilig werden können.

Hoffmanni, Frid. Diss. de Animalibus humanorum corporum infestis hospitibus (Resp. S. de Drauth). Halae, 1734. 4. handelt überhaupt von gewöhnlichen und ungewöhnlichen Bewohnern des menschlichen Darmkanals. Zu letzteren rechnet er auch die Blutigel, Frösche, Kröten, Eidexen, Käfer etc.

Baier, Ch. G. de generatione Insector. in C. H. Altorfi 1740.

Stenzel, C. G. Diss. de Insectorum in C. H. genitorum varia forma et indole (Resp. G. Vaghi). Vitemb. 1741.

Kratzensteins, C. G. Abhandlung von der Erzeugung der Würmer im menschlichen Körper. Halle 1748. 8. enthält eine sehr unvollständige Angabe von den auf der Oberfläche des menschlichen Körpers wie in dessen Eingeweiden vorkommenden Würmern etc.

Linnaei Diss. de noxa insectorum (Resp. Bäkner). Upsal. 1752. und in den Amoenit. acad. Vol. III. p. 337. Es kommen hierinnen vor: *Pediculus humanus*, *Pulex irrit.* *Pedic. pub.* *Acari sirones*, *Acari ricini*, *Formica rufa et rubra*, *Forficula auricularia*, *Cimex lectul.* *Conops calcitr.* *Tabani varii*, *Culex pip. et pulicar.* *Vespae crabrones et vulgares*, *Muscae domesticae*, *Hippobosca equina*, *Gryllus domest.* *Araneae variae*, *Pedicul. pulsatorius*. Unter der Rubrik von Insekten, welche den menschlichen Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Geräthschaften etc. schädlich werden, führt er noch auf: *Musca carnaria*, *Dermest. lard.* *Blatta oriental.* *Musc. meteorica*. Der Ritter begnügte sich überhaupt nur an das Bekannteste von der Schädlichkeit jedes dieser Insekten mit einigen Zeilen erinnert zu haben.

Heise, J. G. Diss. de insector. noxio effectu in C. H. Halae 1757.

Kniphof, J. H. Diss. de Pediculis inguinalibus, insectis et vermibus homini molestis (Resp. Reichard). Erfurti 1759. c. Tab. III. aen. 4. *Lumbricus*, *Vermis S. Viti*, *Ascarides*, *Taenia*, *Cucurbitini*, *Dracunculus*, *Pulex irrit. et penetrans*, *Hirudo*, *Culex*, *Crinones*, *Acari*, *Cimex*, *Pediculus capitis et pubis* sind die Würmer und Insekten, die der Verfasser kürzlich in der angegebenen Ordnung durchgehet.

Pallas, P. S. Dissert. de Insectis viventibus intra viventia. L. Bat. 1760. 4. schränkt sich nicht bloß auf den Menschen ein, sondern handelt überhaupt von den Insekten und Würmern, welche innerhalb des thierischen Körpers gefunden worden sind.

Amoureux, P. J. Diss. de noxa animalium. Monspel. 1762. gedenkt auch verschiedener schädlichen Insekten, so wie folgende Schrift:

Sauvages, Diss. de venenatis Galliae animalibus (Resp. Berthelot). Monspel. 1763.

Spielmann, I. R. Diss. de Animalibus nocivis Alsatae (Resp. Weiler). Argentorat. 1768. enthält §. XX. das Verzeichniß der Insekten und §. XXI. das Verzeichniss

nifs der Würmer, welche in Elsas als vorzüglich dem Menschen schädlich bekannt sind.

Wietzel, J. C. Diss. de morsibus et puncturis animalium. Argentor. 1776.

Buchoz, Histoire des Insectes nuisibles à l'homme, aux bestiaux, à l'agriculture et au Jardinage, à Paris 1781. Göze hat hiervon eine mit Anmerkungen begleitete Uebersetzung geliefert, unter dem Titel: Geschichte einiger den Menschen, Thieren, Oekonomie und Gärtnerey schädlichen Insekten, Leipzig 1787. 8. Der Inhalt dieses 264 Seiten enthaltenden Buchs ist zu viel umfassend, als dafs viele von den dem menschlichen Körper nachtheiligen Insekten hätten angeführt werden können, enthält aber übrigens viel Schätzbares.

Abhandlungen über die Schädlichkeit der Insekten, aus Linn. Amoen. mit Professor Biwalds Zusätzen, aus dem Lateinischen mit vielen Anmerkungen übersetzt. Breslau 1783. — Eine Uebersetzung der oben angeführten Schrift, die durch die Anmerkungen des Herausgebers sehr bereichert worden ist.

Amoureux, Notice des Insectes de la France, réputés venimeux, à Paris 1789. 8. maj. c. Tab. II. aen. — Eine von der Acad. zu Lion gekrönte Preisschrift, welche in vieler Rücksicht wichtig ist, ohngeachtet sich der Verfasser blos auf die in Frankreich bekannten schädlichen Insekten einschränken mußte. Nur führt er eine Menge Insekten an, wozu keine Fakta vorhanden sind, die seine Muthmassungen über ihre Giftigkeit begründen könnten.

Meyers, F. A. A. Gemeinnützliche Naturgeschichte der giftigen Insekten. Erster Theil, Berlin 1792. 8., ist nach einem vielumfassenden Plan angelegt, indem der Verfasser auch die blos verdächtig scheinenden Insekten aufgenommen hat. Mehr als der erste Theil, welcher die Panzerflügel, Pergamentflügel, Staub- und Aderflügel enthält, ist aber davon zur Zeit nicht erschienen.

Aus dem Verzeichnisse dieser Schriften erhellet, dafs sie theils blos als Beiträge zur naturhistorischen Topographie für gewisse Gegenden Werth haben, theils nur einseitig, entweder blos in Beziehung auf Entomologie, oder auf Helminthologie bearbeitet, theils unvollendet gelassen, theils mit andern nicht zur Absicht gehörenden Dingen vermischt worden sind, und den richtigen Gesichtspunkt

punkt einer Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers nicht gefaßt haben.

Der Begriff einer solchen auf den menschlichen Körper angewendeten Würmer- und Insektenkunde kann überhaupt weit oder enge genommen werden. Anfänglich glaubte ich bloß die Geschichte derjenigen Insekten und Würmer darunter befassen zu müssen, welche allein auf den menschlichen Körper angewiesen sind und sich nur auf oder in demselben fortzupflanzen pflegen. Da aber auch solche Insekten und Würmer, die nur zufälliger Weise an oder in den menschlichen Körper kommen, und wegen besonderer Verhältnisse zu ihm, wegen vorzüglicher Plagen und Krankheiten, die sie ihm erregen, gekannt zu werden verdienen und wichtig sind für die Geschichte des Menschen: so habe ich auch diese einer Aufnahme werth geachtet, und in beider Rücksicht mir die Eintheilung anderer Zoologen, z. B. der Ornithologen zum Muster gemacht, welche diejenigen Vögel zu den einheimischen eines Landes zählen, die im Lande selbst nisten und brüten, die übrigen aber zu Zug- und Strichvögeln machen, welche nur zufälliger Weise, um der Nahrung willen, ein oder das andere Land häufiger besuchen.

Werth der Aufmerksamkeit jedes denkenden Menschen schießen mir ferner diejenigen Insekten zu seyn, welche die Auflösung unsers Körpers nach dem Tode und die Entmischung seiner Grundstoffe in vielen Fällen befördern helfen. Ich habe daher auch diesen unter den zufällig schädlichen Insekten einen besondern Abschnitt gewidmet, endlich aber, der Geschichte und der Vollständigkeit des Ganzen wegen, in einem kurzen Anhang noch die Geschichte einiger erdichteten Würmer und dasjenige beigefügt, was von verschiedenen Amphibien, die sich in den menschlichen Körper verirrt haben sollen, gelegentlich gelogen oder wahr befunden worden ist.

Ohne

Ohne mich überhaupt auf bloße Muthmaßungen einzulassen, die sich vielleicht auf die Gegenwart verletzender Werkzeuge, eines widerwärtigen Geruchs, einer schwer von den Händen zu bringenden ölichten und eine Schärfe verrathenden Feuchtigkeit etc. gründen können, hielt ich, bey der besondern Bearbeitung des Ganzen, nur solche Insekten und Würmer einer, dem Grade ihrer Schädlichkeit angemessenen, längeren oder kürzeren Beschreibung würdig, von welchen es durch vorhandene Beobachtungen und Erfahrungen erwiesen ist, daß sie dem menschlichen Körper entweder vorzüglich beschwerlich fallen, oder ihn mechanisch oder chemisch verletzen und einen mehr oder weniger erheblichen Nachtheil auf die Gesundheit desselben äußern können. Hierunter glaubte ich aber, der Vollständigkeit wegen, selbst einige hin und wieder bei den Schriftstellern vorkommende giftige Insekten begreifen zu müssen, deren Bestimmung schwer oder gar unmöglich ist, weil sie ganz unverständlich und undeutlich beschrieben worden sind.

In Rücksicht der Bestimmung des Charakters einzelner Insekten und Würmer, und der Ordnung, in welcher ich sie in den verschiedenen Abschnitten auf einander folgen liefs, habe ich das bekanntere Linnéische System nach Gmelins neuester Ausgabe zu Grunde gelegt, übrigens aber zur Bearbeitung des Textes, so viel möglich, alles Wissenswerthe aus den Autoren gesammelt, dabei die Sagen und Behauptungen über die Existenz und Giftigkeit mancher Insekten und Würmer der nöthigen Kritik unterworfen, verschiedenes aus meiner eigenen Erfahrung hinzugefügt und das Ganze noch durch die schätzbaren Beiträge bereichert, welche ich der gütigen Mittheilung einiger Gönner und Freunde zu verdanken habe.

Ohngeachtet ich selbst der Meinung bin, daß ganz verschiedene Wissenschaften und verschiedene Theile einer und derselben

Wis-

Wissenschaft, besonders Theorie und Praxis, so viel möglich immer von einander abgesondert bleiben müssen, und dafs es z. B. unschädlich ist, in anatomischen Werken, pathologische und therapeutische Bemerkungen einzustreuen; so glaubte ich doch aus einigen Gründen hier eine Ausnahme machen, und diesem Werke durch die Beifügung der bisher gegen verschiedene Zufälle, welche Insekten und Würmer zu veranlassen pflegen, bekannt gewordenen und mit Nutzen angewandten Mittel, noch einen besondern praktischen Werth geben zu müssen. Einmal würde ich durch die Hinweglassung dieser Mittel der Hauptabsicht meines Unternehmens selbst widersprochen haben, nemlich weniger Bemittelten, eine Menge kostbarer Werke entbehrlich zu machen, die bei einer blos aus gegenwärtiger Schrift geschöpften naturhistorischen Beschreibung, doch wieder zur Aufsuchung der Gegenmittel nothwendig werden würde; auf der andern Seite aber schmeichelte ich mir, dieser Schrift hierdurch selbst ein gröfseres Publikum zu verschaffen und das kostspielige Unternehmen des Verlegers selbst mehr zu sichern.

Was die Literatur anlangt, welche ich der Beschreibung einzelner Insekten und Würmer vorausgeschickt habe; so befaßt sie aufser den Monographien, auch die Citate aus gröfseren Werken, in so ferne sie die Naturgeschichte und besondere zur Sache gehörende Notizen betreffen, die ich freilich, wegen ihrer Seltenheit, selbst nicht alle lesen und nicht alle aus den ersten Quellen schöpfen konnte, die aber in der mehr als irgend ein Theil der Zoologie bearbeiteten Entomologie ziemlich zahlreich ausfallen mußten. Sollte die hierdurch beabsichtigte Vollständigkeit der Literatur mir einen besondern Tadel zuziehen; so bin ich überzeugt, dafs er mir nur von denjenigen gemacht werden kann, die nicht wissen, wie viel Zeit es kostet, sich ihre Kenntniß zu erwerben, und von welchem Werth es ist, die über einen Gegenstand vorhandenen Schriften in einem möglichst vollständigen Verzeichnisse beysammen zu finden.

Von

Von den Abbildungen der dem Texte folgenden Kupfertafeln, welche ihre sorgfältige Bearbeitung in Rücksicht des Stichs und der Illumination der gefällig übernommenen Aufsicht des rühmlichst bekannten Kunstkenners, Herrn Frauenholzes in Nürnberg verdanken, habe ich viele nach der Natur gemahlt, die meisten aber aus anderen, gröfseren und kleineren Werken entlehnt. Ohngeachtet sie den Preis dieser Schrift sehr erhöhen, so machen sie doch einen wesentlichen Theil des Ganzen aus, da sich ohne ihre Beihülfe, mit aller wörtlichen Schilderung, kein deutlicher Begriff von unbekannten Insekten und Würmern, oder den Organen machen läfst, wodurch sie schädlich zu werden pflegen. Diese Abbildungen folgen, auf der gröfseren Anzahl der Kupfertafeln, in einer von der im Texte zu Grunde gelegten Abtheilung verschiedenen und ganz nach dem Linnéischen Systeme fortlaufenden Ordnung, weil ich anfangs Willens war, die sämmtlichen Insekten und Würmer nach ihren Klassen und Geschlechtern abzuhandeln und nur in einem tabellarischen Conspektus jene Abtheilungen vor Augen zu legen. Die letzteren Tafeln sowohl des ersten als des zweiten Bandes, sind als Ergänzungstafeln anzusehen, welche ich erst während der Bearbeitung des Textes hinzuzufügen für nöthig fand. Aufser den verletzenden Werkzeugen habe ich bei denjenigen Insekten, welche vorzüglich schädlich oder lästig, und in mehr als einer Hinsicht merkwürdig sind, auch die verschiedenen Lebensperioden von ihrer ersten Entstehung bis zu ihrer vollkommenen Ausbildung durch Zeichnungen anschaulich gemacht. Und wenn dieses vielleicht den Vorwurf einer unnöthigen Vertheuerung erhalten sollte, so bitte ich in Erwägung zu ziehen, dafs ich den Raum jeder Kupfertafel gewifs möglichst benutzt und auf eine Tafel meistens so viel Abbildungen gebracht habe, als man oft in ähnlichen Werken auf zwei bis drei Tafeln vertheilt findet.

Beinahe ist es als blofse Wiederholung anzusehen, wenn ich mich, nach dem bisher gesagten, noch besonders darüber erkläre,
für

für wen dieses Buch eigentlich bestimmt ist, oder wem es vorzüglich nützlich werden kann. Ich glaube ohne Uebertreibung behaupten zu können, daß der Naturforscher, welchem es nicht blos darum zu thun ist, Insekten und Würmer den Namen nach kennen zu lernen, sie systematisch zu ordnen und allenfalls Zimmer damit auszuschnücken, sondern sich auch physiologisch und therapeutisch von ihrem Nutzen und Schaden zu unterrichten, und dem es gleichwohl an Geld, Gelegenheit, Lust oder Zeit fehlt, sich die nöthigen Bücher zu verschaffen und aus einer so beträchtlichen Menge Schriften, das hierher gehörige aufzusuchen und zu vergleichen; daß ferner der Anthropologe, welchem diese Schrift manche wichtige Beiträge und neue Ansichten zur vollständigeren Bearbeitung der Geschichte des Menschen liefert; der Arzt und Wundarzt, der durch die nöthige Kenntniß der verletzenden Organe und Verletzungsart in Stand gesetzt wird, über die Behandlung der Verletzungen und Zufälle, welche Insekten und Würmer hervorbringen können, richtiger zu urtheilen, die bisher gebräuchlich gewesenen Mittel zu prüfen und sie vielleicht mit zweckmäßigeren zu vertauschen, und endlich der Liebhaber alles Wissenswerthen aus verschiedenen Theilen der Wissenschaften, dessen Geschäfte es aber nicht erlauben, sich mit dem Detail der Entomologie und Helmintologie zu befassen, — in dieser Schrift Belehrung und eine in mancher Hinsicht nützliche Unterhaltung finden werden.

Sollte das Ganze die erwünschte Aufnahme erhalten, welche zur Schadloshaltung, ich will nicht sagen für den beträchtlichen Zeit- und Mühe- sondern nur für den Kostenaufwand nöthig ist, den Verleger und Verfasser dabei machen mußten; so werde ich mir angelegen seyn lassen, dasjenige zu einem Supplemente zu sammeln, was weiter entdeckt werden möchte und vorzüglich noch auf der Liste der zufälligen Feinde des menschlichen Körpers fehlt,

welche

welche unfehlbar durch die noch weniger bekannten Insekten und Würmer aus andern Weltgegenden, eine beträchtliche Vermehrung zuläfst.

Schlüßlich halte ich es nicht für überflüssig, für manche Leser noch eine kurze Erklärung der Titelvignetten beizufügen. In der zum ersten Bande gehörigen habe ich die Sorglosigkeit und Unvorsichtigkeit, durch welche die meisten in denselben beschriebenen Insekten dem Menschen nachtheilig und gefährlich zu werden pflegen, in dem Bilde des kleinen Amor des Anakreons vorgestellt, der eine Rose abbrechen wollte, aber von der darauf sitzenden Biene, welche ihm zu schlafen schien, in den Finger gestochen wurde und nun wehklagend über die ganze Hand, zu seiner Mutter eilt, welche ihn warnend dadurch zu beruhigen sucht, daß sie die Schmerzen, die er durch seine Pfeile in den Herzen der Liebenden veranlaßt, noch über die Schmerzen vom Bienenstiche erhebt.

Die Vignette zum zweiten Bande, welcher von den auf und innerhalb des menschlichen Körpers Nahrung suchenden Würmern handelt, habe ich in Beziehung auf den Gedanken entworfen: der Mensch ist selbst eine Welt und seine Bewohner ergötzen sich bei seinem Schmerz, und stellt die Operation vor, die ein Neger an einem Europäer verrichtet, an dessen Fuß sich ein Guineawurm in die Haut eingebissen hat, der unter derselben wie ein durchschimmernder Nerve zu erscheinen pflegt. Diese Operation besteht darinnen, daß dieser beträchtlich lange Wurm durchs langsame Aufwickeln auf ein Stäbchen ausgezogen wird, wobey die Neger große Behutsamkeit anzuwenden pflegen, weil gefährliche Zufälle erfolgen, wenn der Wurm abreißt und ein Theil desselben zurückbleibt.

Inhalt des ersten Bandes.

	Seite
Einleitung.	XVII bis XXVIII
Erste Abtheilung. Geschichte derjenigen Insekten, welche ausschließlich auf dem menschlichen Körper leben, und sich nur auf demselben fortpflanzen können	5
1. Die Aussatzfliege, <i>Musca leprae</i>	3
2. Der Floh des Hautjuckens der Greise, <i>Pulex pruriginis senilis</i>	8
3. Die Kopflaus, <i>Pediculus humanus capitis</i>	9
4. Die Leiblaus, <i>Pedicul. humanus corporis</i>	15
5. Die Filzlaus, <i>Pediculus pubis</i>	19
6. Die Krätzmilbe, <i>Acarus scabiei</i>	22
Zweyte Abtheilung. Geschichte derjenigen Insekten, die den menschlichen Körper nicht zum angewiesenen Wohnplatz haben, aber doch wegen vorzüglicher Plagen und Krankheiten, welche sie ihm zuziehen, merkwürdig sind	32
Erster Abschnitt. Zufällig schädliche Insekten, welche den menschlichen Körper gewöhnlich und vorzugsweise aufsuchen	32
1. Die Bettwanze, <i>Cimex lectularius</i>	32
2. Die Menschenbremse, <i>Oestrus hominis</i>	40
3. Der gemeine Floh, <i>Pulex irritans</i>	41
4. Der Sandfloh, <i>Pulex penetrans</i>	47
Zweyter Abschnitt. Zufällig schädliche Insekten, welche den menschlichen Körper seltener und nur unter gewissen Umständen verletzen	51
1. Der Hirschschröter, <i>Lucanus Cervus</i>	51
2. Der Inquisitor, <i>Cerambix Inquisitor</i>	54
3. Der beissende Bockkäfer, <i>Cerambix mordax</i>	55
4. Der graue Holzbock, <i>Cerambix cinereus</i>	55
5. Der schwarzbraune Warzenkäfer, <i>Cantharis fusca</i>	56
6. Der Laufkäfer, <i>Carabus</i>	58
7. Die spanische Fliege, <i>Meloe vesicatorius</i>	60
8. Der Raubkäfer, <i>Staphylinus</i>	68
9. Der grosse Ohrwurm, <i>Forficula auricularia</i>	68
10. Die amerikanische Schabe, <i>Blatta americana</i>	71
11. Die Maulwurfsgrille, <i>Gryllo - talpa</i>	73
12. Der Warzenfresser, <i>Gryllus verrucivorus</i>	76
13. Der Wanzenskorpion, <i>Nepa cimicoides</i>	80
14. Die maskirte Wanze, <i>Cimex personatus</i>	82
**	15.

	Seite
15. Die Ringelwanze, <i>Cimex annulatus</i>	84
16. Die giftige Fliegenwanze, <i>Cimex venenatus</i>	85
Raupen oder Schmetterlingslarven überhaupt	87
17. Die Wolfsmilchraupe, <i>Larva Sphingis Euphorbiae</i>	91
18. Die grosse Kühn- oder Fichtenraupe, <i>Larva Bombycis Pini</i>	93
19. Die Klee- oder Quittenraupe, <i>Larva Phalaenae Bombycis Trifolii</i>	95
20. Die Eichenraupe, <i>Larva Phalaenae Bombycis Quercus</i>	96
21. Die Gabelschwanzraupe, <i>Larv. Phal. Bomb. Vinulae</i>	98
22. Die Processionsraupe, <i>Larv. Phal. Bomb. Processioneae</i>	102
23. Die Pithyocampa, <i>Larv. Phal. Bomb. Pithyocampae</i>	105
24. Die schwarze Bärenraupe <i>Larv. Phal. Bomb. Cajae</i>	108
25. Die graue Bürstenraupe, <i>Larv. Phal. Bomb. Fascelinae</i>	110
26. Die grosse Holzraupe, <i>Larv. Phal. Bomb. Cossi</i>	111
27. Die Sonderlingsraupe, <i>Larv. Phal. Bomb. Antiquae</i>	114
28. Die Riesenwespe, <i>Sirex Gigas</i>	117
29. Der gelbe Raupentödter, <i>Ichneumon luteus</i>	119
30. Die Sandwölberin, <i>Sphex sabulosa</i>	121
31. Die Hornisse, <i>Vespa Crabro</i>	123
32. Die gemeine Wespe, <i>Vespa vulgaris</i>	126
33. Die Wandwespe, <i>Vespa parietum</i>	131
34. Die Honigbiene, <i>Apis mellifica</i>	132
35. Die schwarze Biene, <i>Apis nigra</i>	141
Ameisen überhaupt.	142
36. Die rothe Ameise, <i>Formica rubra</i>	146
37. Die Zugameise, <i>Formica cephalotes</i>	148
Fliegen überhaupt	149
38. Die Stubenfliege, <i>Musca domestica</i>	152
39. Die Gewitterfliege, <i>Musca meteorica</i>	155
40. Die Papatasi, <i>Musca Rhagio Papatasi</i>	156
41. Die Regenbreme, <i>Tabanus pluvialis</i>	156
42. Die blinzäugichte Breme, <i>Tabanus caecutiens</i>	157
43. Die blauäugichte Breme, <i>Tabanus caesiuss</i>	158
Mücken überhaupt.	158
44. Die Singmücke, <i>Culex pipiens</i>	160
45. Die Flohmücke, <i>Culex pulicaris</i>	167
46. Die Kriechmücke, <i>Culex reptans</i>	169
47. Die kolumbatczer Mücke, <i>Culex Columbatczensis</i>	170
48. Die braungrauliche Tanzfliege, <i>Empis livida</i>	174
49. Die Wadenstecherin, <i>Conops calcitrans</i>	176
50. Die gelbe Raubfliege, <i>Asilus flavus</i>	178
51. Die fliegende Pferdelaus, <i>Hippobosca equina</i>	179
52. Die fliegende Vogellaus, <i>Hippobosca avicularia</i>	181
53. Die Krieger - Termite, <i>Termes bellicosus</i>	182
54. Die beissende Termite, <i>Termes mordax</i>	189
55. Die grimmige Termite, <i>Termes atrox</i>	190
	56.

	Seite
56. Die Baumtermite, <i>Termes arborum</i>	191
57. Die wandernde Termitte, <i>Termes viarum</i>	192
58. Die Fußlaus, <i>Pediculus ricinoides</i>	193
59. Die Reduviusmilbe, <i>Acarus Reduvius</i>	194
60. Die Egelmilbe, <i>Acarus Hirudo</i>	195
61. Die rothe amerikanische Waldmilbe, <i>Acarus americanus</i>	195
62. Der Blutsauger, <i>Acarus sanguisugus</i>	198
63. Die Hundsmilbe, <i>Acarus Ricinus</i>	199
64. Die Ruhrmilbe, <i>Acarus dysenteriae</i>	200
65. Die Käsemilbe, <i>Acarus Siro</i>	202
Giftkanker überhaupt	203
66. Die tödtliche Solpuge, <i>Solpuga fatalis</i>	207
67. Die spinnenartige Solpuge, <i>Solp. arachnodes</i>	208
68. Die afrikanische Solpuge, <i>Solp. africana</i>	213
Phalangien überhaupt	214
69. Der Bücherskorpion, <i>Phalangium cancroides</i>	216
70. Die Milbenspinne, <i>Phalangium acaroides</i>	218
71. Das Phalangium mit halbmondförmigem Brustschilde, <i>Phalangium lunatum</i>	218
Spinnen überhaupt.	221
72. Die Nestspinne, <i>Aranea nidulans</i>	230
73. Die tatarische Spinne, <i>Aranea tatarica</i>	231
74. Die Tarantel, <i>Aranea Tarantula</i>	232
75. Die amerikanische Vogelspinne, <i>Aranea avicularia</i>	245
76. Das Jaikische Sechsauge, <i>Aranea senoculata</i>	249
77. Der Jaikische Vierpunkt, <i>Aranea quadripunctata</i>	250
78. Die spindelförmige Spinne, <i>Aranea fusiformis</i>	250
Skorpionen überhaupt	251
79. Der deutsche Skorpion, <i>Scorpio germanicus</i>	260
80. Der italienische Skorpion, <i>Scorpio europaeus</i>	261
81. Der afrikanische Skorpion, <i>Scorpio afer</i> .	263
82. Der amerikanische Skorpion, <i>Scorpio americanus</i>	265
83. Der punktirte Skorpion, <i>Scorpio punctatus</i>	266
84. Der südländische Skorpion, <i>Scorpio australis</i>	267
Krebse und Krabben überhaupt	268
85. Die Sandkrabbe, <i>Cancer vocans</i>	270
86. Die Giftkrabbe, <i>Cancer Dromia</i>	271
87. Der gemeine Taschenkrebs, <i>Cancer Pagurus</i>	272
88. Die Teufelskrabbe, <i>Cancer Maja</i>	273
89. Die Seeheuschrecke, <i>Cancer Humarus</i>	274
90. Der Schwanenkrebs, <i>Cancer Mantis</i>	275
91. Der Sandkreb, <i>Cancer chiragricus</i>	276
Skolopendern überhaupt	277
92. Die gegabelte Skolopender, <i>Scolopendra forficata</i>	278
93. Die beissende Skolopender, <i>Scolopendra morsitans</i>	279
94. Der größte Tausendfuß, <i>Julus maximus</i>	281

	Seite
Dritter Abschnitt. Zufällig schädliche Insekten, welche als ganz ungewöhnliche Erscheinungen innerhalb des menschlichen Körpers vorgekommen sind	282
Insektenlarven und vollkommene Insekten unter der Haut und in den fleischichten Theilen des menschlichen Körpers	283
Skolopendern und Maden in den Stirnhöhlen	285
Milben und Fliegenlarven in den Augen	286
Insektenlarven in den Kinnbackenhöhlen	286
Insektenlarven in der Nase	287
Insektenlarven in den Ohren	288
Insektenlarven im Munde	289
Insektenlarven in der Luftröhre und in den Lungen	290
Insektenlarven, Asseln und Skolopendern in dem Magen	290
Insektenlarven, Puppen und vollkommene Insekten im Darmkanale	291
Insekten in den Harnwegen	294
Insekten in den Brüsten säugender Personen	294
Insektenlarven und vollkommene Insekten in den inneren weiblichen Geburtstheilen	295
 Dritte Abtheilung. Geschichte derjenigen Insekten, welche im menschlichen Leichname Nahrung suchen, und sich in demselben fortpflanzen	 296
Erster Abschnitt. Insekten, welche den menschlichen Leichnam im ersten Grade der Fäulniß aufsuchen	297
1. Die gemeine Goldfliege, <i>Musca Caesar</i>	298
2. Die Aasfliege, <i>Musca cadaverina</i>	299
3. Die Brechfliege, <i>Musca vomitoria</i>	299
4. Die Fleischfliege, <i>Musca carnaria</i>	301
 Zweyter Abschnitt. Insekten, welche den menschlichen Leichnam im zweyten Grade der Fäulniß aufsuchen	 303
1. Der Speckkäfer, <i>Dermestes lardarius</i>	303
2. Der Erdvielfuß, <i>Julus terrestris</i>	305

Einleitung.

Keine Materie der ganzen organischen und nicht organischen Natur ist ohne Bewohner, und der Mensch so wenig, als der kleinste Wurm hiervon ausgeschlossen, weil im ganzen Universum Leben und Glückseligkeit der Lebenden verbreitet seyn und immer ein Geschöpf dem andern Nahrung und Aufenthalt geben sollte. Viele dieser Bewohner gelangen nur zufälliger Weise in und auf den menschlichen Körper und sind daher blos als Schmarutzer anzusehen, andere aber gehören ihm so eigenthümlich zu, daß er in Beziehung auf sie eine Welt zu nennen ist. Ihr Wohlseyn und ihre Existenz hängen ganz von dem Wohlbefinden und dem Leben desselben ab. Die ihm anklebende Laus, der auf ihm herumirrende Floh, der in seinen Eingeweiden verborgen lebende Wurm etc. werden beunruhiget und zu seiner grösseren Pein in vermehrte Thätigkeit gesetzt, wenn Fieberhitze ihn quälet, und fliehen ihn oder kommen auf und in demselben um, wenn ihn mit dem Tode die Lebenswärme verläßt. So räthselhaft die Bestimmung sowohl dieser eigenthümlichen Bewohner, als jener zufälligen Feinde in Beziehung auf den Menschen selbst zu seyn scheint, indem sie seine Geduld oft ermüden, ihn verfolgen, ihm manche widernatürliche Reize und schmerzhaft Empfindungen veranlassen, ihn manchen Gefahren aussetzen und scheinbar wenig oder keinen Nutzen schaffen; so tragen sie doch gewissermassen zur Erhaltung seines physischen Wohls bey. Die seine Oberfläche bewohnenden und ihr nachtheilig werden den Insekten nöthigen ihn, seinen Körper, seine Kleidungsstücke, Betten, Wohnungen etc. rein zu halten, und hierdurch selbst gesunder, brauchbarer und unanstössiger in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens zu bleiben; die in seinen Eingeweiden wühlenden Würmer aber machen ihn aufmerksam, sich vor gewissen Speisen zu hüten, welche die Vermehrung dieser Würmer begünstigen und seiner Gesundheit nachtheilig sind, und zehren zugleich,

in-

indem sie ihm lästig werden, den schädlichen Überfluß, den ihn beschwerenden Schleim auf. Wahrscheinlich aber erfüllen sie ausserdem noch eine höhere Absicht in dem Plane des allweisesten Schöpfers, der zur Unterhaltung eines beständigen Wechsels von Untergang und Aufleben in der Natur, schon bey der Entstehung jedes Geschöpfs die Mittel zur Beschränkung seiner Lebensdauer angeordnet und deswegen jedem Thiere seine Feinde zugetheilt hat, um allmählich der möglichst grössten Menge Geschöpfe einer und derselben Art, die Freuden der ihr auf diesem Erdenrund angewiesenen, aber gleichzeitig immer nur für eine bestimmte Anzahl erreichbaren Glückseligkeit zu gewähren. Wahrscheinlich gehören sie also, indem sie so manche gefährliche, ja tödliche Zufälle zu erregen, und die Verpflanzung gewisser Krankheitsmaterien zu befördern im Stande sind, wie das zahllose Heer der Krankheiten selbst zu den Mitteln, den Untergang und die Auflösung des menschlichen Körpers, nachdem er seine irdische Bestimmung erreicht hat, zu befördern.

Es ist nicht zu läugnen, daß ältere Schriftsteller durch die auffallenden Beobachtungen der Gefahren, welche Insektenverletzungen zu veranlassen pflegen, verleitet worden sind, diese Gefahren selbst zu übertreiben und alle Insekten in den Verdacht der Giftigkeit zu bringen; aber eben so sonderbar, daß neuere Naturforscher hiervon Veranlassung nahmen, alle Thatsachen von den Nachtheilen und der Giftigkeit gewisser Insekten abzuläugnen und sie blos auf Rechnung der körperlichen Konstitution, des Einflusses der Hitze des Klimas und der Jahreszeit, des vorübergehenden Zorns, der Krankheit der Insekten, und der schlechten oder vernachlässigten Behandlung ihrer Verletzungen zu schreiben. Eine solche Entfernung von der stets zur Wahrheit führenden Mittelstrasse, mußte nothwendig auf mancherley Widersprüche leiten. Indem man nemlich auf der einen Seite alle Insekten gegen jeden Verdacht der Schädlichkeit und Giftigkeit in Schutz nahm, sah man sich doch auf der andern Seite genöthiget, bey den Skorpionen eine Ausnahme zu machen und zuzugeben, daß ein blosser Stich so üble Folgen nicht nach sich ziehen könne, sondern ein mit diesem in die Wunde fließendes Gift sie veranlassen müsse. Auch bedachte man nicht, daß wenn selbst die Gefahren vom Stiche des Skorpions, vom Bisse der Schlangen, dessen nicht

zu bestreitende Nachtheile und Tödtlichkeit die Gegner vorzüglich anerkannt haben, so gut wie vom Bisse toller Hunde, als Folgen des Zorns oder der Krankheit der verletzenden Thiere angesehen werden müßten, diese Gefahren doch immer Folgen eines, diesen Thieren eigenen, wenn gleich durch die Umstände erzeugten oder zur Wirksamkeit gebrachten Gifts bleiben, und die auf die Ähnlichkeit der verletzenden Organe gegründete Wahrscheinlichkeit übrig lassen, daß, ausser dem Skorpionstich, auch die Verletzungen anderer Insekten mehr oder weniger nachtheilig und gefährlich werden können. Denn bekanntlich kommen die Verletzungswerkzeuge der Solpugen, Phalangien, Spinnen, Skolopendern, wie der Skorpionen, in ihrem Baue den sogenannten Giftzähnen der Schlangen, welche inwendig hohl sind, an ihrer Spitze eine Öffnung und an der Wurzel ein kleines Giftbehältniß haben, überaus nahe. Vergleicht man überdies die auf die Verletzungen giftiger Insekten erfolgenden Zufälle mit denjenigen, welche der Schlangenbiß in seinem Gefolge führt; so findet man sie im Grunde nur dem Grade nach verschieden, ja sogar die Umstände unter welchen sie sich zu äußern pflegen, miteinander vollkommen übereinstimmend. Da wir diese Umstände in Beziehung auf Insektenverletzungen unten näher kennen lernen werden; so begnüge ich mich hier bloß darauf aufmerksam zu machen, daß z. B. nur der erste Biß, welcher bey noch vollen Giftbehältnissen, unter einem heissen Himmelsstriche, zu einer heissen Jahreszeit von einer Schlange beygebracht wird, die ihr gehöriges Alter erreicht hat, gesund und frisch ist, die Zufälle der Vergiftung hervorzubringen im Stande ist. Wenn ferner die Gegner der Schädlichkeit und Giftigkeit gewisser Insekten behaupten, daß die Natur in uns eine gewisse Abneigung und Furcht vor einigen Thierordnungen gelegt, und uns vor den gefährlich werdenden Thieren durch ihr finsternes, trauriges, ekelhaftes und zurückschreckendes Aussehen, durch ihre versteckten, unreinen Wohnorte gewarnet habe: so kann man sich nicht genug wundern, warum sie dieses nicht eben so wohl von den Klassen der Insekten und Würmer, als von der der Amphibien gelten lassen wollen. Noch ganz zarte Kinder erschrecken ja vor keinem Thiere so sehr, als gerade vor den im Verdacht der Schädlichkeit stehenden Insekten, zum Beweis, daß diese Abneigung sich nicht auf Sagen und Vorurtheile gründet, sondern uns angebo-

geboren ist; unter den erwachsenen Personen aber giebt es nur sehr wenige, welche im Stande sind, jedes Insekt gleichgültig anzufassen und viele werden sogar schon bey dem Anblicke einer Spinne ohnmächtig, nicht zu gedenken, daß gerade dieser natürliche, uns angeborne Abscheu, diese heimliche Furcht vor den Insekten und Würmern, die Ursache ist, warum wir nur von dem allgeringsten Theil derselben ihre Ökonomie und Schädlichkeit betreffende Beobachtungen besitzen.

Anlangend die Art und Weise der Verletzung dieser Geschöpfe, so kann man sie füglich in die *mechanische*, *chemische* und *vermischte* eintheilen. Viele Insekten und Würmer, und von ersteren sogar manche in den verschiedenen Perioden ihrer Verwandlung, bedienen sich der ihnen zur Fortpflanzung, zur Unterhaltung ihres Lebens und zu ihren ökonomischen Bedürfnissen überhaupt gegebenen Werkzeuge, nach verschiedenen in und ausser ihnen liegenden Veranlassungen, bald als Waffen zum Angriffe, bald als Waffen zur Vertheidigung. Einige haben hornartige Kiefer mit Zinken und Häken; andere in besonderen Scheiden verborgen liegende Stachel oder Lanzetten, wovon letztere Wunden schlagen, erstere die aus denselben hervordringenden Säfte einsaugen; noch andere Stacheln mit Widerhaken, die sie in den Wunden zurücklassen; Kneipzangen, scharfe Spitzen und borstige Haare, die Würmer aber blos besondere Saugorgane, wodurch sie öfters die schmerzhaftesten Empfindungen, die gefahrvollestes Zufälle hervorbringen. Alle diese Insekten und Würmer verletzen also durch besondere Werkzeuge mechanisch.

Die chemisch verletzende Klasse der Insekten aber schadet offenbar durch besondere chemische Schärfen, deren Reiz nicht blos örtlich, wie der mechanische, sondern auch auf die inneren und die entferntesten Theile des Körpers wirkt. Auf diese Art verletzt z. B. die Kantharide, die Coya, (die Larve der *Vinula* etc. Im Ganzen aber begreift sie nur wenige; die dritte Klasse der sowohl mechanisch als chemisch verletzenden oder die gemachte Wunde zugleich vergiftenden aber, die allermeisten Insekten.

Die chemische Verletzung hängt immer von einem besonderen Saft ab, welcher für das Insekt den Nutzen zu haben scheint, daß er durch seine scharfen reizenden Bestandtheile die Verdauung desselben befördert, auf den Menschen

schen aber als Gift, oder als eine solche Materie wirkt, welche im Stande ist, in kleiner Quantität eine lebensgefährliche oder gar tödtliche Wirkung zu äussern. So wenig die innere Natur dieses Gifts selbst bekannt ist, so ist dieses doch keinesweges eine erst durch den Zorn veränderte Feuchtigkeit, weil dergleichen Insekten allermeist ohne dazu gereizt zu werden, verwunden und diese Verwundungen eben dieselben Zufälle hervorbringen, als wenn sie von den in Wuth gesetzten Insekten herrühren; weil ferner sogar der, blos mit einer an den Maxillen der grösseren Spinnen geriebenen Nadelspitze beygebrachte Giftsaft, eben so wohl, wenn gleich in ungleich geringerem Grade, schmerzhaftige Entzündung hervorbringt, als die mit dem Schlangengifte bestrichenen Pfeilspitzen der Scythen und Tataren. Überhaupt aber scheint der Grundstoff des Insektengifts alkalischer Natur, äusserst flüchtig und geschickt zu seyn, die Trennung der feineren Organisation, die Schwächung oder gänzliche Aufhebung des auf die Integrität dieser Organisation gegründeten Gegenwirkungsvermögens, oder eine unsichtbare, innere Zerstörung und den schnellen Übergang der festen und flüssigen Theile in Fäulniß zu bewirken.

Nach den verschiedenen Verletzungsarten der Insekten und Würmer können auch die sie begleitenden Folgen oder Zufälle leicht unterschieden werden. Die mechanische Verletzung beschränkt sich blos auf etwas augenblicklichen Schmerz, leichte Röthe und Jucken, kleine Sugillationen, vielleicht etwas Bluten, eine leichte entzündliche Geschwulst und Eiterung von dem in der Wunde zurückgelassenen, mit Widerhaken versehenen Stachel, welcher als fremder Körper reizt und ein Zuströmen der Säfte veranlaßt. Viele Insekten werden durch diese mechanische Verletzungsart blos lästig und beschwerlich, andere aber bey derselben durch die Mittheilung eines fremden Gifts gefährlich. Es ist nemlich manchen Insekten und vörzüglich dem Geschlechte der Fliegen eigen, sich von allerley faulenden Substanzen und sogar von verschiedenen Ausschlagsmiasmen der Menschen und Thiere zu nähren und diese dann wieder auf gesunde Menschen abzusetzen. Hierdurch sind sie aber im Stande verschiedene Krankheitsstoffe, z. B. das Scharlach- das Masern- das Pockengift etc., in die von der herrschenden Epidemie entlegenen Gegenden und in die sorgfältigst bewachten Isolirhäuser zu bringen.

Was

Was die theils örtlichen, theils allgemeinen Zufälle der chemischen Verletzung betrifft, so geben Insektenstiche sehr häufig Veranlassung zur Rose. Diese ist aber aus der unbedeutenden Stichwunde, die oft die feinste Nadelspitze an Feinheit übertrifft, schwerlich allein zu erklären, wenn wir nicht eine chemische Schärfe annehmen, welche die Insekten zugleich mit in die Wunde flössen. Nicht selten entstehen auch Blasen und Geschwüre, starkes Anschwellen des ganzen verletzten Theils mit mehr oder weniger entzündlicher Röthe und heftigem Schmerz, oder im Gegentheile Fühllosigkeit und Betäubung des verwundeten Glieds. Hierzu gesellen sich Fieberbewegungen, Blässe des Gesichts, Thränen der Augen, Geschwulst des Körpers, Zittern der Glieder, grosse Abspannung der Lebenskräfte, kalte Schweisse, Ohnmachten, Krämpfe und Convulsionen. Alle diese und ähnliche Zufälle setzen voraus, daß dieses Gift durch die Cirkulation in der ganzen Masse der Säfte verbreitet wird, einen besonderen Reiz auf die Nerven des Herzens und des arteriösen Systems macht, wodurch die inneren Funktionen gestört und in Unordnung gebracht werden. Selten gelangt es jedoch unmittelbar ins Blut, sondern gewöhnlich erst mittelst der Saugadern, wie das Anlaufen der lymphatischen Drüsen an denjenigen Stellen beweist, durch welche das Gift seinen Weg nehmen muß, um in den Brustgang und von diesem ins Herz gebracht zu werden.

Unglücklich und beklagenswerth würden die Bewohner solcher Gegenden seyn, wo gefährliche Insekten vorzüglich einheimisch sind, wenn die Wirkung sowohl der chemischen, als mechanischen Verletzung, nicht relativ wäre, und, wie die Wirkung der anerkanntesten Gifte, nicht gewisse Ausnahmen nach gewissen Umständen machte. Die besondere Betrachtung dieser Umstände scheint mir ein Gegenstand von vorzüglicher Wichtigkeit zu seyn, weil sie alleine nur im Stande sezt, die vielfältigen Widersprüche zu vereinigen, welche bis jezt noch die Meinungen in Beziehung auf die Schädlichkeit der Insekten theilen. Man kann dabey sowohl auf das verletzende Insekt, als auf den verletzten Menschen besonders Rücksicht nehmen.

In Beziehung auf das Insekt macht das Klima einen wesentlichen Unterschied. Die Hitze desselben vermehrt seine Wuth und schärft sein Gift, daher die Folgen

sei-

seiner Verletzung immer nachtheiliger um den Äquator, als in den davon entlegenen nördlichen, und südlichen Ländern sind. Wir finden dieses bey Insektenarten eines und desselben Geschlechts bestätigt, welche gleiche Organisation mit denjenigen haben, die in warmen Gegenden sehr gefürchtet werden, es aber weniger oder gar nicht in kälteren Erdstrichen sind. Dieses ist z. B. der Fall, bey den Skorpionen, bey verschiedenen Spinnen und vorzüglich bey den Taranteln, und derjenige macht offenbar einen Fehlschluß, welcher alle diese Insekten für unschädlich erklären will, weil er sie bloß in einem Lande kennen zu lernen Gelegenheit hatte, wo das kältere Klima sie unschädlicher zu machen pflegt.

Beynahe ähnliche Erscheinungen liefert die Jahreszeit und die besondere Beschaffenheit der Witterung. Im Winter, bey kühlem Wetter überhaupt, sind die Folgen der Insektenverletzungen immer weniger bedeutend, und ihr Gift oft ganz unwirksam, wie wir z. B. unten bey den Skorpionen sehen werden. Im Sommer aber und bey heisser Witterung pflegen die Stiche der Insekten viel empfindlicher zu seyn, unfehlbar, weil durch die Entziehung wässricher Feuchtigkeiten, ihr Gift geistiger, erhöhter, schärfer wird, und die Wärme vielleicht auch eine reichlichere Absonderung desselben begünstigt. Die Biene, dieses, bey Gelegenheit ihrer ökonomischen Benutzung, auch in dieser Rücksicht am meisten beobachtete und gekannte Insekt, dient hier offenbar zum Beweise, wie ihre Naturgeschichte in der Folge lehren wird. Verschiedene Insektenarten sind jedoch weniger schädlich bey grosser Dürre, als bey schwülem Regenwetter, welches ihren Begattungstrieb, ihre Vermehrung und durch diese die Verfolgung der Menschen ausserordentlich begünstigt.

Ein wichtiger Umstand, der wohl zu den meisten Trugschlüssen über die Nichtgiftigkeit gewisser Insektenverletzungen Gelegenheit gegeben hat, ist die Erschöpfung des nöthigen Giftvorraths. Alle giftige Insekten führen nemlich nur eine bestimmte Menge ihres schädlichen Safts bey sich, wie verschiedene durch die Grösse ihrer Giftbehältnisse offenbar zu erkennen geben. Ist dieser Vorrath nun durch vorhergegangene, mit Giftergiessungen verbunden gewesene Verletzungen erschöpft; so können den kurz darauf Verletzten nichts als die Folgen der mechanischen Verletzung, sie bestehe nun in einer gekneipten oder in einer Stich-

Wun-

Wunde, treffen. Hat sich aber dasselbe Insekt wieder erholt und neuen Vorrath gesammelt, so ist es wieder zur chemischen Verletzungsart fähig.

Schwerlich kann man auch wohl der Beschaffenheit der Nahrung, die das Insekt vor der Verletzung genossen hat, allen Einfluß absprechen. Hat es vorher etwas Giftiges berührt oder gekostet, sich auf giftige Pflanzen, auf Leichname an pestilenzialischen Krankheiten, und während einer contagiösen Constitution der Witterung Verstorbener niedergelassen; so kann sein sonst wenig schädlicher Stich oder Biss, dennoch so übel ablaufen, daß sich der verwundete Theil stark entzündet und ganz ungewöhnliche Zufälle nachfolgen.

Nicht weniger macht der Hunger des Insekts einen grossen Unterschied in den Folgen der Verletzung. Vorsetzliches Fasten und Mangel der Nahrung theilt allen thierischen Säften eine gewisse Schärfe mit, und warum sollten die Insekten hiervon eine Ausnahme machen? *Redi's* unten bemerkte Versuche mit Skorpionen lassen in dieser Rücksicht wenigstens für dieses Insektengeschlecht, keinen Zweifel übrig.

Absichtliche Reizung zum Zorn und Störung ihrer Triebe setzt alle Insekten in ungewöhnliche Wuth und macht ihre Verletzung doppelt schädlich und gefährlich. Man mag sie nun beym Aufsuchen und Genusse der Nahrung, bey der Äusserung ihrer Kunsttriebe, oder zu der Zeit, wo sie der Begattung nachhängen, beunruhigen; so wird die Schärfe ihres eigenthümlichen giftigen Safts erhöht, und selbst ihr sonst milder Dauungssaft so verändert, daß seine Ergiessung die Merkmale der Giftigkeit auf der Haut zurückkläßt. Vorzüglich ist dieses der Fall in der kurzen Periode, wo der Begattungstrieb die Säfte der Insekten in einen gewissen Orgasmus setzt, der sie überaus nachtheilig für die empfängliche Haut des Menschen macht.

Aber auch von Seiten des Menschen können gewisse Umstände obwalten, die die Wirkung der Insektenverletzung verschieden modificiren, und mithin über die Schädlichkeit derselben sehr verschiedene Resultate geben. Das Alter des Verletzten verdient in dieser Rücksicht vorzüglich in Betrachtung gezogen zu werden. Kleine Kinder und wohlgenährte, gesunde Menschen von mittlerem Alter scheinen von solchen Verletzungen weniger zu leiden, als junge Leute beyderley Geschlechts,

schlechts, welche mannbar zu werden anfangen, deren Nerven gewöhnlich reizbarer, deren Säugadersystem vorzüglich thätig, und deren Ausdünstung mit anlockenden flüchtigen Saamentheilchen geschwängert ist.

Eben so wenig ist der Geschlechtsunterschied gleichgültig anzusehen. Weibspersonen werden ungleich häufiger von Insekten verfolgt und gefährlich verletzt, als Mannspersonen, wozu ihre an sich feineren und reizbareren Nerven, ihr an sich zarteres Hautgewebe, ihre grössere Neigung zu erysipelatösen Hautentzündungen, und die periodische Kränklichkeit und Receptivität für pathologische Einwirkungen überhaupt beyträgt, welche die monatliche Reinigung, die Schwangerschaft, die Milchabsonderung und der Säfteverlust in der Saugzeit zu Folgen haben.

Überaus viel kommt ferner bey Beurtheilung der Insektenverletzungen auf die körperliche Constitution und kränkliche Erregbarkeit an. Das Insektengift gehört überhaupt unter die hitzigen Reizmittel, welche nicht nur die Nerven, sondern auch das arteriöse System in Thätigkeit setzen. Daher bey denjenigen Personen, die viel Muskelkraft und Irritabilität des arteriösen Systems und mithin eine grosse Empfindlichkeit gegen erhitzende Reize haben, Insektenverletzungen vorzüglich gefährlich sind, Erhitzungen, Congestionen und Entzündungen veranlassen. Nicht minder laufen aber diejenigen Gefahr, die an besonderen Kakochymien leiden. Schon eine unbedeutende Stich- oder Schnittwunde macht bey diesen oft eine starke und lang anhaltende Eiterung, etwas Zupfen an einer Warze, ein leichter Druck oder Stoß an einer Drüse, krebsartige Verhärtungen und Geschwüre. Ganz unbedeutende Insektenverletzungen sind daher nicht weniger im Stande bey solchen Personen die übelsten Folgen, and nicht selten Geschwüre zu veranlassen, welche schwer oder nie eine Heilung annemen. Diese üble Mischung der Säfte hat gemeiniglich eine eigne Reizempfindlichkeit der dabey oft täuschenden, derb und fest aussehenden Haut zur Folge, welche nicht selten schon auf den äusserlichen Gebrauch ölichter und harzichter Mittel, der Pflaster und Salben, noch mehr aber vom Saft des *Cortex Mezerei*, des *Rhus Toxicodendron*, vom Gifte der Canthariden, vom Stiche und Bisse anderer Insekten aufschwillt, sich entzündet, heftigen Schmerz und eine Menge anderer Zufälle nach sich zieht. Im Durch-

schnitte

schnitte scheinen auch Insektenverletzungen mehr magere, als fette Menschen zu treffen. Die meisten Insekten sind blutgierig, und finden, da sie die tiefer liegenden blutführenden Gefäße mit ihrem Stachel nicht erreichen können, kein Behagen am ölichten Serum der Fetthaut. Ferner sind Personen, welche keinen Überfluß vom Blute haben, für Insektenvergiftungen empfänglicher, als vollblütige Menschen, weil Vollheit und Überladung der Blutgefäße der aus dem Lymphgefäßsystem ankommenden Feuchtigkeit und mithin der Absorption des Gifts selbst Hindernisse setzt.

Bekanntlich sind die Insekten mit den feinsten Fühl- und Geruchsorganen versehen und werden daher durch nichts mehr, als durch die flüchtigen, riechbaren Stoffe der Ausdünstung herbeygezogen. Je alkaliscirender diese sind, desto anlockender werden sie für alle Insektenarten, je mehr sie sich hingegen der sauren Beschaffenheit nähern, desto weniger. Daher kommt es, daß Personen, welchen ein saurer Schweiß eigen ist, selten oder nie von Insekten verfolgt werden, dahingegen die eigene, widerwärtige, faulichte, oft einen dem Katzenurin ähnlichen Geruch verbreitende Atmosphäre anderer bewirkt, daß sie sich vor den Verfolgungen der Insekten nicht retten können. So wie aber die specifische Ausdünstung des ganzen Körpers bey manchem Menschen, die Insekten zu Verletzungen verleitet; so geschieht dieses besonders noch durch den anlockenden Duft oder Hauch, einzelner Theile. Man bemerkt in so ferne, daß die Insekten mehr dem Munde zueilen, besonders bey Personen, von deren Lippen sich ein alkaliscirender Geruch, ein skorbutischer Fötor verbreitet, daß die Öffnungen der Nase, der Ohren, des Afters, die weiblichen Schamtheile, daß die Füße solcher Personen, die durch ihren modernden Fußschweiß sich und anderen lästig werden, diejenigen Stellen und Theile des menschlichen Körpers sind, welchen die Insekten vorzugsweise nachstreben.

Noch verdienen aber einzelne Stellen der Oberfläche des ganzen Körpers in Rücksicht der Lymphgefäße, der Nerven und der örtlichen Beschaffenheit der Haut in Betrachtung gezogen zu werden, um von den Nachtheilen der Insektenverletzungen richtig urtheilen zu können. Was die Lymphgefäße oder Saugadern betrifft, so haben diese die besondere Bestimmung, keiner auf der leicht verwundeten

deten Haut angebrachten Materie den Übergang ins Blut zu verstatten, ohne von ihnen gleichsam geprüft, und durch die enthaltene Lymphe abgestumpft und gemildert worden zu seyn. Die grosse Reizbarkeit ihrer Mündungen hält daher im gesunden Zustande, den Zutritt jeder scharfen, giftigen Feuchtigkeit, und mithin auch das Insektengift von den Nerven ab. Sind aber diese Gefässe zerrissen, gequetscht, und überhaupt in dem Zustande einer gewissen Atonie; so findet der in sie gebrachte Giftstoff schon weniger Hindernisse in die Masse des Bluts zu gelangen. Wird dieser aber vollends unmittelbar in verletzte Blutgefässe gebracht, so findet keine Läuterung und Milderung desselben mehr statt, sondern er gelangt vermisch mit dem Blute in seiner völligen Causticität zum Herzen. Hieraus läßt sich nun der ganz verschiedene Erfolg erklären, den das Insektengift bey erfolgter Absorption, und im Gegentheile bey unmittelbarer Vermischung mit der Blutmasse hervorbringen muß. Eben so verschieden muß er aber seyn, wenn die Verwundung unbedeutende Hautnerven, oder beträchtliche Nervenäste und Plexus, wenn sie schwielichte, oder weiche und zarte Stellen der Haut trifft, an welchen Gefässe und Nerven mehr bloß liegen; denn je empfindlicher der gestochene Theil ist, desto stärker ist der Reiz, desto grösser wird die Geschwulst und desto schlimmer werden die Folgen.

Es ist der Vorsicht gemäß, die uns gerade verletzenden Insekten nicht auf der Haut zu verscheuchen oder zu zerschlagen, weil viele, indem sie genöthiget werden, sich schnell loszureissen, ihren mit Widerhaken versehenen Giftstachel, welchen sie ungestört leicht wieder entwickelt und losgewunden haben würden, in der Wunde zurücklassen, und nun erst ihr schädliches Gift ergiessen; andere aber, welche ganz Gift sind, durch die Zerquetschung, mit der ganzen Masse ihrer gefährlichen Feuchtigkeit unsere Haut verletzen, wodurch nothwendig alle Zufälle weit schlimmer und gefährlicher werden müssen. Bey der Behandlung der Verletzungen selbst verdient aber im allgemeinen bemerkt zu werden, daß örtliche Mittel unstreitig den grössten Nutzen leisten, weil sie das von den Saugadern aufgenommene Gift zunächst verfolgen, zerstören und unwirksam machen, ehe es noch ins Blut und in die Masse der Säfte übergegangen ist. Sie sind daher im Anfange der einzige und kürzeste Weg zur Heilung und innerliche Mittel ohne sie
völ-

völlig fruchtlos. Öle und Fettigkeiten, welche verschluckte Gifte im Magen und Darmkanal einwickeln und abstumpfen, leisten in so ferne auch äusserlich angewandt, durch die Resorption die vortheilhafteste Wirkung. Sie heben die entzündliche Spannung und den Schmerz und sind bey leichten Insektenverletzungen zur Heilung alleine hinreichend, völlig fruchtlos aber dann, wenn das Insektengift einmal in die Masse der Säfte übergegangen ist. Dennoch darf auch in diesem Falle die äussere Behandlung der Wunde nicht vernachlässiget werden, um wo möglich durch dieselbe dem resorbirten Gifte einen Ausweg zu bahnen. Tiefes und starkes Schröpfen derselben, Auflegen der Blasenpflaster und Unterhaltung der Eiterung durch Digestivsalben, sind daher bey gefährlichen Verletzungen unentbehrlich. Innerlich dienen in leichteren Fällen gelinde schweifestreibende und schmerzlindernde Mittel, z. B. Hollunderthee mit Sydenhams Laudanum, in schwereren mit starker Entzündung und heftigem Fieber verbundenen Fällen aber antiphlogistische Mittel und Aderlassen. Die meisten Schriftsteller empfehlen noch den innerlichen und äusserlichen Gebrauch des flüchtigen Laugensalzes, und allerdings läst sich von seiner fäulnißwidrigen Kraft viel erwarten, da die Wirkung des Insektengifts wahrscheinlich so gut, als die Wirkung des Schlangen- und Viperngifts, gegen welches dieses Salz seine treffliche Wirkung vorzüglich bestätigt hat, in einer starken, zunächst an die Fäulung gränzenden Auflösung der Säfte besteht. Noch mehr aber müssen unfehlbar die mineralischen Säuren leisten, wenn sie nach *Reichs* Vorschrift in starker Quantität angewandt werden.

Von der Behandlungsart der Würmerverletzungen läst sich im Allgemeinen so wenig sagen, wie von ihrer Verletzungsart und den Zufällen, welche sie zu erregen pflegen, da sie beynahe so verschieden, wie ihre Arten selbst und ihre Angabe daher mehr für ihre besondere Geschichte, als für eine Einleitung geeignet ist.

Entomologie.

Entomologie

Erste Abtheilung.

Geschichte derjenigen Insekten, welche ausschliesslich auf dem menschlichen Körper leben, und sich nur auf demselben fortpflanzen können.

Unter den Insekten verdienen wohl diejenigen unsre erste und vorzüglichste Aufmerksamkeit, für welche unser Körper selbst eine Welt ist, auf dessen Oberfläche sie entstehen, sich nähren, fortpflanzen und endlich ihren Untergang finden. Sie sind eigentlich diejenigen, die durch ihre Überhandnahme den Menschen am meisten herabwürdigen, aber eben hierdurch ihre wahre Bestimmung an den Tag legen, ihn, als das edelste Geschöpf, auf die Cultur seiner Oberfläche aufmerksam zu machen, um nicht durch Vernachlässigung derselben zu den unedelsten herabzusinken. Wären sie uns unbedingt und beständig in Menge zugetheilt, so würde nichts räthselhafter, als unsere irdische Existenz seyn. Unablässige Reize und schmerzhaftige Gefühle, würden uns gefühllos gegen alles machen, was ausser uns ist. Zum Glücke für die Menschheit ist aber die Zahl dieser Insekten selbst sehr geringe und beschränkt sich bloß auf fünf, zur Zeit bekannt gewordene Arten.

I. Die Aussatzfliege. Tab. IV. Fig. 2. — 3.

Musca leprae, atra nitens, antennis pedibusque albis, oculis rufo inauratis. Linn. Syst. Nat. Edit. Gmel. XIII. Tom. I. Pars V. p. 2849. n. 91. — Habitat in Nigritarum Americae Elephantiasi, pediculo minor, abdomine subtus basique albo.

Arstaei Cappad. Opera omnia. Lugd. Fol. 1735. Lib. II. Cap. 13.

Aeginetae de Compos. medicam. per gener. Lib. IV. C. 10.

Borelli observ. med. Cent. II. Obs. 48.

Calmeti, Dictionaire historique de la Bible. Tom. II. p. 478. und desselben Biblische Untersuchungen von Mosheim. Unters. 12. S. 162.

Celsi de Medicina Lib. V. Cap. 28. Sect. 17. de impetiginis speciebus.

Fabricii Mantissa Insectorum. Tom. II. p. 347. n. 60.

Galleni Lib. de tumoribus praeter natur. Cap. IV. Hauptmanni A. Epistola praeliminaris, tractatui, de viva mortis imagine, mox edendo, sacrata. Francof. 1650.

Langii, Christian. Pathologia animata.

Linnaei, C. Diss. Exanthemata viva (Resp. Nyander) Upsaliae 1757. Ejusd. Diss. de Lepra (Resp. Uddmann) 1765. Ejusd. Rariora Norvegiae (Resp. H. Tonning) 1768. Amoenitates academicae Vol. V. p. 103.

Martin, S. Kgl. Vetensk. Acad. Handl. 1760. p. 306, 308, 311.

Me.

Medical Observations and Inquiries by a Society of Physicians in London 1757. Obs. XIX. p. 201.

Murray, J. A. de Vermibus in lepra obviis. Gotting. 1769.

Müllers Linneisches Natursyst. der Insekten II. Band. S. 973 n. 91. *Musca leprae*, der Aussatz.

Plateri, F. Praxeos medicae Tom. II. Cap. 17. p. 554.

Pryssonel S. Philosophical Transactions Vol. I. Part. 7. for the Year 1757. Obs. 7. An account of a

Visitation of the Leprous Persons in the Isle of Guadalupe.

Sennerti Lib. V. Part. II. Cap. 11.

Schwammerdamms Bibel der Natur. Leipzig 1752. S. 276. — 286. Tab. XLIII. von der Zergliederung des Käsewurms und den Fliegen, die daraus erwachsen.

Steeneyet, Diss. de ulcere verminoso. L. B. 1698 und Bidloi Oper. omn. Icon. p. 18.

Ström, H. Physikog oekonomisk Beskrivelse over Fogderiet Sundmør in Norge.

Unreine Geschwüre aller Art, welche der Einwirkung der freyen Luft und des sie erfüllenden Insektenheeres, vorzüglich in der wärmern Jahrszeit, überlassen werden, gehören zu den gewöhnlich ekelhaften Herbergen gewisser Maden oder Insektenlarven. Dieses ist eine schon den alten Griechen bekannt gewesene Erfahrung, deren ich unten, bey Gelegenheit der uns nur unter gewissen Umständen nachtheilig werdenden Fliegen, noch besonders gedenken werde. Aber auch *Gallen* und *Aegineta* kannten sie, und unter den Neuern handeln hiervon noch besonders *Hauptmann*, *Lange*, *Plater*, *Sennert* und *Borellus*, vorzüglich aber *Steeneyet*, der die bey jenen Schriftstellern mangelnde genaue Beschreibung dieser sogenannten Würmer, nicht nur ersetzte, sondern auch durch Abbildungen versinnlichte, welche zugleich ihre Verwandlung in Puppen und Fliegen darstellen. Wie noch jezt, zog man auch damals viel zu allgemeine Folgen für die praktische Heilkunde aus einzelnen Beobachtungen, und sah, weil man nicht blos in unreinen Geschwüren und Wunden, sondern auch in verschiedenen Hautausschlägen, Maden und Insekten gefunden hatte, letztere nun als Ursache der meisten Krankheiten an, welche die Annahme jedes Miasma überflüssig machte. Selbst der große *Linne* und viele seiner Zeitgenossen, traten dieser Meinung bey, erhöhten ihre Wahrscheinlichkeit zur Gewißheit durch die Autorität, welche sie sich durch ihren Forschungsfleiß verschafft hatten, und nun entstanden nicht nur alle Ausschläge, sondern auch die Lustseuche, die Pest und eine Menge anderer Krankheiten von Würmern und Insekten. Allein die Verschiedenheit der in verschiedenen Hautausschlägen gefundenen Insekten, berechtigt nicht, sie als Ursache, sondern vielmehr als Folge zu betrachten. Nicht jedes der sich von scharfen, gährenden und faulenden Substanzen nährenden Insekten, findet überall sein Wohlbehagen, wo Gährung und Fäulniß ist; sondern der verschiedene Grad dieser Gährung und Fäulniß wird für verschiedene Arten derselben besondere Lockspeise. Es kann daher in besonderen Hautgeschwüren ein besonderes Insekt ausschließlich seine Nahrung

fin-

finden, ohne übrigens den geringsten Antheil an der eigenen Form und Bösartigkeit derselben zu haben, so wie der Nahrungstrieb anderer von frischen und unverdorbenen Substanzen lebenden Insekten, ebenfalls in der Auswahl keine Gleichgültigkeit äussert.

Diese Bewandniss hat es ohnfehlbar mit dem Insekte, welches in dem arabischen Aussatz entdeckt worden ist. Die Bewohner Arabiens werden nemlich von einer Hautkrankheit geplagt, deren schon *Moses* gedenkt, und welche sich durch die Bösartigkeit ihrer Zufälle von der *Lepra* der Griechen wesentlich unterscheidet, daher auch zum Unterschied *Lepra arabum* oder *Elephantiasis* genennt wird. Letztere Benennung erhielt sie wegen der besonderen Ausartung der Haut in dieser hässlichen Krankheit, welche durch die Härte, Rauheit, Unempfindlichkeit, Runzeln und Knoten, der Elephantenhaut gleichzukommen, an den knotigen Stellen aber noch besonders bösartige Geschwüre zu bilden pflegt. Eben diese Krankheit herrscht auch unter den Negern im mittäglichen Amerika, und *Rolander* hat daselbst zuerst, wahrscheinlich in den Geschwüren dieser Hautkrankheit, eine besondere Fliege entdeckt, welche kleiner als eine Laus ist, übrigens, ausser den weissen Fühlhörnern, Füßen und der weissen Fläche des Unterleibes, glänzend schwarz aussieht, deren Augen einen Goldglanz haben und deren Rüssel zu beyden Seiten gezähnt ist. Doch kann man aus der unvollständigen Erzählung, die *Linne* von dieser Entdeckung macht, nicht mit Gewissheit schliessen, ob es die Fliege selbst, oder nur ihre Made ist, die in jenem Aussatze nistet? Wahrscheinlich ist es letztere, da er mit *Martin* die in Norwegen vorkommende *Lepra* ebenfalls einer Wurm-art zuschreibt, die zwischen den Gordien und Askariden das Mittel halten soll, und daselbst *Queise* genannt wird; sicher aber eben sowohl Made oder Insekten-larve ist, als es die Würmer waren, welche in den medicinischen Beobachtungen einer Gesellschaft Londner Ärzte, für die Bewohner des Aussatzes gehalten werden, und die zahllosen Leiden des, wahrscheinlich am arabischen Aussatze krank gewesen, Hiobs vermehrten.

Murray's Beobachtung giebt uns über die wahre Beschaffenheit dieser Würmer einen wichtigen Aufschluß. Er hatte die in Teutschland seltene Gelegenheit, einen Menschen, der den arabischen Aussatz hatte, zu behandeln, und mithin Krankheit und Würmer näher kennen zu lernen. Letztere, welche sehr wohl mit bloßen Augen gesehen werden konnten, kamen erst drey Tage vor dem Tode des Kranken, zum Vorschein, wo die Krankheit, zu Ende des Augusts und also zu einer Jahreszeit, wo es noch die meisten Fliegen giebt, ihre grösste Höhe erreicht hatte,

hatte, und die Verderbnis der Säfte aufs höchste gestiegen war. Sie waren alsdann nicht nur an den Füßen in der GröÙe der Käsemaden, sondern auch an der mit Gauche besudelten Bettdecke in Menge sichtbar. Doch fühlte der Kranke nichts von dem Kriechen und Nagen des zahllosen Madenheeres, von deren Gestalt und übrigen Beschaffenheit uns *Murray* folgende Beschreibung liefert.

Sie (Tab. IV. Fig. 2. 3. 4.) hatten nach dem verschiedenen Zeitpunkt ihrer Entstehung, eine verschiedene Länge, und die größten erreichten höchstens einen halben Pariser Zoll. Ihre Farbe war anfänglich grau, und wurde, wahrscheinlich aus Mangel der Nahrung bey der Untersuchung, allmählich blaßgelb, ihre Gestalt konisch und ihr Körper nach seiner ganzen Länge in elf Ringe getheilt. Das spizige Ende war mit einem schwarzen, nach unten gebogenen Haken (versehen (Fig. 3. und 4. a.) welcher in einer Scheide verborgen war, die die Made, wenn sie berührt wurde, nebst dem Haken in den nächsten Ring zurückzog. Dieser Haken schien theils zur Zerstückelung und Aufnahme der Nahrungsmittel, theils dazu bestimmt zu seyn, sich bey dem Kriechen damit befestigen, und dann den übrigen Körper vorwärts nachziehen zu können. Ausserdem waren am vorderen Ende noch die zwey hervorragenden Mündungen der Luftröhrenäste (c. c.) zwischen dem ersten und zweyten Ring durchs Mikroskop sichtbar. Das stumpfe oder hintere Ende der Made (Fig. 3. b.) war an dem Theil, der an die Rückenseite (e.) grenzte, convex, an dem sich an die Bauchseite anschliessenden Theil aber (g.) concav. Auf jenem erhabneren Theil befanden sich die hinteren Enden der Luftröhren, als zwey braune neben einanderstehende Hervorragungen (Fig. 3. und 4. e. e.), welche der Wurm nach Belieben hervorstrecken und einziehen konnte. Die Luftröhren oder Respirationswerkzeuge selbst (d. d.) bestanden in zwey weissen geschlängelten, nach den Aussenseiten Ästchen verbreitenden Gefäßen, welche längs der Rückenfläche sichtbar waren. Ausser diesen lies die feine, durchsichtige Haut die tiefer liegenden Eingeweide in dunkleren Flecken durchschimmern. An der Bauchseite ragte die Haut immer zwischen zwey Ringen etwas hervor (Fig. 3. f. f. f.), so daß man von der Seite gespaltene FüÙe zu sehen glaubte. Auch waren diese Falten wirklich Stellvertreterinnen der FüÙe, und halfen dem Wurm im Kriechen fort, wobey er viele Fertigkeit äusserte und sich oft schnell auf die Seite wälzte.

Murray glaubte nun, daß diese Maden aus den Eyern der Stubenfliegen gekrochen wären, welche sich immer in ungeheurer Menge um den Kranken aufhielten, und ihn so sehr plagten, daß er sich genöthigt sah, Fliegengift bey seinem Bette aufstellen, und da dieses ihre Abtame nicht hinreichend beförderte, noch einen

einen Knaben mit dem Fliegenwedel dieses Ungeziefer verscheuchen zu lassen. Allein die von ihm beschriebene Made weicht zu sehr von der Fliegenmade (Tab. III. Fig. 31.) ab, als daß ich seiner Meinung beytreten könnte, kommt aber so sehr mit der Larve der Quarkfliege (*Musca putris*) überein, daß ich sie um so mehr für eine und dieselbe halte, da ich letztere Fliege immer sehr häufig in Gesellschaft der Stubenfliegen angetroffen habe. Ich trage daher kein Bedenken, die Beschreibung und Abbildung dieser Made und Fliege nach *Schwammerdam* noch beyzufügen.

Die Larve der Quarkfliege oder der Käsemade (Tab. IV. Fig. 5.) hat, so wie jene des *Murray*, zwölf Abtheilungen oder Ringe. Der erste Ring (*a.*) macht eigentlich den aus zwey gehörnten Hervorragungen bestehenden Kopf aus. Zwischen diesen liegt der Mund, an welchem zwey schwarze kleine Nägel oder Klauen stehen, welche zugleich die Stelle der Füße, der Klauen und Zähne vertreten. Auf dem zweyten Ring ragen die Mündungen der Luftgefäße (*c.*) vor, deren zwey längs des Rückens der Made fortlaufende Haupttröhren (*d. d.*) mit ihren öfters anastomosirenden und dadurch mehrere Inseln bildenden Nebenzweigen, durch die dünne Haut schimmern. Am zwölften Ring (*b.*), der noch verschiedene Wärzchen oder Knöpfchen hat, endigen sich aber jene Luftröhren mit zwey ähnlichen Hervorragungen, wie die bey ihrem Anfange auf dem zweyten Ringe befindlichen sind. Schikt sich die Made zum Springen an, worinnen sie eine besondere Fertigkeit hat, so faßt sie mit ihren Kopf- oder Mundhäkchen das Schwanz-Ende (Fig. 5.), wodurch sie wie ein Reif gebogen erscheint, und schnellt sich, indem sie sich wieder ausstreckt, fort.

Bey ihrer Verwandlung verlassen diese Maden den faulen Käse und erscheinen nun in Puppengestalt (Fig. 6. *a.*), welche unter dem Mikroskop (*b.*) Kopf, Leib und die anliegenden Flügel der künftigen Fliege, sehr deutlich darstellt. Diese (Fig. 7. *a. b.*) verläßt nach zwölf Tagen die Puppenhülle, ist grau, ziemlich klein, aber doch noch immer viel größer, als eine Laus. Das Vergrößerungsglas macht die 2 getheilten Fühlspitzen am Kopf (Fig. 8.), so wie die hinter ihnen stehenden ziemlich großen, netzförmigen und röthlichen Augen deutlicher. Die Brust ist braun und fällt ins Schwarze. Das vorderste Paar der an ihr eingelenkten Füße ist beynahe ganz, das mittelste nur am zweyten Gliede schwarz, an den zwey letzten Gliedern aber dunkelbraun. Das hinterste Paar gleicht dem ersten. Alle sind mit borstigen Härchen besetzt und am Ende mit zwey Krallen versehen. Die zwey Flügel haben schwarze Rippen und feine Härchen in ihrem ganzen Umfange.

fange. Hinter denselben stehen an der Brust zwey Flügelkölbchen. Der Hinterleib ist in sieben Ringe getheilt, der Farbe nach der Brust gleich, nemlich glänzend dunkelbraun. Das Weibchen ist größer als das Männchen, legt seine Eyer mittelst seines Legrohrs in die feinsten Ritzen der Käse, oder in andere denselben ähnliche, faulende, thierische Substanzen, und aus den Eyern kriechen die jungen Maden schon 24 Stunden, nachdem jene gelegt worden sind, aus. Da diese Maden, nach *Linnés* Beschreibung der Aussatz - Fliege, etwann die Größe der Flohmaden (Tab. VI. Fig. 4.) haben müßten, wenn sich ein Insekt, das kleiner als eine Laus ist, daraus entwickeln sollte: so bleibt es, ohngeachtet der großen Ähnlichkeit, welche übrigens die Quarkfliege mit der Aussatzfliege hat, dennoch unentschieden, ob die in Teutschland in dem Aussatz nistende Fliege die nemliche ist, welche den amerikanischen Aussatz bewohnt? oder ob die scheinbare Verschiedenheit bloß darinnen liegt, daß die amerikanische Aussatzfliege nicht die Größe der europäischen erreicht? wie dieses der Fall bey einigen andern, in beyden Welttheilen vorkommenden Insektenarten ist.

2. Der Floh des Hautiuckens der Greise. (*Pulex pruriginis senilis*.) Tab. V. Fig. 33—35.

Sommer, J. F. Diss. de Affectibus pruriginosis
Senum. Altdorff 1727. 4.

Willan, R. Die Hautkrankheiten und ihre Be-

handlung, aus dem Englischen übersezt von Friesse, 1. Band, Breslau 1799. Tab. VII. Fig. 3. 4. gr. 4.

Ein neues, von *Willan* entdecktes Insekt, von welchem er aber, bey unterlassener genauerer Untersuchung, keine bestimmten Merkmale angeben konnte. Er fand es in Menge auf der Haut und Wäsche eines an der *Prurigne senile* leidenden Kranken. Man versteht hierunter eine erst im späten Alter vorkommende Hautkrankheit, wobey sich ziemlich grosse, entzündungslose, mit Schorfen vermischte und ein unerträgliches Jucken veranlassende Blätterchen, auf der trockenen, duftlosen Haut zeigen. Hautkleien und Schuppen, als Folgen der mehrmaligen Absonderung und unvollkommenen Wiedererneuerung der vom Ausschlage angegriffenen Hauttheilchen unterhalten, nebst den darunter wahrscheinlich verweilenden Insekten, noch mehr ienen schmerzhaften Reiz, der die Geduld und Gelassenheit des Alters, durch seine Grenzenlosigkeit zu erschöpfen pflegt. Diese Insekten bewegen sich, nach *Willans* Beobachtung, schnell, sind aber wegen ihrer Kleinheit, nur mit Mühe zu entdecken (Tab. V. Fig. 33.). Das Vergrößerungsglas stellte sie in einer Form dar, die ihren Entdecker berechtigte, sie unter
das

das Geschlecht der Flöhe aufzunehmen (Fig. 24.). Ob er aber eben sowohl Ursache hatte sie als Ursache dieser Hautkrankheit anzusehen, und sogar zu vermuthen, daß die *Prurigo formicans*, welche auch jüngere erwachsene Personen befällt, deren Blätterchen aber nicht so groß, wie bey der *Prurigo senilis*, doch mit weit unerträglichern Jucken verbunden sind, von eben diesem Insekte herrühren? überlasse ich dem Urtheile künftiger Forschung und sachverständigerer Kenner.

3. Die Kopflaus. Tab. VII. Fig. 1 — 5, und Tab. XIII. Fig. 15 — 17.

Pediculus humanus capitis, cinereus; thorace abdomineque fascia interrupta nigra marginatis. *Pou humain de la tête*. Degeers, E. Abhandlung zur Geschichte der Insekten aus dem Franz. mit Anmerkungen von Götze. Nürnberg 1775 — 1783 gr. 4. VII. Band. S. 28 und 97 Tab. 1. Fig. 6 — 10.

- Albini a natural history of Spider. Tab. XXXXII.
Aldrovandi de Insect. Lib. V. Cap. IV.
Amoureux Notice des Insectes de la France réputés venimeux. Paris 1789. gr. 8. p. 135 et 272.
Baker, H. Emplotment for the Microscope. London 1753. 8. c. Tab. 17. aen. Tab. XIII. Fig. 4.
Bonanni, Phil. Observatio circa viventia, quae in rebus non viventibus reperiuntur, seu Micrographia curiosa Romae 1691. 4. c. Tab. aen. Fig. 55.
Blumenbachs, J. F. Handbuch der Naturgesch. 8. Aufl. Göttingen 1797. S. 286. *Pediculus humanus*, Griechisch *Φησι*; Engl. *Louse*; Franz. *Pou*.
Cuvier, G. Tableau-élémentaire de l'histoire naturelle des Animaux, à Paris an. 6. (1798) p. 622. *le pou humain*.
Cypriani, J. continuatio historiae animalium a Franzio, Tem. II. p. 3560.
Fabricii Mantissa Insect. II. p. 368. n. 1. System. Ent. p. 804 n. 1. Spec. Ins. II. p. 476. n. 1.
Füßlys Schweizerische Insecten, Zürich 1775. S. 59. n. 1167.
Götze, F. A. C. Geschichte einiger den Menschen, Thieren, Oekonomie und Gärtnerey schädlichen Insekten, aus dem Franz. übersetzt. Leipz. 1787. 8. S. 43 und 85.
Gründelii ab Ach Obs. II. p. 14. Fig. 3.
Heinsius, Dan. Orat. XXXV. admirand. rerum admirabilium p. 134.
Hercules Saxon, Pract. Med. Lib. X. Cap. XIX. p. 811.
Heurnius de Morbis capitis, Cap. IV.
Hooke, R. Micrographia, Lond. 1667. fol. p. 211.
Joblot, L. Observations de l'histoire naturelle faites avec le Microscope à Paris 1754. 4. c. Tab. T. I. Tab. 1.
Journal des Sav. Vers. 1at. I. p. 483.
Isidorus Orig. Libr. XII. Cap. VII.
Kniphof Diss. de Pedic. inguin. §. XXXVII. Tab. I. Fig. A. et Tab. III. Fig. N. T.
Kolbe Beschreibung des Vorgebürgs der guten Hofn. S. 222.
Lederermüllers mikroskopische Gemüths- und Augenergötzung, S. 45. Tab. XXI.
Leeuwenhoek (A. v.) de pediculis, v. Phil. Trans. n. 94. p. 6037. et n. 97. p. 6116. Ejusdem Opera. Tom. III. p. 56.
Lesseri Insecto-theologia, p. 57.
Linnaei Amoenit. acad. Vol. III. de noxa insect. p. 341. — Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. Pars. V. p. 2914. n. 1. *Pediculus humanus* abdomine lobato cinereo, habitat in capite durior magis coloratus. Faun. Suec. n. 1939.
Mouffetti, Th. Insector. sive minimor. animal. Theatrum. Lond. 1634. p. 259 et 264.
Müllers, P. L. St. Linneisches Natursyst. der Insekt. II. Band. S. 1027. n. 1.
Mülleri, O. F. Fauna Fridrichdalina, Lips. 1764. n. 798. Ejusdem Zoologiae Danicae prodromus. Hafn. 1776. n. 2180.
Muralto, J. de, anatome pediculi. V. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. obs. 53. p. 136.
Onomatologia historiae naturalis, Pars VI. p. 223.
Pediculus humanus, die Menschenlaus, Kopflaus.
Pauli, Sim. quadripart. Class. III. p. 299.
Ranchius, F. in opusculis medicis. Lugd. 1627. p. 304.

- | | |
|--|--|
| <p>Redi, F. Opusculor. Pars prior sive Experimenta circa Generationem insector. Amstelaed. 1686. 12. Tab. XVIII. <i>Pediculus ordinarius</i>. Ejusd. Opera Tab. XXV. Rolfincii Epit. Affect. particul. L. III. C. 20. p. 321.</p> <p>Ruyschii Theatr. animal. Pars. V. hist. nat. de Insectis. Lib. II.</p> <p>Sauvages Nosologia methodica edit. Daniel. Tom. V. p. 284.</p> <p>Schaefferi, J. C. Elementa entomologica. Ratib. 1766. Tab. LXXXV.</p> | <p>Schrank's Beyträge zur Naturges. S. 112 n. 1.</p> <p>Schwammerdamms, J. Elbel der Nat. Leipz. 1752. S. 29. Tab. I. und II.</p> <p>Schwenkfeld Theriotr. Siles. p. 548.</p> <p>Sulzers, J. H. abgekürzte Geschichte der Insekten. S. 240. Desselben Kennzeichen der Insekten. Tab. XXII. Fig. 145.</p> <p>Teichmeyer's Instit. Pathol. Pract. p. 431.</p> <p>Tenzels Monath-Gespräche. 1691. S. 332.</p> <p>Watkins exercice du Microsc. p. 31. Fig. 31.</p> |
|--|--|

Das gemeinste und bekannteste Insekt, welches auf dem menschlichen Körper seinen angewiesenen Wohnplatz hat, ist wohl die *Laus*, und von dieser sind ihm drey, nach den verschiedenen Gegenden des Körpers, welche sie bewohnen, verschiedene Arten zugetheilt, nemlich die *Kopf-* die *Leib-* und die *Filzlaus*.

Unter allen ist die *Kopflaus* von den berühmtesten Naturforschern am meisten und genauesten beschrieben und zum Gegenstand der mühsamsten Zergliederung, und mikroskopischen Untersuchungen gemacht worden. Ohne erst einer Verwandlung unterworfen zu seyn, verläßt sie das Ey, zwar nicht in ihrer vollkommenen Gröfse, die sie aber selbst in kurzer Zeit erreicht, doch in ihrer vollkommenen Gestalt, und ist völlig ausgewachsen, zwey Linien lang und eine halbe Linie breit (Tab. VII. Fig. 1.). Ihre Haut erscheint durchs Mikroskop pergamentartig, gleich der Haut des Menschen mit Linien, Furchen und Punkten durchzogen, und überall mit feinen Härigen besetzt. Sie ist so durchsichtig, daß man nicht nur die Luftröhren, den mit Blut und Unrath angefüllten, und daher braunroth, im nüchternen Zustande aber weißgelb, wie der übrige Körper, erscheinenden Magen und Darmkanal (Fig. 2. f. f.); sondern auch ihre peristaltische Bewegung, nach welcher sie sich bald verlängern, bald verkürzen, bald breit, bald schmal werden, deutlich wahrnehmen kann. Dabey hat diese Haut gleichwohl eine besondere Festigkeit, welche veranlaßt, daß die Laus mit einem Knall zerplatzt, wenn sie zerdrückt wird. Ohngeachtet die Farbe des ganzen Körpers milchweiß ist; so geben doch die ohnweit des Randes vom Brustschilde und Hinterleibe geschlängelt durchschimmernden Luftgefäße, den Anschein, als ob die Haut der Kopflaus an den Seiten mit einem dunkleren, unterbrochenen Streif eingefast sey. Doch bemerkt man überhaupt in Rücksicht der Farbe nichts Beständiges, welche sich einzig nach der Verschiedenheit des Aufenthalts zu richten scheint. Denn manche Menschen haben ganz weisse, andere dunkelbraune, und die Mohren schwarze Läuse. Was aber die einzelnen Theile dieser Insekten besonders betrifft; so ist der vorne konische, hinten sphärische Kopf

Kopf, durch einen sehr kurzen Hals mit dem Brustschilde vereinigt. An dem äussern Rand seines breitsten Theils, sieht man zwey schwarze, mit einem weissen Ring umzogne hervorstehende Augen (Fig. 2. a. a.) und vor diesen, ebenfalls an beyden Seiten des Kopfs, zwey fünfgliedrichte, mit den feinsten Härchen besetzte, und sich beständig bewegende Fühlhörner (b. b.) von der Länge des Kopfes. Dieser ist an seinem konischen Ende mit einer kleinen cylindrischen Hervorragung (d.) versehen, welche die Scheide oder der Köcher des spitzigen, hohlen Saugstachels (Tab. XIII. Fig. 15. a. und Fig. 16. a.) ist, den *Leeuwenhök* zuerst entdeckte, und der nur äusserst selten wahrzunehmen ist, da ihn die Laus nicht eher aus der Scheide des Stachels (Fig. 15. b.) hervorstreckt, als bis sie Blut zu saugen beginnt. *Schwammerdam* liefert eine musterhafte Beschreibung dieses Saugstachels, seiner Verbindung mit der Speiseröhre, und den sämtlichen Verdauungsorganen der Laus, und giebt zugleich in seiner Abbildung die Widerhaken (Tab. XIII. Fig. 16. b.) an, welche sie in die Kopfhaut des Menschen einsenkt, um sich damit zu befestigen, daß sie den Stachel nicht nur einstossen, sondern auch bey dem Einziehen des Bluts, frey vor- und rückwärts bewegen kann.

Am Bruststücke (Tab. VII. Fig. 2. f.) sieht man zwischen den Ästen der Luftröhren drey Erhabenheiten auf jeder Seite, und in der Mitte eine schildförmige Vertiefung. Unterwärts befinden sich nahe am Rande desselben die sechs Füße, wovon jeder aus vier kurzen Gliedern besteht. Das letzte Glied, oder das Fußblatt (e. e. e.) ist mit zwey Krallen versehen. Die kleinere ist unbeweglich, die grössere aber beweglich, und sichelförmig gekrümmt, so daß sie über jene zusammengeslagen werden kann. Die Laus ist hierdurch vermögend, sich mit diesen sechs Zangen an den Haaren festzuhalten, und mit ziemlicher Geschwindigkeit auf denselben fortzulaufen.

Der Hinterleib besteht aus sieben Ringen, welche an den Seiten eben so viele, in der Mitte etwas ausgeschnittene Lappen bilden. In den kleinen Ausschnitten dieser Lappen liegen die Mündungen der Lungenröhren. *Schwammerdam* versteht hierunter diejenigen kleinen weissen Gefässe, deren Hauptstämme an verschiedenen Stellen des Körpers mit einem Perlemutterglanze durchschimmern und deren zahllose, unendlich kleine Ästchen nicht nur in der Brust, im Hinterleibe, in den Füßen, sondern auch in den Fühlhörnern wahrzunehmen sind. Sie bestehen, wie die menschliche Luftröhre, aus schmalen, wahrscheinlich ebenfalls knorpelartigen und aus breiteren häutigen Ringen (Tab. VII. Fig. 5.), und sind die Respirationswerkzeuge der Laus.

Der Magenschlund ist eigentlich die Fortsetzung des Saugstachels. Das eingesogene Blut kommt nemlich durch letzteren, hinter der kleinen warzenförmigen Hervorragung des Kopfs, zuerst in den Mund (Tab. XIII. Fig. 15. c.) und dann in den Schlund (d.), oder diejenige Erweiterung des im Saugstachel anfangenden Kanals, welche zwischen und vor den Augen lieget, worauf die Speiseröhre (e.) folget, die das Blut in den Magen leitet. Dieser liegt theils in der Brust, theils im Hinterleibe. Dort bildet er zwey gabelförmige Anhänge, hier ein länglichtes Säckchen, das sich beständig wechselsweise erweitert und zusammenziehet. Die Fortsetzung des Magens ist der Darmkanal, der sich am Schwanzringe in den After endiget.

Was den Geschlechtsunterschied betrifft, so ist es dem *Schwammerdamm* nicht gelungen, diesen zu entdecken. Er fand in allen Läusen Eyerstöcke, die den größten Theil des Hinterleibes einzunehmen pflegen, und wurde dadurch veranlaßt zu glauben, daß die Läuse Zwitter wären. Da aber diese Läuseart so zahlreich an Weibchen ist, daß man auf hundert kaum ein Männchen rechnen kann, so ist es wohl nicht zu bewundern, wenn ihm lauter Weibchen unter die Hände kamen. Diese sind im Ganzen größer, als die Männchen. Ihr Hinterleib ist flacher, breiter und endigt sich am Schwanz-Ende mit einer gabelförmigen Spalte, in deren Mitte sich der After und der Ausgang der Eyerstöcke befinden (Tab. VII. Fig. 2. g.). Die Männchen haben einen breiteren und bemerkbarern Einschnitt zwischen dem Kopfe und dem Bruststücke; ihr Unterleib ist ungleich schmaler, am Schwanzringe nicht gespalten, sondern rund (Tab. XIII. Fig. 17.), und mit einem gewöhnlich unten am Bauch zurückgeschlagenen, nach der Begattung aber nach hinten hervorstehenden Stachel (a. b. b.) versehen, welcher an seiner Grundfläche sehr breit, an seiner Spitze aber braun, hornartig und wahrscheinlich das männliche Geschlechtsglied ist.

Das Weibchen legt ihre, unter dem Namen der *Nüsse* bekannten, kleinen, weissen und länglichten Eyer, gerne auf den Boden des Kopfs, weil sie nur in der feuchten, vom Kopfschweiße begünstigten Wärme gedeihen, auf der Oberfläche des Kopfs, welche der Kälte mehr ausgesetzt ist, aber unkommen. Sie erscheinen unter dem Mikroskope als länglichtrunde, vorne flache und hinten bauchigte Körper (Tab. VII. Fig. 3.), deren von der ausgekrochenen Laus zurückgelassene Hülse einen kleinen, mit einem flachen Deckel versehenen Schlauch (Fig. 4.) ähnlich sieht. Ungeheuer ist die Vermehrung der Läuse durch diese Eyer. Denn nach *Leeuwenhöcks* Beobachtungen legt ein Weibchen in sechs Tagen funfzig Eyer, und behält dennoch eine große Menge im Leibe. Aus diesen gelegten Eyern kommen

men nach sechs Tagen schon die Jungen hervor, welche nach achtzehn Tagen ebenfalls Eyer legen. Auf diese Art können zwey Mütter in acht Wochen Großmütter von zehntausend Läusen werden.

Die Nahrung der Laus scheint hauptsächlich der rothe Bluttheil der Menschen zu seyn, welches man sowohl aus ihrer Farbe nach vorhergegangener reichlicher Sättigung, als auch aus ihren braunrothen Excrementen schliessen kann. Sucht sie diese Nahrung, so biegt sie den Kopf zwischen den Vorderfüssen gegen die Haut und senkt den Stachel in ein Schweißloch. Man bemerkt nun durch eine gute Lupe das eingesogene Blut in einem ausserordentlich feinen Strahl in den Kopf steigen, durch den Magenschlund in den mit seinen Anhängen aufschwellenden Magen gelangen, welcher nunmehr sich mit Nachdruck bewegt und wechselsweise zusammenziehet, im dicken Gedärme aber die Excremente fortrücken, deren sich die Laus bisweilen zu gleicher Zeit entlediget.

Das Einsenken des Stachels veranlaßt vorzüglich die lästige Empfindung des Juckens und Beissens, ausserdem aber das Aufschliessen kleiner Pusteln, die entweder von sich aufbrechen, oder durch das Kratzen aufgerieben werden. In beyden Fällen ergießen sie eine klebrichte Feuchtigkeit, die bald zu kleinen Schuppen vertrocknet, welche bey öfterer Kopfreinigung, sich wie Kleyen abkämmen lassen. Wird aber diese Reinigung unterlassen, so veranlaßt der unter jenen Schuppen stockende Schweiß einen Reiz auf die kleinen Drüsen der Kopfhaut, wodurch eine widernatürliche Absonderung der fettigen Feuchtigkeit dieser Drüsen erfolgt. Es entsteht auf diese Art eine ekelhafte, stinkende, graue und mit Blut unterlaufene Borke auf dem Kopfe, welche die Vermehrung der Läuse ungemein begünstiget, indem diese für ihre Eyer und Excremente in und unter derselben die schicklichsten Lagerstätten finden. Man nennt diese Krankheit die *Kopfläusesucht* (*Phthiriasis capitis*), welche vorzüglich bey Kindern vorkommt.

Was die Ursache der Erzeugung und Überhandnahme der Läuse betrifft, so glaubten unsre, mit der Fortpflanzung der Insekten unbekannten Vorfahren, sie in dem übermässigen Genuß süsser Kastanien und Feigen suchen zu müssen, wahrscheinlich, weil diese bey dem Kauen ein gewisses Knirschen veranlassen, welches der Empfindung nicht unähnlich ist, die das Zerdrücken der Läuse mit dem Nagel für den Gefühlsinn des Fingers hat, woraus sie, nach den damaligen Begriffen von der Entwicklung der Insekten aus allerley thierischen und vegetabilischen Substanzen, zu schliessen sich berechtigt glaubten, daß jene Früchte Läusestoff enthielten, der sich in unserem Körper zu vollkommenen Insekten entwickeln könne. Das

Lächer-

Lächerliche dieser Meinung wird durch das, was von der Fortpflanzung der Läuse und von der Art, wie sie sich in und auf der Kopfhaut einnisten, gesagt worden ist, hinreichend widerlegt. Zu den besonderen, ihre Vermehrung begünstigenden, gelegentlichen Ursachen aber muß bey diesen in Schmutz und Unsauberkeiten, Nahrung und Aufenthalt findenden Insekten, alles gehören, was Schmutz und Unsauberkeit veranlassen kann. Man findet sie daher immer in Menge in kinderreichen Ehen der niedrigen Volksklasse und überhaupt da, wo Zeit und Gelegenheit zur Besorgung der Kopfreinigung fehlt, z. B. bey Soldaten, beym Schiffsvolke, bey Bettlern, Reisenden, Gefangenen, pflegelosen Kranken. Der Mittheilung selbst ist auch der Ordentlichste und Reinlichste ausgesetzt, dessen Verhältnisse und Verrichtungen es nothwendig machen, unter solche Menschen zu kommen. Auf diese Art werden sie oft, und nicht selten statt des Honorars, dem Arzt und Wundarzt bey der gemeinen Volks- und Spitalpraxis, den Geistlichen bey seinen Krankenbesuchen, und den Aufsehern und Wärtern in den Hospitälern zu Theil. Am häufigsten und gewöhnlichsten aber werden sie, als Nüsse und vollkommene Insekten, in den Kämmen der Friseurs von einem Kopfe auf den andern getragen und durch das beständige Beysammensitzen und Zusammenstecken der Köpfe sauber und unsauber gehaltener Kinder, das nothwendige Übel öffentlicher Schulen. Doch scheinen Mittheilung und Mangel der Kopfreinigung nicht allein hinreichend, sondern noch eine gewisse Beschaffenheit der Kopfausdünstung und ein gewisser Grad der Wärme erforderlich zu seyn, wenn sich diese beschwerlichen Bewohner wirklich auf den Kopf erhalten und vermehren sollen. Es giebt Personen, die es sogleich gewahr werden, wenn ihnen auch nur eine einzige Laus auf den Kopf gekommen, dieser auch noch so sehr behaart, und mit Pommade und Puder, welche ihren Aufenthalt noch angenehmer zu machen pflegen, reichlich versehen ist. Sie wird bey diesen Personen wahrscheinlich durch eine eigene widerwärtige Ausdünstung der Haare und Kopfhaut so sehr beunruhiget, daß sie auf den Kopf umherirret und dadurch ihre Gegenwart sogleich verräth, gemeiniglich aber die Haare verläßt, und über die Stirne, die Ohren oder am Halse herabläuft. Im Gegentheile vermehren sich bey andern Personen die Läuse so gerne, daß sie mit allem Kämmen sie nicht zu vertilgen im Stande sind. Auffallend bestätigt dieses die ungeheuere Vermehrung der Läuse im Weichselzopfe (*Plica polonica*), einer vorzüglich den Pohlen, aber auch den Russen und Tartaren eigenen Krankheit, in welcher, nicht etwann von Staub und Schmutz, sondern von einer besondern klebrichten, aus der Kopfhaut schwitzenden Feuchtigkeit, die Haare so sehr zusammengepappt werden, daß

sie Zöpfe oder Stricke bilden. In Rücksicht der Wärme bemerken wir, daß sich die Läuse bey Personen, die den Kopf leicht zu bedecken gewohnt sind, im Winter sehr vermindern, bey andern aber, die ihnen die wohlthätige Wärme der Pelzmützen angedeihen lassen, bey aller Kälte dennoch vermehren. Die Spanier scheinen vorzüglich wegen des gehörigen Wärmegrades von den Läusen geplagt zu seyn. Gleichwohl verlieren sie diese, wie alle Europäer, wenn sie am Tropikus und in Indien angekommen sind, vermuthlich wieder wegen des den europäischen Läusen ungewohnten Wärmegrads, der dennoch, nach Kolbe, den Läusen der Hottentotten überaus angemessen ist. Denn sie vermehren sich bey denselben so ausserordentlich, daß sie von ihnen für ein Geschenk des Himmels angesehen, daher verzehrt und zu einem ihrer Lieblingsgerichte gemacht werden.

In Gözens Geschichte schädlicher Insekten findet man eine Menge Mittel zur Vertilgung der Kopfläuse, welche mehr oder weniger sicher und schädlich sind. Am bewährtesten habe ich, nebst fleissiger Kopfreinigung, immer das Pulver des *Sabadillsaamens* gefunden. Man streuet dieses in die mit etwas Fett oder Pommade ausgesalbte Nachtmütze, damit es nicht auf den Kopf fällt und ein heftiges Beissen veranlaßt. Wiederholt man dieses einige Abende hinter einander, so ist man sicher von allen Läusen befreyet.

4. Die Leiblaus. Tab. XIII. Fig. 14.

Pediculus humanus corporis, albidus totus immaculatus. *Pou humain du corps*. Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. VII. B. S. 28. und 30. Tab. 1. Fig. 7.

Aristotelis Hist. Animal. Lib. V. Cap. XXXII.
Blancardi, Steph. Lexic. Med. ed. noviss. Vol. II. p. 958.

Blondelius de Therm. Aquisgr. Cap. XIV. §. 2.

Borellus, P. Cent. I. Hist. Med. 20. et 313.

Coel. Aurelian. de Phthiriasi.

Castelli Barthol. Lex. Med. p. 569. *Phthiriasi*.

Crüger, D. von einem mit Läusen angefüllten Geschwür im XIV. Th. d. Abh. d. k. A. d. N. f. S. 28.

Daniel. Syst. Aegrit. Pars II. p. 554.

Fabricii Spec. insect. Tab. II. p. 476. *Varietas capitis durior, coloratio, vestimentorum laxior, magis cinerea*. Syst. Ent. p. 804. n. 1.

Foresti Obs. Med. XIV. Lib. VIII.

Francus, G. Diss. de Phthiriasi, s. morbo pediculari, quo nonnulli Imperatores, Reges aliq. illustres viri ac foeminae misere interierunt. Heidelberg 1678. 4.

Galenus de Comp. Med. Sec. Loc. Lib. I. Cap. VIII et IX.

Heurnius, I. de morb. capitis. Cap. VI.

Iosephus Lib. II. Cap. V.

Mangeti, I. I. Bibliotheca medico practica, de morbis pilorum.

Onomatol. Hist. nat. Pars. VI. p. 228.

Paullini. C. F. de morte verminosa p. 94. Eben- derselbe von einem venerischen Menschen, der durch die Läusekrankh. aufgerieben worden, im XV. Th. der Abh. d. k. A. d. N. f. S. 458. und von einer Läusekrankheit, die durch das Verschlucken lebendiger Kopfläuse entstand, im XV. Th. derselben Abhandl. S. 471.

Plenk, de Morb. cutan. Class. XII.

Sauvages Nosolog. method. Edit. Daniel. Tom. V. p. 284.

Phthiriasis pedicularis, *Phthiriasis funesta*, *La maladie pediculaire Vermine interne*.

Sel-

Selle Med. Clin. 3te Aufl. S. 412. n. 4. innerliche Läusesucht.

Serapion Pract. Tract. I. Cap. V.

Velli, l'Abbe, l'Histoire de France. Tom. I. p. 315.

Welschius, Exercitatio de venâ medinens. August. Vind. 1674. p. 41. de Phthiriasi.

Willan, R. Hautkrankheiten übers. v. Friese I. B. S. 55. Körper- oder Kleiderlaus Engl. Bodylice.

Linné und andere Naturforscher haben dieses Insekt, welches auch unter dem Namen der *Kleider-* oder *Haderlaus* bekannt ist, nicht für eine von der Kopflaus wirklich verschiedene Art, sondern blos für eine Abänderung oder Spielart angesehen. Ihre körperliche Verschiedenheit, und die Eigenheiten ihrer Lebensart haben aber neuere Naturforscher bewogen, sie als eine besondere Art aufzustellen. Sie ist im ganzen ungleich grösser, und weicher, als die Kopflaus; und hat einen dickeren Kopf, mehr hervorstehende Augen, und nicht wie diese eckigte, sondern rund abgestumpfte Ränder an den Ringen des Hinterleibes. Ihre Farbe ist weit lichter und hellgrauer, und man bemerkt an ihr nicht die dunklen Streife am Rande des Brustschildes und der Ringe des Hinterleibes zu beyden Seiten. So wenig als die Kopflaus, ohne besondere Veranlassung, den Kopf verläßt, so wenig verliert sich diese, ohngeachtet sie auf dem ganzen Körper herumzuirren pflegt, in die Kopfhare, wo sie eben so bald, wie die Kopflaus am Leihe, ihren Untergang findet. Sie hält sich bloß an diesem und in alten Kleidungsstücken unreinlicher Menschen auf, und kommt nur, wenn es regnen will, gerne aus den Falten jener Kleidungsstücke hervor. Nie begattet sie sich mit der Kopflaus, und nie legt sie ihre Eyer in und an die langen, sondern stets an die kurzen Haare und in die Lumpen und Falten schmutziger und veralteter Kleider. Nur die Säfte, die Ausdünstung, der fette, klebrige Hautschmutz des lebenden Menschen sind ihre Nahrung; den Sterbenden und Todten aber verläßt sie. Zu ihrer Aufnahme und Vervielfältigung gehört durchaus eine gewisse Beschaffenheit des Bluts und der Ausdünstungsmaterie, und wenn diese vorhanden ist, so kann sie sich, wie die ältere und neuere Geschichte beweist, bey Menschen aller Alter und Stände ins Unendliche vermehren. Schlechte Nahrungsmittel, Mangel und Vernachlässigung des Wechsels der Wäsche und Kleidungsstücke, können jedoch Ursachen einer solchen, das Fortkommen der Leiblaus begünstigenden Cacochimie werden, und hieraus ist erklärbar, warum vorzüglich herumziehende Bettler, lange im Felde stehende Soldaten, gewisse Mönchsorden, die Bewohner schmutziger Wohnungen und Arbeitshäuser, so gewöhnlich von diesen Insekten angegriffen werden. Auch finden wir, daß sie bey chronischen Handausschlägen unreinlicher Menschen mehr als gewöhnlich sich efinden, und Willan bemerkt sogar, daß sie bey der größten

Sorg-

Sorgfalt für Reinlichkeit und Reinigung, bey dem *Hautiucken der Greise* zum Vorschein kommen, und den Kranken durch ihre schnelle Vermehrung, in einer an sich schon mit unausstehlichen Jucken verbundenen Krankheit, doppelt peinigen.

Nemen unter diesen oder anderen Umständen diese Insekten ungewöhnlich überhand, so entstehet daraus eine eigene Krankheit, welche die *Läusesucht des Körpers* (*Phthiriasis corporis*) genannt wird. Die Läuse setzen hierbey ihre Eyer sowohl an die kleinen Härchen der Haut und in die Hautporen, als in die Hemden und Wäsche ab. Von dem eigenen scharfen Schweiß mancher Menschen werden sie hier ausgebrüthet, und das nun heranwachsende und sich täglich vervielfältigende Läuseheer greift, wenn es allen Vorrath von Schmutz und anklebendem Schweiß auf der Oberfläche der Haut aufgezehrt hat, die Haut selbst an, indem es diese beym Saugen durchbohrt, hierdurch Geschwüre veranlaßt, die oft bis auf die Knochen gehen, und so seine weitere Ausbreitung und Verheerung zwischen Haut und Fleisch fortsetzet. Man nennt diesen Grad einer der häßlichsten Krankheiten, die *innere Läusesucht* (*Phthiriasis interna*). Es kommen hierbey oft aus verschiedenen Theilen des Körpers, sogar aus den Augen, der Nase, dem Munde etc. Läuse hervor, wodurch wahrscheinlich die älteren Beobachter verleitet worden sind, zu behaupten, daß die Läuse in dieser Krankheit im Körper selbst erzeugt würden, da sie gleichwohl erst von den äusseren Theilen zu den inneren gelangen. Daß die Kranken durch den Reitz und die böartigen Geschwüre, welche dieses Ungeziefer veranlaßt, ausserordentlich leiden und abgezehrt werden, bedarf wohl keiner besondern Erwähnung; aber eine eigene und unerklärbare Eigenschaft dieser schon weit gediehenen Krankheit ist es, daß die Läuse durch alle Mittel nicht auszurotten sind, und die davon ergriffenen Kranken daher jämmerlich unkommen müssen. *Aristoteles, Cälius, Josephus, Plinius, Velli, Frank etc.* führen die Beyspiele grosser und berühmter Männer der Vorzeit und des Mittelalters an, welche an dieser schrecklichen Krankheit gestorben sind, und bey welchen sicher nicht Schmutz und Unreinigkeit, als Ursache des Übels angeklagt werden könnten. Ich gedenke hier nur der Könige *Antiochus, Agrippa* und *Herodes*, des römischen Dichters *Ennius*, des Dictators *Sylla*, des römischen Schriftstellers *Valerius Maximus*, und des griechischen Philosophen *Pherecydes*, in den neuern Zeiten aber *Philipps des Zweyten*, Königs von Spanien, des französischen Kaisers *Arnulfus*, welcher im Jahre 899, der Läusesucht unterlag, des Bischofs *Foucquau* von Noyon, der im Jahre 955 durch eine so grosse Menge Läuse verzehrt wurde, daß man genöthiget war, ihn in einen ledernen Sack zu nähen, ehe man ihn begraben konnte, endlich noch des

Cardinals *Du Prat*, welcher im Jahre 1545 ebenfalls an der Läusekrankheit starb. Ausserdem findet man bey den Schriftstellern auch Beyspiele von innerlichen und äusserlichen, sich nur auf gewisse Theile einschränkenden Läuseansammlungen. So erzehlt *Borellus*, daß bey Öffnung gewisser Blasen, welche am Leibe eines Menschen entstanden waren, unzehlich viele Läuse hervorkamen. Eben dieses erfolgte bey der Öffnung einer Geschwulst auf dem Rücken, zwischen den Schultern, nach *Crügers* Wahrnehmung. Nach *Forests* Erzählung aber war ein zufälliger Weise mit einem Degen verwundeter Kropf voller lebendiger Läuse, und *Heurnius* will sogar in einem in der innern Fläche des Magens befindlich gewesenen Bläschen, Läuse angetroffen haben. Diese und ähnliche Beyspiele, vorzüglich von inneren Läusesuchten, werden zwar von einigen Schriftstellern sehr in Zweifel gezogen und dabey eine Verwechslung der Läuse mit Maden und Milben angenommen. Da aber die Läuse zu bekannte Insekten sind, als daß sie auch von dem Unwissendsten verkannt werden könnten; viele dieser Beobachtungen glaubwürdige Naturforscher und Ärzte gemacht haben, und überdies nichts Widersprechendes darinnen liegt, daß sich die Läuse eben so gut in allen übrigen Theilen des Körpers eingraben können, als sie dieses in der dicken und festen Kopfhaut zu thun vermögend sind; so sind jene mit scheinbarem Gründen unterstützte Zweifel, wohl nichts als Äusserungen eines in unsern Tagen öfters zu weitgetriebenen, und nicht selten bloß affectirten Scepticismus. Selbst die dritte egyptische Landplage, von welcher *Josephus* erzehlt, daß die aus den Körpern der Egypter, so zu sagen, hervorgequollenen Läuse, weder durch Bäder, noch Salbungen zu vertilgen waren, behält, bey den Erfahrungen, welche wir von den ekelhaften Veränderungen der Läuse auf der menschlichen Kopfhaut täglich machen können, einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit. Denn es ist sehr wohl gedenkbar, daß schlechte, verdorbene, der reinen Mischung der Säfte nachtheilig werdende Nahrungsmittel; eine besondere, die Entwicklung der Nüsse vorzüglich begünstigende Beschaffenheit der Luft; vielleicht die durch mancherley Umstände nöthig gewordene Unterlassung der sonst gewohnten Kopf- und Hautreinigung, eben so wohl eine im höchsten Grad überhandnehmende, und alles ansteckende Vermehrung der Läuse bewirken konnten, als ähnliche günstige Umstände zu der Überhandnahme und zu den Verwüstungen der Heuschrecken, Käfer, Raupen u. s. w. noch in unsern Tagen beyzutragen pflegen.

Die sichersten Mittel, der anfangenden Läusesucht zu begegnen, sind wohl: tägliche Hautreinigung durch Bäder, zu welchen man Sabadillsaamen und Taback abko-

abkochen lassen kann, fleissiger Wechsel der zuvor mit Schwefeldampf durchzogenen Wäsche, der Genuß milder und keine Schärfe begünstigenden Speisen und Getränke. Ist aber das Übel schon zu einer solchen Höhe gediehen, daß es diese und ähnliche Mittel verspottet; so ist vielleicht von dem innerlichen und äusserlichen Mercurialgebrauch, in Verbindung warmer Bäder, noch das meiste zu erwarten.

5. Die Filzlaus. Tab. VII. Fig. 6.

Pediculus Pubis, abdomine posterius emarginato, pedibus cheliformibus. Linn. Syst. Nat. Edit. Gmel. XIII. Tom. I. Pars V. p. 2915. n. 2. — Hospitatur in hominis immundi pube, rarius in superciliis.

Amoureux Notice des Ins. de la France réputés venimeux p. 138.

Blumenbachs Handb. der Naturgesch. p. 368. *Pediculus pubis*, Fr. *Morpion*, Engl. *the Crab-louse*, Ital. *Piattoni*.

Celsus de Medicina Lib. VI. Cap. 6. de *Pediculis patybrarum*.

Cuvier Tableau élémentaire p. 622. le *Morpion*. Fabricii Mantiss. Ins. II. p. 368. n. 2. Syst. Ent. p. 805. n. 2. Spec. Ins. II. p. 476. n. 2.

Forestii Opera. p. 244.

Gözens Geschichte einiger dem Menschen etc. schädlichen Insekten. S. 46.

Hafenreffer, de Cutis Affectibus. Lib. I. Cap. X. Kniphof, Diss. de pediculis inguinalibus, p. 51. Tab. II. Fig. M.

Linnaei Amoenit. acad. Vol. III. de noxa infector. p. 342. Faun. Suec. 1940.

Lorry de Morb. cut. p. 570.

Mercurialis de Morb. cut. Lib. I. Cap. 17.

Mouffetti Theatr. insect. p. 200.

Müllers Linneisches Natursyst. der Ins. II. B. S. 1028. Tab. XXIX. Fig. 6. *Die Filzlaus*.

Onomatologia historiae naturalis, Pars. VI. p. 230. *Pediculus pubis*.

Paullini, C. F. Tract. de morte verminosa, p. 159.

Pechlinii Obs. Med. 24.

Petiveri, I. Gazophylacii Nat. et Art. Decades. Tab. LXIX. Fig. 9.

Raji, I. Historia Insectorum. Lond. 1710. 4. p. 8.

Redi, Experimenta. Tab. XIX. Fig. 1.

Richters chir. Biblioth. VIII. Band, S. 734.

Sauvages Nosologia Ed. Daniel. Tom. V. p. 285.

Phthiriasis inguinalis.

Schenckii Observationes. 676.

Tulpaii Observ. Med. Lib. III. Cap. 40.

Wedelius, G. W. de medicamentorum facultatibus, Jenae 1678. p. 179. Ejusd. Amoenitat. Mat. Med. Jen. 1684. p. 372. et Theor. Sapor. medic. Jen. 1703. p. 239. enthalten Mittel wider die Filzläuse.

Willan's Hautkrankheiten, übers. von Friese. I. B. S. 60. *Prurigo pubis*. *Plactulae*, *Morpiones*, *Petalae*, *Pessolata*.

Die *Filz-* oder *Schamlaus* ist die Bewohnerinn derjenigen Stellen des menschlichen Körpers, welche mit kurzen und krausen Haaren besetzt sind. Sie findet sich daher nicht nur in stark behaarten Schamtheilen beyder Geschlechter, am Mittelfleische und um den After; sondern auch, in seltneren Fällen, in den Augenbraunen, Augenwimpern, bisweilen im Bart, unter den Achseln, und auf der behaarten Brust haarreicher Männer. Nie setzen sie sich auf den behaarten Theil des Kopfs und an unbehaarte Gegenden des übrigen Körpers fest, zum Beweis, daß sie schon in Rücksicht des Aufenthalts eine von der Kopf- und Körperlaus verschiedene

dene Art ausmachen. Schmutzige und unreine Personen überhaupt, besonders aber Leute von einer liederlichen, in der Wollust ausschweifenden Lebensart, werden vorzüglich der Aufenthalt dieser lästigen Gäste. Die ekelhafte, sie schwelgerisch nährendе Ausdünstung, der sie anlockende stinkende Eiter, und Schleim venerischer Geschlechtstheile macht, daß sie sich an denselben ungeheuer vermehren. Daher trifft man sie vorzüglich in Krankenhäusern an, wo dergleichen Personen aufgenommen werden, am meisten aber bey venerischen Weibspersonen, deren Geburtstheile oft von diesen Insekten wimmeln.

Sie sind, wenn sie ihre Eyer verlassen haben, so klein, daß sie nur von einem scharfen Auge entdeckt werden können. Bald aber erreichen sie eine Grösse, die diejenige der Kopf- und Leiblaus noch übertrifft. Ihre Gestalt ist dann ungleich kürzer, breiter, runder und flacher, als die der zwey andern menschlichen Läusearten. Der Kopf ist wegen seines weit mehr hervorragenden Rüssels und seines deutlicheren Halses, um die Hälfte länger, ausserdem mehr zusammengedrückt und vorzüglich um den Rüssel stärker mit Haaren besetzt. Er bewegt sich frey in einer deutlichen Aushöhlung am Brusttheile. Am Rande seines breitsten Theils stehen zu beyden Seiten die Augen, vor welchen die fünfgliedrichten Fühlhörner sich bisweilen wild in die Höhe richten, sobald sie aber etwas Unangenehmes gewahr werden, oder dem Tode nahe sind, sich gegen den Hintertheil des Kopfs und gegen die Schultern zurücksenken.

In Rücksicht des Leibes weichen *Redis*, *Kniphofs* und *Müllers* Beschreibungen von einander ab. Wahrscheinlich nahm ersterer, von welchem meine Abbildung entlehnt ist, da mir die Zeichnungen der letzten nicht gleich in die Hände kamen, zufällig Männchen, beyde andere Naturforscher aber, Weibchen zu ihren mikroskopischen Untersuchungen. Alle kommen darinnen überein, daß der Körper, gleich einer Schildkröte, zusammengedrückt und breit sey. *Redi* läßt ihn aber hinten mehr spitzig zulaufen, da ihn *Kniphof* und *Müller* am Ende mehr abgeschnitten vorstellen. An dem, die Stelle des Bruststücks einnehmenden Theil des Körpers, sieht man ein kleines, auf dem Rücken des übrigen Körpers aber ein grösseres Schildchen. Beyde sind überaus glatt, und haben beynahe die Durchsichtigkeit des Bernsteins. Wirklich schimmert auch am Rücken ein in die Quere liegendes, halbmondförmiges, am hintern Theile aber ein etwas längeres Eingeweide durch. Ersteres ist wahrscheinlich der Magen, letzteres der Darmkanal. Hinter den Füßen ist der Rand des Hinterleibes mit zehn bis zwölf zitzenförmigen Hervorragungen versehen, welche sämmtlich an ihren Spitzen mit borstenartigen

Haa-

Haaren besetzt sind. Zwischen den beyden letztern will *Kniphof* die Öffnung des Afters entdeckt haben; vielleicht befinden sich auch daselbst die weiblichen Geschlechtstheile.

Am Vordertheile des Körpers sind auf jeder Seite drey Füße eingelenkt, wovon die zwey ersten dünner und kürzer, als die vier übrigen sind. Jeder Fuß besteht aus vier, mit Borsten besetzten Gliedern, einem dicken, oder dem Schenkel, zwey Mittelgliedern und dem Fußblatte, welches eben solche Klauen wie die Kopflaus hat, die aber von *Redi* aus der Acht gelassen worden sind. An den vier Hinterfüßen bemerkt man über den Klauen, am Ende des zweyten Mittelglieds, noch eine Spitze oder einen Stachel, womit sich diese Laus noch fester als die übrigen Läuse an die haarige Haut anklammern kann.

Die Farbe der Filzlaus ist schwarzgrau, ihre Haut überaus schuppicht, und runzlicht, und überall mit kleinen Härchen besäet, ihre Vermehrung in kurzer Zeit ausserordentlich. Sie verliert sich nicht leicht ausserhalb den Grenzen ihrer angewiesenen Lagerstätten, weil sie daselbst bald umkommt, hängt sich vielmehr mit ihren Klauen und ihrem Saugrüssel so fest an die Haut, daß sie oft kaum mit den Nägeln, bisweilen nur mit einer Scheere davon zu trennen ist. Sie durchnagt so die Oberhaut und nistet sich unter derselben ein. Der Reiz, den sie hierdurch auf die Hautnerven macht, veranlaßt ein unerträgliches Jucken, vorzüglich am Hodensacke und an den weiblichen Schamlippen, welches das Jucken und Beissen der Kopfläuse weit übersteigen soll. Suchen sich die damit Behafteten durch Kratzen Erleichterung zu verschaffen; so reissen sie hierdurch diese Läuse aus ihren Adhäsionspunkten, und es entstehen nun an den Stellen, wo sie fest sassen, schmerzhafte Knoten und Pusteln, aus welchen Eiter und Blut hervorkommt, so, daß die Hemden in dieser Gegend oft wie mit Blut besprüzt aussehen. Auch von ihnen liefert die Geschichte schreckliche Beyspiele der Verheerung. *Paullini* erzählt, daß ein ausschweifender Sicilianer so viele Filzläuse in den Haaren der Augenbraunen, unter den Achseln, und an den Geschlechtstheilen hatte, daß er in wenig Stunden eine ganze Schachtel davon füllen konnte. Er hatte ein unablässiges Jucken und Beissen an jenen Theilen, vermehrte aber durch das häufige Reiben den Zufluß der Säfte dahin und hiermit den Schmerz. Endlich fiel das ganze männliche Glied welk und faul mit den Läusen stückweise ab, und der noch übrige Theil wurde künstlich abgenommen, der Kranke aber starb elendiglich unter den heftigsten Schmerzen.

Am gewöhnlichsten werden diese Läuse durch unreinen Beyschlaf fortgepflanzt, und eine Hure ist im Stande sie unzähligen Mannspersonen mitzutheilen. Aber auch öffentliche Abtritte sind in dieser Rücksicht verdächtig, da die daselbst durchs Reiben abgefallenen Läuse auch an die Geschlechtstheile der sittsamsten Person kriechen können. Zwar werden sie bey diesen nicht leicht ihr Fortkommen finden, wenn sie sich vorzüglich der Reinlichkeit befeissigen; aber bey jungen Onaniten beyderley Geschlechts, deren Geschlechtstheile stark schwitzen, können sie allerdings festen Fuß fassen, wie ich durch Beyspiele belehrt worden bin. Andrang der Säfte nach den Geschlechtstheilen, und eine widernatürliche, der Ausdünstung dieser Gegend eine besondere Schärfe mittheilende Absonderung der Saamenfeuchtigkeit, scheint daher vorzüglich Veranlassung zum Verweilen, und zur Fortpflanzung dieser Insekten zu geben.

Zur Vertilgung derselben hat man mancherley Mittel, und selbst den Arsenik angewandt. Allein auf das Einstreuen desselben sind nach *Schneiders* Beobachtung in Richters chirurgischen Bibliothek, Entzündung der Schaamgegend, Geschwüre, und Blasen an den Geschlechtstheilen entstanden. Auf eine ähnliche Art könnte wohl das von andern zu Einreibungen empfohlene Terpentinöl bey reizbaren Personen, besonders an schon aufgefressenen Stellen, schaden. Auch ist die Anwendung der neapolitanischen Salbe, welche sie zwar sogleich tödtet, bedenklich, wenn sie öfters wiederholt wird. Am unschädlichsten, und vielleicht nicht weniger sicher, ist daher wohl das fleissige Waschen der angesteckten Theile mit einem starken Tabaksabsud. *Sauvages* empfiehlt noch besonders gegen die sich in den Schamtheilen aufhaltenden Läuse, die *Läusekörner*, (*Semen Staphidis agriae*), und zur Vertilgung der in den Augenbraunen, und Augenwimpern hängenden, Spiköl, oder Meerzwiebeleessig, worinnen etwas Aloe aufgelöst worden ist.

6. Die Krätzmilbe. Tab. VII. Fig. 17. 18. 19.

Acarus Scabiei, albus, pedibus rufescentibus, posterioribus quatuor seta longissima. Lin. Syst. Nat. Edit. Gmel. XIII. Tom. I. Pars. V. p. 2928. n. 50. — Habitat in ulceribus scabiosorum, cutis rugas sequendo penetrans, titillationem excitans, utrum causa, an potius symptoma mali?

Amoreux Notice des Insectes venimeux, p. 139.
Baker, Employment for the Microscope, Cap. XVIII. p. 193. Tab. XIII. Fig. 2. a. b. c.
Baldinger, E. G. Progr. Exanthemata non oriri ab animalculis (Insectis) Jen. recus. in Gruneri collect. Diss. Jenens. Vol. I.
Baldingers neues Magazin Band XV. Stück 2.

S. 121 über die *Wichmannsche Actiologie der Krätze*, und Stück 4. S. 348 *Periodische Krätze*.

Beyträge zur Arzneywissenschaft und Geburtshülfe I. Heft. Stendal 1793. S. 14. über eine *epidemische Krätze*, welche nach dem harten Winter 1788 und 89 grassirt.

Bonanni Micrographia curiosa 113.

Bonomo, J. C. Epistola ad F. Redum 1678. und Act. Nat. Cur. Append. ad An. 10. Dec. 2. p. 33. Abh. d. k. Ak. d. N. f. XX. Th. S. 390. Tab. VI. f. 1—4. Teredo. Ebendas. Osservazioni intorno a pellicolli del corpo umano in Firenze 1687. 4. maj. Borelli Obs. microscop. 21.

Bücking über die Krätze, in Baldingers neu. Mag. B. V. St. 4. S. 323.

Cestoni, Hyac. Historia animalculorum, quae in pustulis scabiosis habitant.

Clerici Histor. lat. lumbrie. p. 273. Syrones mortem inferentes, p. 320. Syrones vel Acari dentium.

Crell, F. L. F. Diss. de Contagio vivo. Helmst. 1768.

Cuvier Tableau élémentaire p. 623. la mite de la gale.

Degeers Abhandlung zur Gesch. der Ins. v. Göze II. B. 1. Th. S. 61. VII. B. S. 37 und 41. n. 2. Tab. V. Fig. 12—14. Mitte de la gale, Krätzmilbe.

Fabricii Syst. Ent. p. 814. n. 19. Mant. ins. II. p. 373. n. 25. Spec. Ins. II. p. 489. n. 22.

Froweinii Diss. de Scabie. Duisburg.

Gassendi Phys. S. F. Lib. III. C. 6. p. 269.

Geoffroy Hist. des Ins. T. II. p. 622. n. 2. le Ciron de la gale.

Göze, Geschichte einiger dem Menschen etc. schädli. Ins. Vorred. S. VI. und S. 79.

Großmann, Folgen der übelgeheilten Krätze, Siehe Balding. neues Mag. B. XI. St. 1. Ebendesselben Prüfung der Justischen Gründe für die Wichmannsche Theorie. S. Bald. n. M. B. XII. St. 6.

Hauptmanni Epist. ad Kircher. Therm. Wolkenstein. annex. p. 200.

Heffelle in Loders Journal II. B. 2. St. S. 318, wo der Verfasser die Sublimatauflösung gegen die Krätze äusserlich mit dem glücklichsten Erfolg anwandte und Hr. G. H. R. Loder die Fälle auseinander setzt, in welchen die innerl. oder äusserl. oder die vermischte Kur statt hat.

Hundertmark, C. F. Diss. de Scabie artificiali (Resp. Ziegler) Lips. 1758. p. 35.

Jonas, Zweifel über Hrn. Wichm. Theor. S. Bald. n. Mag. B. XI. St. 1.

Justi, Bestätigung der Wichmannschen Theorie, S. Bald. n. Mag. B. X. St. 2. B. XI. St. 5. B. XII. St. 6.

Kniphof, Diss. de Pedic. ing. §. XXI. et §. XXVI. Tab. I. Fig. d. d.

Langguth, G. A. Diss. de Scabie viv. Resp. Petzsch. Vit. 1767.

Langii, Ch. J. Opp. Med. Lips. 1704. Pars II. Prax. med. Cap. VII. §. 7. de Scabie p. 42, wo die Gründe für das Exanthema vivum widerlegt werden.

Linnaei Diss. Exanthemata viva in Amoenit. acad. p. 92 und 95. Ibid. Vol. III. de miraculis insector. p. 333. Vol. V. p. 95. Faun. Suec. Ed. II. Spec. 1975. β.

Lobes, Guldener von, über die Krätze im Arbeitshause zu Prag.

Ludovici, Dan. de varis, acaris et sironibus in Eph. N. C. Dec. ann. 9. et 10. Obs. 39. p. 109.

Mead, R. Monita et Praecepta medica, Londini 1751. Cap. XIV. p. 210. de morb. cutis.

Mouffeti Theatr. Insect. Lib. II. Cap. 24.

Müllers Linn. Natursyst. V. Th. 2. B. S. 1049 und S. 1051. n. 18. Die Ausschlagmilbe.

Murray de verm. in lepra obviis in der Note S. 8. hält die Krätzmilbe mit der Käse- und Mehlmilbe für einerley Species und schreibt ihre Erscheinung in der Krätze der Verderbnis der Säfte zu, die sie herbeyleckt.

Onomat hist. nat. P. I. p. 34. Acarus humanus, der Hautwurm.

Paullini de Morte verminosa p. 101 et 115. Syrones, Cirones, Riedliesen.

Philosophical Transactions, Vol. V. p. 197. n. 283. Tab. IX. Fig. 127. 128. Vol. XXIII. p. 1296. n. 283. An Abstract of part of a Letter from Dr. Bonoma to Sign. Redi, containing some Observations concerning the Worms of Humane Bodies by Richard Mead.

Reisig, Diss. de Sulphuris usu interno. Lips. Rivini, A. Q. Diss. de Pruritu exanthematum ab Acaris (Resp. Schiebe) c. Fig. Lips. 1722.

Roederer, J. J. Diss. de Scabie. Argentor. 1710. p. 3. §. III. bezweifelt Bonomo's Theorie.

Sager, Prüfung der Wichmannschen Theorie in Bald. n. Mag. B. XI. St. 6.

Sauvages Nosol. meth. Ed. Dan. T. V. p. 244. n. 11. Scabies vermicularis.

Toggenburger, J. U. Diss. Casum stuporis Scabiei inoculatione curati exhibens. Argentorat. 1760.

Valentini Amphitheatr. Zootomic. P. II. p. 229. Wichmanns Aetiologie der Krätze. Hannover 1786. Acarus humanus.

Willan, Hautkrankheiten, I. B. p. 47. das Krätzinsekt.

Dieses schon im zwölften Jahrhundert unter dem Namen *Seure* oder *Reitliese* bekannt gewesene Insekt, wurde von dem Engländer *Mouffet*, dem die zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gemachten Verbesserungen der Vergrößerungsgläser bey seinen naturhistorischen Untersuchungen zu statten kamen 1634 zuerst sehr tref-

treffend beschrieben, 1682 aber von *Bonomo* aufs neue beobachtet, und so gut durchs Mikroskop abgebildet, daß seine Zeichnung von der Wichmannischen (Tab. VII. Fig. 17, 18) nur wenig abweicht. *Linné* nam von jener Entdeckung Veranlassung zu behaupten, daß diese Milben wegen ihrer Kleinheit geschickt wären, wie Atomen in der Luft herumzuschweben, durch die feinsten Ritzen zu dringen, und um so mehr Ursache der Ausschläge zu werden, da nach den Gesetzen der Natur die Vermehrung der Thiere im entgegengesetzten Verhältnisse ihrer GröÙe stünde, so daß also schon eins oder das andere dieser äusserst kleinen Insekten im Stande seyn könnte, durch seine zahlreiche Nachkommenschaft den ganzen Körper mit Ausschlag zu bedecken. Nicht weniger glaubte er, sey es durch Einstreuen des Mehls in die wunden Stellen der Kinder möglich, bey diesen einen Krätzeausschlag zu veranlassen, da eben diese Milbe sich auch im verdorbenen Mehle, so wie in altem Käse, aufhalte. Allein die Erfahrung, daß gerade die Müller und Becker, deren Hände und Gesicht doch beständig mit Mehlstaub bedeckt sind, nicht leicht die Krätze bekommen, widerspricht schon dieser Meinung und *Linné* scheint also bloß dadurch zu einer völlig irrigen Behauptung verleitet worden zu seyn, daß er unterließ, dieses Insekt mit bewaffnetem Auge zu beobachten, wobey kein Zweifel wegen der Verschiedenheit beyder Milbenarten übrig bleibt.

Die Mehl- oder Käsemilbe (Tab. XIII. Fig. 18.) hat einen länglichten, käferartigen Körper, einen vom Kopf deutlich abgesonderten Brustschild, und sechs am Brustschild und Hinterleib vertheilte FüÙe. Die Krätze milbe hingegen ist mehr rund (Tab. XII. Fig. 17. und 18.) und gleicht von der höckrichten hin und wieder mit Härchen versehenen Rückenseite einer Schildkröte, an welcher man den Kopf und die vier VorderfüÙe, als kleine Hervorragungen bemerkt. Von der Bauchseite (Fig. 19.) aber, wird man diese Theile, wie die vier HinterfüÙe, deutlicher gewahr. Der Kopf (*a.*) ist nichts als ein kurzer, vorne runder und mit einigen Haaren besetzter Rüssel. Dicht am Kopfe sitzen die vier VorderfüÙe, die aus kurzen abgestumpften Schenkeln, und langen, röhrenförmigen, am Ende mit kleinen Blasen versehenen Fußblättern (*b. b. b. b.*) bestehen, am Ende des bauchichten Hinterleibes aber sitzen die vier HinterfüÙe (*c. c. c. c.*), deren Schenkel röhrenförmig, die Fußblätter hingegen ungleich dicker, länglicht rund sind, und am Ende in lange borstenartige Haare auslaufen. Die Farbe des ganzen Körpers dieser Milbe ist weiß, die der FüÙe aber mehr rostfarbig. Von ihrer Fortpflanzungsart und der Beschaffenheit ihrer Eyer ist noch nichts bekannt, ohngeachtet *Göze* letztere in dem ihm von *Wichmann* zugesandten Krätze yter entdeckt zu haben glaubte.

Was

Was ihren Wohnort betrifft, so machte *Kniphof* eine eigne Eintheilung dieser Milben oder Reitliesen, nach verschiedenen Theilen des menschlichen Körpers. Seine *Augenreitliesen* halten sich in der *membrana conjunctiva* auf und veranlassen grosses Jucken im Auge. Seine *Gesichtreitliesen* sind in den Finnen und Kupferhandel; die *Zahnreitliesen*, deren auch *Mouffetus* und *Clericus* gedenken, in den hohlen Zähnen zu finden, und die Ursache der Zahnschmerzen. Ausser dieser giebt es nach seiner Meinung noch *Haarmilben*, welche die Haarwurzeln abfressen, *Handmilben*, welche sich zwischen den Fingern und Fußzehen aufhalten, und ein starkes Jucken verursachen, *Urinmilben*, welche im Urin gefunden werden, und *Krätzmilben*, die in den Pusteln des Krätzausschlags wohnen. Allein ausserhalb dieser Krätze und der *Prurigo mitis*, sind jene Milben zur Zeit nirgends in und an dem menschlichen Körper gefunden worden. Auch enthält nicht jede Krätze nach *Wichmann* dergleichen Milben, sondern nur diejenige, welche mit kleinen weissen, sehr zerstreut und einzeln stehenden, juckenden Knötchen anfängt, die sich bald in Pusteln oder Bläschen verändern, und eine durchsichtige Feuchtigkeit fassen. Gewöhnlich sind diese Bläschen zuerst zwischen den Fingern oder an den Händen und Handgelenken sichtbar, und verbreiten sich sodann langsam über den ganzen Körper, nur das Gesicht ausgenommen. Ihre durchsichtigkeit wird allmählich gelblicht und eiterartig, und bildet, wenn die Pustel aufgekratzt wird, eine kleine wässrige Borke, wovon dieser Ausschlag in manchen Gegenden auch den Namen *Grind* erhalten hat. Als ein charakteristisches Kennzeichen desselben sieht *Wichmann* noch das sich durch die Bettwärme vermehrende, und fast nur alleine auf die durchsichtigen Bläschen einschränkende Jucken an.

Die ersten Spuren der diesen Ausschlag bewohnenden Milben sucht er in röthlichten Furchen der Finger oder der Hände, die sie in die Haut graben, und in welcher sie noch gewöhnlicher, als in den Pusteln selbst, anzutreffen seyn sollen. Ausser diesen Kanälen sind sie aber allein nur in den erst entstehenden, eine wässrige, durchsichtige Feuchtigkeit fassenden Bläschen, als weisse, von der Farbe der Feuchtigkeit selbst unterschiedene Pünktchen sichtbar. Wird ein solches Pünktchen mit einer Nadel behutsam herausgenommen, welche Verrichtung schon im siebenzehnten Jahrhundert unter dem Namen *Seurengraben* bekannt war, und auf einer dunklen Fläche abgestrichen; so sieht man wie dieses Pünktchen sich allmählich zu bewegen anfängt, und bald, aber sehr langsam, fortkriechet. Vertrocknet die wässrige Feuchtigkeit der Pustel, so kommt die sie bewohnende Milbe um, ohngeachtet sie sich eigentlich nicht in der Pustel selbst, sondern in

der Hautfurche hinter oder unter der Pustel aufhält und in letztere vielleicht nur ihre Eyer absetzt. Sie ist daher in den grossen, reifen und gelben Krätzblättern nicht mehr anzutreffen, wahrscheinlich, weil in diesen die ihr zur Nahrung dienende, dünne, flüssige Feuchtigkeit vertrocknet ist, welche von ihren feinen Saugorganen nur allein aufgenommen werden kann. *Wichmann* will hingegen, daß sie blos deswegen ihren Aufenthalt verläßt oder umkommt, weil sie ihre Bestimmung erreicht hat, sobald sie durch ihren Reiz eine Feuchtigkeit herbeygelockt und ihre Brut in Sicherheit gebracht hat, und daß dann die von ihr verlassenen alten und vollen Pusteln auch nicht mehr jucken können.

Die Ansteckungsarten, wodurch Milben und Krätze, oder Krätze und Milben so häufig verbreitet werden, sind sehr verschieden. Die gewöhnlichste ist die unmittelbare Berührung der krätzigen Person selbst, oder der Dinge, welche sie gerade in den Händen gehabt hat, das Essen und Trinken aus den nemlichen Trink- und Eßgeschirren, das Tragen solcher Kleidungsstücke, das Abtrocknen an solchen Handtüchern, deren sich Krätzige bedient haben, und das Schlafen in den Betten solcher Personen. Lezteres ist die Ursache, warum die Krätze gewöhnlich in Waisenhäusern, in Schul- und Pensionsanstalten zu Hause ist, wo man bisweilen das unschuldige Wasser u. s. w., statt der alten von Krätzstoff halbe und ganze Jahrhunderte hindurch besudelten und durchdrungenen Betten, als Ursache anzuklagen pflegt. Am gewöhnlichsten unter allen Theilen des Körpers bleiben immer die Hände der Ansteckung ausgesetzt, weil wir damit nicht selten unwissend, das berühren, was Krätzige berührt hatten. Diese Erfahrung hat vielen Ärzten Veranlassung gegeben, die Krätze blos als ein örtliches Übel der Haut anzusehen, an welchen Säfte und Nerven des übrigen Körpers keinen Antheil nehmen könnten. Gewisse Handwerker, z. B. Schneider und Weber, bey welchem sie häufig vorkommt, und andere, z. B. die Töpfer, bey welchen man sie fast nie antrifft, befestigten sie in dieser Meinung. Der Reiz der feinen Härchen wollener Tücher und Fäden auf die Hautnerven und Hautgefäße, sollte bey erstern die Krätze veranlassen, und die fleissige Reinigung der Hände durch den alle Unreinigkeiten aus den Hautporen und Furchen mitnehmenden Thon, sie bey letzteren verhüten. Weit erklärbarer ist aber die Entstehung der Krätze bey jenen, aus ihrer sitzenden, die Verdauung in Unordnung bringenden, und zur Erzeugung eines rohen, scharfen Chylus Gelegenheit gebenden Lebensart, und bey diesen, ausser der öfteren Hautreinigung, aus der stärkeren, keine Stockung im Unterleibe zulassenden Bewegung, welche mit dem Drehen der Scheibe verbunden ist.

Da

Da es aber in Rücksicht der Kur durchaus nicht gleichgültig seyn kann, ob man die Krätze durch eine sich im Körper entwickelnde Krätzschärfe, ein eigenes Krätzmiasma, oder durch Milben entstehen läßt, indem durch den alleinigen Gebrauch äusserlicher, die Milben tödtender Mittel, sehr leicht eine gefährliche Versetzung der Krätze bewirkt werden kann; so halte ich es nicht für überflüssig, hier die Gründe für und gegen die Krätze milbe kürzlich auseinander zu setzen.

Für *Wichmanns* Meinung, der also die Krätze, worinnen die Milbe zu finden ist, als ein örtliches Übel der Haut ansieht, und sie für völlig verschieden von der trocknen, scorbutischen, gichtischen und venerischen Krätze hält, scheint vorzüglich der Umstand zu seyn, daß sich die Milbe in den entstehenden, und alleine juckenden, nicht in den reifen, nicht mehr juckenden Krätzpusteln findet, und daher mehr zur Entstehung, als zur Verschlimmerung des schon vorhandenen Übels beyzutragen scheint. Auch glaubt er analogisch vermuthen zu können, daß sich die Krätze milbe, gleich der Laus in der Läusesucht, unter der äussern Haut eingraben, darunter fortwühlen, und, durch das Saugen, Bläschen und Grinde veranlassen könne. Ferner soll diese Milbe, ausser der Krätze, in keinem anderen chronischen Ausschlage zu finden seyn, blos und allein durch Berührung und Kleidungsstücke mitgetheilt, und nur durch solche Mittel, wie Schwefel und Quecksilber, welche Insekten zu vertilgen im Stande sind, und zwar blos durch den äusserlichen Gebrauch dieser Mittel, geheilt werden können. Nach diesen Prämissen leugnet *Wichmann* die critische, metastatische Krätze, deren Beobachtungen blos in Hospitälern gemacht worden seyn sollen, wodurch diese Art Crise nothwendig verdächtig, und viel wahrscheinlicher würde, daß dieses Übel durch Ansteckung beygebracht worden sey. Die Folgen von Zurücktreten und Zurücktreiben der Krätze aber erklärt er blos als zufällig, hält es jedoch für gedenkbar, daß wenigstens die Milbeneyer nicht zu groß wären, um von den Mündungen der einsaugenden Gefässe mit aufgenommen, in die Blutmasse gebracht, und so auch nach inneren Theilen geführt zu werden. Die absichtliche Ansteckung und Inokulation der Krätze betrachtet er endlich als ein grosses Reizmittel, dessen Nutzen eben so wohl durch andere künstliche Geschwüre, Vesikatorien, Fontanelle und Haarseile erreicht werden könne.

Allein, viele und grosse Männer haben die Milbentheorie durch Gründe widerlegt, deren Werth gewiß kein Unbefangener leugnen wird. *Meckel* in Halle hat *Wichmannsche* Krätzpusteln mit und ohne Milben gefunden, so daß sie also
nichts

nichts Beständiges seyn können. *Baldinger*, *Göze* und andere grosse Naturforscher haben durch gute Lupen und Linsen, die viertausendmal vergrösserten, und womit sie ihre Untersuchungen ganz nach *Wichmanns* Anleitung anstellten, auch nicht eine Milbe entdeckt, wodurch nothwendig die Vermuthung entsteht, daß jene Milben nur unter gewissen, vielleicht von der epidemischen Konstitution begünstigten Umständen, jene Pusteln bewohnen, die freylich nur so lange jucken können, als die Flüssigkeit des Eiters die Wirkung der enthaltenen Salztheile auf die Hautnerven nicht hindert, oder daß sie gar nur ein endemisches Übel sind. Sie sind überdies nach *Wichmann* nicht in den Pusteln selbst, sondern nur in den Furchen und Ritzen, oder in den Zugängen zu den Pusteln zu finden, weil sie, wie mir scheint, zu den Insekten gehören, welche trockne Orte lieben, und also gewiß nicht ihrer Natur zuwider, ein feuchtes Behältniß um sich bilden werden. Auch ist Analogie mehr gegen als für *Wichmanns* Gründe. Denn in verschiedenen andern, mit der Krätze zum Theil verwandten, chronischen und nicht minder juckenden Hautausschlägen, sind weder Milben, noch andere Insekten zu finden, denen man ihre Entstehung zuschreiben könnte. Es ist aber nicht einzusehen, warum diese Ausschläge nicht eben so wohl, wie *Wichmanns* Krätze, von Insekten entstehen sollten. Hierzu kommt, daß die Krätzmilbe, nach *Willans* neueren Beobachtungen, auch in den Furchen der Epidermis beym vernachlässigten gelinden Hautjucken (*Prurigo mitis*) brütet, daß sie also der *Wichmannischen* Krätze keinesweges eigen ist, und daher nothwendig als Schmarutzerinsekt angesehen werden muß.

Dem *Wichmannischen* Beweisgrund, daß die Krätze blos durch äussere Ursachen fortgepflanzt werden könne, widersprechen ebenfalls mancherley Dinge. Jedes Insekt sucht seine eigne Nahrung. Wir müssen daher entweder annehmen, daß die Krätzmilben in der ansteckenden krätzigen Wäsche und Kleidung ebensowohl, wie in den Krätzpusteln Nahrung finden, wenn wir sie nicht Jahre lang darinnen schlafen lassen wollen, bis sie durch die Wärme eines lebendigen Menschen wieder erweckt werden, oder es für unbegreiflich halten, wie sie darinnen Nahrungslos so lange verweilen können. Eben dieses gilt von der Impfmaterie. Man kann nemlich, wie *Hundertmark*, *Toggenburger* und andere bewiesen haben, die Krätze, wie die Pocken, den Kopfgrind und die Gonorrhoe durch Fäden einimpfen, welche lange ihr Ansteckungsvermögen behalten. Wovon leben aber nun die in den Impffäden befindlichen Milben in der ganzen Zwischenzeit, welche von der Aufnahme des Gifts in die Fäden, bis zur Einfropfung in die Oberhaut verstreicht?

streicht? Um jedoch wieder zu der, nach *Wichmann*, bloß möglichen äusseren Ansteckung zurückzukehren; so bleibt es ferner unerklärbar, wie der erste Krätze angesteckt werden konnte? Wie noch täglich Menschen die Krätze bekommen, bey welchen an keine Ansteckung durch Berührung und Kleidungsstücke etc. zu denken ist? Wie die Krätze nach dem Gebrauch mineralischer Wasser, und oft an Theilen ausbricht, die durch die genaueste Bedeckung vor jedem äusseren Einfluß gesichert sind? Wie die periodische, die auch in der Privatpraxis häufig vorkommende kritische, die nach strengen Wintern, wo die Milben doch erstarren und ihren Untergang finden sollten, oft epidemisch herrschende Krätze möglich sind? Welches alles sich aber aus innerlichen Ursachen; aus dem Mangel der bey einer sitzenden Lebensart wegfallenden, die gute und reine Mischung der Säfte begünstigenden, die Daauung befördernden, die zur Verderbnis der Eingeweide Gelegenheit gebende Stockung der Säfte verhütenden Bewegung; aus der durch Kälte zurückgehaltenen schädlichen Ausdünstung; aus dem unmässigen Genuß scharfer, gesalzener, fetter und zäher Speisen, worauf ich so oft auf dem Lande die Krätze entstehen sah, wo man in den warmen Jahreszeiten, aus Mangel an frischem Fleische, oft Vierteljahre lang nichts als geräuchertes Fleisch und Speck genießt, und noch aus andern Ursachen, sehr gut erklären kann.

Ausserdem sind die Zufälle von der, auf Erkältung, oder den äusserlichen Gebrauch zusammenziehender, austrocknender, die Hautporen verstopfender Mittel, zurücktretenden Krätze, welche oft in den heftigsten Fieberbewegungen, in Raserey, Steckfluß, Entzündung innerer Theile, schwarzem und grauem Staare, Taubheit, Lämung, Epilepsie, Wassersucht, Beinfraks etc. bestehen, keinesweges so sehr zu bezweifeln, wie *Wichmann* glaubt, und höchstens nur dem unzeitigen und verkehrten Gebrauch der in zu grosser Menge angewandten äusserlichen Mittel zuzuschreiben: da sie nur allzuoft, und unter Umständen in der Praxis vorkommen, die durchaus keinen Zweifel wegen einer Versetzung des Krätzgiftes zulassen, und nicht selten nur auf das unbedeutende Einreiben zurücktreibender Mittel an einigen Stellen des Körpers erfolgen. Als bloße, nur vom Reize der Milben herrührende, von der ganzen Masse der Säfte unabhängige Hautkrankheit, kann aber die Krätze unmöglich diese Erscheinungen liefern.

Der in einzelnen Fällen zur Heilung der Krätze bewährt gefundene Nutzen bloß äusserlicher Mittel, bleibt nicht weniger ein schwacher Grund für *Wichmanns* Theorie. Schwefel und verschiedene äusserlich angewandte Quecksilber - Präparate, gehören zwar allerdings unter die Insekten und Würmer tödtenden Mittel,

aus-

ausserdem aber beweist ihre Wirkung in anderen Krankheiten unumstößlich ihre Säfte verbessernde Kraft. Will man ihnen ja eine Wirkung auf die sich in der Krätze einfindenden und die Heilung derselben vielleicht erschwerenden Milben zugestehen; so wird damit keinesweges widerlegt, daß innerliche blutverbessernde Mittel überflüssig sind. Ja, man kann behaupten, daß jene Salben die Wirkung letzterer Mittel bloß unterstützen, da sie nicht der ganzen Oberfläche des Körpers, sondern gewöhnlich nur den Gelenken eingerieben werden, und eine hartnäckige Krätze immer zugleich die innerliche Kur nothwendig macht, wenn sie gründlich und ohne üble Folgen zurückzulassen, geheilt werden soll. Auch ist nicht einzusehen, wie dieser Ausschlag bloß durch den nach der Oberfläche gelangenden und daselbst die Milben tödtenden Dunst des innerlich genommenen Schwefels geheilt werden kann, da die Krätze, als bloße Folge der Milben, gewiß nicht hierauf anfänglich noch mehr hervorkommen könnte, sondern gleich abnehmen müßte, sobald die Milben durch den Schwefel umgekommen sind; wie ferner verschiedene Zufälle von zurückgetretener Krätze bloß durch den innerlichen und äusserlichen Gebrauch des Insekten tödtenden Schwefels, z. B. durch laue Schwefelbäder gehoben werden können, indem dieser Ausschlag hierdurch wieder auf die Haut gebracht wird; wie es endlich zugeht, daß sogar Friktionen, Blasenpflaster, künstliche Geschwüre bey zurückgetretener Krätze vortreffliche Dienste zu leisten pflegen.

Ohngeachtet ich glaube, durch diese zur Geschichte der Krätzmilbe gehörende Erörterung der Gründe, welche zu einem, dem Arzt und Natuforscher gleich interessanten, von berühmten Männern viele Jahre geführten Streit Gelegenheit gegeben, jeden im Stande gesetzt zu haben, sich von der Wahrheit zu überzeugen, daß die Milben nicht Ursache des Krätzausschlags, und der Ansteckung, sondern Folge sind, und als fremde Gäste betrachtet werden müssen, die von aussen in die Krätzpusteln gelangen, um für sich Nahrung und für ihre Eyer eine angemessene Herberge zu suchen: so scheint mir doch darinnen gefehlt worden zu seyn, daß man den wichtigen, den ganzen Streit mit einem Male entscheidenden Versuch, aus der Acht gelassen hat, nemlich mit solcher Materie aus unreifen Krätzpusteln inokulirt zu haben, welche man durch Beyhülfe guter Vergrößerungsgläser von den enthaltenen Milben und Milbeneyern zuvor vereinigt hatte, oder hierzu nur Materie aus alten gelben, Eyer- und Milbenlosen Krätzblättern genommen zu haben. Der dennoch erfolgte Ausbruch der Krätze würde alsdann ein unumstößlicher Beweis gewesen seyn, daß sie nicht von Milben, sondern durch ein eignes Miasma hervorgebracht werde.

Vor der Krätze schützt am meisten die Reinlichkeit, nicht deswegen, weil die Milben dadurch nicht Gelegenheit und Zeit finden, auf der Haut zu haften, sich daselbst einzunisten und Krätze zu erregen; sondern deswegen, weil dadurch kein Verweilen des Miasmas auf der Haut gestattet wird, und die Saugadern nicht Zeit gewinnen können, dasselbe aufzunehmen. Ausserdem aber gehört noch zur Präservation die Vermeidung der oben angegebenen Ansteckungsarten. Die gründliche Kur erfordert anfänglich den alleinigen innerlichen Gebrauch des Schwefels und der Antimonialmittel, und wenn die Krätze hierdurch mehr herausgetrieben worden ist, zugleich den Gebrauch der Schwefelbäder und Schwefelsalben.

Zweyte Abtheilung.

Geschichte derjenigen Insekten, die den menschlichen Körper nicht zum angewiesenen Wohnplatz haben, aber doch wegen vorzüglicher Plagen, und Krankheiten, welche sie ihm zuziehen, merkwürdig sind.

Ungeheuer groß ist das Heer der hieher gehörigen Insekten, von welchen ich nur die bekanntesten anführe, um die Gränzen meines Plans nicht zu überschreiten. Schon unter den europäischen, noch mehr unter den Insekten der übrigen Welttheile, giebt es noch überaus viele, von welchen uns, ausser einer oft unvollkommenen Beschreibung oder Abbildung ihrer Gestalt, nichts bekannt ist, die aber gleichwohl aus den Vertheidigungs- und Fresswerkzeugen, womit sie ausgerüstet sind, auf den Schaden schliessen lassen, welchen sie wahrscheinlich dem Menschen zufügen können. Wie viel befassend müßte daher das Werk seyn, welches sie alle in dieser Hinsicht zu schildern im Stande wäre! Indem ich mich nun hier blos auf diejenigen einschränke, von welchen es ausgemacht ist, daß sie uns mehr oder weniger nachtheilig werden; finde ich nöthig, hier wieder drey Unterabtheilungen in Beziehung auf die Plagen und Gefahren zu machen, welche diese Insekten dadurch veranlassen, daß sie unsre Oberfläche vorzugsweise vor anderen Thieren, oder nur unter gewissen Umständen verletzen, oder daß sie als ganz ungewöhnliche Erscheinungen innerhalb des menschlichen Körpers vorkommen.

Erster Abschnitt.

Insekten, welche, als zufällig schädliche, den menschlichen Körper gewöhnlich und vorzugsweise aufsuchen.

1. Die Bettwanze. Tab. I. Fig. 16 — 25.

Cimex lectularius, apterus. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. Pars. V. p. 2123.
n. 1. — Habitat in Europae domibus, exoticus.

Aldrovandi de Insectis 534.
Amoreux Notice des Insectes p. 133, et 270.
la punaise domestique.
Baldingers neues Magazin VI. Band. S. 43.
Miwel.

Bekmanns phys. ökon. Biblioth. I. B. S. 151.
Dekokt von der grünen Schale der Rofskastanie, als Mittel.
Berlinische Sammlungen II. B. 395. VI. B. S. 146.
VIII. B. S. 39.

Blu-

Blumenbachs Handbuch d. N. G. S. 338. n. 1.
Cimex lectularius, Bettwanze, Wandlaus (Engl. *The wall-louse*).

Bonanni Micrographia curiosa. T. 65.

Bremisches Magazin B. VII. S. 619. Mittel die Wanzen zu vertreiben (Terpenthinöl und Kampher in Brandtwein aufgelöst).

Breslauer Sammlungen 1721. August, Klass. IV. Art. 9. (frisches abgeschältes Ellernholz).

Chemisches Mittel die Wanzen zu vertreiben (ein rothes Oel aus dem Vitriol) 1780. 8.

Cuvier Tableau élémentaire p. 575. *la punaise des lits*.

Degeers Abhandl. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. II. Th. I. S. 65. B. III. S. 195. n. 35. Tab. XVII. Fig. 9 — 15. *Punaise des lits*, Bettwanze.

Elliot (John) Bemerkungen über die Einwohner der Garrowhügel. S. Asiatic researches. Calcutta 1792 Vol. III. p. 17.

Fabricii Syst. Ent. p. 693. *Acanthia* 1. Spec. ins. II. p. 335. n. 1. Mant. ins. II. p. 278. n. 1.

Fuesslys Verz. schweiz. Ins. S. 25. n. 474. Neues Mag. B. II. S. 94. versch. Mittel wider die Wanzen.

Gazette litter. de Berlin. 1773. p. 220.

Gazette salut. 1773. n. 16. p. 128.

Geoffroy, Hist. des Ins. de Paris. T. I. p. 434. n. 1. *la punaise des lits*.

Göze I. A. E. entomologische Beyträge Th. II. S. 180. (enthält viele Schriften, worinnen Mittel wider die Wanzen angegeben sind). Geschichte schäd. Ins. S. 1.

Hanov. Magaz. 1773. S. 1134. (Mittel - Dekokt von Wallnussblättern).

Herbsts Anleitung zur Kenntniss der Insekten Th. I. S. 254.

Houttuyn Nat. Hist. I. D. X. st. p. 324. n. 1. Ioblot Observations d'histoire naturelle Tom. I. Part. 1. Tab. IV.

Ionstoni, I. Histor. naturalis de Insect. p. 89.

Journal encyclopedique 1773. p. 327. Tab. III.

Kniphoff de ped. inguin. §. XXX, *Bettlaus*, *Wandlaus*.

Kolbe Beschreib. des Vorgebürgs der guten Hoffnung S. 222.

Kühn im Naturforscher Stück VI. S. 8. n. 5. von einer mit den Bettwanzen angestellten Jagd.

Ledermüllers mikroskop. Gemüths- und Augengergözt. S. 121. Tab. 52. n. 63.

Linnaei Faup. Suec. Edit. II. n. 909. Reisen durch Westgothland. S. 249.

Martialis epigrammatum Lib. XI. Epigr. XXXIII. „Nec toga, nec focus est, nec tritus cimice lectus
„und ejusd. Libri Epigr. LVII. Et teges et cimex,
„et nudi sponda grabati, et brevis atque eadem nocte
„dieque toga.“

Martini, P. H. W. allgemeine Geschichte der Natur in alphabetischer Ordnung, fortgesetzt von einer Gesellschaft Gelehrten und herausgegeben v. D. I. G. Krünitz Th. VII. Berl. 1787. S. *Bettwanze*.

Meyers Naturgesch. d. giftigen Ins. Th. I. S. 119 n. 1. *Bettwanze*.

Modeer, A. Singularia Cimicis. Schwed. akad. Abhandl. 1764. S. 43.

Mouffetti Theatr. insector. 269. f. superiores. *Cimex domesticus*.

Müllers Linneisches Natursyst. d. Insekten B. I. S. 477. n. 1.

Muralto, I. de, Anatome Cimicis murorum et lignorum, in Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. I. Obs. 57. p. 141.

Neues Hamb. Magaz. St. 93. S. 282. (Mittel).

Nachrichten der Schles. patriot. Gesellsch. B. IV. S. 106. (*Agaricus muscarius* als Mittel).

Oekonomische Nachrichten der patriotischen Gesellschaft in Schlesien S. 71. (*Thlaspi arvense* als Mittel).

Onomatol. hist. natural. Pars II. p. 860. *Cimex apterus*.

Pratie allgem. ök. Magaz. I. Jahrg. S. 63. (Mittel.)

Pontoppidans, E. Nachrichten die Naturhistor. v. Dänemark betr. m. Kupf. gr. 4. Copenh. 1765. S. 215. n. 1.

Raji Hist. Insect. p. 7. *Cimex*.

Reichsanzeiger 1800. n. 123. (Mittel).

Salberg, I. I. Neue Erfindung und Versuch Wanzen zu tödten, und ihre Eyer unfruchtbar zu machen, in den Schwed. Abh. 1745. S. 20 und 182.

Schwed. Akad. Abh. B. VI. S. 120. B. X. S. 69 u. 73. B. XXVIII. S. 277. B. XXIX. S. 304. (enthalten verschiedene Mittel).

Scopoli, I. A. Entomologia Carniolica, Vind. 1764. 8. maj. p. 354.

Seelliger im II. B. v. Schmuckers chir. Schriften (*Sabadilla*saamen, als ein zuverlässiges Mittel, Wanzen aus Betten und andern Geräthschaften zu vertreiben.)

Southall's, J. curieuse Nachricht von der Wanzen-Natur, Fortpflanzung, Nahrung und Ausrottung. Hamburg 1737. 8.

Sulzers, J. H. abgekürzte Geschicht. d. Ins. S. 93. Kennzeichen der Ins. T. X. Fig. 69.

Stolls, K. Abbildungen und Beschreibungen der Wanzen. Nürnberg. 1792. S. 59. Tab. XIX. Fig. 131. B. Die Bettwanze.

Stutg. phys. ökonom. Ausz. B. VI. S. 555.

Wiegles Zauberlexikon. S. 1639.

Wittenb. Wochenbl. B. VII. S. 619. (Mittel.)

Zincii Leipz. Samml. B. VII. S. 593 und B. XI. S. 76.

Ohngeachtet *Amoureux* glaubt, daß dieses abscheuliche, Ruhe störende Insekt, welches man in Griechenland *κόρις*, in England *the wall Lowse*, in Frankreich *Punaise*, in Spanien *Chismes* oder *Chimeses*, in Italien *Cimice*, in Schweden *Wagglus*, in Holland *Wants* nennt, lange vor dem Jahre 1670 in Frankreich, und vorzüglich in Paris bekannt gewesen seyn müsse; so fieng man doch erst in diesem Jahre an, sich in England über dasselbe zu beschweren, und es wird daher wahrscheinlich, daß wir dessen Verpflanzung nach Europa ebenfalls dem englischen Handel zu verdanken haben. Nur ist es zu bewundern, wie man es so sehr überhand nehmen lassen konnte, daß es nun beynahe in ganz Europa einheimisch und unvertilgbar ist.

Es ist vollkommen ausgewachsen (Tab. I. Fig. 20.) höchstens dritthalb Linien lang und nicht gar zwey Linien breit, beynahe ovalrund, im nüchternen und eyerlosen Zustande ziemlich dünne und flach, hat es sich aber recht voll Blut gesogen, so wird der Rücken gewölbter und, wenn der Bauch mit Eyern angefüllt ist, auch dieser dicker. Auf der ganzen Oberfläche bemerkt das bewaffnete Auge kurze, krause Härchen (Fig. 21.). Übrigens ist die Farbe der jungen Wanze (Fig. 19.) mehr weiß, die der alten aber mehr gelb und braunroth.

Der Kopf ist gegen den übrigen Körper sehr klein, und hat an den Seiten seines breitesten Theils zwey ziemlich grosse, gleich einer Brombeere, aus lauter schwarzbraunen, glatten Körnern bestehende Augen, vor welchen die aus zwey kurzen und drey langen Gliedern bestehenden Fühlhörner stehen. Der Saugrüssel oder Saugstachel am vorderen und unteren Theil des Kopfs (Fig. 19.) ist etwa eine Linie lang (Fig. 22.), aus dem Zangengebisse (Fig. 19. a.) und drey längeren, mit vielen Härchen versehenen Gliedern (Fig. 23.) zusammengesetzt, welche die Scheide des Stachels ausmachen. Senkt die Wanze diesen hornartigen Stachel in die Haut des Menschen, so schiebt sich die Scheide in drey Wulsten über einander zurück. Im Ruhestand aber liegt er auf der untern Brustfläche zwischen den Füßen (Fig. 19.). Durchs Mikroskop entdeckt man noch, daß er zwey, am Ende in die Stachelspitze zusammenlaufende Saugröhren enthält, welche durch die Stachelscheide durchschimmern. Die Bettwanze hat keinen, vom Hinterleibe deutlich abgesonderten Brustschild, zu welchem nur die ersten drey flachen Ringe hinter dem Kopfe gerechnet werden können. Der erste dieser Ringe (Fig. 21. b.) hat auf jeder Seite ein bis an das Auge hervorstehendes Läppchen, der zweyte einen ebenfalls breitgedrückten, halbmondförmigen, der dritte einen blos etwas ausgeschweiften Rand. Weder auf der obern Fläche des Brustschilds noch am

- hin-

hinterleibe ist eine Spur von Flügeln, oder einer Artikulation derselben zu entdecken, und die Behauptung, daß sie zu gewissen Zeiten des Jahres Flügel bekämen, daher völlig ungegründet. Der ovalrunde Hinterleib besteht aus acht, durch feine Furchen unterschiedenen Ringen. Seine durchsichtige Haut (Fig. 21.) gestattet, daß man durchs Mikroskop den schon in der Brust schmal anfangenden, sich dann in mehreren Stellen erweiternden, wechselsweise sich ausdehnenden und zusammengehenden Nahrungskanal, deutlich wahrnehmen kann. Zwey feine Röhrchen, welche im Mund ihren Anfang nehmen, sich hinter den Augen in einem gemeinschaftlichen Kanal vereinigen, führen den vom Saugstachel aufgenommenen Nahrungssaft in diese Werkzeuge der Verdauung, an deren Seiten man zwey grosse Schlagadern, und mehrere Luftgefäße entdeckt. Durch den vorletzten Ring des Hinterleibes (Fig. 24.) schimmert bey dem Weibchen ein bauchigter, flaschenförmiger Theil, der in einen engen Hals zuläuft, und sich im letzten Ring mit einer runden Öffnung endiget, bey dem Männchen aber fängt sich schon im sechsten Ring (Fig. 25.) ein länglichtrunder Theil an, der im siebenten Ring in einem röhrenförmigen, noch ausserhalb den letzten Ring hervorragenden Theil übergeht. Ersteres sind die weiblichen, letzteres die männlichen Geschlechtstheile. Die sechs Füße haben ihre Artikulationen am untern und hintern Theil des Bruststücks (Fig. 19.). Ihre Hüften sind kurz und dick, die Schenkel länger, mehr ins gelbrothe fallend und ebenfalls dick, die Schienbeine viel länger und dünner, als die Schenkel, die Fußblätter halb so lang, als die Schienbeine am Ende mit einem kürzern, mehr einwärts gebognen, und einem längern, weniger gekrümmten Haken versehen, welche die Wanze schliessen und öffnen kann. Mit diesen Krallen, die sie in die Haut einsetzt, veranlaßt sie eine kribelnde Empfindung, wenn sie schnell über die Haut weglauft.

Die Begattung des Männchens und Weibchens geschieht nach Göze mit vereinigten Hintertheilen in einer geraden Linie, wahrscheinlich viermal im Jahre, da das Weibchen eben so oft, nemlich im März, May, Julius und September, jedesmal ungefehr funfzig Eyer, mehrentheils in die Ritzen und Fugen des Holzwerks legt, wo sie am leichtesten auskommen. Das Wanzennest (Fig. 16.) besteht nach *Ledermüller* aus kleinen Stroh- und Federtheilchen, unter und zwischen welchen, die kleinen weissen, durchs Mikroskop sackförmig erscheinenden Eyer (Fig. 17.) in Sicherheit gebracht sind. Die auskriechende junge Wanze öffnet den oberen Theil des Eyes, wie den Deckel einer Weinkanne, und erscheint als ein kleiner, weisser Punkt, welcher sich aus diesem Säckchen herauswühlt und, in
weni-

wenigen Minuten, sich so sehr entwickelt, daß man Kopf und Füße deutlich unterscheiden kann (Fig. 18.). Auch kriecht sie nun so behend, wie die allergröste davon. Man bemerkt jedoch an ihr in diesem zarten Alter noch manche Verschiedenheit von der ausgewachsenen Wanze. Kopf und Brustschild sind grösser und breiter (Fig. 19.), die Fühlhörner länger und dicker, die Füße kürzer und dicker, die Augen hellroth, der ganze Körper weißgraulich, weit durchsichtiger und weit mehr behaart. Erst nach mehreren Häutungen verlieren sich diese Abweichungen mit dem eintretenden Zustand ihrer Vollkommenheit (Fig. 21.).

Sonderbar ist es, daß wir von dem ursprünglichen Aufenthalte dieses, uns so sehr plagenden Insekts, gar nichts wissen. Nur aus seiner grossen Empfindlichkeit gegen die Kälte, welche dasselbe so betäubt, daß es sich nur wenig bewegt und bald erstarret, läßt sich vermuthen, daß es ursprünglich die Bewohnerinn einer warmen Gegend ausserhalb Europa ist. Zwar wird es auch in nordischen Ländern gegenwärtig gefunden; allein es vermehrt sich daselbst nur wenig und hält sich daher nur in geringer Anzahl in solchen Wohnungen auf, die der Sonne vorzüglich ausgesetzt sind, und sonst warm liegen. Dagegen aber ist es in vielen Gegenden von Asien und Afrika, in Südamerika, im südlichen Frankreich, in Italien, in unglaublicher Menge in allen Häusern anzutreffen. So meldet *Elliot*, daß die gemeinen Bettwanzen bey den Einwohnern der Garrowhügel in ungeheurer Menge gefunden werden, und daß er selbst sehr von ihnen geplagt worden sey, und *Kolbe* versichert, daß man sich auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung vor Wanzen nicht retten könne. Alles wimmelt daselbst von denselben, besonders in solchem Holzwerke, welches keinen Anstrich von Ölfarbe hat. Daher man auch daselbst beynahe alles Holzwerk der Häuser mit rothbrauner, gelber oder mit andern Ölfarben überstrichen findet. Als ein die Unreinlichkeit liebendes Insekt, findet die Wanze überhaupt da ihr Fortkommen, wo weder auf Lüftung der Zimmer und Kammern, noch auf Reinlichkeit gesehen wird. *Martial* führte sie deswegen schon im Gefolge der Armuth auf. Doch kommt sie keinesweges häufiger in den Hütten der Armen, als in den vielgadigen Pallästen grosser Städte vor, welche im Gegentheil mehr als die Häuser kleiner Städte von diesem Ungeziefer heimgesucht zu werden pflegen. Sie hält sich daselbst hinter den Tapeten und dem Getäfel der Wände, selbst in den Rissen alter Mauern, in allen Fugen und Falzen der Möbeln, hauptsächlich der Bettgestelle von Tannenholze, in dem Faltenwerke der Sessel und Bettvorhänge, auch im alten Strohgemölme und überhaupt in solchen Betten auf, welche in Stuben stehen, die selten gelüftet werden, deren

ren Kissen nicht fleissig ausgeklopft, und deren Stroh, Überzüge und Bettücher nicht oft genug erneuert werden. Ausser den Wohnungen der Menschen kommen sie auch öfters in Tauben- und Hühnerhäusern, und zwar so häufig vor, daß die Wände völlig damit, wie mit einer Tapete bedeckt sind. Überhaupt vermehren sie sich in dem warmen, hitzigen Tauben- und Hühnermist, der das frühe Auskommen der Eyer so sehr begünstiget, ungeheuer, und solche Stuben und Kammern, welche dergleichen Tauben- und Hühnerställe in der Nähe haben, sind daher nie von diesem Uegeziefer zu befreien. Als seltene Erscheinungen hat man sie auch in Wäldern entdeckt, welches vermuthen läßt, daß sie, wenigstens in warmen Ländern, ihren ersten Aufenthalt in denselben hatten, und durch das Bauholz erst in die Häuser gebracht worden sind. Man hat auch im mittäglichen Teutschland nicht selten Gelegenheit die Bemerkung zu machen, daß vor noch nicht langer Zeit neu aufgeführte Häuser, schon von Wanzen wimmeln, und diese Erscheinung dem noch grün verarbeiteten Bauholz zugeschrieben. Es verdient in soferne alle Aufmerksamkeit, das Bauholz erst gehörig in freyer Luft, welche diesem Insekt tödtlich zu werden pflegt, austrocknen zu lassen, und durchaus kein krankes Holz dazu zu nehmen, weil sie sich in diesem wahrscheinlich vorzugsweise aufhalten. Selbst auf die Art des an sich gesunden Holzes, welches sowohl zum Bauen, als zu Möbeln gebraucht wird, scheint in Rücksicht der Vermehrung der Wanzen sehr viel anzukommen. So sollen sie sich zum Beyspiel wegen des Kiefern- und Fichtenholzes in der Mark und in Berlin mehr, als in andern Gegenden Teutschlands finden.

Was die Nahrung der Wanzen betrifft; so weiß man noch nicht, wovon sie eigentlich leben. Aus dem Menschen ziehen sie Blut, aus dem faulenden Holze im Walde, vielleicht die sauren Säfte desselben. Sind sie sehr hungrig, so saugen sie einander selbst, und oft die Weibchen die Männchen aus, wobey sie nichts als den leeren Balg, so wie er bey der Häutung abzugehen pflegt, zurücklassen. Sie können jedoch sehr lang ohne Nahrung leben, den strengsten Winter in einem gewissen Schlaf zubringen, und dennoch im Frühling wieder aus ihren Schlupfwinkeln hervorkommen. Sie fliehen die Helligkeit des Tages und kommen nur des Nachts aus ihrem Hinterhalte, um ihre Nahrung zu suchen. Gewöhnlich wird man daher nur des Nachts von ihnen beunruhiget, am Tage aber, höchstens dann, wenn man sich in einem dunklen Zimmer zu Bette legt. Kriechen sie alsdann auch nur über die Haut; so lassen sie bey empfindlichen Personen in warmen Gegenden, oder in der heissen Jahrszeit, brennende Spuren zurück. Gewöhn-

wöhnlich aber stechen sie, um Blut einzusaugen. Sie ziehen zu dem Ende die Scheide des Saugrüssels zurück und senken den Stachel bis an die Kehle in die Haut des Menschen. Indem sie nun die Luft in der hohlen Röhre des Stachels durch das Anziehen verdünnen; so steigt das Blut so lange in die Höhe, als sie selbst Nahrung suchen und dabey ungestört bleiben. Den herausgezogenen Stachel überziehen sie erst wieder mit seiner Scheide, bevor sie ihn auf die Brust zwischen die Füße zurücklegen.

Die Wirkung des Wanzenstichs auf die Haut ist anfänglich kaum bemerkbar. Die Wunde schließt sich nach ausgezogenem Stachel, und es kommt kein Blut zum Vorschein. Diese Stockung der ausgetretenen Feuchtigkeit unter der Haut trägt aber, nebst der besondern Giftigkeit des Stichs selbst, dazu bey, daß eine kleine entzündliche, heftig juckende Geschwulst entsteht, die nach der individuellen Verschiedenheit des Hautgewebes, verschieden ist. Bey manchen Personen erhebt sich an der Stellé des Stichs blos ein gelbrothes, brennendes Knötchen, welches den pustelartigen Erhabenheiten der Haut bey der Nesselsucht, nicht unähnlich ist. Bey andern verbreitet sich um diese Knötchen eine völlig erysipelatöse Röthe und sie verwandeln sich selbst in grosse, harte Pusteln, welche das teuschende Ansehen von den *Variolis magnis* (*Grande Vérole* der Franzosen) haben, endlich aufplatzen und etwas wässerichte Feuchtigkeit ergiessen. Die zur Hervorbringung solcher Pusteln nöthige Disposition der Haut, beruht keinesweges, wie es scheinen könnte, auf ihrer Zartheit; denn ich habe sie sowohl bey Personen von fester und brauner, als bey Personen von dünner und weisser Haut wahrgenommen und bin anfangs, bis ich die verschiedenen Wirkungen des Wanzenstichs näher kennen lernte, verleitet worden, sie als Folgen besonderer Schärffen, durch innerliche und äusserliche Mittel zu behandeln.

Auch diese Insekten verfolgen nicht alle Menschen ohne Unterschied, sondern beweisen durch die Ausnamen, welche sie machen, daß es besondere, sie anlockende oder abschreckende Eigenheiten der Säfte giebt. Manchem Menschen raubt eine einzige Wanze allen Schlaf. Ein anderer aber schläft ruhig unter Legionen von Wanzen. Auffallend ist in dieser Rücksicht *Degeers* Beobachtung von zwey Personen, welche in einem Bette schliefen. Bey der einen waren Gesicht, Hände und Füße von den Wanzenstichen ganz aufgeschwollen, die andere aber hatte gar nichts von einer solchen Verletzung wahrgenommen. Es ist jedoch ausgemacht, daß die Wanzen nicht zu jeder Zeit gleich stark, und ohne Ausnahme verletzen; sondern daß sie desto ärger stechen, je lebhafter sie sind,
und

und daß dieses vorzüglich von der heisseren Witterung oder dem heisseren Klima abhängt.

Ausser ihren juckenden und brennenden Stich, werden die Wanzen noch durch den ekelhaften Geruch unerträglich, den sie verbreiten, wenn sie zerdrückt werden, welches wegen ihres zarten Balgs leicht möglich ist. Dieser Geruch ist die Wirkung einer ihnen eigenen, scharfen Feuchtigkeit und macht sie wegen einer gewissen Giftigkeit noch verdächtiger.

Die Wanzen haben verschiedene Feinde unter den Insekten, nach *Linne* die Spinnen und rothen Ameisen, nach *Stoll* die Larve der Koth- oder Fliegenwanze (*Cimex personatus*), nach *Kühn* nebst dieser noch die hartschaalichte Wanze (*Cimex coleoptratus*), welche auf sie in ihren verschiedenen Schlupfwinkeln Jagd machen, und sie aufreiben. Man hat sie auch deswegen als Vertilgungsmittel der Bettwanzen in Vorschlag gebracht. Da aber letztere sich leicht flüchten können, und, wenn sie auch selbst den Verfolgungen ihrer Feinde zuletzt unterliegen müssen, dennoch immer eine zahlreiche Nachkommenschaft in ihren Eyern zurücklassen, überdies aber jene Bettwanzenfeinde dem Menschen nicht weniger lästig zu werden pflegen: so ist von dem Rath, diese in die Kammern und Zimmer zu setzen, wo sich Bettwanzen aufhalten, weder ein bleibender, noch ein reeller Nutzen zu erwarten. Überhaupt hat man sich schon seit *Hippokrates* Zeiten vergebens bemühet, ein sicheres und schnell wirkendes Vertilgungsmittel der Wanzen zu entdecken. *Linne*, *Göze*, *Blumenbach*, *Meyer*, führen dergleichen in Menge an, ja es giebt beynahe keine ökonomische Wochenschrift, kein Intelligenzblatt, wo dergleichen nicht von Zeit zu Zeit angepriesen werden. Alles kommt hierbey wohl ebenfalls auf Wachsamkeit und zeitliche Thätigkeit an. Sobald man nur wenige dieser abscheulichen Insekten gewahr wird: so ist es nöthig, gleich alles durchsuchen, die Bettstellen, Mobilien etc. mit kochenden Wasser auswaschen, die Wände und Ritzen derselben mit Kalk übertünchen, das Zimmer oder die Kammer beständig lüften zu lassen. Auch bleibt dieses Verfahren selbst dann noch immer zweckmässig, wenn sie schon wirklich überhand genommen haben, und nebenher noch andere kräftige, Wanzentödtende Mittel angewandt werden müssen. *Linne* rechnet hieher vorzüglich eine übelriechende Pflanze, die *Cimifuga foetida*, andere empfehlen zu dem Ende den Rauch von Pfeffer, *Assa foetida* und Schwefel, noch andere den Kalkdampf. Man soll nemlich zwey bis drey Schefel, und nachdem das Zimmer grösser, noch mehr Kalk, bey fest verschlossenen Thüren und Fenstern, in dem Zimmer oder der Kammer löschen, wo sich Wan-

zen aufhalten. Nach 24 Stunden kann man Zimmer und Kammer wieder öffnen, und wenn man nun Wände, Gardinen etc. rein abgekehrt hat, so soll sich alsdann keine Spur von lebendigen Wanzen mehr zeigen. Wenn aber auch solche Dinge, welche starke Gerüche oder erstickende Dämpfe verbreiten, im Stande sind, die Wanzen zu tödten; so sind sie doch sicher nicht im Stande, auf die zurückgelassenen Eyer zu wirken; daher in dieser Rücksicht der Vitriol, wenn er in Wasser aufgelöst und damit alle Ritzen und Spalten des Holzwerks wohl ausgestrichen, die Wände aber mit Kalk, der mit Vitriolwasser vermischt worden ist, überstrichen werden, bis jezt wohl das bewährteste Mittel ist.

2. Die Menschenbremse.

Oestrus hominis, totus fuscus. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. P. V. p. 2811. n. 10. — Habitat larva in America australi per sex menses sub cute hominum abdominali, si turbetur, profundius penetrando periculosa, adeo ut fertur, lethalis; imago muscae domesticae magnitudine.

Albucasis Lib. II. Cap. 93.
Alzaravius Sect. II. Tract. XXXI. Cap. 13.
Avenzoar Lib. II. Tract. VII. Cap. 20.
Clerici Histor. lator. lumbricor. Genev. 1715.
p. 267. Fortasse *Vermiculis affectum bovinum indu-*
gens.

Modeer Fortsetzung von den Bremsen. S. die
neuen Abhandlungen der Schwedischen Akademie der
Wissenschaften Band VII. S. 163. Menschenbremse.
Pallas neue nordische Beyträge Band I. S. 157.
Auszug aus einem lateinischen Schreiben des jüngern
Herrn Carl von Linné vom 24. März 1780.

Was wir von diesem merkwürdigen Insekte wissen, verdanken wir dem jüngeren Herrn Carl von Linné, der schon 1780 Hoffnung hatte, diese in Europa noch völlig unbekannte Art *Oestrus*, welche die Menschen in Peru plagt, selbst zu erhalten und sie dann durch eine genauere Beschreibung bekannt zu machen. Sie hat, nach seiner Erzählung, das Eigne, daß sie wohl funfzig Eyer, oder vielmehr schon lebendige Maden am Hinterleibe herumträgt, und hiervon eine nach der andern auf die Haut des Menschen absetzt. Salben und andere äusserliche Mittel, welche man zu ihrer Vertilgung anwendet, haben den Nachtheil, daß sich diese Larven immer tiefer ins Fleisch eingraben und hierdurch schreckliche, ja tödtliche Schmerzen veranlassen. Es ist daher rathsamer, sie nicht zu beunruhigen, weil sie dann ohne weiteren Schmerz zu veranlassen, zu der Zeit, wo sie sich verwandeln wollen, selbst hervorbrechen, und sich in schwärzliche, die gemeine Hausfliege an Grösse nicht viel übertreffende Fliegen verwandeln. Wahrscheinlich werden blos die nackend gehenden westindischen und die aus Afrika kommenden Wilden von dieser Bremse angefallen.

Beynahe scheint dieses amerikanische Übel mit dem arabischen, welches *Albucasis*, *Alzaravius* und *Avenzoar* unter *Passio* oder *Aegritudo bovina* beschreiben, und welches ausser dem Menschen, noch öfters beym Rind vorkommen soll, einerley zu seyn. Sie melden nemlich, daß sich in dieser Krankheit, nach ihren irrigen Begriffen von der Entstehung der Würmer und Insekten, ein Wurm aus einer faulen Feuchtigkeit zwischen Haut und Fleisch entwickele, daselbst seinen Ort oft verändere und auf und abziehe, bis er endlich durch die Haut hervorbreche. Zur Heilung empfehlen sie die Unterbindung des Theils über und unter dem Wurm, sodann die Herausziehung desselben durch eine auf demselben gemachte Incision, wenn er sich aber schon tief ins Fleisch gewühlt hat, das glühende Eisen.

Clericus gedenkt, daß *Vallisneri* in einer eignen, in italiänischer Sprache geschriebenen Dissertation, *de Boum Oestro*, die ich selbst nicht erhalten konnte, die Krankheit der Araber einer Bremse zuschreibe, welche ihre Eyer unter die Haut legt und dadurch die heftigsten Schmerzen veranlaßt. Die aus dem Ey unter der Haut sich entwickelnde Larve rückt aber, nach seiner Beobachtung nicht aus einem Ort in den andern, womit auch Linnés Erzählung übereinstimmt; sondern verweilt den ganzen Winter hindurch an einer und derselben Stelle. So wie die Larve an Grösse zunimmt, entsteht eine schmerzhaftige Geschwulst, hat sie aber ihr Wachsthum vollendet, welches im Sommer, also ebenfalls nach einem halben Jahre zu geschehen pflegt, so bricht sie aus der Haut hervor, verwandelt sich sodann in eine Puppe, woraus endlich die Bremse zum Vorschein kommt. Sonderbar ist es, daß verschiedene Naturforscher und Ärzte, welche in neueren Zeiten jene Gegenden bereist haben, von der Krankheit der alten arabischen Ärzte nichts weiter erwehnen.

3. Der gemeine Floh. Tab. VI. Fig. 1 — 23.

Pulex irritans, rostro corpore brevior. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. P. V. p. 2923. n. 1. — Habitat ubique in Europa, et America sanguisugus, leporibus potissimum molestus, hinc a Dalecarlis ramento vestimenti leporini capitur et avertitur, satureja, pulegio, persicaria, cotula, alno, ut fertur, pellendus.

Adams Microgr. Tab. XXVII. n. 158.

Albini, E. a natural history of Spiders Tab. 41.

Amoreux Notice p. 130 et 268.

Anon. angl. p. 204. f. 12.

Baxter Empl. for the Microsc. T. XIII. f. 6.

Blumenbachs Handbuch der Nat. Gesch. S. 387.

(Engl. *flea*.)

Bouannani Museum Kircher. Pars. I. de Observ.

rer. min. ope Microsc. f. 56.

Borelli, P. Obs. microsc. obs. 12.

- Camerarius, E. de Pulice; in *Electivae Medicinae spec.* p. 71.
- Cellarii, J. Diss. de viventibus sponte nascentibus (Resp. Fischbeck) Helmst. 1674. 4.
- Cuno in observationibus microscopicis.
- Cuvier Tableau élémentaire p. 621. *la puce ordinaire.*
- Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze. B. VII. S. 5. Tab. I. f. 1 — 5. *Puce commune, Pulex vulgaris, der gemeine Floh.*
- Diacinto Cestone the generation of fleas. Philos. Transact. n. 249. p. 42. Badd. III, p. 336. c. f.
- Fabricii Syst. Ent. p. 732. n. 1. *Pulex irritans*. ejus. Spec. ins. II. p. 383. n. 1. Mant. ins. II. p. 314. n. 1.
- Frisch, J. L. Beschreibung von allerl. Insekten in Teutschland, Th. XI. S. 8.
- Fuefslis Verzeichniß schweiz. Ins. S. 59. n. 117. *der gemeine Floh.*
- Gassendus in vita Peireskii L. VI. p. 361.
- Geoffroy Ins. par. II. p. 616. n. 1. Tab. XX. f. 4. *la Puce.*
- Göze, Geschichte schädli. Insekten, S. 52.
- Griendelius obs. II. p. 16. f. 4. (vom Streite zwischen dem Floh und der Laus.)
- Hamburg. Magaz. neues, St. 93. S. 282. (Mittel wider Flöhe etc.)
- Historische und physikalische Untersuchung der Flöhe. Bressl. Natur- und Kunstgeschichte. Suppl. II. S. 105.
- Hooke, R. Micrographia. Lond. 1667. p. 210. Tab. XIII. Fig. 6.
- Joblot Observat. avec le Microsc. Tom. I. Part. 1. Tab. III.
- Kähler in den Abhandlungen d. Schwed. Ak. der Wissenschaften. Band XX. S. 33.
- Kniphof Diss. de pedicul. inguin. §. XV.
- Kratzenstein, C. G. Abhandlung von der Erzeugung der Würmer im menschlichen Körper. Halle 1748. S. 9.
- Ledermüllers mikroskopische Ergötzungen. S. 41. Tab. XX.
- Leeuwenhoek, Lettre du 15. Oct. 1698. Epist. 76. Fig. 1 — 20.
- Liceti, F. de Spontaneo vivent. ortu. Lib. IV. Vicentiae 1618. Fol.
- Linnaei Faun. Suec. n. 1695.
- Moschetti de Pulice 1544.
- Mülleri Faun. Fridr. p. 91. n. 813. Zool. Dan. Pr. p. 186. n. 2208.
- Muralto anat. pulic. vulg. in Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. obs. 54. et 55. p. 137.
- Müllers Linneisches Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 1040. n. 1. *Der Nachtwecker.*
- Neuer Schauplatz der Natur. III. S. 138.
- Onomatal. Hist. nat. P. VI. p. 702. *Der gemeine Floh.*
- Raji Histor. Insect. 7.
- Rösels Insektenbelustigung. Th. II. Samml. d. Mücken und Schnacken. S. 9. Tab. II. III. und IV.
- Sachs, Ph. J. in Messe observ. Microscop. Miscell. curios. T. I. p. 52.
- Schaeffer. Element. Entomolog. Tab. 105.
- Sulzers Geschichte der Ins. S. 242 und 244. Tab. XXIX. Fig. 6. e. *Der gemeine Floh.*
- — Kennzeichen der Ins. Tab. XX. Fig. 146.
- Vallisnieri Opera Th. I. Tab. XXV. Fig. 1.
- Watkins exercice du Microsc. à Londr. 8. 1754. p. 29. Fig. 29.
- Weisse, E. Obs. de pulice. Act. Helvet. Vol. V. p. 340.

Der grösseren Vervollkommnung der Mikroskope und ihrer bequemerer Einrichtung zum naturhistorischen Gebrauch, verdankt die Naturgeschichte des Flohs ebenfalls ihre endliche Aufklärung. Vor *Leeuwenhök* und *Redi* glaubte man allgemein, daß der Floh, wie alle Insekten und Würmer, deren Zeugungsorgane dem blossen Auge wegen ihrer Kleinheit verborgen waren, durch faulende Substanzen hervorgebracht würde, und suchte also in Dingen eine schaffende Kraft, welche die Entwicklung desselben durch den enthaltenen nährenden Stoff bloß begünstigten. Vorzüglich liefs man ihn in Kinderstuben und anderen Schmutzwinkeln wachsen, wo faulende Urintheile im Staube, und vorzüglich unter den Sägespänen, in Menge angehäuft sind. Allein auch er entsteht, nach der männlichen und weiblichen Paarung, aus einem befruchteten Eye, und bedarf im Sommer vier, im Winter sechs Wochen zu seiner völligen Entwicklung.

Gleich

Gleich nach der Begattung legt das Flohweibchen sechzehn bis zwanzig überaus kleine, weisse Eyer (Tab. VI. Fig. 1.), welche unter dem Mikroskope die gewöhnliche eyrunde Gestalt (Fig. 2.) haben. In jedem solchen Eye entdeckt man nach drey, vier Tagen eine schneckenförmig zusammengekrümmte Made (Fig. 3.) und diese erreicht im Sommer schon in sechs, im Winter in zwölf Tagen, diejenige Reife, die sie zum Auskriechen geschickt macht. Nachdem sie mit dem Kopfe die Schale des Eyes durchstossen hat, erscheint sie in einer Länge (Fig. 4.), die nur eine halbe Linie beträgt, nimmt aber täglich an Grösse zu, und ist im Sommer nach eilf Tagen, im Winter einige Tage später, völlig ausgewachsen (Fig. 5.). Die männliche Flohmade (Fig. 6. a.) ist dann eine gute Linie lang, die weibliche (b.) etwas länger. Ihre Farbe ist weifs, verändert sich aber und wird roth, wenn sie sich vom Blute genährt haben.

Durch das Vergrösserungsglas entdeckt man am Kopfe der Made (Fig. 7. und 8. a.) vier kleine Fühlspitzen oder stumpfe Häckchen, wovon die zwey längern gleich unter den beyden Augen, die zwey kürzern zur Seite des Munds stehen. Hinter dem Kopfe folgen die dreyzehn Ringe des übrigen Körpers der Made, welche mit feinen Härchen besetzt, weifs oder gelbröthlicht nach der durchschimmernden Farbe der genossenen Nahrung, und auch auf der Bauchfläche rund sind, weil sie keine Füsse haben. Doch scheinen zwey am Schwanzende befindliche Häckchen der Made im Kriechen fortzuhelfen, ihr nebst dem am Kopfe befindlichen Häckchen, womit sie sich anstemmt (Fig. 8.), zu verschiedenen Bewegungen und Krümmungen des Körpers zu dienen, und sie geschickter zu machen, den Staub und Schmutz zu durchwühlen, um in demselben ihre Nahrung zu suchen. Diese ist Schleim, Blut, Urin und Unrath überhaupt, daher auch Miststätten, geheime Gemächer, unsaubere Betten, die Ritzen der Fußböden unreiner Stuben, und vorzüglich das weibliche Geschlecht, wenn es sich nicht der Reinlichkeit befleissiget, der Lieblingsaufenthalt der Flohmaden sind.

Kaum hat die Flohmade ihre vollkommene Grösse erreicht, so verliert sie ihre Fresslust, verkriecht sich im Staub und Schmutz, wird wieder völlig weifs (Fig. 9.) und schickt sich zur Verpuppung, indem sie sich ganz zusammen krümmt (Fig. 10). Nach einigen Tagen erfolgt diese Verwandlung wirklich, und man findet an der Stelle der Made eine kleine, weisse, länglichtrunde Puppe (Fig. 11. und 12.), an deren Schwanzspitze der abgestreifte Madenbalg hängt. Auch in der Puppe ist der Geschlechtsunterschied nicht zu verkennen. Die an sich gewöhnlich grössere weibliche Puppe (Fig. 12), hat, unter dem Mikroskope betrachtet (Fig. 13),

am

am Schwanzende nur eine, die kleinere, männliche Puppe (Fig. 11), zwey stumpfe, mehr aufwärts gebogene Spitzen (Fig. 14). Übrigens hat jede Flohpuppe, ausser dem Kopfring, wie die Made, zwölf Bauchringe und einen Schwanzring. Am Kopfe sind die Augen sichtbar, zu beyden Seiten des Leibes aber die Hülsen der Flohfüsse. Die Flohpuppe verliert bald ihre weisse Farbe und wird immer gelber und dunkler (Fig. 14), je reifer sie zum Auskriechen wird. Dieses erfolgt den eilften Tag nach der Verpuppung und mithin den acht und zwanzigsten nachdem das Ey gelegt worden ist.

Das Wachsthum des jungen Flohs scheint sich auf keine gewisse Zeit zu beschränken und früher, oder später beendigt zu seyn, je nachdem sich ihm mehr, oder weniger Nahrung darbietet. Da er ein Alter von sechs Jahren erreichen soll, so ist es wahrscheinlich, daß er sehr langsam zu seiner vollkommenen Grösse gelangt, welche die seiner Puppe höchstens noch einmal übersteigt (Fig. 15 und 16). Der Kopf des ausgewachsenen Flohs ist gegen seinen langen und dicken Körper ziemlich klein. An demselben werden durchs Mikroskop (Fig. 19.) seine überaus hellen Augen sogleich kenntlich und hinter denselben auf jeder Seite des Kopfs, ein den Fischohren oder Fischlungen ähnliches Läppchen (*a.*) sichtbar, welches der Floh öfters bewegt, und, wenn es nicht das Ohr ist, vielleicht ähnliche Bestimmung, wie bey den Fischen, haben kann. Vor den Augen stehen in einiger Entfernung die viergliederichten Fühlhörner (*b. b.*), zwischen und unter welchen sich der schnabelähnliche Saugrüssel (*c.*), nebst dem hornartigen Saugstachel (*d.*), befinden. Der Floh sucht damit seine Nahrung und bewegt ihn zu dem Ende unaufhörlich hin und her, bis er eine schickliche Stelle zum Stich findet. Nunmehr stemmt er seine zwey Vorderfüsse an, stellt den Hinterleib hoch, und senkt den Stachel in die Haut, worauf im Umfange des verletzten Punkts eine kleine Entzündung, wie ein rother Hof entsteht, die sich gewöhnlich nach einigen Stunden, bisweilen aber auch erst nach mehreren Tagen, wieder verzieht, wenn der Floh stark gesogen und hierdurch veranlaßt hat, daß von dem, nach zurückgezogenen Stachel noch hervorkommenden Blute, ein kleines Extravasat im Umkreise des Stichs unter der Haut entsteht.

Der ganze Körper des Flohs gleicht einem schuppichten Panzer, der an den verschiedenen Absätzen mit borstigen Haaren besetzt, auf dem Rücken braunroth, gegen den Bauch zu aber gelb ist (Fig. 17. 18. 20.). Ausserdem hat der Floh das Eigne, daß seine zwey Vorderfüsse gleich am Kopfe zu beyden Seiten des Saugrüssels eingelenkt sind, welches man bey keinem andern Insekte findet. Die vier

vier übrigen Füße aber haben ihre Gelenke an dem Theil des Vorderleibes, den man, nach der übrigen Bildung des Flohs, für den Hals desselben ansehen könnte. Jeder Fuß hat drey lange Glieder, an welche sich bey den zwey Vorderfüßen neun, bey den vier Hinterfüßen fünf kürzere Glieder anschliessen. Das erste Glied, oder der Schenkel, ist glatt, das Schienbein, das Afterschienbein und die aus den kleinen Gliedern bestehenden Fußblätter aber, haben kurze, borstenartige Haare. Diese verursachen nebst den zwey, am Ende jedes Fusses befindlichen krummen Häckchen, die unangenehme juckende und kitzelnde Empfindung auf unserer Haut, welche der herumirrende Floh veranlaßt, und erinnern uns, wie seine Stiche, an die Reinigung unsrer Oberfläche, wodurch diesem Insekte seine Lockspeise entzogen wird. Sucht der Floh den Nachstellungen seiner Feinde zu entgehen; so setzt er seine zwey weit längeren Hinterfüße in Thätigkeit, in welchen er eine solche Schnellkraft besitzt, daß er wohl funfzehn Zoll weit zu springen vermag.

Die bisherige Schilderung ist dem männlichen und weiblichen Floh gemein, und es ist daher noch übrig, den Geschlechtsunterschied anzugeben. Der an sich immer kleinere männliche Floh (Fig. 17) hat einen hohlen Rücken und schmalen Hinterleib, der weibliche Floh (Fig. 18.) einen bauchichten Rücken und bauchichten Hinterleib. Die Geschlechtsorgane des männlichen Flohs sind in der stark in die Höhe gekrümmten Schwanzspitze befindlich (Fig. 17. *b.*) und bestehen aus drey verschiedenen Theilen, nemlich aus dem männlichen Gliede, aus zwey Haltzangen, und zwey andern kolbenähnlichen Hervorragungen. Das männliche Glied hat am obern Theil seines gegen den Rücken gekehrten, vordern, und hohlen Rands, eine hackenförmige Spitze (Fig. 21 und 22. *a.*), bildet sodann nach hinten eine ungleiche, warzenförmige Erhabenheit, wird unter derselben schmaler, läuft aber sodann wieder breiter in grössern und kleineren Hervorragungen gegen die Spitze des Hinterleibes zu, wo es in einem rothen Sack enthalten ist. Dieses Glied ist von einer durchsichtigen Substanz, mit einigen Härchen besetzt und kann von dem Floh verschieden verändert werden, so daß es bald höckerichter bald ebener erscheint. Es wird von beyden Seiten durch zwey gelbrothe, ovalrunde, stark mit Haaren besetzte Klappen, oder blätterförmige Haltzangen aufgenommen (Fig. 21. *c.*), zwischen welchen es (*a.*) immer nur zum Theil sichtbar ist. Gleich hinter dem männlichen Gliede kommen aus dem nemlichen rothen Sack, zwey an Substanz und Farbe demselben gleichende, unten stielförmige und oben bauchigte Theile (*b.*) hervor, welche zwey Pistillen, oder Kolben ähnlich sind,

und

und gleiche Bestimmung mit der Haltzange zu haben scheinen, nemlich die weiblichen Geschlechtstheile in ihr zu umfassen und zur Aufnahme des männlichen Glieds beyzutragen.

Die Geschlechtstheile des Flohweibchens (Fig. 18 und 23.) sind weniger zusammengesetzt und bestehen aus einer warzenförmigen, behaarten Hervorragung (*b.*) am Schwanzende, welche das Weibchen verlängern und verkürzen kann; ferner aus einer andern halbrunden Erhabenheit über und unter jener Warze. Letztere Erhabenheit (*c.*) bedeckt grötentheils die Spalte, welche zur Aufnahme des männlichen Glieds bestimmt ist, und aus welcher das Flohey (Fig. 23. *a.*) hervorkommt.

Zur Begattung begiebt sich das Flohweibchen allezeit auf den hohlen Rücken des Flohmännchens (Fig. 20). Dieses krümmt sein Schwanzende noch mehr in die Höhe und faßt, nachdem es das männliche Glied in die Öffnung der weiblichen Geburtstheile eingebracht hat, die Spalte jener Öffnung zwischen die beyden Blätter seiner Haltzange (*a.*). So vereinigt bleiben beyde Flöhe öfters länger, als eine Stunde beysammen. Das Flohweibchen legt nach der Begattung seine befruchteten Eyer und bringt hiermit beynahe eben so viele Stunden zu, als es Eyer im Leibe hat. Es scheint dann keiner weiteren Begattung fähig zu seyn, welche das Männchen noch öfter unternimmt und daher mehrere Weibchen zu befruchten im Stande ist. Aber kaum ist auch vom Männchen die Absicht der Fortpflanzung erreicht; so tritt, wie beym Weibchen nach gelegten Eyern, die Abnahme der Kräfte ein. Sie schrumpfen zusammen, werden dunkler an Farbe, und nach zwey, drey Tagen sind sie schon todt.

Was den Aufenthalt des Flohs betrifft, so liebt er, wie die Flohmade, die Haut und die behaarten Theile unreinlicher Menschen, und saugt sich am liebsten von ihrem Blute voll, bewohnt aber vorzüglich die behaarten Stuben- und Hausthiere z. B. die Hunde, Katzen, Mäuse etc. von welchen er auf den Menschen, besonders auf das weibliche Geschlecht, um so leichter übergehen kann, da dessen mehr offene und den Zugang zu den Geschlechtstheilen weniger verschliessende Kleidung, den Anlauf dieser Insekten überaus begünstiget. Er flieht aber alle todte Menschen und Thiere, wahrscheinlich weil er, nebst dem ihn lockenden übelriechenden Schweiß, besonders der Wärme nachgeht, und ist deswegen auch nur in den gemässigten und warmen Erdstrichen zu Hause. Dies ist nach Köhler vorzüglich der Fall in Taranto, der schmutzigsten und unreinlichsten Stadt im ganzen Königreiche Neapel, wo sich die Einwohner im Sommer auf den Gassen

vor Flöhen nicht retten können, und daher Strümpfe von Leder zu tragen genöthiget sind. Hingegen ist er in weit geringerer Anzahl, oder gar nicht in den nordischen Ländern, und aus eben dem Grunde bey uns am häufigsten zur warmen Jahrszeit, am seltensten bey strenger Kälte anzutreffen.

Zur Vertilgung der Floheyer und Flohmaden schlägt *Frisch* das öftere Waschen der bretternen Fußböden der Zimmer mit kochendem Wasser vor. Dem Floh selbst aber sind allerley bittere Mittel zu vertreiben im Stande, und man dürfte daher solchen Damen, die wegen ihrer besonderen Atmosphäre von den Flöhen sehr geplagt werden, vorschlagen, sich mit Wermuthwasser, oder einen andern bitteren Dekokt zu waschen. Bisweilen verirrt sich der Floh auch ins Ohr und wird dann durch seinen Reiz ausserordentlich lästig. Etwas eingelegte Baumwolle, in welcher er sich verwirret, oder etwas ins Ohr getropfeltes Öl, welches ihn tödtet, sind dann die besten Mittel ihn wieder los zu werden. Übrigens findet man eine Menge Mittel wider die Flöhe in *Gözes Geschichte schädlicher Insekten* angezeigt.

4. Der Sandfloh. Tab. VI. Fig. 24. und 25.

Pulex penetrans, rostro corporis longitudine. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. Pars V. p. 2924. n. 2. — Habitat in America, pedes hominum intrans, ova depouens, ulcera maligna, saepe mortem caussans, caute extrahendus, fusco-rufescens, abdomine subtus feminae ovis innumeris gravidarum orbiculato, ad magnitudinem centuplam totius corporis intumescens.

Adansons Reise nach Senegal 1757. S. 248.
Amoureux Notice p. 138 und 269. *Chique* ou *Pon de Pharaon*.

Baierus, J. J. Act. Acad. N. C. Vol. III. p. 18.

Bankrofts Naturgeschichte von Guiana, p. 152 und 474.

Barrere Beschreibung von Guiana.

Berlinische Sammlungen B. V. S. 396. B. VII. S. 231 und 235. *Chiken*, *Chigger*.

Blumenbachs Handb. der Naturgesch. S. 387. n. 7. *der Sandfloh*, *die Tschike*, *Nigua*, *Ton*, *Attun*.

Bomare, Vallin. de. Dict. Tom. II. p. 374 und Tom. III. p. 143.

Browne, a civil and natural History of Jamaica, Lond. 1756. p. 418. *Acarus fuscus* sub cute nidulans, proboscide acutiori.

Catesby, a natural history of Carolina. Lond. 1731. Vol. III. p. 10. Tab. X. f. 3. *Pulex minimus*, *cuteum penetrans*, *americanus*, *Chogo*.

Clericus, Histor. lat. lumbric. p. 270. *Vermiculi americani*, *pedibus hominum molesti*.

Cuvier, Tableau élémentaire, p. 622. *la puce pénétrante*.

Fabricii Syst. ent. p. 733. Spec. ins. II. p. 383, n. 1. Mant. ins. II. p. 314 n. 2.

Fermins Reise durch Surinam, II. Th. S. 289.

Gazette littéraire de Berlin 1765. p. 374.

Gazette salut. 1771. n. 49. p. 386.

Groben, O. F. v., Oriental. Reis. K. XXIX. S. 278. *Pharaonis Läuse*.

Linnaei Amoenit. acad. Vol. III. p. 323. *pulex cauda furcata*, in America *Nigua* dicta.

Marcgravii Hist. rer. natural. Brasil. p. 249. *Tunga*.

Müllers Linn. Naturs. d. Ins. II. B. S. 1042. n. 2. *der Sandfloh*.

Mouffetti Insector. Theatr. Lib. II. Cap. XXIV.

*Oromatol. hist. nat. P. VI. p. 704. der amerikani-
sche Floh.*

Paulini, de morte verminosa, p. 42.

Pisoni s de Indiae utriusq. re naturali et medica
Lib. V. Cap. XII. Amstel. 1658.

Roche fort (Charl. de) Histoire naturelle et mo-
rale des Isles Antilles de l'Amerique Vol. I. p. 398.
C. XXIV. §. 6. *Chique.*

Sauvages Nosologia Lips. 1797. Tom. V. p. 201.
Malis americana.

Schöpf's, J. D. Reise durch einige der mittlern
und südlichen vereinigten nordamerikanischen Staaten

nach Ost-Florida und den Bahama-Inseln. Th. II.
S. 479 und 482. *Chigger.*

Seeligmanns, J. M. Sammlung verschied. aus-
länd. Vögel. Nürnberg. 1753. Th. III. Tab. 108. Fig. 3.
der kleinste amerikanische Floh.

Sloane Histor. v. Jamaica. Einleit. S. 124. und
Th. II. S. 191.

Smeathmanns Sendschreiben über die Termit-
ten Afrikas. Götting. 1789. S. 58. *Ligger of the
Westindies.*

Sulzers Geschichte der Insecten. S. 243.

Unzers medicinisches Handbuch, 1789. S. 653.
der Schicke.

Man kennt diese schwarzen, überaus kleinen, nach Schöpf's schätzbaren Nach-
richten nicht bloß auf den Bahama - Inseln, sondern auch auf allen westindischen
Eylanden und in den wärmeren Gegenden von Nordamerika bis Karoline und
selbst Virginien zu findenden Insekten, welche kaum den vierten Theil so groß,
als die gemeinen Flöhe sind, unter verschiedenen Namen. Auf den antillischen
Inseln nennt man sie *Chiques*, in Brasilien *Tungas* und *Piques*, in Peru *Ninguas*,
in Rio de Berbice, *Mobitjes*. Auch nennen sie die Franzosen *Poux de Pharaon*,
Pharaos-Läuse, weil man sie für die nemlichen Insekten hält, womit Pharaon heim-
gesucht worden ist. Ihr ganz schwarzer, kaum bemerkbarer Kopf, zeichnet sich
unter dem Mikroskope durch einen ungewöhnlich langen, röhrenförmigen Saug-
rüssel (Tab. VI. Fig. 24. a.) aus, der aber keinesweges der Länge des ganzen übr-
igen Körpers gleich kommt, sondern höchstens den dritten Theil derselben aus-
macht. Über und neben dem Saugrüssel befinden sich, wie beym gemeinen Flo-
he, zwey gegliederte Fühlhörner und hinter diesen erhebt sich mit einemmale der
Rücken des in zehn Ringe getheilten, in der Mitte sehr dicken, gegen das Schwanz-
Ende aber wieder etwas schmälere zulaufenden Leibes. Letzterer endigt sich mit
einem stachelförmigen, etwas nach oben gekehrten Anhang (b.), der den dritten
Theil länger, als der Saugrüssel selbst ist. Das Flohweibchen unterscheidet sich
durch seinen überaus aufgetriebenen, mit unzähligen Eyern angefüllten Hinterleib
von dem Männchen. Übrigens haben diese Flöhe sechs Füße, wovon die vorder-
sten nahe am Kopfe die kürzesten, die hintersten die längsten sind. An letzteren
ist vorzüglich der Schenkel, das Schien- und Afterschienbein ungleich länger,
als an den vier Vorderfüßen, und daher scheint die ungewöhnliche Fertigkeit
dieser kleinen Insekten im Springen zu kommen. Das Fußblatt aber hat, mit dem
des gemeinen Flohs vollkommene Ähnlichkeit.

Sie bewohnen nicht nur den warmen Sand in den angeführten amerikanischen Kolonien, sondern auch die Fußböden der Wohnungen, vorzüglich solcher Häuser, die nur ein Stockwerk hoch und ungepflastert sind, und sind besonders auf den Inseln in solcher Menge vorhanden, daß sie nicht bloß den Negern und andern Barfußgehenden gefährlich werden, sondern sogar durch Strümpfe und Schuhe dringen, um sich am liebsten zwischen den Nägeln der Zehen einzunisten. Doch verschonen sie ausserdem auch keinen andern Theil des menschlichen Körpers, und man hat sie eben sowohl schon am Unterleibe, in den Schenkeln, Armen und Händen angetroffen. Lezteres bestätigt *Schöpf* aus eigener Erfahrung. Er war auf seiner Rückreise schon eine Woche zur See, als er zwischen dem Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand eine kleine, harte Geschwulst bemerkte, deren beständiges Jucken und Zunahme endlich die Besorgniß erweckte, daß sich ein Chigger hier eingenistet haben könnte, und bey vorgenommener Untersuchung wurde auch wirklich ein Chiggernest mit dem darinn sizenden Floh, und wenigstens 70 bis 80 Eiern herausgeholt. Gewöhnlich bahnen die Chiggers durch einen Stich, der nicht mehr, als ein gewöhnlicher Flohstich schmerzt, den Weg unter die Haut. Bald aber entsteht an der Stelle, wo sich der eingedrungene Chigger befindet, ein unangenehmes Jucken, und eine kleine, mit der Haut gleichfärbige, anfangs kaum bemerkbare Erhabenheit, in deren Mitte ein kleines, braunes Pünktchen den Sitz des Flohs bezeichnet. Der Hinterleib des Chigger fängt nun, oft schon nach drey, oft erst nach vierzehn Tagen, wie bey den Termitenköniginnen, an zu schwellen. Andere aber versichern, daß der Chigger zu der Zeit einen weissen Balg um sich bilde, aus welchem er nur den Kopf, Rüssel und einige Vorderfüsse hervorstecke, und daß er in diesem Balg seine Eier lege, der dann bis zur Grösse einer Erbse anschwelle, und heftige Schmerzen erzeuge. Läßt sich der Mensch hierdurch nicht bewegen, den Floh mit seinem Eysacke herauszunehmen; sondern die jungen Chiggers auskriechen; so nagen auch diese, gleich ihrer Mutter, das Fleisch um sich her weg, vermehren sich durch ähnliche Eysäcke und durchwühlen oft nach und nach den ganzen Fuß. Bey Personen, welche an sich schon üble Säfte haben, werden hierdurch, besonders in einem so warmen Klima, überaus böartige, fressende, nicht selten in Brand eilende und die Abnahme des Glieds nothwendig machende Geschwüre veranlaßt, wozu, ausser der starken Vermehrung dieses Insekts, der Reiz des spitzigen Saugrüssels, des Stachels am Schwanzende des Flohs und der zwey kleinen Stacheln, die an dem schmalen Ende jedes Eyes (Fig. 25.) unter dem Vergrößerungsglase sichtbar werden,

den, nothwendig beytragen muß. Die Füße der Sklaven, welche den Verfolgungen der Chiggers am meisten ausgesetzt sind, wenn sie sich auch, nach *Barrere*, durch das Einreiben des Karapaöls dagegen zu verwahren suchen, werden von den Geschwüren und den Wunden, welche das öftere Ausschneiden dieser Insekten verursacht, oft völlig verunstaltet, und nicht selten lahm. Alle diese und mehrere Zufälle vom Stiche und Einnisten des Chigger unter der Haut des Menschen, begreifen die Franzosen unter dem Namen *Malingre*.

Als ein Beytrag zur Geschichte dieses merkwürdigen Insekts, verdient hier noch *Fermis* Erzählung von einem Kapuziner Erwähnung, der sehr empfindlich für die gewagte Ausführung des besonderen Einfalls, diese westindische Seltenheit lebendig mit nach Frankreich zu bringen, gestraft wurde. Er ließ ein solches Insekt nicht weit vom Knöchel seines Fusses einnisten, welches unterwegs sich auf die angegebene Art unter der Haut vergrößerte, und ihn endlich durch die unerträglichsten Schmerzen zu den Entschluß brachte, dasselbe herausnehmen zu lassen. Allein, der Chigger hatte schon ein überaus bösesartiges Geschwür veranlaßt, wozu sich endlich der kalte Brand gesellte, der den Kranken nöthigte, sich das Bein bey seiner Ankunft in Frankreich abnehmen zu lassen. Diesen, bisweilen tödtlich werdenden Verletzungen der Chiggers, sind jedoch nicht alle Menschen ausgesetzt, und es giebt Personen, welche beständig barfuß gehen, ohne von ihnen verletzt zu werden. Es scheinen also ebenfalls gewisse Eigenheiten der Ausdünstung sie zu den Verfolgungen der Menschen zu bestimmen.

Die Bemerkung, daß nach *Rocheport* vorzüglich solche Personen von diesem Insekte geplagt werden, welche sich nicht reinlich halten, daß man vor demselben sicherer ist, wenn man Strümpfe und Schuhe trägt, und sich nicht da verweilt, wo der Fußboden ungedielt und ungepflastert ist, daß Regen und feuchte Witterung die Chiggers verscheuchen und tödten, giebt zum Theil die Verwahrungsmittel vor diesem Ungeziefer an. Es wäre nemlich in so ferne das Besprennen des Fußbodens mit frischem Wasser, das fleissige Waschen der Füße, das Tragen lederner Strümpfe zu empfehlen. Die Indianer suchen diese Insekten dadurch von sich abzuhalten, daß sie ihre Füße mit den Blättern bitterer Kräuter, auch des Tobacks und vorzüglich einer Pflanze bestreichen, welche sie *Rongon* nennen. *Piso* empfiehlt zu gleicher Absicht Schifftheer oder Fischtran, *Amoureux* Citronensaft oder Tafia. Doch sind diese und ähnliche Mittel noch immer nicht als unfehlbare Verwahrungsmittel befunden worden, und zum Theil wegen ihres Gestanks, und anderer Beschwerlichkeiten, nur bey den Negern anwendbar. Es

kom-

kommen daher die Fälle sehr häufig vor, wo der Chigger herausgenommen werden muß. Je zeitlicher man zu dieser kleinen Operation schreitet, desto leichter und weniger schmerzhaft ist sie. Man thut daher wohl, wenn man den Chigger, welcher sich bald durch einen schwarzen Punkt zwischen Haut und Fleisch verräth, so bald man nur den Stich empfindet, aufsucht oder aufsuchen läßt. Man sondert nunmehr die Haut rund um die Öffnung, die er sich beym Eindringen gemacht hat, mit einer Nadel, oder einem spitzigen Messer ab, und zieht ihn, und wenn schon ein Eyerstock vorhanden ist, auch diesen behutsam heraus. Die Negerinnen haben hierinnen eine besondere Fertigkeit, und man thut daher wohl, wenn man sich ihnen anvertraut. Denn, wenn man nicht den ganzen Chigger oder den ganzen Sack desselben herauszuschälen weiß; so hat man von den zurückbleibenden Eyern immer noch Schmerz, Entzündung, und, wenn die Eyer ausgebrütet sind, bösartige Geschwüre zu erwarten. Ist aber der Chigger ausgezogen, so füllt man in Surinam die kleine Öffnung der Wunde mit Tobacksasche, in Mexiko mit Talk, auch mit etwas Schnupftoback aus, weil es gefährlich, ja tödtlich seyn soll, wenn auch nur etwas Wasser in diese Höhlungen kommt. Sind hingegen diese Insekten in Menge vorhanden und haben z. B. den ganzen Fuß eingenommen; so wird, nach *Sauvages*, ein leinener Lappen in Schifftheer oder in eine andere flüssige und harzichte Masse getaucht, und der leidende Theil damit umwickelt. Hierdurch sollen nun diese Insekten von ihren Adhäsionspunkten getrennt, und der Kranke nach einem Fußbade, von diesem Übel befreiet werden.

Zweyter Abschnitt.

Zufällig schädliche Insekten, welche den menschlichen Körper seltner und nur unter gewissen Umständen verletzen.

1. Der Hirschschröter. Tab. XIII. Fig. 1.

Lucanus cervus, scutellatus: maxillis exsertis, apice bifurcatis, latere unidentatis. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. T. I. P. IV. p. 1588. n. 1. — Habitat in Europae et Sibiriae ligno quercino putrescente, femina minor; larva obesa albida, capite pedibusque ferrugineis, a Roeselio pro cosso veterum habita.

Albrecht, J. S. in Act. Nat. Cur. obs. CXX. p. 404.

Aldrovandi (U.) de Animalibus insectis 151. f. 16.

Bergsträssers Nomenclator I. S. 18. n. 1—3. S. 25 n. 2. 3. Tab. III. f. 1—3. und Tab. IV. f. 2. 3. Der Kneipschröter.

Blu.

Blumenbachs Handbuch S. 314. *Der Hornschröter, Wainschröter, fliegende Hirsch, Neuntöter, Börner, Donnerguge*, Engl. *the stag fly*.

Brückmann, F. E. Epist. itiner. LXXVIII. p. 3. Degeer's Abh. z. Gesch. der Ins. von Göze. B. IV. S. 189. n. 1. Tab. XII. f. 1 — 8. Grand Cerf-volant, *der grosse Hirschkäfer*.

Fabricii Spec. ins. I. p. 1. n. 2. Mant. ins. I. p. 1. n. 2. Syst. Ent. p. 1. n. 2.

Fermins Reise durch Surinam, Th. II. S. 266. *Hirschkäfer*. (Lucanus cervus.)

Geoffroy Hist. ins. Paris. I. p. 61. n. 1. Tab. I. f. 1. *Platycerus fuscus* etc. le *Grand Cerf-volant*. p. 62. n. le *grande Biche*.

Cözens entomol. Beyträge I. S. 118. n. 1. *der Hirschschröter*. II. Vorr. S. XXVII. n. 1.

Gözens Gesch. schäd. Ins. S. 220. *Hirschschröter*.

Gronoviani Zoophilicii 446.

Hoefnagel, J. Archetypa studiaq. patris sui etc. Francof. ad Moen. 1592. Fol. P. I. Tab. VI. et P. II. Tab. I.

Imperati, F. Historia naturale 924. f. 3. 925. f. 1. 2.

Jonstoni Hist. nat. de Ins. Tab. XIV. f. 1. 2.

Leske, Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 417. n. 1.

Linnaei Faun. Suec. n. 405.

Merian. Ins. europ. T. 168.

Mouffetti Theatr. Ins. 148. *Cervus volans*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Insekten B. I. S. 94. n. 1. *Der Hirschschröter*.

Müller, O. F. Zool. Dan. Prodr. p. 52. n. 444. *Lucanus Dorcas*.

Muralt (J. v.) Betrachtung des männlichen und weiblichen gehörneten Käfers oder Schröters. S. Abh. d. k. Ak. d. Nat. f. Th. XII. S. 171.

Olearii, A. Gottorffische Kunstkammer, Schleswig. 1674. 8. Tab. XVI. f. 5. *Taurus volans*.

Onomatol. hist. natural. B. II. p. 797. *Cervus volans*.

Plinii Hist. Nat. Lib. XVII. Cap. 24. Prae. grandesque roborum delicatiora sunt in cibo, *Cossos* vocant.

Raji Hist. Ins. p. 74. n. 2. *Scarabaeus maximus*.

Rösels Insectenbel. Th. II. Erdkäfer I. Klass. S. 25. Tab. IV. u. V. *Hirschkäfer* oder *Schröter*.

Schaeffer Elem. Ent. Tab. IX. f. 1.

— Icon. Ins. Ratisb. Tab. CXXXIII. f. 1. 2.

Schluga, I. B. primae lineae cognitionis insect. Vind. 1767. 8. Tab. I. f. 1.

Schwammerdamm's Bib. d. Nat. Th. I. S. 324.

Scopoli, Entomologia Carniolica. 1.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 18. *Kammkäfer*.

Voets Käferwerk, übers. mit Anmerk. von Panzer, Nürnberg. 1782. 4. Tab. XXIX. f. 1 — 4.

Wormii, O. Museum. Lugd. Bat. 1655. Fol. p. 242.

Die von dem Gebißswerkzeuge dieses Geschlechts hergenommene Benennung desselben, kommt vorzüglich der gegenwärtigen Art zu, deren geweihartige Kiefer besonders geschickt sind, die grobe Nahrung zu zermalmen oder kleinzuschroten. Ihre Eyer sind länglichrund, und haben eine dunkle, glänzende Lederfarbe. Die aus denselben hervorkommenden Larven, oder Schröterwürmer, welche oft vier Zoll lang werden, leben im faulen Holze und fauler Holzerde, haben überhaupt eine weisse, gelbgrauliche Farbe, einen ockergelben Kopf und sechs ockergelbe Füße. Sie werden, theils wegen ihres Aufenthalts in den Steineichen, theils wegen ihres vielen Fetts, vom *Rösel* für die *Cossos* gehalten, welche nach *Plinius* zu den Leckerbissen der alten Römer gehörten. Wenn sie nach sechs Jahren die zur Verwandlung nöthige Vollkommenheit erreicht haben; so machen sie sich im leimichten Boden ein der Grösse ihrer Nymphe angemessenes festes, ovalrundes Gehäuse. Die Nymphe selbst giebt sehr deutlich die äusseren Theile des künftigen Schröters zu erkennen, welcher nach zwey, bis drey Monaten die Puppenschale verläßt, und, ohne mehr zu wachsen, die nemliche Grösse behält, die er mit aus der Schale bringt, und ihn zum Riesen unter den hartschalichten europäischen Insekten macht.

Die Farbe des langen gezähnten Kiefers, der Flügeldecken und der Füsse des männlichen Hirschschröters ist glänzend kastanienbraun, die des übrigen Körpers beynahe ganz schwarz. Der sehr grosse, mehr breite, als lange Kopf, hat oben eine vieleckigte Platte mit einem erhabenen Rand, und an jeder Seite ein hervorstehendes, kleines, netzförmiges Auge, vor welchem das in einen Winkel gebogene, zehngliederichte Fühlhorn (Tab. XIII. Fig. 1. *b. b.*) stehet. Nächste diesem ist der Kopf an jeder Ecke der Stirne, mit einem, bey grossen Schrötern wohl zwey Zoll langen Horne (*c. c.*) bewaffnet, welches einem Hirschgeweihe sehr ähnlich sieht, von harter hornartiger Substanz, an der Innenseite mit vielen kleinen, stumpfen Zähnen und einer grossen Zinke, am Ende aber mit zwey gabelförmig neben einander stehenden Zinken versehen ist. Beyde Hörner bewegen sich durch Gelenke, öffnen und schliessen sich wie eine Scheere. Unter diesen Hörnern befinden sich am Vordertheile des Kopfs der durch zwey hornartige Lippen geschlossene Mund. Aus diesem streckt der Schröter, wenn er sich von dem Honigsafte der Eichen- und anderer Baumblätter zu nähren sucht, einen zwey Linien langen Saugrüssel (*a.*) hervor, der aus zwey länglicht ovalen und zwey andern, unterwärts kürzeren, ganz mit den feinsten seidenartigen Härchen bedeckten Theilen besteht, und an dessen Grundtheile zwey längere viergliedrichte und zwey kürzere dreygliedrichte Bartspitzen sitzen. Der Brustschild ist viel kürzer, als der Kopf, mehr breit als lang, und ebenfalls mit einem erhabenen Rand eingefasst. Der Hinterleib schliesst sich vorne mit einer breiten Grundfläche an den Brustschild an, und läuft am Ende in eine ovalrunde Spitze zu. Sein Rücken ist durch zwey hornartige, rauhe Flügeldecken gedeckt, unter welchen die zwey gelbbraunen, durchsichtigen Unterflügel im Stande der Ruhe gefaltet liegen. Die sechs Füsse des Schröters sind sehr lang und mit vielen Stacheln versehen. Das letzte Glied der fünfgliedrichten Fufsblätter hat zwey sehr krumme Krallen, und zwischen denselben noch ein anderes dünnes, ebenfalls gekrümmtes Spitzchen. Überaus verschieden ist der weibliche Hirschkäfer von dem männlichen. Sein Kopf ist ungleich kleiner. Seine geweihartigen Kiefer gleichen mehr Kneipzangen, die jedoch neben ihrer mittleren, grossen Zinke, noch zwey kleinere haben. Sein Brustschild ist nicht nur in Rücksicht der Farbe, die dunkel kastanienbraun ist, sondern auch in Rücksicht der Grösse, die die des Kopfs ungleich übertrifft, ganz verschieden von dem männlichen, und ausserdem zeichnen ihn die weit längeren Füsse, und der mehr abgerundete Hinterleib noch besonders aus.

Die Hirschschröter sind nicht allein in Europa, sondern, nach *Fermin*, auch in Surinam, und, nach *Degeer*, in Pensylvanien zu Hause, und machen daselbst die merkwürdige Ausname, daß sie nur halb so groß, als die europäischen sind, da sonst die amerikanischen Insekten, die europäischen weit an Grösse, so wie an Schönheit, zu übertreffen pflegen. Bey uns kommen sie in den Monathen Junius und Julius in Gegenden, wo viele Eichen wachsen, zum Vorschein, bleiben den Tag über ruhig auf den Bäumen, am Abend aber werden sie rege und fliegen umher. Sie äussern eine ungewöhnliche Stärke mit ihren geweihartigen Zangen, und kneipen, wenn man sich letzteren unvorsichtig mit den Fingern nähert, bis auf die Knochen, so daß das Blut darnach läuft. Noch empfindlicher und schärfer als die Männchen, zwicken die Weibchen, wegen der zwey kurzen Zinken, die sie ausser der mittleren grossen, an der innern Seite jeder Kneipzange haben. Nicht selten unterbricht der empfindliche Schmerz, welchen diese Schröter veranlassen, durch Weinen die Freude der damit spielenden Knaben. Sie sterben, wie andere Insekten, nachdem durch die Paarung die Absicht ihres Daseyns erreicht worden ist.

2. Der Inquisitor. Tab. I. Fig. 4

Cerambix inquisitor, niger, thorace spinoso, elytris nebulosis testaceo subfasciatis, antennis brevioribus. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. P. IV. p. 1845. n. 49. —

Habitat in Europae truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique corneis fuscis, dorso canaliculato.

Degeers Abhandl. zur Gesch. d. Ins. v. Göze. B. V. S. 302. n. 2. Tab. IV. f. 7. *Lepture inquisiteur*. Der Spion.

Fabricii Spec. Insect. I. p. 229. n. 1. Mantiss. insect. I. p. 145. n. 2.

Frischs Beschreib. von allerley Ins. Teutschl. Th. XIII. Tab. XIV.

Geoffroy Hist. de Ins. de Paris. T. X. p. 223. n. 2. *le Scencore noire velouté de jaune*.

Gözens entomol. Beytr. I. S. 444. n. 49. *Der Inquisitor*.

Linnaei Faun. Suec. Ed. II. n. 659. *C. inquisitor*.

Müllers Linnéisches Natursyst. d. Ins. B. I. S. 269. n. 49. *Der Stenkerer*.

Schaefferi Icon. Insect. Rat. Tab. II. f. 10.

Sulzers Gesch. d. Ins. Tab. V. f. 7.

Das männliche Geschlecht dieser Bockkäferart ist achthalb, das weibliche neun Linien lang und dritthalb Linien breit. Die Grundfarbe des ganzen Körpers ist gelb mit unterlaufenen aschgrauen Flecken, auf den Flügeldecken aber wechseln zwey gelbrothe Binden mit drey schwarzgrauen ab (Tab. I. Fig. 4). Der länglicht-runde Kopf hat vier Bartspitzen an der Unterlippe, zwey eiförmig gedrückte, sich mit einer rundlichen Spitze endigende Fühlhörner, welche halb so lang, als der gan-

ganze Körper sind, und vor den ovalen, braunen Augen stehen. An jeder Seite des Brustschilds, der überhaupt schmaler, als der länglicht - ovale Körper ist, bemerkt man eine nach aussen stehende Dornspitze. Die Füße sind sehr lang, die viergliedrichten Fußblätter mit rauhen Haarbürsten oder Ballen und am Ende mit Krallen versehen.

Sie beißen mit den Zähnen um sich, und zwar ziemlich empfindlich. Gewöhnlich tragen sie Kopf- und Brustschild mehr nach vorne geneigt, und haben einen besonderen Gang. Sie laufen nemlich eine Strecke ziemlich geschwind, stehen auf einmal still, drehen Kopf und Brustschild rechts und links, als ob sie sich nach etwas umsehen wollten, und rücken nun wieder stoßweise fort. Überall klammern sie sich im Kriechen fest an.

3. Der beissende Bockkäfer. Tab. I. Fig. 5.

Cerambyx mordax, griseus, thorace spinoso, elytris nebulosis, testaceo subfasciatis.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. T. I. P. IV. p. 1845. n. 241. — Habitat in Germania, *Cerambyci inquisitori affinis*; at paulo major.

Fabricii Mantiss. ins. I. p. 145. n. 1.

| Schaefferi Icon. Ins. ratisb. Tab. VIII. Fig. 2.

Dieser Bockkäfer, der von seiner Eigenschaft zu beißen, den Namen hat, kommt im ganzen mit den vorhergehenden ziemlich überein, nur ist der Kopf etwas länger, der Brustschild aber kürzer, schmaler und auf beyden Seiten abgerundet. Auf dem Brustschilde hat er einen schwarzen getheilten Fleck. Auch haben die Flügeldecken schwarze, sich in die gelbe Grundfarbe verlierende Längsstreifen.

4. Der graue Holzbock. Tab. I. Fig. 6.

Cerambyx cinereus, coleopterorum fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso. Onomat. Hist. nat. P. II. p. 755. —

Habitat in Europa.

Degeers Abhandl. zur Gesch. d. Ins. v. Göze. B. V. S. 302. n. 1. Tab. IV. Fig. 6. *Lepture hargneuse*, die beissigte *Lepture*.

Frischs Beschr. von allerl. Ins. Teutschl. Th. XIII. F. 2.

Füefßlins Magazin der Entomologie, B. II. S. 182.

Geoffroy Hist. des Ins. I. p. 222. n. 1. *Le Stercoraire lisse à bandes jaunes*.

Gözens entomol. Beytr. I. S. 444. n. 49.

Schaefferi Elem. Entom. Tab. CXVIII. F. 1.

Icones Ins. Ratisb. Tab. VIII. F. 3.

Die

Die unbedeutende Abweichung dieses Insekts in Rücksicht der Grösse und Gestalt von dem Inquisitor, hat den *Linne* bewogen, dasselbe nur als eine Spielart des letzteren anzusehen. Allein, wenn auch die Grösse, welche höchstens eine Linie mehr beträgt, und der ganze Habitus keinen merklichen Unterschied darbieten; so sind sie doch in Rücksicht der Farbe überaus verschieden. Die Fühlhörner des grauen Holzbocks sind aschgrau. Der dornichte Brustschild ist durch einen quer durchlaufenden schwarzen und erhabenen Rand in zwey Hälften getheilt, wovon die vordere mit zwey kurzen, schwarzen Streifen, die hintere mit einem runden Fleck von gleicher Farbe bezeichnet ist. Die schwarzen, grauhaarichten Flügeldecken unterscheiden sich noch besonders durch zwey in ihrer Mitte befindlichen neben einander stehenden, gelben Binden und die Füße durch ihre ebenfalls schwarzgraue Farbe. Sie können sehr geschwind laufen und nachdrücklich in die Finger beißen, sind häufig in Schonen, auch anderwärts in Europa zu Hause.

5. Der schwarzbraune Warzenkäfer. Tab. I. Fig. 7. und 8.

Cantharis fusca, thorace rubro: macula nigra, elytris fuscis. Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. T. I. P. IV. p. 1890. n. 2. — Habitat frequens in Europae sepibus, rapacissima.

Blumenbachs Handb. der Naturgeschichte, V. Aufl. S. 324. n. 1. *Cantharis fusca*.
 Brahm's Insektenkalender, Th. I. S. 114.
 Degeers Abhandl. zur Gesch. d. Ins. von Göze. B. IV. S. 36. Tab. II. Fig. 12 — 15. *Thelephora ardoise*, der schieferfarbige Warzenkäfer.
 Fabricii Mantiss. Ins. I. p. 167. n. 1. Spec. Ins. I. p. 257. n. 1.
 Frischs Ins. Teutschl. Th. XII. S. 36. n. 30. Tab. VI. Fig. 5. Der schwarzbraune Holzkäfer mit dünnen Flügeln.
 Geoffroy Hist. des Ins. Tom. I. p. 170. n. 1. Tab. II. Fig. 8. la *Cicindele noire*.
 Gözens entomol. Beytr. I. S. 528. n. 2. Der schwarzbraune Afterscheinkäfer.
 Götze, Natur, Menschenleben und Vorsehung, B. III.

Herbsts Anleitung zur Kenntniss der Insekten, Th. I. S. 144. Tab. XX. Fig. 1.
 Leske's Anfangsgr. der Naturgeschichte, Th. I. S. 430. n. 1. Der schwarzbraune Afterscheinkäfer.
 Linnaei Fauna Suec. n. 200. It. oel. 38.
 Meyers Naturgeschichte der giftigen Insekten, Th. II. S. 89. Schwarzbrauner Warzenkäfer, Räuber.
 Müllers Linn. Naturs. der Ins. B. I. S. 307. n. 2. Der Räuber.
 Poda Ins. 40. n. 4.
 Raji Hist. Ins. p. 84. n. 29. et p. 101. n. 2. *Cantharis sepiarius major*.
 Schäfferi Elem. entom. Tab. CXXIII. Fig. 1. 2. Icon. Ins. Ratisb. Tab. XVI. Fig. 9 — 12.
 Scopoli Entomol. Carniol. n. 120.
 Sulzers Kennzeichen der Ins. Tab. V. Fig. 33.

Die höchstens einen Zoll lange und nicht gar zwey Linien breite, überaus weiche, zwölfringichte Larve dieses Insekts, hat einen schwarzen, ovalrunden, hornartigen, mit zwey starken Zähnen, zwey kleinen Fühlhörnern, vier Bartspitzen,

spitzen, und zwey Augen versehenen Kopf, und einen unten platten, mit sechs hornartigen Füßen versehenen Körper, hält sich gerne in feuchter Erde auf und nährt sich von andern Insekten, von Regenwürmern, auch von ihres gleichen. Sie verwandelt sich im May in eine nur sechs Linien lange Nymphe von blaßrother Farbe, in welcher schon alle Theile des vollkommenen Insekts sichtbar sind, und aus dieser Nymphe kommt im Junius der Wanzenkäfer selbst zum Vorschein. Das Weibchen dieses Käfers ist sechs Linien lang und zwey Linien breit, das Männchen etwas kleiner. Der Vordertheil des Kopfs von den Augen bis zum Maule, der Brustschild, die Seiten und beyden letzten Ringe des Hinterleibes, so wie der größte Theil der untern Fläche des Körpers, sind rothgelb. Der Brustschild ist vorne mit einem schwarzen Fleck bezeichnet, hinten mit einem schwarzen Saum eingefasst. Die nahe am Kopfe rothen Fühlhörner sind übrigens schwarz, der Hintertheil des Kopfs, die Flügeldecken, die Füße ausser den rostfarbigen Hüften und beyden ersten Gliedern, aber dunkelschieferfarb.

An dem beynahe runden, oben etwas eingedrückten Kopfe (Tab. I. Fig 8), der zwey, vor den Augen stehende, eilfgliedrichte, und die Länge des Hinterleibs erreichende Fühlhörner (*a. a.*) hat, sind die Fresswerkzeuge vorzüglich merkwürdig. Sie bestehen aus zwey langen, hakenförmigen, sehr spitzigen Zähnen oder Fresszangen (*c. d.*), welche sich geschlossen kreuzen, geöffnet aber das Insekt ziemlich furchtbar machen, und aus zwey langen und zwey kurzen an der Unterlippe befindlichen Bartspitzen (*b. b.*). Der beynahe herzförmige Brustschild ist oben eben und mit einem hervorstehenden Rande versehen, der Hinterleib so weich und biegsam, daß ihn dieser Warzenkäfer nach allen Seiten bewegen und gegen das Brustschild zurückschlagen kann. Die durchsichtigen schwarzbraunen Flügel liegen gefaltet übereinander auf dem Rücken, und den sehr biegsamen, länglichten, gleich breiten, am Ende abgerundeten Flügeldecken, welche so beweglich sind, daß sie das Insekt in einem Augenblicke öffnet und davon fliegt. Die Füße haben fünf ziemlich breite Gelenke und am Ende des letzten zwey kleine Krallen.

Es ist überall in Europa auf Wiesen, Hecken und Obstbäumen vom May bis im August zu finden. Seine Larve hat man sogar oft im Winter auf dem Schnee angetroffen, und hierdurch sich um so mehr berechtigt gehalten, an die Sagen vom Insektenregen zu glauben, da auch sie mit dem Schnee herabgefallen zu seyn schien. Wahrscheinlich gräbt sie sich aber nicht immer tief in die Erde, und hat vielleicht noch über derselben ihre eigenen Schlupfwinkel, aus welchen sie auf besondere Veranlassungen hervorkommt. Das vollkommene Insekt wehrt

sich mit seinen Fresszangen und beißt ziemlich empfindlich, zerfleischt damit andere Insekten und frisst selbst die Seinigen auf, daher man ihm auch den Namen *Räuber* gegeben hat. Nicht weniger wird dasselbe durch einen gelben übelriechenden Saft, den es bey sich führt, wegen einer besonderen Giftigkeit verdächtig. Es begattet sich im Monath Junius auf den Pflanzen, wobey das Männchen dem Weibchen auf dem Rücken lieget, und stirbt wahrscheinlich bald nach dieser Begattung.

6. Der Laufkäfer.

Carabus, Antennae filiformes, Palpi sex. articulo ultimo obtuso, truncato. Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus, Elytra marginata. Linn. S. N. E. G. XIII.

T. I. P. IV. p. 1959.

Amoureux Notice de Ins. de la France reput. venim, p. 78 et 82. *le Bupreste*.

Brogiati, de venenis p. 70.

Creutzer, C. Entomologische Versuche, Wien 1799. S. 107. Tab. H. Fig. 13.

Cuvier Tableau Élémentaire p. 559. *les Carabes*.

Digestorum Libr. XLVIII, Tit. VIII. ad Legem Corneliam de Sicariis et Veneficiis in Sect. III. §. 3.

„Alio Senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam, salamandram, aconitum, pituocampas, aut *bubrostim*, mandragoram, et id, quod lustramenti causa dederint cantharidas, poena teneantur hujus legis.“

Dioscorides Theriac. Cap. XX. *βέπρησις*.

Galenus de simpl. med. facult. L. XI.

Geoffroy Hist. des Ins. de Paris. T. I. p. 137.

Buprestis.

Meyers Naturgesch. der giftigen Ins. Th. I. S. 56 und 67. *Laufkäfer*.

Monti, H. J. medicinisches Dictata a. d. Ital. gr. 8. Stutg. 1781. S. 24.

Müllers Linn. Naturs. der Ins. B. I. S. 352. *Erdkäfer*.

Spielmanni Diss. de animal. ven. Als. p. 45.

Sulzers Geschichte der Insekten. S. 61. *Der Laufkäfer*.

Geoffroy, welcher den Linneischen Geschlechtsnamen *Carabus* mit *Buprestis* vertauschte, den Linneischen *Buprestis* aber unter *Cucujus* oder *Richard* zu begreifen für gut fand, und nach ihm Spielmann, Amoureux, Meyer etc. glauben, daß die Erzählungen der Alten vom Gilte der Bupresten in die Geschichte der Laufkäfer gehören, und wirklich scheinen sie nach allen Umständen unter ihren *βέπρησις* unsren *Carabus* verstanden zu haben. Dieser hat starke, hervorragende Kinnladen, zwey borstenförmigs Fühlhörner und sechs mit einem breiten, kolbenförmigen Gliede sich endigende Fressspitzen; ein beynahe herzförmiges, am hinteren, schmaleren Ende aber mehr oder weniger ausgeschnittenes oder abgestumpftes und mit einem erhabenen Rand umzogenes Brustschild; einen breiten, länglicht-runden, ebenfalls mit einem Rand versehenen Hinterleib; und sechs lange mit starken Schenkeln, Schienbeinen und fünfgliedrichten, zweykrallichten Fußblättern versehene Füße.

In allen Welttheilen giebt es verschiedene Arten dieses Geschlechts. Allen ist ein schneller Gang eigen, von welchem sie auch den Namen *Laufkäfer* erhalten haben. Sie und ihre Larven sind überaus raubsüchtig und gefressig, verzehren nicht nur andere Insekten, sondern auch ihres Gleichen. Gegen ihre Feinde können sie sich nachdrücklich vertheidigen. Schon die kleineren Arten beißen mit ihren starken Kinnladen heftig, weit mehr müssen dieses aber die grösseren z. B. der *Carabus Gigas* können, den *Creutzer* so schön abgebildet hat, und der mit einem fürchterlichen Gebisse versehen ist. Ausserdem besitzen sie noch zwey andere abschreckende Eigenschaften. Ihre Oberfläche schwitzt nemlich eine klebrichte Feuchtigkeit aus, welche schon in einiger Entfernung einen üblen Geruch verbreitet, einen noch ekelhaftern und kaum zu entfernenden aber in der Hand zurückläßt. Sehen sie sich ferner von einiger Gefahr bedroht, oder fallen ihren Verfolger in die Hände; so geben sie eine braune, stinckende und kaustische Feuchtigkeit durch Maul und After von sich. Überhaupt kommen sie nach *Dioscorides* und *Galen* in Rücksicht der Schärfe und Kausticität mit den Canthariden überein, und *Geoffroy*, der die meisten Laufkäfer für giftig hält, ist in der Meynung, daß man sie, als Arzneymittel, vollkommen den Canthariden substituiren könne, indem diese vielleicht noch weniger Kausticität, als jene besäßen. Als dieser berühmte Naturforscher einmals einen grossen *Carabus* etwas stark drückte; so kam ein Strahl scharfer und brennender Feuchtigkeit hervor, der seinem, der Untersuchung beywohnenden Freunde ins Auge spritzte, worauf dieser einen sehr heftigen Schmerz erlitt. Er selbst bekam nur zwey Tropfen auf die Lippe, und empfand hierauf sehr heftiges Brennen. *Geoffroy* schließt hieraus, daß ein so kaustisches Insekt innerlich angewendet, als ein sehr starkes und gefährliches Gift wirken könne. Was *Geoffroy's* Freunde wiederfuhr, begegnete Herrn *Meyer* durch den gekörnten Laufkäfer (*Carabus granulatus*). Er sprüzte, als er ihn an einem heissen Tag von der Erde aufhob, seinen schwarzbraunen Saft von sich, wovon dem Untersucher einige Tropfen in die Augen kamen und ein schmerzhaftes Brennen veranlaßten.

Bey den Alten war dieses Insekt vorzüglich wegen des Schadens, den es dem Rindviehe brachte, merkwürdig, und furchtbar. Sie sahen es nemlich als die Ursache der verheerenden Rindviehseuche an und gaben ihm den Namen *Βεργήτης* welches so viel als ein, den Ochsen eine Entzündung erregendes Insekt bedeutet, weil sie glaubten, daß sich dasselbe im Grase aufhielte, und wenn es von dem Rindvieh auf der Weide mit verschluckt würde, eine Entzündung, und

alle

alle, von den Canthariden gewöhnlich veranlaßten ähnlichen Zufälle, ausserdem aber noch ein tympanitisches Anschwellen des Thiers hervorbrächte, wovon dieses Insekt auch den Namen *Ochsenschweller* (*Enfle-boeuf*) erhalten hat. Auch hielten sie es für ein dem Menschen tödtliches Gift, und verhängten durch die *Lex Cornelia* die Todesstrafe über diejenigen, welche dasselbe boshaft unter das Getränke oder die Speisen mischten. Sogar liest man in *Monti's* Diktaten, daß noch in den neuern Zeiten die Vergiftung mit dem Weine der Consekration von dem Buprest hergeleitet wurde.

Als Gegenmittel wider die Wirkungen der in den Magen gekommenen Laufkäfer empfiehlt *Geoffroy* starke Purganzen — ich würde Brechmittel vorziehen — ferner schleimichte, säuerliche Getränke, eine Aderlaß, wenn Entzündung da ist, und alle gewöhnliche Gegengifte. Im Ganzen findet hier wohl die nemliche Heilart, wie bey der Cantharidenvergiftung Statt.

7. Die spanische Fliege. Tab. XIII. Fig. 2.

Meloë vesicatorius, alatus viridissimus nitens, antennis nigris. Linn. Syst. N. Ed. Gm. XIII. T. I. P. IV. p. 2013. n. 1. — Habitat in Ligustro, Fraxino, Sambuco, Syriaga, Persiae populo tremula, Tatariae, Ionicera tatarica, Calabriae quoque asperula, officinalis pro vesicatoriis.

- | | |
|---|---|
| <p>Aetii Tetrab. IV. Serm. I. Cap. 49.
 Albanus de Venenis Cap. LXIV.
 Albinj, B. Diss. de Cantharidibus. (Resp. Heinsius) Francof. O. 1687. 4.
 Adrovandus de Insect. 276. Cantharis major.
 Alexander, G. de Cantharidum usu et historia Edinb. 1769. 4.
 Amoreux Notice des Insect. p. 73.
 Ardoynus, de Venenis. Lib. VIII. Cap. 9.
 Baglivi Diss. de usu et abusu vesicantium. C. II. §. 4.
 Barrere Observat. Anatom. p. 205.
 Bartholinus, Th. Cantharidum usus internus. Hist. Amst. Cent. V. hist. 82. p. 159. Act. Hafn. Vol. IV. p. 186. Epist. Med. Cent. IV. p. 292.
 Blumenbachs Handb. der Naturgesch. S. 328. n. 3. <i>Die spanische Fliege.</i>
 Borrich, Ol. Cantharidum examen. Act. Hafniens. Vol. IV. Obs. 80. et Vol. V. Obs. 89.
 Carolus, Th. de Cantharidibus. Eph. N. C. Dec. II. ann. 5. Obs. 36. p. 66.
 Carson, J. Diss. Cantharidum historia, operatio et usus, Edinb. 1776. 4.
 Ciceronis Epist. L. IX. Ep. XXI.</p> | <p>Cordus, Valer. Annot. in Dioscoridis Mat. Med. Lib. II. Cap. 65. 66.
 Cuvier, Tableau élémentaire. p. 541. <i>la Cantharide des boutiques.</i>
 Degeers Abh. zur Gesch. der Ins. von Göze. B. V. S. 241. n. 2. Tab. I. Fig. 9 — 12. <i>Cantharide vesicatoire, der Blasenzieher.</i>
 Dioscoridis Alexiph. Cap. I.
 Erastus, Th. modus, quo Cantharides tam velociter ad vesicam perforantur; in Smetii Miscellan. L. II. p. 109.
 Fabricii Syst. Ent. p. 260. 77. 1. Spec. ins. Tom. I. p. 328. n. 1. Mant. ins. I. p. 215. n. 1. <i>Lytta vesicatoria.</i>
 Fabric. ab Achen Chir. p. 688.
 Forster, E. Diss. Cantharidum historia naturalis, chemica et medica. Lugd. Bat. 1775. 4. (Versuche an Hunden.)
 Fuchsius, in Cantharidum exhibitione alas, tanquam magis exitiosas, minime esse abiiciendas; in Paradoxor. Libr. I. C. 39. Fol. 91.
 Fuesly, neues Magazin der Entomologie, B. II. S. 126. Naturgesch. der Canthariden, und S. 225. besonderer Gebrauch der Canthariden in verschiedenen Krankheiten.
 Ga-</p> |
|---|---|

- Galenus, de Simpl. Med. facult. L. XI. de Canthar.
- Gallo, J. M. de morte subitaneo virginis, quae comedit Bingelkraut, cui insidebant cantharides; in ejus Opusculis medico-practicis. Romae 1752. 4.
- Gazette de Santé. 1777. n. 14. p. 54.
- Geoffroy, Hist. des Ins. de Par. T. I. p. 341. n. 1. Tab. VI. Fig. 5. *la Cantharide des boutiques*.
- Geyeri, F. D. Targelus Apollini sacer, continens Trigam medicam e regno Animalis etc., I. de Cantharidibus. Lips. 1687. 4.
- Gmelin's, J. F. allgemeine Geschichte der Gifte. Th. I. Leipz. 1776. S. 306. *spanische Fliege*.
- Gözens entomol. Beytr. I. S. 695, n. 3. *Meloe vesicatorius, die eigentliche spanische Fliege*. Desselben Gesch. schäd. Ins. S. 224. *Cantharidenfliege*.
- Greenevelt, J. Traité de la sûreté de l'usage interne des cantharides. Londres 1698. 8.
- Hartmanni, P. J. Diss. de Hyperdiuresi ex perverso Cantharidum usu externo orta (Resp. Forell) Francf. O. 4.
- Heer, v. Observat. med. Lugd. Bat. 1685. Obs. IX.
- Heide, A. d. Cantharides cuti impositae stranguentiam excitant; in ejus Observ. Cent. p. 194.
- Hellfeld, Diss. Experimenta circa venena. Götting. 1760. p. 65. (Versuche an Hunden.)
- Herbsts Anleitung zur Kenntniss der Insekten, Th. I. S. 179. Tab. XXVIII. Fig. 2.
- Hildanus, F. de noxis ex Cantharidibus. Obs. Cent. VI. Obs. 98 et 99. edit. oper. 1682. Fol. p. 631.
- Houttuyn, Natuurlyke Histor. volgens Linnaeus. Tom. X. p. 7.
- Jaeger, C. F. Diss. de Cantharidibus earumq. actione et usu, (Resp. Kaiser) Tubingae 1769. 4.
- Jonston, Hist. Insect. p. 76. T. VII.
- Kirchdorf, M. Diss. de Cantharidibus Regionum. 1711. 4.
- Lachmund, F. de Cantharidibus in magna copia prope Hildeshemium captis, in Misc. Ac. N. C. Ann. IV et V. 1673. p. 242. Obs. 186.
- Lindestolpe de venenis p. 136.
- Linnaei Faun. Suec. 827; Amoen. Acad. T. VI. p. 132; It. Scan. 186. *Cantharis officinarum*; Diss. *Meloe vesicatorius* (Resp. Linaeus.) Ups. 1762. 4.
- Lösekens, J. L. L. Materia medica, 6. Aufl. S. 254.
- Loschge, Beytrag zur Gesch. der spanischen Fliege, im 23. Stück des Naturforschers, S. 37. Tab. I. Fig. 1—8.
- Magnenus, J. C. Exercit. de Manna Cap. I.
- Meyers Naturgesch. der giftigen Insecten. Th. I. S. 39.
- Mouffetti Theatr. Ins. 144. *Cantharis officinarum*.
- Müllers Linn. Nat. Syst. der Ins. B. I. S. 180. Tab. VIII. Fig. 6. *Die spanische Fliege*.
- Muralto, J. A., de Cantharidibus varia scripsit in Eph. N. C. Dec. II. ann. 2. Obs. 20. p. 44. Obs. 21. p. 46. Obs. 22. p. 47.
- Nicandri, Alex. Theriaca et Alexipharmaca. p. 137.
- Olivavd Obs. de Symptomatibus per Cantharides productis; in Roux Journal de Médecin Tom. XXXXVI. p. 242.
- Onomatol. Hist. nat. P. V. p. 154.
- Paré, Opera chirurgica, Francof. ad Moen. Fol. 1594. Lib. XX. de venenis Cap. XXVIII.
- Paul. Aegin. Lib. V. Cap. XXXI.
- Plinii, Hist. nat. L. XI. Cap. XXXVI.
- Probst, J. F. J. Diss. de Sale volatili Cantharid. Argent. 1759. 4.
- Raji Hist. Ins. I. p. 341. *Cantharis vulgaris officinarum*.
- Rumpel, R. F. C. Progr. de Cantharidibus eorumque externo et interno usu. Erf. 1764. 4.
- Sande (J. B. van den) Kennzeichen der Güte und Verfälschung der Arzneymittel, übersetzt von Hahne-mann. Dresd. 1787. S. 201.
- Scaliger de Cantharidibus, de subtil. exerc. 184. p. 605.
- Schaeffer Elem. ent. Tab. XXXIII. Fig. 1. Icon. Ins. Bat. Tab. XLVII. Fig. 1.
- Schwenkfeld Theriatr. Siles. p. 520.
- Scopoli Ent. carn. 185.
- Sitonius de Cantharidum cum vesica et seminis amnios cum cantharidibus antipathia, in ejus Miscell. Tract. 21. p. 103.
- Stenzel, C. G. Diss. de Cantharidibus prosperae adversaeq. valetudinis auctoribus. (Resp. Hermann) Witt. 1740. 4. Ejusd. Diss. de externo Cantharidum usu imprudentum prudentumque asylo medicorum. (Resp. Häntschel.) Witt. 1743. 4. Ejusd. Diss. de Cantharidibus aliisque aphrodisiacis veneri inimicis amicisq. (Resp. Horn) Witt. 1747. 4.
- Stocker a Neuforn; J. C. Diss. de usu Cantharid. interno. Götting. 1781.
- Swieten, van, Commentarii in Boerhavii Aphorismos. Lugd. Bat. 1766. Tom. V. p. 486.
- Thouvenel Mémoires sur les principes et les vertus des Substances animales médicamentieuses, Bordeaux 1779. p. 38.
- Tode, J. C. medicinisch-chirurg. Biblioth. B. VII. Stück 1. S. 191.
- Tournefort Traité de la matière médicale. T. I. Lib. I. p. 265.
- Tralles, Usus vesicantium salubris et noxius in morborum medela, solidis et certis principiis substratus. Vratislav. 1782.
- Unzers medicinisches Handb. Leipz. 1789. S. 560.
- Vallisnieri Osservazioni sopra la Cantaride de gigli; in operum To. I. p. 255. c. f.

Vogel, R. A. Diss. de venenor. quorund. virtute medica, inpr. Cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Göttingae 1762. 4. Ejusd. Historia materiae medicae Lugd. Bat. 1758. p. 340.

Wedel, G. W. Diss. de Cantharidibus (Resp. Arz-wieser) Jenae 1717. 4.

Whitaker, W. Diss. de Cantharidibus. L. Bat. 1718.

Wichmann Diss. de insigni venenor. quorund. virtute medica, imprimisq. cantharidum ad morsum animalium praestantia, Goettingae 1726.

Wiel (Stalpart van der) Cantharides corpori exterius admotae etiam vesicae noxiae; in Ejusd. Obs. Cent. I. Obs. 83. p. 353.

Wilbrecht, in der Geschichte und den Versuchen einer chirurgischen Privatgesellschaft zu Copenhagen, 1774. Wahrnehm. XXVI.

Wolffs, G. J. Arzeneykundige Abhandlungen, S. 95.

Zacutus Lusit. an Cantharides sint venenosae. Medic. Princip. Histor. L. II. ed. oper. To. I. p. 395.

Die spanische Fliege griechisch *κάνθαρις*, englisch *Spanisch Flies*, entsteht aus einem cylindrischen, an beyden Enden abgerundeten, gelben und undurchsichtigen Eye, welches das Mutterinsekt in die Erde verbirgt, und aus welchem in vierzehn Tagen, bis drey Wochen ein kleiner, raupenähnlicher Wurm hervorkommt, der einen runden, mit zwey Fühlhörnern versehenen Kopf, einen gleich dicken, hinten etwas zugespitzten Körper, und an dessen Vordertheile sechs Füsse, am Ende aber zwey schwanzborsten hat. Kopf, Rücken und Hintertheil sind schwarz, der mittlere Theil des Körpers aber gelb. Diese Würmer halten sich gewöhnlich in der Erde auf, und verlieren sich nicht selten in die Ameisenhaufen, um sich von den Ameisenpuppen zu nähren. Sie verwandeln sich wahrscheinlich in Nymphen, aus welchen das vollkommene Insekt hervorkommt. Lezteres ist überhaupt zehn Linien lang und drey Linien breit, das Männchen jedoch immer etwas kleiner. Die Farbe des ganzen Körpers ist glänzend goldgrün und spielt ins Himmelsblaue, nur die Fühlhörner sind, ausser den zwey ersten Gelenken am Kopfe, schwarz. Der Brustschild erscheint unter dem Vergrösserungsglase fein punktirt und die langen, schmalen Flügeldecken sind einigermaßen gestreift. Vor den etwas ausser dem Kopf hervorragenden, ziemlich grossen, ovalen und schwarzen Augen, stehen die eifgliegerichteten, spitzig zulaufenden Fühlhörner. Der Hintertheil des Kopfs ist in zwey Buckeln gewölbt, der Vordertheil, ausser den vier Bartspitzen, mit zwey starken, schwarzen Zähnen versehen. Der Brustschild ist an den Vorderecken abgerundet, an den Hinterecken mehr spitzig, übrigens uneben. Die hornartigen, dünnen, biegsamen, am Ende abgerundeten Flügeldecken, bedecken ganz die hellbraunen, sich auf den Rücken kreuzenden und am Ende etwas gefalteten Flügel. Von dem überhaupt langen und dünnen Füßen, sind die vier vordern Fußblätter fünf- die zwey hinteren aber viergliedricht, alle aber am Ende mit vier langen Krallen versehen.

Ehemals glaubte man, daß diese Insekten vorzüglich in Spanien zu Hause wären, bezog sie von daher zu pharmaceutischen Gebrauch, und gab ihnen deswegen den Namen *spanische Fliegen*. Gegenwärtig weiß man, daß sie in allen warmen Gegenden von Europa, namentlich in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, in Kalabrien, wo man sie vorzüglich auf dem Waldmeister (*asperula arvensis*) antrifft, auch in nördlicheren Gegenden z. B. in Deutschland, Holland, England, in den südlichen Provinzen von Schweden, wie in Schonen, wo sie sich auf dem Liguster, spanischen Flieder (*Syringa vulgaris*) und Eschenbäumen aufhalten, und auch ausserhalb Europa z. B. in Persien auf der Zitterespe, und in der Tartarey auf der tartarischen Lonicere zu finden sind. Die Monathe, wo sie am häufigsten und gewöhnlichsten vorkommen, sind der Junius und Julius. Sie leben alsdann gesellschaftlich nicht nur von den Blättern der schon angegebenen Pflanzen, sondern auch der Hahnenbutten, des Hartriegels, des Geißbarts, der Hundszunge, der Weide, des Ulmen- Eichen- und Olivenbaums, die sie, nach ihrer ausserordentlichen Gefressigkeit, manchmal ganz entblättern, so daß diese Bäume und Sträucher darüber verdorren. Nebst der Befriedigung ihrer Fressbegierde erfüllen sie noch durch die Begattung die Bestimmung ihres kurzen Daseyns. Bey dieser besteigt das Männchen den Rücken des Weibchens, umfaßt es mit seinen Füßen, und sucht mit seinem Schwanzende die Schwanzspitze des Weibchens zu erreichen. Die Plättchen des männlichen Schwanzendes theilen sich so dann, und es tritt aus demselben ein kleines kugelförmiges Zeugungsglied in die geöffnete Schwanzspitze des Weibchens.

In Hinsicht auf Nutzen und Schaden gehören die Canthariden zu den merkwürdigsten Insekten. Sie haben das Eigne, daß sie weder besondere Giftbehälter, noch besondere Werkzeuge, womit sie verletzen könnten, besitzen; sondern daß sie selbst ganz Gift sind. Dieses erkannte schon *Galenus*, der bemerkte, daß die ganze Substanz dieser Insekten auf eine unbekannte Art als Gift wirke, und *Dioscorides* und *Plinius*, die sie unter die Gifte rechnen. Überhaupt beweist die Menge der angeführten Schriftsteller, wie allgemein anerkannt ihre Giftigkeit in den älteren und neueren Zeiten war, und wie sehr sie Ärzte und Naturforscher ihrer Aufmerksamkeit würdigten. Nicht nur das lebende, frische; sondern auch das todte, schon in Pulver verwandelte Insekt, äussert diese Giftigkeit auf eine auffallende Weise, und kann sie nach *van den Sande* wohl dreissig Jahre behalten.

Auf die Geruchsorgane macht es einen überaus unangenehmen Eindruck, und verbreitet oft weit um sich her seine ekelhafte Ausdünstung, vorzüglich bey
einem

einem bevorstehenden Gewitter, und bey Untergang der Sonne, wenn es bisweilen in ganzen Schwärmen die Luft erfüllt, oder auf Bäumen in grossen Haufen heysammen lebt. Man hat Beyspiele, daß Personen, die unter solchen Bäumen eingeschlafen waren, vom Fieber befallen worden sind, und *Magnenus* erzehlt, daß man im Jahre 1628 die vor der heiligen Kreutz-Kirche bey Pavia gestandenen Eschenbäume habe ausrotten müssen, weil die Süßigkeit des an diesen Bäumen befindlichen Manna's so viele spanische Fliegen herbeygelockt hatte, daß der Gestank den Personen, welche diese Kirche besuchten, unerträglich wurde. Auch die schon zu Pulver gestossenen Canthariden verbreiten noch diesen flüchtigen Geruch, und es leiden davon besonders diejenigen, welche sie pulverisiren, ohne den Mörsel zu bedecken. Nicht weniger heftig und unangenehm ist er in dem aus frischem Cantharidenpulver bereiteten Blasenpflaster. Ich habe bemerkt, daß er durch einen starken Verband und die Ermel eines dicken Camisols drang, und reizbare, sanguinische Personen mit einer solchen Beängstigung und Blutwallung aus dem Schlafe erweckte, daß sie nicht mehr einzuschlafen im Stande waren.

Vorzüglich merkwürdig und bey einer unvorsichtigen Anwendung schädlich ist die Wirkung der Canthariden auf die Haut. Man muß sich daher hüten, sie mit bloßen Händen anzufassen, oder lange darinnen zu halten, wenn man sie untersuchen oder zu pharmaceutischen Gebrauch sammeln will. Sie veranlassen ein Brennen in der Haut, durch diesen Reiz auf Nerven und Gefäße eine Entzündung und einen Zufluß seröser, zuweilen gallertartiger Feuchtigkeiten, die sich unter dem Oberhäutchen in einer gemeinschaftlichen grossen, oder in mehreren kleinen Bläschen ansammeln. Die nach geöffneter Blase darunter bloß liegende Haut ist überaus entzündet, empfindlich, ja schmerzhaft und zu einer, geraume Zeit fort-dauernden Eiterung geneigt. Je frischer das Cantharidenpulver und das davon bereitete Blasenpflaster ist, desto schneller äussert es diese Wirkung, und zieht oft schon in fünf bis sechs Stunden eine vollkommen erhabene Blase, wenn ein altes erst in acht bis zwölf Stunden eine unvollkommene bildet.

Wird ein an sich gut bereitetes, und, nach einem in manchen Apotheken eingeführten üblen Gebrauch, noch überdies mit groben Cantharidenpulver bestreutes Blasenpflaster, ungewöhnlich lange liegen gelassen, oder das Cantharidengift, es sey in Pulver oder Tinktur, auf die verwundete Haut angebracht; so veranlaßt es nicht nur eine heftige Entzündung und tiefe Eiterung, sondern bisweilen auch bey sehr empfindlichen, bey alten oder solchen Personen, welche schlechte Säfte und ödematöse Geschwülste haben, den Brand.

Ausser diesen nachtheiligen Wirkungen auf unsre Haut hat dieses Gift durch die Resorption und Aufnahme in die Masse unsres Bluts alle die üblen Folgen, welche es innerlich beygebracht oder angewandt nach sich zieht, und welche wir unten besonders kennen lernen wollen. Die Saugadern unsrer Oberfläche nehmen die von den lebendigen spanischen Fliegen ausschwitzende Materie bey Personen, die sie mit bloßen Händen sammeln, oder den im Cantharidenpulver enthaltenen Giftstoff, wenn er zu anhaltend auf die Haut wirkt, auf, und bringen ihn in die Saugaderdrüsen, durch welche die eingesogene Feuchtigkeit erst dringen muß, um in das Blut zu gelangen. Diese Drüsen schwellen vom Reiz der Schärfe auf und es entstehen daher am Halse, unter den Achseln, in den Weichen und überall Knöten, wo Drüsen sind. Man hat sogar Beyspiele, daß von den an den Füßen applicirten Vesicatorien, die Leistendrüsen so sehr angelaufen sind, daß sie von Unerfahrenen um so mehr für Bubonen angesehen wurden, weil das eingesogene Cantharidengift zugleich unwillkührliche und schmerzhaftere Erektionen erweckt hatte. Dergleichen Bubonen zertheilen sich aber von selbst, wenn das spanische Fliegenpflaster entfernt worden, und die Stelle geheilt ist, wo dasselbe gelegen war. Eine zweyte, schwer zu erklärende Wirkung äussern die zu lange auf der Haut liegenden spanischen Fliegen, auf die Urinwege. Es erfolgen darauf nicht nur öfterer Drang zum Harnen und ein reichlicherer Abgang des Urins, sondern auch oft mehr oder weniger starke Entzündungen der Nieren, der Harnleiter, der Harnblase und Harnröhre, mit blutharnen, beschwerlichem, nur tropfenweise erfolgendem Urinabgang oder gänzlicher Verhaltung desselben, welche Zufälle nicht selten, Convulsionen, Delirien, ja den Tod zur Folge haben. In Rücksicht dieser Harnbeschwerden erfordert der äusserliche und innerliche Gebrauch der spanischen Fliegen hauptsächlich bey solchen Personen die größte Behutsamkeit, welche an Gries, Stein, schleimichten Hämorrhoiden der Blase, Carunkeln und andern Hindernissen der Urethra leiden, und deren Ab- und Ausscheidungsorgane des Harns überhaupt sehr reizbar sind. Man hat Beyspiele, daß solchen Peronen schon der Geruch der Canthariden, leichte Harnbeschwerde machte, und in der *Gazette de Santé* liest man den merkwürdigen Fall, wo ein Kunstverständiger blos dadurch einen heftigen Schmerz in der Urinblase und einen Krampf in den Waden bekam, daß er eine halbe Unze Cantharidenpulver, welches noch überdies doppelt in Papier eingewickelt war, mehrere Tage in seiner Westentasche trug. Gelangt endlich das Cantharidengift mittelst des Saugadersystems zum Herzen und in das Arteriensystem; so werden beyde durch dieses

erhitzende Reizmittel ausserordentlich in Thätigkeit gesetzt, und Hitze, Wallung, Beängstigung, Andrang der Säfte nach Brust und Kopf veranlaßt.

Alle diese Zufälle erfolgen, nur in weit höherem Grade, auf den innerlichen Gebrauch der Canthariden, vorzüglich bey sehr reizbaren, zu Krämpfen geneigten Personen, und überhaupt da, wo das Nervensystem leidet, jedoch nach *Bartholins* und *Hildans* Bemerkung immer mit geringerer Gefahr, wenn sie ganz, als wenn sie in Pulver verschluckt werden. *Dioscorides* und mit ihm beynahe übereinstimmend *Plinius*, *Nicander*, *Paul von Aegina*, *Bagliv* und viele andere versichern, daß Personen, welche zufällig oder vorsetzlich Canthariden genommen haben, vom Mund bis zur Blase und zum After die schmerzhafteste Empfindung, als ob alles angefressen wäre, einen Pech- oder Cedernharzähnlichen Geschmack im Munde, ein Brennen in der Herzgrube, ausser den schon angegebenen Beschwerden in den Urinwegen, erhalten und überdies beständig an Ekel, ruhrartigen Stuhlgängen, Schwindel, Niederschlagenheit und Mangel des Bewustseyns gelitten hätten. Hiermit stimmen auch die von *Rumpel*, *Forster*, *Tralles*, *Stockar*, *Fuesly* und andern Schriftstellern gesammelten Beyspiele überein, so wie *Willbrechts* Erzählung von einer fünf und dreissig jährigen Jungfer, welche ein Quint spanisches Fliegenpulver, statt eines Laxierpulvers genommen hatte. Ohngeachtet dieses durch ein bald darauf genommenes Brechmittel grossentheils wieder ausgeworfen worden ist, so wurden die gewöhnlichen Zufälle dadurch doch nicht abgewendet. Es erfolgte nemlich heftiger Schmerz im Magen und Darmkanal, beständiger Ekel und Brechen, ein unerträgliches Urinbrennen und Blutharnen, ein kleiner, harter, aussetzender Puls, Kälte des Gesichts, der Hände und Füsse, kalter Schweiß, öftere Zuckungen und nur mit Mühe wurde die Kranke errettet. In anderen Fällen erfolgte wirklich der Tod. So starb z. B. der römische Ritter *Cosanus*, dem ein ägyptischer Arzt einen Trank von spanischen Fliegen verordnete, und, nach *Ciceros* Erzählung, *Cajus Carbo* nach genommenen Canthariden. Auch *Barrere* erzählt, daß ein sechzigjähriger gesunder und starker Mann auf eine Drachme Cantharidenpulver Leibschmerzen und Strangurie bekam und, als am andern Morgen ein Arzt herbeygerufen worden, schon über und über mit einem klebrichten Schweiß bedeckt war, kalte, mit Flecken besetzte Extremitäten, einen kaum fühlbaren Puls, einen aufgetriebenen und gespannten Unterleib hatte, und wenig Stunden darauf starb. Bey der Leichenöffnung fand man das Bauchfell voll Brandflecken, den Hals und Boden der Urinblase überaus entzündet, diese überhaupt sehr ausgedehnt und lauter brandige Streife in ihrem Umfange.

Thouvenet, der die chemische Analyse der Canthariden lieferte, fand die corrosive Beschaffenheit dieses Gifts in einer, mit einer fetten oder öligen Materie verbundenen Säure. *Gmelin* wagt es nicht, mit Zuversicht zu behaupten, auf welchem Grundstof eigentlich die Schärfe der spanischen Fliege beruhe und ist ungewiß, ob er sie in dem darausgezogenen Harze oder in dem sich durch das Aufbrausen mit Säuren verrathenden Laugensalze suchen soll. *Löseke* äussert sich hierüber bestimmter und glaubt, daß der Hauptbestandtheil dieses scharfen Wesens weder in dem stinkenden, gelben Öle, noch in dem scharfen, flüchtigen Laugensalze, als man bey der Destillation erhält; sondern in dem harzigen Extraktivstoffe liege, den man durch Weingeist aus den spanischen Fliegen ziehen kann. Wahrscheinlich gehört zum Wesen dieses Gifts die innige Verbindung aller dieser Bestandtheile.

Fuetsly sagt: „es ist nicht schwer zu erkennen, ob jemand dieses Gift bekommen habe. Die Symptomen, welche darauf folgen, sind demselben so eigen, daß sie den Arzt nicht lange in Zweifel lassen können. Ausser dem besonderen Geschmack im Munde, und dem Schmerz in den Hypochondrien, ist noch ein Jucken in den Schaamtheilen, Harnwinde und bald ein blutiger Harn vorhanden, welcher unter dem heftigsten Brennen nur tropfenweise abgeht. Hilft man nicht schleunig, so kommt der Kranke von Sinnen, delirirt, bekommt Schwindel, Zuckungen und stirbt.“

Die Heilart ist die nemliche, welche bey allen scharfen, äzenden Giften statt findet. Äusserlich legt man auf die von den Canthariden angegriffenen Stellen der Haut, Schleime, Milch oder Öl. Das in den Magen gelangte Gift, verlangt aber gleich anfänglich die Ausleerung desselben durch Brechmittel, sodann aber müssen einwickelnde, die Schärfe des Gifts abstumpfende Mittel z. B. schleimichte Getränke, Milch, Öle, Honig mit Wasser etc. in Menge durch Mund und After lauwarm beygebracht, auch äusserlich erweichende Bähungen auf den Unterleib, vorzüglich in der Schamgegend, ferner ölige, schleimichte Einspritzungen in die Blase gemacht und besonders noch der Kampfer, als das wahre Gegengift der spanischen Fliegen, in starken Gaben zu zehn und mehr Gran, am besten in einer Emulsion angewendet werden. Bisweilen erfordert der entzündliche Zustand noch Aderlassen, laue Bäder und andere anti-phlogistische Mittel.

8. Der Raubkäfer.

Staphylinus, Antennae moniliformes. Palpi quatuor, Elytra dimidiata. Alae tectae.
Cauda simplex, exserens duas vesiculas oblongas. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I.
P. IV. p. 2025.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S.
329. n. 29.

Meyers Naturgesch. der giftigen Insekten, Th. I.
S. 34. Raubkäfer.

Müllers Linnéisches Natursyst. der Ins. B. I.
S. 387. Raubkäfer.
Onomatol. Hist. natural. B. VII. S. 292. Das Raub-
käfer-Geschlecht.
Sulzers Gesch. der Ins. S. 68. Raubkäfer.

Die Insekten dieses ziemlich zahlreichen Geschlechts entstehen aus Larven, die sich in feuchter Erde aufhalten, und sind nach Verschiedenheit der Arten überaus verschieden in der Grösse, die von der einer Linie bis zu der eines Zolls steigt. Sie haben paternoster- oder perlenschnurförmige Fühlhörner, vor denselben meistens ein scharfes Zangengebiss, kurze, etwan die Hälfte des Hinterleibes bedeckende Flügeldecken und am Schwanzende zwey verborgene, länglichte Bläschen, welche sie hervortreiben können, übrigens sechs Füsse, welche nichts Auszeichnendes haben. Die meisten Arten dieser Raubkäfer sind schwarz, andere fallen mehr ins blaue, noch andere sind gelb, braun oder roth, die Schwanzbläschen aber gelblich und bey den schwarzen Arten weifs. Sie sind sehr geschwind, welches ihrer Raubsucht, wovon sie auch den Namen erhalten haben, sehr zu Statten kommt, leben meistens von andern Insekten, und sind nicht nur in, sondern auch ausserhalb Europa zu Hause.

Die grösseren Raubkäfer beissen ziemlich schmerzhaft, und geben einen schmierigen, schwarzgelben, übelriechenden Saft von sich, wenn sie gefangen werden und in Lebensgefahr sind, dessen Giftigkeit jedoch noch zweifelhaft ist.

9. Der grosse Ohrwurm. Tab. I. Fig. 9. und 10.

Forficula auricularia, elytris apice albis, antennis 14 articulatis. L. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2038. n. 1. Amoenit. acad. Vol. III. p. 343. Faun. Suec. p. 860. —
Habitat in Europae fructibus frequens: aures dormientium interdum intrans, spiritu frumenti pellenda.

Berlinische Sammlungen, B. VIII. S. 342. Bemerkungen über den Ohrwurm.

Blumenbachs Handb. der Naturgesch. 5te Aufl. S. 329. n. 1. Ohrwurm, Oehrling, Ohrkühler.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 567. le grand perce-oreille.

Degeers Abhandl. zur Gesch. der Ins. von Göze. B. III. S. 353. Tab. XXV. Fig. 16 — 25. Grand perce-oreille, der grosse Ohrwurm.

Fabricii Mantiss. Ins. I. p. 224. n. 1. Spec. Ins. I. p. 340. n. 1. Syst. Ent. p. 269. n. 1.

Forbicinii Bom. Dict. VIII. p. 334.

Frisch

Frisch's Beschreib. allerley Ins. Teutschl. Th. VIII. S. 31. Tab. XV. Fig. 1. 2. *Vermis auricularius*.

Füßslins Schweitz. Ins. S. 21.

Gazette lit. de Berlin 1775. no. 570.

Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 375. n. 1. Tab. VII. Fig. 5. *le grand perce-oreille*.

Gözes entomologische Beytr. II. S. 734. n. 1. *Der grosse Ohrwurm*. Geschichte schäd. Ins. S. 225.

Herbst's Anleitung zur Kenntniss der Insekten. Tab. XXVI. Fig. 1. a, b.

Jonstoni Hist. nat. de Ins. Tab. XVI. Fig. 2.

Lister Scarab. angl. p. 391. mut. T. XXXI. Fig. A. *Scarabaens subrufus, cauda furcata*.

Merian, M. S. Europ. Ins. Tab. XXX.

Meyers Naturgesch. der giftigen Ins. Th. I. S. 95. *Der grosse Ohrwurm*.

Mouffetti Theatr. Ins. 171. F. inf. *Forficula s. auricularia vulgaris*.

Müllers Linn. Natursyst. der Ins. B. I. S. 396

n. 1. *Der grosse Ohrwurm*. Tab. VIII. Fig. 9.

Muralto de Forficula in Eph. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 19. p. 44.

Onomatol. Hist. nat. P. III. p. 911. *Das Ohrenwieselchen*.

Petiveri Gazophylac. Nat. et Art. Decad. Tab. 74. Fig. 5. *Forficula vulgaris*.

Sauvages Otagia a forficulis aliisq. Ephem. Nat. Cur. Volckameri obs. 266.

Schaeffer. Elem. Ent. Tab. 62. Icon. Inst. Rat. Tab. 144. Fig. 3. 4.

Scopoli Entomol. Carniol. 312.

Sonderbare Erzählungen aus der Naturgesch. Magdeburg 1784. Stück I. S. 39.

Sulzers abgekürzte Gesch. der Ins. S. 69. Tab. VII. Fig. 17. Kennzeichen der Ins. Tab. VII. Fig. 50. *Der grosse Ohrwurm*.

Volckamers Wahrnehmung von Würmern im Kopf. S. Abh. der kais. Ak. der Naturf. Th. III. S. 406.

Ein überall in Europa, und in Deutschland vorzüglich noch unter dem Namen *Ohrenhöhlen*, *Ohrkäfer*, *Zangenkäfer*, in England unter dem Namen *the ear-wig*, in Schweden unter dem Namen *Oernmask* und *Twestiert*, in Holland unter dem Namen *Oorkruiper* oder *Oorworm* bekanntes Insekt, welches seine weissen, ziemlich grossen, ovalen Eyer in die Erde, oder zwischen die Baumrinde legt, aus welchen es als Nymphe in einer von dem vollkommenen Insekte nur in so ferne abweichenden Gestalt kommt, daß es noch keine Flügel hat, welche es erst nach der zweyten, dritten Häutung zu erhalten pflegt. Bis dahin bleibt die Nymphe weis und hat blos braunrothe Zähne und Augen, frisst und läuft aber wie das vollkommene Insekt, und ist daher eigentlich nur Halbnympe. Sowohl Nymphe als Insekt, haben eine Länge von zehn bis eilf, und eine Breite von höchstens zwey Linien. Der Kopf des Ohrwurms (Tab. I. Fig. 9.) ist oval, braunroth und hat zwey netzförmige schwarze Augen, dunkelbraune, borstenförmige, vierzehngliedrige Fühlhörner, welche so lang, als der halbe Körper sind, zwey gelbe Beißzangen und vier Bartspitzen. Auf dem Brustschilde sieht man oben eine flache, vorne quer abgeschnittene und hinten rundliche Platte, welche hornartig, in der Mitte schwarz, und an den erhabenen Rändern blafsbraun und graulich ist. Die zwey braunen halbhornartigen Flügeldecken sind so kurz, daß sie kaum die Brust bedecken, und verbergen demohngeachtet die feinen durchsichtigen, gatz zusammengefalteten Flügel, welche ausgebreitet so lang als der Hinterleib sind. Dieser ist länglicht, mit einer hornartigen, kastanienbraunen Haut bedeckt, aus zehn

zehn Ringen zusammengesetzt und daher so biegsam, daß das Insekt nach allen Seiten damit herumschlagen kann. Sein letzter Ring (Fig. 10. *a. a.*) ist mit vier Erhabenheiten versehen und endigt sich in eine bewegliche, hornartige Zange, wovon das Insekt den lateinischen Namen *Forficula* und den teutschen *Zangenkäfer* erhalten hat. Die zwey Arme dieser Zange (*b. b.*) sind an der Wurzel sehr dick, und an der Innenseite mit mehreren Zähnen versehen, am Ende aber hakenförmig gebogen. Das Insekt kann sie öffnen und schliessen, und damit seinen Raub halten. Übrigens haben die Fußblätter der ziemlich kurzen, ockergelben Füße nur drey Gelenke.

Was den Geschlechtsunterschied betrifft, so beruht dieser blos auf einigen Abweichungen mit der Gestalt und Bewegfertigkeit der Zange, welche bey dem Männchen (Fig. 10.) grösser, an der Wurzel stärker, überhaupt bogenförmiger und an der Innenseite der Wurzel mit mehr Zähnen, als bey dem Weibchen versehen ist. Auch zeigen sich an den Seiten des letzten Rings bey dem Männchen einige eckigte Erhöhungen (*a. a.*). Dabey ist letzteres im Stande die Arme der Zange vollkommen übereinander zu schlagen, da sie das Weibchen kaum zusammenbringt. Mit dieser Zange nähert sich bey der Begattung das Männchen rücklings dem Weibchen, sucht damit den Ort der Vereinigung auf, welche mittelst eines aus der Fuge des vorletzten Ringes bey dem Männchen heraustretenden Theils erfolgt, so daß die Zange des Männchens am Hinterleibe des Weibchens, und die des Weibchens am Hinterleibe des Männchens anliegt, wobey beyde in entgegengesetzter Richtung ruhig sitzen bleiben.

Man findet die Ohrwürmer in der Erde, unter Steinen, im Mist, unter der Rinde alter, fauler Bäume, auch in hohlen Bäumen, an und in verschiedenen Gartenkräutern, an den Kohlblättern, in den Stielen der Angelika, des wilden Pastinaks, auch in Blumen, z. B. in den Kelchen der Nelken, nicht weniger in verschiedenen Früchten, ihrer Lieblingsspeise, z. B. in süßen Birnen und Äpfeln, in Pflaumen, Aprikosen und Pfirschen, in welche sie sich hineinfressen. In die Häuser werden sie theils durch dergleichen Früchte, theils durch Blumen und Kräuter gebracht, und dann sind sie bisweilen in den Rissen feuchter Mauern, in den Spalten fauler Bretter, unter den Blumenscherben und an andern feuchten Orten anzutreffen. Überhaupt äussern sie einen Trieb sich in Höhlungen zu verbergen, und schlüpfen daher nicht selten in das menschliche Ohr. Zwar suchen letzteres verschiedene Naturforscher wegen des die Insekten zurückscheuchenden Ohrenschmalzes zu bezweifeln; allein mehrere Beyspiele, wobey ich Augenzeuge war, haben

haben mich von der Wirklichkeit dieses thierischen Instinkts überzeugt. Auch findet man hin und wieder bey den Schriftstellern merkwürdige Exempel. So erzehlt *Bomare* in seinem Dictionaire der Naturgeschichte von sich selbst, daß ein Ohrwurm, den ihn sein Bruder ins Ohr laufen ließ, bey ihm Dummheit und Kopfschmerzen, bey seinem Bruder aber, an welchem er sich auf gleiche Art gekrochen, weit schlimmere und bedenklichere Zufälle hervorgebracht habe, und *Volckamer* führt das Beyspiel einer Frau an, welcher mehrere Ohrhöhlen ins Ohr gekrochen sind, als sie auf dem Grase eingeschlafen war, und welche, da sie nicht alle wieder herauszubringen waren, Zeitlebens die heftigsten Schmerzen davon auszustehen hatte. Auch aus den *sonderbaren Erzählungen aus der Naturgeschichte* führt *Göze* eine merkwürdige Anekdote an. Eine mit heftigen Kopfschmerzen geplagte Frau sagte einst in der Verzweiflung zu ihrem Mann: er mögte sie todt schlagen. Der Mann schlug mit einem Beil auf die Ecke des Tisches und sogleich blieb die Frau, die er gleichwohl nicht berührt hatte, todt. Bey der Sektion fand man einen Ohrwurm im Kopfe, der sich vom Ohr herein weiter gefressen hatte, welches freylich wegen der schwachen Fresswerkzeuge dieses Insekts wenig Wahrscheinlichkeit hat, da kein Ausgang aus dem Gehörwerkzeuge ins Gehirn vorhanden ist, und daher die Knochensubstanz hätte durchnagt werden müssen. So viel ist indessen gewiß, daß der Ohrwurm in die Stellen, wo er sich anhängt, zu kneipen und zu beißen und dadurch nicht selten den lebhaftesten schmerz zu verursachen pflegt. Auch dreht er, sobald er Verfolgung bemerkt, gleich überall seinen Zangenschwanz herum und sucht damit zu zwicken. Um sich von diesem lästigen Gaste im Ohre zu befreyen, dient das Einspritzen mit Öl, Essig oder Brandwein.

10. Die amerikanische Schabe. Tab. I. Fig. 11.

Blatta americana, ferruginea, thoracis clypeo posterius exalbido. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2042. n. 4. — Habitat in America, cum saccharo in Europam delata.

Brückmann, U. F. E. Epistolarum itinerarium Cent. I. Epist. XXIII. c. Fig.

Degeers Abhandl. zur Geschichte der Ins. von Göze, B. III. S. 347. Tab. 44. Fig. 1 — 3. *Blatte Kakerlac, der Kakerlak.*

Fabricii Mantiss. ins. I. p. 225. n. 6. Spec. ins. I. p. 342. n. 5. Syst. Ent. p. 271. n. 3.

Fermins Reise durch Surinam, Th. II. S. 268. *Hausküfer, Kackerlack.*

Frischs Ins. Teutschl. Th. V. Tab. III.

Geoffroy Hist. des Ins. I. p. 381. n. 2. *Blatte fusco-flavesce.*

Gözens entomol. Beytr. Th. II. S. 7. n. 4. *Blatte americana, der braune amerikanische Kakerlak.*

Herbst,

Herbst, in Fueslys Archiv der Insektengeschichte
VIII. T. 49. Fig. 5. *Blatta alata*.

Merian. Ins. de Surin. I. Tab. I. *Kakkerlaque*.

Meyers Naturgesch. der giftigen Ins. Th. I. S.
103. n. 3. *Die amerikanische Schabe*.

Müllers Linn. Natursystem d. Ins. B. I. S. 403.
n. 4. *Der Amerikaner*.

Neueste Mannichfaltigkeiten. Jahrg. II. S. 1. c. F.
Raji Hist. Ins. 623. *Blatta molendinaria* ab insula
Jamaica allata, major.

Seeligmanns, J. M. Sammlung verschiedener
ausländischer und seltener Vögel. Th. IV. Tab. CVIII.
Fig. 5. *Blatta americana*, die amerikanische Schabe.

Villers (de) Entomologia Faunae Suecicae Ca-
roli Linnaei Vol. I. p. 428.

Degeer und *Fermin* geben die Grösse der amerikanischen Schabe verschieden an. Ersterer giebt ihr nur anderthalb Zoll, letzterer fast dritthalb Zoll Länge. Ihre borstenartigen Fühlhörner aber übertreffen oft die Länge des ganzen Körpers. Letzterer ist mehr platt, als rund, und besteht aus einem schmalen Bruststück und einem bauchigten, vielringigen Hinterleibe. Flügel und Flügeldecken sind länger als der Körper. Einige sollen, nach *Seeligmann*, gar keine Flügel haben, worinnen er, wohl irrig, den Geschlechtsunterschied sucht. Denn beyde Geschlechter haben Flügel, nur sind die des Weibchens, so wie der Körper, kürzer, als die des Männchens, welches überdies zwischen den beyden Schwanzhörnern noch zwey andere, ziemlich lange, kegelförmige Fäden hat, die dem Weibchen fehlen. Die Farbe des ganzen Körpers und der Flügeldecken ist rostfärbig braun, die runde Brustschildplatte, nach *Degeer*, dunkelockergelb, mit zwey grossen, dunkelbraunen Mittelflecken, die dickschenkligten Füsse aber sind nach *Seeligmann* rothgelb. Sie legen eine Menge, den Senfkörnern ähnliche Eyer auf einem Haufen, den sie dann, wie die Spinne, mit einem starken Gewebe überziehen.

Amerika ist ihr Vaterland. Ursprünglich leben sie daselbst in Wäldern und im Gebüsche, und gehen in warmen Sommernächten in grossen Heeren auf ihren Raub aus. Im Winter verlieren sie sich, kriechen in die Löcher alter Mauern und in den Schutt, wo sie den ganzen Winter wie todt verborgen liegen. Da sie den Süssigkeiten sehr nachgehen; so findet man sie in Menge auf den mit Zucker beladenen Schiffen, und durch diese werden sie, theils todt, theils lebendig, mit nach Europa gebracht. Wirklich sind sie nach *de Villers* Versicherung schon im südlichen Frankreich einheimisch geworden.

Unglaublich ist der Schade, welchen diese Insekten durch ihre ausserordentliche Gefressigkeit anrichten. Sie beschädigen nicht nur die Feldfrüchte, sondern sie nisten sich auch in die Schränke, in das Holzwerk der Häuser etc. und vermehren sich so sehr, daß in den meisten Häusern in Surinam alles davon wimmelt. Alles leinene und wollene Zeuch, Papier, Leder, Pergament, Brod und alle Lebensmittel, vorzüglich Zuckerwerk, wird von ihnen zernagt, und es hält sehr

schwer,

schwer, Eßwaaren vor ihnen zu verwahren, da ihr dünner, platter Körper sie geschickt macht, überall durchzuschlüpfen. Sie kommen daher auch in Gefässe, worinnen Wein und Bier, und vorzüglich in die Gläser, worinnen Confituren enthalten sind. Das Lästigste ist noch ihr unerträglicher Geruch, welcher den der Wanzen weit übertrifft, und welchen sie sowohl den Kleidungsstücken, als den Eßwaaren mittheilen, und letztere hierdurch ungenießbar machen. Bey Nacht, wo sie auf ihren Raub ausgehen, plagen sie die Menschen durch ihre Bisse, besonders gehen sie, wie *Seligmann* versichert, den Fingern der Kinder nach, wenn sie fett sind. Von den in ihrem Vaterlande gebräuchlichen Mitteln zu ihrer Vertilgung, findet man bey den Schriftstellern nichts angegeben.

II. Die Maulwurfsgrille. Tab. XIII. Fig. 3.

Gryllo-talpa, alis caudatis elytro longioribus, pedibus anterioribus palmatis tumentosis. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2059. u. 10. Faun. Suec. 806. — Habitat in Europae, borealis Americae et Asiae, ipsius Javae (Minor tamen) cultis, hortorum pestis, fimo equino allicienda, porcino pellenda.

Aldrovandi, de animalibus Insectis, Lib. V. C. IX. p. 225. *Vermis cucurbitarius*.

Bartholini. Act. Hafn. Vol. IV. p. 5. F. 1—6.

Blanck Herb. T. 81. Fig. 10.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. 5. Aufl. S. 333. n. 1. Die *Werre*, *Maulwurfsgrille*, der *Rehwurm*, *Reutwurm*, *Schrotwurm*, *Ackerwerbel*, *Erdkrebs*.

Bresl. Natur- und Kunstgesch. Vers. 12. S. 666. von den *Werren*.

Catesby (M.) the Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, Vol. I. Tab. VIII.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 571. *le taupe-grillon*, *Courtillière*.

Degeers Abh. zur Gesch. d. Ins. von Göze, B. III. S. 336. n. 2. *Taupe-Grillon*, *Maulwurfsgrille*.

Fabricii Mant. ins. I. p. 231. n. 1. Spec. ins. I. p. 353. n. 1. Syst. Ent. p. 279. n. 1.

Fränkische Samml. B. II. S. 10. vom Fangen der *Gryllo-Talpa*.

Frischs Ins. Deutschl. Th. XI. S. 28. n. 28. Platte I. Tab. 5. Die *Feldgrille* mit *Maulwurfsfüssen*, der *Schrotwurm*, *Gerstenwurm*, *Reutwurm*.

Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 387. n. 1. Tab. VIII. Fig. 1. *la Courtillière* ou *le Taupe-Grillon*.

Goedartii Insecta Tom. I. p. 290. Tab. 76.

Göze, entomol. Beyträge II. S. 49. n. 10. *Acher-*

werre, *Riethrebs* Geschichte schäd. Ins. S. 120. *Maulwurfsgrille*.

Griselini Giornale d'Italia, T. V. p. 205.

Hannov. g. Anz. 1754. S. 1421. von Ausrottung des *Reut-* oder *Schrootwurmes*.

Hanow von einem *Schrootwurm*. Merkwürdigk. B. I. S. 334.

Jacobaeus, Ol. Anatome Gryllo-Talpa Act. Hafniens. Vol. IV. obs. 2.

Imperati (Ferrantes) Hist. nat. Lib. XXIX. C. 1. p. 901. Edit. Colon. Fig. 2. *Talpa*.

Jonstonii Ins. Tab. XII. Fig. ult. *Gryllotalpa*.

Mem. et Obs. de la Soc. Oecon. de Berne, T. IV.

Menzel in Actis N. O. Dec. II. An. VI. p. 120.

Mouffetti Theatr. Ins. p. 104. *Gryllo-talpa*.

Müllers Linn. Naturs. d. Ins. B. I. S. 422. p. 10. *Maulwurfsgrille*.

Muralt, J. v. von dem Ackerwirbel. S. Abh. d. k. Ak. d. Natf. Th. XI. S. 92 und Th. XII. S. 52. Tab. II. Fig. 5—7.

Museum Lud. Ulr. 120.

Museum Richter. p. 358. *Gryllus subterraneus*.

Nachrichten der Schles. patriot. Gesellsch. B. I. S. 129. über die *Werre*.

Onomat. Hist. nat. P. IV. p. 73. *Gryllus Gryllo-talpa*.

Peyeri, J. C. *Merycologia s. de Ruminantibus et Ruminatone commentaria*. Basil. 1683. p. 4. et 198.

Physikalische ökonomische Auszüge, B. II. S. 314. *Werren oder Schrootwürmer in Gärten zu vertreiben.*

Raji Hist. Insect. p. 64. n. 67. *Gryllotalpa*.

Reaumur Memoires pour serv. a l'hist. des Ins. T. I. p. 27.

Rösels Insektenbel. Th. II. Heuschr. S. 89. Tab. XIV. XV. *Der geflügelte Maulwurf, oder die schädliche grosse Feldgrille mit Maulwurfsfüßen; der Ackerwerbel*. S. 90.

Schaefferi Icon. Ins. Ratisb. Tab. XXXVII. Fig. 1.

Schwenkfelt Theriotropheum Silesiae, p. 528.

Curtilla, die Werre.

Scopoli Entomol. Carniol. 317.

Seba Mus. IV. T. 89. Fig. 3. 4.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 71. Vignette. Kennzeich. T. IX. Fig. 59.

Welsch Hecatostee II. Observationum Physico-medicar. p. 39. c. f.

Wittenbergisches Wochenblatt. B. I. S. 89 und 201.

B. II. S. 294. 309. B. VII. S. 401. von der *Gryllotalpa* oder *Erdwölfe* und Vertreibung desselben.

Zinks Leipz. Sammlung. B. XIII. S. 840.

Zu den verschiedenen Benennungen, unter welchen dieses Insekt bekannt ist, gehören auch noch der von dem Schaden, welchen es den Kürbisen zufügt, hergenommene Name *Kürbswurm*, der seine Ähnlichkeit bezeichnende Name *Erdkrebs*- die englische Benennung *Fen-Cricket* und die holländischen *Veen-Mol* und *Mol-Krekel*. Es hat einen ziemlich kleinen, länglicht-ovalen Kopf, den es in das Bruststück zurückziehen und aus demselben wieder hervorstrecken kann, zwey borstenartige, ziemlich lange und starke Fühlhörner vor den schwarzen netzförmigen Augen, zwey viergliedrichte und zwey dreygliedrichte Fressspitzen am Munde. Sein Brustschild hat viel Ähnlichkeit von dem eines Krebses, eine schmale, erhabene Kante in seinem ganzen Umfange, ist dabey ziemlich lang und dick, und mit dem feinsten Wollhaare versehen. Am Hintertheile des Brustschilds sind die lederartigen, mit starken und schwachen Adern durchzogenen Flügeldecken befestiget, welche den Rücken kaum zur Hälfte bedecken. Die stärkeren Adern dieser Flügeldecken sind nach *Rösel* das einzige Kennzeichen, wodurch sich das Männchen von dem Weibchen unterscheidet, und womit es einen besonderen Laut hervorbringen kann, um das Weibchen zur Begattung herbeyzulocken. Völlig unkenntlich sind die langen dicht gefalteten, sich wie zwey Leisten über den Rücken hinabziehenden, und in zwey noch über den Hinterleib hinausreichenden Spitzen sich endigenden Flügel, welche ausgebreitet überaus breit, und beynahe dreyeckig sind. Der lange, aus neun bis zehn Ringen bestehende, ziemlich weiche Hinterleib, ist bey seiner Vereinigung mit dem Brustschilde ziemlich schmal, wird aber alsdann bauchicht und hat am Schwanzringe zwey, den Fühlhörnern in der Länge beynahe gleichkommende, nur etwas dickere, borstenartige Spitzen, welche *Rösel* ebenfalls zu Fühlhörnern macht, die diesem Insekte in seinen unterirdischen Gängen die von hinten drohende Gefahr gewahr werden lassen. Von den sechs

sechs Füßen zeichnen sich die zwey vorderen durch ihre besondere Bildung aus. Sie bestehen aus drey Gliedern, wovon das kleinere seine Artikulation im Brustschilde hat, das mittlere das dickste, und das äussere oder das Fußblatt den Vorderfüßen des Maulwurfs sehr ähnlich ist. Dieses Fußblatt besteht aus einem kleinen, daumenförmigen, am Ende mit zwey borstenartigen Spitzen versehenen Glied (Tab. XIII Fig. 3. a.), welches in ein zweytes, zweyzackichtes (b.) eingelenkt ist, und aus einem dritten vierzackichten Gliede (c.), worinnen das zweyte Glied des Fußblatts seine Artikulation findet. Die Maulwurfsgrille ist, nach Rösels Versicherung, mit diesen Vorderfüßen im Stande, eine Last von sechs Pfunden auf einer ebenen Fläche fortzuschieben, woraus sich auf die Kraft schliessen läßt, mit welcher sie das Erdreich, bey dem Graben ihrer Gänge, zu entfernen vermag. Das zweyte Paar Füße ist gleich an der Vereinigung des Hinterleibes mit dem Brustschilde eingelenkt, viel dünner und etwas länger, als das vordere Paar, übrigens durch nichts ausgezeichnet. Das hinterste Paar, oder die Springfüße, haben sehr dicke Schenkel und sind am Schienbeine mit drey bis vier Stacheln versehen, ihr viergliedrichter Plattfuß aber, hat, wie der dreygliedrichte des zweyten Fußpaares, zwey Klauen. Da beyde Hinterfüße länger, als die vier vordern sind; so ist die Maulwurfsgrille auch vermögend, gleich anderen Grillen, zu hüpfen; obgleich sie dabey sich wenig vom Erdboden entfernt. Die Farbe des Insekts ist, von der Rückenfläche betrachtet, ein ins Gelbe spielendes Grau, von der Bauchfläche aber beynahe orangefarb. Die zwey Vorderfüße sind rothbraun, die vier Hinterfüße ebenfalls pomeranzengelb.

Das befruchtete Weibchen macht sich im Monath Junius oder Julius einen halben Schuh tief unter der Erde eine Höhle und leget daselbst seine glänzenden, gelblichbraunen, den Hirsenkörnern an Grösse und Form gleichenden Eyer, öfters zu zwey bis drey hundert, auf ein Häufchen beysammen. Die ausgekrochenen, jungen Maulwurfsgrillen haben viele Ähnlichkeit mit jungen schwarzen Ameisen, und nähren sich wie die Alten, von den zarten Wurzeln des Grases, der Gerstensaart und der Küchengewächse. Sie verrathen im Monath August und September ihre Gegenwart unter der Erde durch die verwelckten, gelben Flecken auf den Wiesen. Im Oktober und November sind sie, nach der dritten Häutung, schon beynahe zwey Zoll lang und suchen nun durch tieferes Eingraben in die Erde sich vor der Kälte zu sichern, in den wärmeren Tagen des März aber werden sie wieder sichtbar, jedoch ohne Flügeldecken, welche sie erst nach der vierten Häutung erhalten. Nach der fünften Häutung im Junius und Julius erscheinen sie in ih-

rem

rem völlig ausgewachsenen Zustände, jedoch selten über, sondern gewöhnlich ganz nahe unter der Oberfläche der Erde, wo sie diese überall, wie kleine Maulwürfe, aufwerfen. Ausser den feuchten Wiesen, wählen sie auch feuchte Gärten, die an Flüssen und Kanälen liegen, vorzüglich, wenn sie mit Pferdmist gedüngt werden, zu ihrem Aufenthalte. Sie lassen sich daselbst in den Sommermonaten Früh und Abends hören, wo sie zur Begattung locken. Nur ein mildes Klima begünstigt ihr Fortkommen, daher sie, nach *Degeer*, nicht in den nördlichen Provinzen Schwedens, wohl aber in Schonen anzutreffen sind. In manchen Gegenden Deutschlands, z. B. in Thüringen, sind sie als sehr verheerende Geschöpfe bekannt, auch sind sie nach *Catesby* in Virginien und Carolina zu finden.

Sie beißen sehr empfindlich, und man muß sich daher hüten, an den Orten wo die wahrscheinlich durch sie verwelkenden Pflanzen etc. ihre Gegenwart verrathen, mit den Händen in der Erde zu graben. Viele halten sogar ihren Biß für giftig. Doch hat man darüber noch keine, wohl aber hierüber zuverlässige Erfahrung, daß Schweine davon augenblicklich sterben, wenn sie beym Aufwühlen der Erde von ihnen verschluckt werden, es sey nun, daß sie todt als ein Gift wirken, oder lebendig den Magen und Darmkanal durchnagen und zerkratzen. Zu ihrer Vertilgung werden in verschiedenen der angeführten Schriften Mittel vorgeschlagen.

12. Der Warzenfresser. Tab. I. Fig. 12—15.

Gryllus verrucivorus, Thorace subquadrato laevi, alis viridibus fusco-maculatis, antennis setaceis longitudine corporis. Linn. Syst. N. Ed. Gm. XIII. T. I. P. IV. p. 2067. n. 34. Faun. Suec. 870. Iter wgoth. 253. — Habitat in Europa, e murino fuscescens, a rusticis Suecis manuum verrucis admotus, quas praemordet, et liquorem in vulnus evomendo, vt contabescat, efficit.

Blumenbachs Handb. der N. G. S. 334. n. 5. *Gryllus verrucivorus*, das Heupferd.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 570. la Saute-relle tachetée.

Degeers Abh. zur Gesch. der Ins. von Göze, B. III. S. 269. 270 und 279. Tab. XXI. la Saute-relle rouge-verrue, der Warzenfresser, Wärt-bit.

Fabricii Mant. ins. I. p. 234. n. 27. Spec. ins. I. p. 359. n. 24. Syst. Ent. p. 286. n. 23. *Locusta verrucivora*.

Frisch's Ins. Teutschl. 12. T. 2. Fig. 1. 2.

Geoffroy Hist. des Ins. II. p. 398. n. 1. *Locusta cauda ensifera curva*.

Gözens entomol. Beytr. II. S. 64. n. 33. *Gryll. Tettigonia verrucivorus*, die grüne Säbelheuschrecke. Geschichte schäd. Ins. S. 147.

Jonstoni Hist. Ins. T. XI. Fig. 1—3.

Merianae Ins. Eur. Tab. 176.

Mouffetti Theatr. Ins. T. 117. Fig. 5.

Müllers Linneisch. Natur. d. Ins. B. I. S. 433. n. 33. Der Warzenfresser.

Onomatol. Hist. nat. P. IV. p. 93. Die Mausgrau-braunlichte Heuschrecke.

Raji Hist. Ins. 61. *Locusta viridis major*.
 Rüssels Insektenbel. Th. II. Samml. der Heuschrecken, S. 49. Tab. VIII. IX und X. *Die im Gras lebende grösste Heuschrecke*, auch S. 58 und 144.
 Schaefferi Icon. Ratisb. Tab. 62. Fig. 5.

Scöpoli Entomol. carn. 321.
 Sulzers abgekürzte Gesch. d. Ins. S. 79. 114.
 Vignette. Kennz. T. IX. Fig. 61.
 Welschii Dentes gryllorum et aliorum insectorum.
 Obs. Hecat. I. obs. 87. p. 90.

Diese in Deutschland sehr bekannte und auch in andern Gegenden von Europa nicht selten vorkommende Heuschrecke, erreicht im ausgewachsenen Zustand eine Länge von anderthalb Zoll. Ihr länglich-runder, mit einer hornartigen Haut überzogener Kopf hat eine gewölbte Stirne (Tab. I. Fig. 14. a.), unter und an den Seiten derselben zwey ovale, netzförmige, schwarzbraune Augen (c. c.), vor welchen in einer Vertiefung die langen, vielgliedrichten, überaus feinen und sich in eine äusserst feine Spitze endigenden Fühlhörner (Fig. 12. und 13.) stehen, die das Insekt nach allen Seiten herumbewegt. Unter der Vertiefung, worinnen Augen und Fühlhörner liegen, wird der Kopf bis gegen seine Mitte immer breiter, von hier aus aber nimmt er in konischer Form wieder ab. Diese konische, stumpfe Spitze, enthält die fürchterlichen Fresswerkzeuge dieses Insekts, welche sich vor dem übrigen grünen Theil des Kopfs, auch durch ihre Fleischfarbe auszeichnen. Sie bestehen überhaupt aus einer obern und untern Lippe und aus den Gebisszangen. Erstere ist aus zwey ziemlich flachen Theilen zusammengesetzt, wovon der obere (Fig. 14. e. u. Fig. 15. a.) an seiner Grundfläche breit ist und dann schmaler und rund zulauft, der untere (Fig. 14. f. u. Fig. 15. b.) aber beynahe ganz rund ist. Diese Oberlippe ist knorpelartig und verbirgt die Fresszangen. Die Gestalt der weit mehr zusammengesetzten häutigen Unterlippe läßt sich nicht deutlich beschreiben. Sie ist vorne etwas gespalten (Fig. 14. g. g.) und an ihrer Wurzel mit zwey sechsgliedrichten (h. h.), in ihrer Mitte aber mit zwey viergliedrichten Bart- oder Fressspitzen (i. i.) versehen. Die Gebisszangen selbst (Fig. 15. c. c.) sind sehr dick und von harter Substanz, von der Innenseite gekerbt und laufen in eine einwärts gebogene Spitze zu. Sie öffnen sich seitwärts, und das Insekt setzt sie von innen nach aussen zu, bey dem Kauen, in Bewegung, so daß die Oberlippe (b.) zwischen beyden Gebisszangen herabhängt, wenn sie geöffnet werden. Diese Gebisszangen sind ebenfalls fleischfarb, nur an der innern Seite, bis zur äussersten Spitze braun. Ein häutiges Wesen verbindet den Kopf mit dem Brustschild, welchen die Heuschrecke in diesen mehr oder weniger zurückziehen kann. Von oben ist der Brustschild mit einer hornartigen Platte bedeckt, die von den Seiten des Kopfs schmal und abgerundet herab läuft (Fig. 12. u. 13.), am Vordertheile desselben sind die vier Vorderfüsse und die Flügeldecken, am Hinter-

tertheile die Hinterfüsse und Flügel eingelenkt. Der ziemlich dicke Hinterleib ist länglichtrund und besteht aus neun, mit zirkelrunden, hornartigen Platten bedeckten Ringen. Beym Männchen endigt er sich mit zwey hornartigen Haltzangen (Fig. 12. b.), wovon jede zwey Spitzen hat. Mit diesen beweglichen Haltzangen umfaßt das Männchen bey der Begattung die Geschlechtstheile des auf ihm sitzenden Weibchen, welche in einem säbelförmigen Fortsatze (Fig. 13. b.) bestehen, der an der Wurzel dick ist, dann dünner und flach wird und sich wie eine Zange öffnet. Die lederartigen Flügeldecken bedecken den hintern Theil des Bruststücks und den Rücken des Hinterleibes, und liegen am Ende übereinander. Sie sind eigentlich die Werkzeuge, durch deren Aneinanderreibung diese Insekten den zwitschernden Gesang hervorbringen, und verbergen unter sich die gleichlangen aber weit breiteren, zusammengefalteten, überaus dünnen, durchsichtigen und mit vielen Adern durchzogenen Flügel. Von den sechs Füßen sind die zwey vordersten die kürzesten, die mittleren etwas länger, beyde in der Bildung einander gleich. Sie bestehen nemlich aus kurzen Einlenkgliedern, dann aus längeren und dicken Schenkeln, aus gleich langen Schienbeinen, welche mit kleinen Dornen besetzt sind, und aus viergliedrichten, am Ende mit beweglichen Krallen versehenen Fußblättern. Das dritte, oder hintere Paar Füße weicht aber von den vorderen merklich ab. Es hat überaus lange und dicke Schenkel, welche gegen das Ende schmaler werden, und mit einem knieförmigen Gelenke versehen sind, und noch längere Schienbeine, welche mehr viereckicht als rund, und mit zwey Reihen Dornspitzen besetzt sind. Die untersten und längsten dieser Dornspitzen (Fig. 12. u. 13. a.) dienen der Heuschrecke wahrscheinlich zum Anstemmen bey Springen. Das Fußblatt weicht von den der übrigen Füße, durch nichts, als durch seine grössere Stärke ab. Schenkel und Schienbeine der Hinter- oder Springfüße stehen immer in einem Winkel nach oben gekehrt. Je spitziger dieser Winkel ist, unter welchem die Heuschrecke die Springfüße anstemmt, desto mehr ist sie vermögend, sich damit von der Erde zu heben und fortzuschellen. Hierbey kommen ihr die Flügel noch zu Hülfe und sie gelangt daher oft ziemlich hoch in die Luft. Doch kommt sie nie sehr weit, sondern sucht immer bald wieder die Erde zu erreichen, um ihren Flug durch erneuerte Sprünge zu unterstützen. In Rücksicht der Farbe sind sie sehr verschieden. Viele sind ganz grün, andere fallen mehr ins Gelbbraune, noch andere mehr ins Rothe, immer sind sie aber an den Flügeln, Flügeldecken, an den Körper und an den Schenkeln der Springfüße mehr oder weniger schwarz oder braun gefleckt. Die Schienbeine

beine der Springfüsse und die Fußblätter aller sechs Füße sind aber, nebst dem weiblichen Legrohre braunroth.

Nach der Begattung legt das Weibchen seine weißgrauen, ziemlich langen, an beyden Enden abgerundeten Eyer in das lockere Erdreich, worein es sein Legrohr senkrecht einbohrt, und stirbt, wie das Männchen, gemeiniglich noch vor dem Winter. Die Eyer hingegen bleiben vom Herbste an, den ganzen Winter hindurch, in der Erde und erst im Frühjahr kommen die jungen Heuschrecken ohne Flügel und Flügeldecken zum Vorschein, die sich, wie die Geschlechtstheile, nach zweymaliger Häutung erst entwickeln. Ihre vollkommene Ausbildung erreichen sie gewöhnlich in drey bis vier Wochen, nachdem sie sich zum letztenmal gehäutet haben. Man findet sie dann vorzüglich in den Monathen Junius und Julius häufig auf den Wiesen, wo sie bis im September verweilen und ihr Geschlecht fortpflanzen. Sie leben daselbst vom Grase, von andern Kräutern und sind überhaupt sehr gefräßig. In ihren Fresszangen besitzen sie eine ungewöhnliche Kraft und man hat sich um so mehr zu hüten, nicht von ihnen gebissen zu werden, da sie sehr boshaft sind und, wenn sie die Haut erreichen, gleich so scharf einbeissen, daß nicht nur das Blut darnach läuft, sondern sogar ihr Kopf von dem übrigen Körper abreißt und an der Haut hängen bleibt, wenn man sie von der Stelle, wo sie eingebissen haben, abziehen will. Dabey lassen sie zugleich einen braunen, ätzenden Saft in die Wunde fließen. Die schwedischen Bauern benutzen sie daher zur Vertilgung der Warzen, welche diese Heuschrecken nicht nur wegbeissen, sondern deren Wurzeln sie auch durch jenen ätzenden Saft austrocknen und vernichten. Mit Recht haben sie also den Namen *Warzenfresser* erhalten.

Ohngeachtet uns nicht bekannt ist, ob die grossen indianischen Heuschrecken den menschlichen Körper wirklich verletzen; so läßt sich dieses doch in ungleich höhern Grade von ihnen erwarten, da sie nach *Rösels* Versicherung (S. 63) ähnliche Gebißwerkzeuge, wie gegenwärtige Art haben. Überhaupt verdienen die Heuschrecken auch dadurch unsere vorzügliche Aufmerksamkeit, daß sie eine der grossen Naturerscheinungen liefern, die bey den Gefahren, womit sie den Menschen bedrohen, ihm zugleich sein Unvermögen fühlen lassen, da etwas auszurichten, wo verborgene Naturkräfte wirken. Oft ziehen sie, besonders in China, in so ungeheuren Heeren in der Luft einher, daß sie dieselbe wie schwarze Wolken verfinstern, und dabey ein fürchterliches Getöse verbreiten. Fallen sie dann in irgend einer Gegend auf ihrem Zuge nieder, so richten sie die schrecklichsten

Ver-

Verheerungen an, und verwandeln oft in wenig Stunden die gesegnetesten Fluren in eine arabische Wüste. In der Bucht St. Louis in Ostindien, und auf der Insel Madagaskar, springen sie den Menschen in solcher Menge vor die Brust und ins Gesicht, daß sie kaum Athem holen können. Aus dieser Ursache waren sie auch Karl dem Zwölften, Könige von Schweden, bey seinen kriegesischen Unternehmungen in Niederarabien hinderlich, wo sie auf seine Armee, wie ein Hagel herab- und den Soldaten in solcher Menge auf den Leib und ins Gesicht fielen, daß sie nicht vor sich sehen konnten, bis die Armee die Grenze des Distrikts erreicht hatte, welche die Heuschrecken einnahmen, und bald sah man da, wo vorher alles grün gewesen, nichts als eine dürre und sandige Steppe. Nur plötzliche Veränderungen in der Luft, Kälte, Hagelwetter, anhaltender Regen, Sturmwind etc. sind im Stande, diese, menschlichen Kräften unbezwingbaren Insektenheere mit einemmale zu entfernen und zu vernichten. Aber nicht selten erwächst aus ihrem Tode ein neues Elend für die Menschheit. So viele Millionen Cadaver verpesteten nothwendig die Luft und veranlassen gefährliche Krankheiten. Dies war nach dem *Orosius*, den Göze anführt, der Fall in Afrika, wo im Jahre 3800 eine Menge alles verzehrender Heuschrecken, endlich ins Meer stürzte, und das Wasser durch die Fäulniß so verpestete, daß mehr als dreymal hunderttausend Menschen starben.

13. Der Wanzenscorpion. Tab. XIII. Fig. 4. 5.

Nepa cimicoides, abdominis margine serrato. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2122. n. 6. Faun. Suec. 907. — Habitat in Europae aquis.

Beckmanni Epitome, p. 101. n. 6.
 Blumenbachs Handb. der Naturgesch. S. 338.
 n. 2. *Nepa cimicoides*.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 578. la nêpe punaise.
 Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. III. S. 346. n. 3. Tab. XIX. Fig. 8 — 13. Punaise d'eau, die Naucoriswanze.
 Fabricii Mant. Ins. II. 277. n. 1. Spec. Ins. H. p. 334. n. 1. Syst. Entom. p. 693. *Naucoris* 1.
 Frisch Ins. Teutschl. VI. S. 28 und 31. n. 14. Pl. 3. Tab. 14. Die breitere Wasservanze.
 Fuesly's Verz. Schweiz. Ins. S. 24. n. 472.
 Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 474. n. 1. Tab. IX. Fig. 5. *Naucoris*, la Naucore.
 Gözens entomol. Beytr. II. S. 175. n. 6. Der wanzenartige Wasserscorpion.
 Gronoviani Zoophilacii. 686.
 Mulleri O. F. Fauna Fridrichdalina, p. 27. n. 250. Zoologiae Danicae prodromus, p. 104. n. 1180.

Müllers, P. L. St. Linneisches Natursyst. d. Ins. B. I. S. 473. n. 6. Tab. XI. Fig. 3. Der Wanzen-scorpion.

Muralto in Eph. N. C. Dec. II. An. II. p. 179. *Pygolampis lacustris*, der Glystling.

Museum Leskianum, p. 117. n. 62. *Naucoris sutura integra*.

Rösels Insektenbel. Th. III. S. 173. Tab. 28. Die breiteleibige schwarzbraune Wasservanze mit dem gelb eingefassten Hinterleibe, der Wanzenscorpion (Kleemann.)

Schaefferi Elem. Ent. Tab. 87. Icon. Ins. Rat. Tab. 33. Sig. 3. 4.

Spielmanni Diss. de Animal. noc. Als. p. 50. Sulzers abgekürzte Gesch. d. Ins. S. 93. T. X. Fig. 3. *Wanzen-scorpion*.

Soll's, K. Abbildungen und Beschreibungen der Wanzen, S. 41. Tab. XII. Fig. VIII. und Fig. B. Der wanzenartige Wasserscorpion.

Die

Die Benennung dieser Insekten beruht auf ihrer Ähnlichkeit. Sie kommen als Nymphen aus runden Eyern, wandeln als solche herum, rauben und fressen, wie im Stande ihrer Vollkommenheit, die sie nach viermaliger Häutung im Monat August erhalten, und unterscheiden sich blos dadurch von den vollkommenen Insekten, daß Flügel und Flügeldecken bey ihnen in besonderen Scheiden verborgen sind. Sowohl Nymphe, als Insekt, hat eine glatte, hornartige Haut, letzteres (Tab. XIII. Fig. 4.) eine eyförmige, oben konvexe, unten plattgedruckte Form, eine Länge von sieben und eine Breite von vier Linien. Der vorne runde, oder abgestumpfte Kopf hat beynahe die Breite des Brustschilds, in welchen er zum Theil steckt, und erhält in jedem Winkel seines Randes (Fig. 5.) ein grosses länglichrundes, flaches, netzförmiges und dunkelgrünes Auge, unter welchem ein sehr kurzes, nicht über dem Rand des Kopfes hervortretendes, viergliedrichtes und haarichtes Fühlhorn steht, welches *Rösel* bey seiner Beschreibung und Abbildung übersehen hat. Am untern und vordern Theil des Kopfs sieht man die zwischen den Vorderfüssen, auf der Brust liegende, den Saugstachel enthaltende Scheide (*a.*), welche an ihrer Basis breit ist und dann in drey Absätzen spitzig zuläuft. Der Brustschild ist vom Kopfe nur durch einen feinen Einschnitt und auf beyden Seiten durch leichte Vertiefungen unterschieden, gewölbt und so breit, als der Hinterleib, der mit einem dreyeckigen Rückenschildchen an den Brustschild anstößt, übrigens aus acht Ringen besteht, und an den Seitenwänden sägeförmig gezähnt ist. Die lederartigen, dünnen, biegsamen und etwas haarigen Flügeldecken, sind an den Rändern, wo sie auf den Rücken zusammenschliessen, so eckigt ausgeschnitten, daß sie das dreyeckigte Rückenschildchen (Fig. 4.) aufnehmen können. Sie bedecken wie die unter demselben liegenden, auf dem Rücken sich kreuzenden, weissen Flügel, den Hinterleib nur bis an den orangenfarbigen, sägeförmigen Rand. In den Brustschild sind die zwey Vorder- oder Fangfüsse (Fig. 5. *b. c.*) eingelenkt. Ihr erstes Glied ist überaus kurz und rund, ihr zweytes oder der Schenkel, das längste, am Anfange sehr dicke und gegen das Ende zu schmaler; ihr drittes etwas kürzer, als der Schenkel, stellt eine sehr spitzige Klaue vor, die sich in eine Falz des Schenkels, wie die Klinge eines Taschenmessers in den Griff einlegt. Mit diesen Fangfüssen hält das Insekt seine Beute fest, um sie mit den Saugstachel aussaugen zu können. Die Mittelfüsse sitzen am Hinterleibe und bestehen aus einem platten Schenkel, aus einem am Ende etwas dickeren und mit Borsten besetzten Schienbeine, und aus einem dünnen, zweygliedrichten, am Ende mit zwey Krallen versehenen Fußblatte. Die

ebenfalls am Hinterleibe befestigten Ruder- oder Hinterfüsse, sind unter allen die längsten, am Schienbeine und Fußblatte mit vielen steifen Haaren, aber nicht mit Krallen versehen. Kopf, Saugstachel und Fangfüsse sind grün, das Brustschild braun, die Flügeldecken schwarzbraun, die untere Fläche des Körpers und die vier Hinterfüsse ockergelb. Das Weibchen unterscheidet sich nur durch seine Dicke und Grösse von dem Männchen. Sie überleben den Winter und paaren sich erst im Frühling des kommenden Jahres.

Man findet sie in stehenden Wassern überall in Europa, nur die ganz nordischen Gegenden ausgenommen, zu Ende des Sommers auch bisweilen auf dem Lande. Ihre Nahrung besteht in verschiedenen kleinen Wasserinsekten, die sie überaus raubsüchtig verfolgen. Sie schwimmen nicht nur sehr geschwind, sondern kriechen auch des Nachts ans Land, und fliegen aus einem Wasser in das andere. Ihr Stich ist überaus schmerzhaft. Dieses bestätigt nicht nur Muralt, der den gefährlichen Stachel irrig am Hinterleibe sucht; sondern auch Spielmann, welcher vor Schmerzen unsinnig zu werden glaubte, als er von diesem Insekte, welches er zwischen den Fingern hielt, gestochen wurde.

14. Die maskirte Wanze. Tab. XIII. Fig. 6. 7. 8.

Cimex personatus antennis apice capillaribus, corpore subvillosa fusco. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2196. n. 64. Faun. Suec. 942. — Habitat in Europae quisquiliis. Larva horrida consumit lectularium.

Amoureux Notice des Ins. p. 270. la Punaise-mouche.

Berlinische Sammlungen, B. VIII. St. 1. S. 40.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 340. n. 4.

Cimex personatus.

Börners Samml. B. I. S. 149. Fig. 4. 5.

Brahms Insektencaender, Th. I. 617.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 577. la reduve masqué.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. III. S. 185. n. 25. Tab. XV. Fig. 1—9. Punaise à balafures, die Kothwanze.

Fabricii Mant. ins. II. p. 309. n. 2. Spec. Ins.

II. p. 377. n. 2. Syst. Ent. p. 730. Reduvius II.

Frischs Ins. Teutschl. Th. X. S. 22. Tab. XX.

Fig. 1—4. die länglichte grosse Kothwanze.

Fuefsllys Verzeichn. schweiz. Ins. S. 26. n. 499. Die Fliegenwanze.

Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 436. n. 4. Tab.

IX. Fig. 3. la Punaise mouche.

Gözens entomol. Beytr. B. II. S. 206. n. 64.

Die maskirte Wanze. Gesch. schäd. Ins. S. 14.

Lister de Scarabaeis angl. p. 397. n. 38. *Cimex maximus pullus, alis nudis ex toto membranaceis*.

Meyers Naturgesch. d. gift. Ins. Th. I. S. 137. n. 1. Die schwarze Fliegenwanze, *Reduvius personatus*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 493.

n. 64. Tab. XI. Fig. 13. Die Fliegenwanze.

Mülleri Faun. Fridr. p. 28. n. 263.

Naturforscher Stück VI. S. 80.

Raji Hist. Ins. p. 56. n. 3. *Musca cimiciformis teretia, graviter olens*.

Schaefferi Icon. Ins. Ratisb. Tab. XIII. Fig. 6. 7. et Tab. LVII. Fig. 9.

Schrank (F. P. v.) Beyträge zur Naturgesch.

S. 81. Die verummnte Wanze.

Scopoli Entomologia Carniolica, p. 130. n. 375.

Sulzers Geschichte der Ins. S. 94. Die Fliegenwanze. Kennzeichen Tab. XI. Fig. 74.

Stoll's, K. Abbildungen und Beschreibungen der Wanzen, Nürnberg. 1792. 4. S. 22. Tab. V. Fig. 38.

und Fig. A. Die schwarze Fliegenwanze.

Villers entomol. Faun. Suecic. Linn. p. 506.

Mas-

Maskirt heist diese Wanze, weil ihre eigentliche Gestalt in ihrem Nymphenstande (Tab. 13. Fig. 7.) unter einer Decke von feinen Wollhaaren aus den Abgängen der Kleidungsstücke, von feinen Feder- und Strohtheilchen, von Sand und Staub aus den Winkeln der Zimmer und Kammern, wo sie schleichend herumzuirren, Bettwanzen und andere Insekten zu ihrer Nahrung aufzusuchen pflegt, nicht erkannt werden kann, wenn man sie nicht mit einer Feder oder einem Pinsel abstäubt. Alsdann aber findet man, daß sie ausser den noch fehlenden Flügeln und Flügeldecken, den etwas dicken Füßen, dem erst nach der letzten Häutung seine Vollkommenheit erreichenden Insekten ähnlich ist. Sie hat zwey schwarze Augen, vier - bis fünfgliedrichte, lange und dünne Fühlhörner, einen unter dem Kopfe zurückgebogenen Saugrüssel, durch welchen sie wahrscheinlich zugleich ein schnell wirkendes Gift in die Wunde fliessen läßt, weil die Insekten auf ihren Stich augenblicklich sterben, einen kleinen Brustschild und einen langen, eyrunden Hinterleib. Alle diese Theile sind mit einer hornartigen, braunen und glänzenden Haut überzogen.

Der länglichtrunde, ziemlich kleine Kopf des vollkommenen Insekts (Fig. 6.) ist mit dem Brustschilde durch einen ziemlich langen Hals vereinigt, und auf dem Kopfe hinter den Augen, mit zwey kleinen, gelben, glänzenden Ocellen versehen, der Saugstachel kurz, dick und bogenförmig. Der Brustschild besteht aus einem vorderen, schmalen und niedrigen, und aus einem hintern, breitem, und erhabneren Höcker, an welchen sich das kurze, dreyeckigte, in eine sehr feine Spitze sich endigende Rückenschildchen anschliesst. Durch das Reiben des Kopfs und Halses gegen den Brustschild giebt dieses Inseckt einen hellen, durchdringenden Laut von sich. Der mit dem Brustschilde vereinigte Hinterleib ist oben concav, unten convex und läuft am Ende kegelförmig zu. Die durchaus aderlichten Flügeldecken, sind von sehr feiner Substanz, am Ende ovalrund, und die weissen etwas kürzeren Flügel schillern mit Roth, Gelb und Grün. An den Füßen ist das Insekt rauh und seine zwey Hinterfüsse sind ungleich länger, als die vier vorderen. Es hat eine mehr, oder weniger schwarzbraune Farbe, eine Länge von acht bis neun, und am breitesten Theil des Hinterleibes, eine Breite von drey Linien.

Sein Vaterland ist ausser den nördlichen und südlichen Provinzen von Europa, auch Amerika, besonders Pensilvanien. Es erscheint gemeiniglich im Julius, fliegt sehr gut und macht im Fluge ein besonderes Geräusche. Eigentlich gehört es unter die Feldwanzen, fliegt aber nicht selten, vorzüglich Abends bey geöff-

geöffneten Fenstern, in solche Stuben und Kammern wo sich Bettwanzen aufhalten, die es begierig aufsucht und frisst, und macht durch sein Anprellen an die Geräthschaften und Wände, die Nacht hindurch viele Unruhe. Setzt es sich auf den Menschen ab, oder faßt man es unvorsichtig an, so sticht es überaus empfindlich. Dabey hat es einen sehr widerwärtigen Geruch, welchen es lange an den Fingern zurück läßt. Seine Eyer legt es in die Winkel der Stuben und Kammern und kommt aus denselben, als Nymphe in der oben gedachten, seltsamen Gestalt hervor.

15. Die Ringelwanze. Tab. II. Fig. 1.

Cimex annulatus rostro arcuato, antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus sanguineo maculato. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. IV. p. 2198. n. 71. Faun. Suec. 943. — Habitat in Europae corylo.

Amoureux Notice des Ins. p. 270. *la Punaise-mouche à pattes rouges*.

Degeers Abhandl. zur Gesch. der Ins. von Göze. B. III. S. 188. n. 26. *Punaise noire à jambes rouges, die schwarze rothfüssige Wanze*.

Fabricii Mantiss. Ins. II. p. 310. n. 13. Syst. Ent. p. 730. *Reduvius* 5. Spec. Ins. II. p. 379. n. 9. *Reduvius annulatus*.

Füefslins Verz. Schweiz. Ins. S. 26. n. 500.

Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 437. n. 5. *la Punaise mouche à pattes rouges*.

Gözens entomolog. Beytr. B. II. S. 209. n. 71. *Die Ringelwanze*.

Meyers Naturgesch. der giftigen Insekten, Th. I. S. 140. *Reduvius annulatus, die rothe Ringelfliegenwanze*.

Müllers Linnéisches Natursyst. der Ins. B. I. S. 495. n. 71. *Die Ringelwanze*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 106. n. 1209.

Schaefferi Icon. Ins. Ratisb. I. Tab. V. Fig. 9 — 11.

Sulzers abgekürzte Gesch. der Ins. S. 97. Tab. X. Fig. 13. *Die Ringelwanze*.

Stollis Abbildungen und Beschreibungen der Wanzen. S. 45. Tab. XIII. Fig. 89. *Die rothe Ringwanze*.

Beynahe von gleicher Grösse und Gestalt mit der maskirten Wanze ist die *Ringelwanze*. Der Kopf ist klein, länglichtrund, die langen, viergliedrichten, borstenförmigen Fühlhörner sind an der Spitze mit Härchen versehen, der Saugrüssel hakenförmig, sehr stark, viel länger und spitziger, als bey der maskirten Wanze, und ebenfalls unter dem Kopf zurückgebogen, der Hinterleib breit, mit einem scharfen, aufwärts gebogenen Rand eingefalst, Brust, Flügel und Füsse, wie bey der maskirten Wanze. Schwarz und blutroth sind die Farben des Körpers, besonders sind Kopf, Fühlhörner und der vordere Theil des Brustschilds schwarz, die beyden Seiten des Hinterleibes abwechselnd schwarz und roth gestreift. Da auch die Schenkel ringsherum mit solchen Streifen umgeben sind, so hat man ihr deswegen den Namen *Ringelwanze* gegeben.

Sie

Sie ist überhaupt in Europa, vorzüglich in Schweden und Frankreich, seltener in den Niederlanden und in der Schweiz zu Hause. Wie die maskirte Wanze fliegt auch sie oft des Nachts herum, hat einen ähnlichen, ekelhaften Wanzengeruch, sticht aber mit ihrem Saugstachel noch weit empfindlicher.

16. Die giftige Fliegenwanze. Tab. XV. Fig. 7.

Cimex venenatus, antennis quinque articulatis, oculis valde prominentibus, tibiis anterioribus nigro-capillatis. Meyers Naturgeschichte der giftigen Insekten, Th. I.

S. 141. No. 3. — Habitat in America.

Litterary Magazine Tom. VI. ann. 1790. p. 252.

Meyer, D. F. A. A. Versuch zur nähern Bestimmung einiger schädlichen, weniger bekannten Insekten in Voigts Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, B. IX. Stück 2. S. 64.

Nützliche Versuche und Bemerkungen aus dem Reiche der Natur, Nürnberg 1761. S. 211.

Stoll, K. Abbildungen und Beschreibungen der Wanzen, S. 44. Tab. XIII. Fig. 86. *Die giftige Wanze.*

Bey Stoll findet man die Beschreibung einer giftigen Wanze, deren Vaterland Surinam, und welche beynahe einen Zoll lang und über drey Linien breit ist. Der überaus kleine, mit einem stielförmigen Hals mit dem vorne schmalen und runden, hinten breiten und in zwey Ecken auslaufenden Brustschild vereinigte Kopf, hat zwey sehr hervorstehende Augen, zwey lange fünfgliedrige, gelbe Fühlhörner, und hinter den Augen zwey kleine, glänzende Ocellen. An das dreyeckigte Rückenschildchen schliessen sich die häutigen, an ihrer hintern Hälfte hellrothen Flügeldecken an, von welchen die bräunlichgelben Flügel nur zum Theil bedeckt werden. Der lange Hinterleib ist an jeder Seite dunckelgelb. Die beyden Vorderfüsse sind, wie der grösste Theil des Körpers glänzend schwarzbraun, sehr plump und haaricht, die vier Hinterfüsse aber sehr dünne und roth. Dieses Insekt soll sehr heftig stechen, welches auch sein langer gebogener Saugstachel vermuthen läßt, und einen unerträglichen Schmerz verursachen.

Meyer glaubt nun, daß dieses die giftige *Coya* von Südamerika sey. Da aber letztere nicht eigentlich durch den Stich, sondern durch das Gift ihrer ganzen Substanz gefährlich wird, ungleich kleiner und ganz verschieden nach der Farbe ist: so ist wohl nicht zu zweifeln, daß die *Coya* unter die uns noch gänzlich unbekannten, gefährlichen Insekten gehöret. Inzwischen glaube ich, daß das von ihr Bekannte, hier einen schicklichen Platz findet. In dem *Litterary Magazine* und aus diesem übersezt in den *nützlichen Versuchen und Bemerkungen aus dem*

dem Reiche der Natur und in Voigts Magazin liest man nemlich folgendes: „In den Thälern der Provinz Popayan, einem Distrikte in Neugranada, wird ein Insekt gefunden, das in Betracht seiner Kleinheit, wegen des giftigen Safts, den sein Körper enthält, sehr merkwürdig ist. Es wird *Coya* oder *Coyba* genannt, ist feuerroth von Farbe, und nicht viel grösser als eine gemeine Wanze. Gewöhnlich findet man es unter Steinen und auf dem Felde zwischen Gras und andern Kräutern. Wenn dieses Insekt auf der Haut eines Thieres zerdrückt oder zerquetscht wird, so dringt sein giftiger Saft in die Schweisslöcher des Thieres, vermischt sich mit dessen Säften und bringt dann augenblicklich eine fürchterliche Geschwulst hervor, die in kurzer Zeit den Tod zur Folge hat, wenn nicht sogleich dienliche Mittel angewandt werden. Das einzige Mittel dagegen ist, das Stroh oder die dürrn Stengel einer gewissen Pflanze, die in diesen Thälern wächst, anzuzünden und damit den Körper des Kranken, so bald er zu schwellen anfängt, zu sengen, welches die Einwohner dieser Gegend mit grosser Geschicklichkeit verrichten können. Es ist merkwürdig, daß wenn das Insekt in der flachen Hand zerdrückt wird, keine üble Wirkung daraus erfolgt, woraus man schliesst, daß es nur eine geringe Menge giftigen Safts enthalten müsse, weil es von der schwielichten Haut der flachen Hand verschlungen und der Eingang ins Blut dadurch verhindert wird. Die eingebohrnen Fuhrleute, die durch diese Gegend reisen, zerdrücken sie oft in ihren Händen, um die Neugierde der Reisenden zu vergnügen. Doch ist kein Zweifel, daß wenn die *Coya* in der Hand einer zärtlichen Person zerquetscht würde, sich eben die Wirkung zeigen müßte, als wenn man sie auf andern Stellen des Körpers zerdrückte. Diejenigen, welche durch diese Thäler reisen, müssen, wenn sie im Gesicht oder im Nacken von einem Insekte gestochen werden, die Stelle nicht berühren, oder reiben, weil der geringste Druck die *Coya* zerquetscht, diese aber unschädlich ist, wenn sie nicht zerdrückt wird. Vielmehr lassen sie die Eingebohrnen, welche sie begleiten, an der Stelle, wo sie den Stich bemerken, nachsehen. Nehmen diese nun daselbst eine *Coya* wahr, so blasen sie dieselbe weg, ohne sie anzurühren, wodurch denn die Reisenden von der Gefahr befreit werden. Der Instinkt leitet das Hornvieh, das in diesen Thälern weidet, beynahe die nemliche Vorsicht zu gebrauchen. Es bläst nemlich allezeit erst sehr stark auf die Kräuter, von welchen es fressen will. Nichts desto weniger trägt es sich bisweilen zu, daß die Maulthiere oft eine *Coya* mit fressen, wovon sie allezeit gleich aufschwellen und alsbald darauf sterben.“

Raupen oder Schmetterlingslarven überhaupt.

- | | |
|---|---|
| <p>Amstein in Fuesly's neuen Magazin, B. I. S. 46.</p> <p>Buchner Misc. med. phys. 1730. p. 1200.</p> <p>Degeer's Abh. zur Gesch. d. Ins. von Göze, B. I. Quartel 1. S. 131.</p> <p>Frankfurter medicinisches Wochenblatt vom Jahr 1781. Stück XXXI. S. 492. Anfrage wegen des Gifts einiger Raupen.</p> <p>Fuesly's neues Magazin, B. I. S. 188.</p> <p>Geoffroy Histoire des Insectes de la France, Tom. II. p. 96.</p> | <p>Heise Diss. de Insect. nox. effect. Hall. 1757.</p> <p>Lorry de morbis cutaneis, p. 513.</p> <p>Meyers Naturgesch. der giftigen Insekten, S. 143.</p> <p>Reaumur Mem. des Ins. Tom. II. Part. I. Mem. 4.</p> <p>Seereisen im Südmeer, Th. III. S. 112. und aus diesen in den berlinischen Sammlungen, Band VIII. S. 570.</p> <p>Sulzers abgekürzte Geschichte der Ins. S. 153.</p> <p>Wagner in den fränkischen Sammlungen, B. II. S. 122.</p> |
|---|---|

Unter *Raupen*, (griechisch κάμψη, lateinisch *Eruca*, holländisch *Rups*, englisch *Cater - Pillars* und *Canker - Worms*, französisch *Chenille*, italiänisch *Ruga* und *Bruchio*, spanisch *Oruga*) versteht man diejenigen schmalen und langen, wurmförmigen Thiere, deren Leib aus lauter Ringen zusammengesetzt, mit einem mehr oder weniger ausgezeichneten Kopf- und Schwanzende und allermeist mit sechzehn Füßen versehen ist, welche aus den Schmetterlingseiern hervorkommen, und nach der Verpuppung wieder zu Schmetterlingen werden. Sie waren von jeher wegen einer gewissen Giftigkeit im Verdacht, wozu vorzüglich mit das abschreckende Aussehen der haarichten Arten, Veranlassung gegeben hat, die auch deswegen in verschiedenen Gegenden, vorzüglich in der Schweiz, den Namen *Teufelskatzen* erhalten haben. In wieferne diese wirklich nachtheilig werden können, haben vorzüglich *Amstein*, *Buchner*, *Fuesly*, *Heise*, *Sulzer*, und *Wagner* durch eine Menge Erfahrungen dargethan, aus welchen erhellet, daß sie, wie verschiedene Nesselarten, mehr mechanisch, als physisch unsrem Körper schaden. Sie veranlassen nemlich zum Theil, wenn sie angefaßt werden, durch ihre feinen, steifen, in die Haut eindringenden und oft darinnen brechenden Filzhaare, die sie leicht fahren lassen, bey den langhaarichten Bärenraupen oft unter den langen Haaren stehen und nur mit Beyhülfe eines Vergrößerungsglases entdeckt werden können, ein unleidliches Jucken und Brennen in der Haut und nicht selten gar ein Auffahren kleiner Pusteln mit entzündlicher Röthe und Geschwulst. Untersucht man mit bewaffnetem Auge die aufgelaufenen und schmerzhaften Stellen der Haut, so entdeckt man die Enden der eingedrungenen Haare, als kleine schwarze Punkte. Ähnliches Jucken und nesselartiges Brennen etc. entsteht, wenn man mit den verletzten Händen ins Gesicht fährt, oder sonst eine Stelle des Körpers berührt. Wahrscheinlich kommt dieses von den Härchen her, welche, ausser den in die Haut der Hände eingedrungenen, bloß auf derselben liegen geblieben

ben und, durch die Berührung anderer Theile, erst in eine solche Lage gebracht worden sind, daß sie in die berührten Stellen der Haut ebenfalls eindringen konnten. Es ist leicht einzusehen, daß Brennen, Geschwulst und Röthe immer ärger werden müssen, je mehr man sich durch das Reiben der verletzten Stellen Linderung zu schaffen sucht; denn eben hierdurch wird das tiefere Eindringen der Härchen in die Haut und ihre stärkere Verbreitung auf derselben befördert. Da die Raupen hauptsächlich zu der Zeit ihre Haare fahren lassen, wo sie sich häuten wollen; so hat man sich dann besonders in Acht zu nehmen, sie mit bloßen Händen zu berühren. Manche Arten schleudern in der Häutungsperiode, bey den verschiedenen Bewegungen ihres Körpers, ganze Flocken der feinsten Härchen in die Luft, die, vermöge ihrer Leichtigkeit, in derselben zerstreut werden, und daher, auch in einiger Entfernung von den Raupen, sich auf die Haut des Menschen absetzen und dann ähnliche Zufälle, wie von ihrer unmittelbaren Berührung, veranlassen. Dieses erfolgt sogar öfters in der Nähe haarichter Raupennester, besonders, wenn sie schon alt und von den ausgekrochenen Schmetterlingen verlassen sind. Die Haare solcher Nester sind überaus spröde und brüchig, fliegen auf die geringste Berührung in den feinsten Stückchen in die Luft und fallen leicht auf die entblößten Stellen der Haut. *Reaumur* machte diese Erfahrung mehr als einmal an seinem Körper und setzte, ohne böse Absicht, die zarte Haut der ihn besuchenden und seinen naturhistorischen Beobachtungen beywohnenden Damen, gleichen Verletzungen aus. Diese Damen bekamen einen Ausschlag um den Hals, und hätten sich, ohne *Reaumurs* Erklärung, gewiß für vergiftet gehalten. Er selbst fühlte oft ein Brennen in den Augen und Nasenlöchern, mußte oft niesen, wenn er seine Raupen und Puppen in Bewegung setzte, wovon er ganze Magazine beysammen hatte. Auch *Lorry* erzählt, daß bey einem Frauenzimmer von sehr zarter Haut, dem eine Raupe auf den Hals gefallen war, nicht nur dieser, sondern auch das Gesicht aufstieg und die Spuren der Raupe sich durch erysipelätöse Röthe und wässrichte Blätterchen auszeichneten. Diese Erscheinungen sind bloß durch eine eigene Reizbarkeit der Haut zu erklären, welche sich vielleicht mit den Jahren verliert, vorzüglich aber mehr oder weniger von dem dichten Hautgewebe abhängt. Denn es giebt Personen, welche ohne Unterschied alle Arten von Bären- und filzhaarichten Raupen mit bloßen Händen anfassen können, und nicht die geringste Beschwerlichkeit darauf empfinden. Doch kann man seine feine und reizbare Haut, gegen das Eindringen der Raupenhaare bey der unmittelbaren Berührung, sehr leicht durch das Bestreichen der Hände mit Öl sichern,

gegen

gegen das Jucken und Brennen nach schon eingedrungenen Haaren aber, frisches oder goulardisches Wasser anwenden. Sollten Raupen dieser Art verschluckt worden seyn, worauf Entzündung des Magens und Darmkanals, ja Convulsionen erfolgen können; so ist es nicht rathsam, sie wieder durch Brechmittel aus dem Magen zu schaffen, wodurch die Haare nur in den Schlund zurückgetrieben und die Zufälle vermehrt werden könnten, sondern vorerst einwickelnde, ölichte, schleimichte, krampflindernde Mittel durch Mund und After bezubringen und dann erst ein Purgiermittel anzuwenden.

Ungleich seltner sind die Beyspiele, wo unbehaarte, glatte Raupen einen besonderen Einfluß auf die Haut äussern. Im frankfurtischen medicinischen Wochenblatte kommt jedoch ein solcher Fall vor, den ich hier wörtlich, auch der äusserlichen Behandlung wegen, anführe. „Vor kurzem schickte man einen Knaben zu mir, der von der untern Lippe bis unter das Kinn hin, wie auch an der linken Seite des Gesichts längs der Nase herunter und am obern Theile des Backens, grosse, ein wenig entzündete, blasigt aufgeschwollene Flecken hatte, wie wenn er mit heissem Wasser gebrannt worden wäre. Er klagte über heftiges Brennen, und sagte, daß diese Blasen über Nacht von selbst gekommen wären, und daß er keine Ursache wüßte, wenn er nicht etwan sein Gesicht mit seinen Händen unreinigt hätte, mit denen er am Abende einige Gattungen glatter, unbehaarter Raupen, die er in Schachteln ernährte, berührt, aufgehoben und von einem Ort zum andern getragen hätte. Ich verordnete Kalchwasser mit dem achten Theil Kampfergeist vermischt, aufzulegen. Dieses benam auch das Brennen, aber den folgenden Tag waren die blasigten aufgeschwollenen Stellen, in denen hin und wieder helles Wasser war, grösser. Ich öffnete sie, wo sichs thun liess, und befahl alles mit einem Sälbgen öfters zu bestreichen, das aus einem ganzen Ey mit zwey Löffeln voll gutem Olivenöhl gemischt, bereitet wurde. Die davon entstehende Rinde mußte sitzen bleiben. Nach 24 Stunden konnte man diese samt dem Oberhäutchen, ablösen und der Schaden war geheilt.“ *Fuefsly* erzehlt, daß ihm etwas ähnliches in einem Alter von 11 Jahren begegnet sey, wo er eine Schachtel mit Raupen von der *Phalaena Chrysorrhoea* und *Caculeocephalea* Linn. begierig öffnete, die Raupen betrachtete, die herauskriechenden wieder in die Schachtel zurückschob etc. Kaum hatte er dieses Spiel eine halbe Viertelstunde getrieben, so spürte er im Gesichte, am Halse und auf der Brust ein heftiges Jucken und Brennen und zusehends entstanden rothe Blasen. Am Morgen hatte sich das Jucken sehr vermindert und die Blasen hatten sich gesetzt, und nach ein

Paar Tagen war alles, ohne etwas dagegen gebraucht zu haben, gänzlich verschwunden. Es begegnete ihm dieses nachher öfters, wenn er seine Raupen aller Arten behandelte, doch verminderte sich diese Wirkung mit zunehmenden Jahren so sehr, daß er, da ihm vorher auch die glatten Raupen schädlich waren, nur noch die Filzhaarichten zu fürchten hatte.

Verschiedene Raupen sind auch mit sehr starken und schneidenden Gebißwerkzeugen versehen, womit sie empfindlich beissen, noch andere verletzen durch einen scharfen brennenden Saft, den sie, sobald sie gereizt werden, von sich sprützen, noch andere verbreiten einen ekelhaften Geruch. Alle diese, nur in einem grossen Theil von Europa bekannten Raupenarten, hier einzeln zu schildern, würde weit die Grenzen dieses Werkchens überschreiten. Vorzüglich giebt es von den schädlichen haarichten Raupen, wovon ich nur diejenigen beschrieben und abgebildet habe, deren nachtheilige Wirkung auf die Haut, ich aus eigener Erfahrung kennen gelernt habe, noch eine grosse Menge z. B. die Larve der *Phal. Bomb. Rubi*, *Plantaginis*, der *Phal. noct. Matronula*, *Villica*, *Purpurea*, *Hera* etc. welche mehr oder weniger schädlich sind, und wie viele dieser Art mögen nicht erst in anderen Welttheilen vorkommen? Ich begnüge mich hiervon nur noch ein Beyspiel aus den *Seereisen im Südmeere* anzuführen. „Auf der Dreyeinigkeits - Bay trafen die Reisenden, *D. Banks* und *Solander* an Morästen und Sümpfen in diesen Gegenden, den in Westindien bekannten, ächten Mangrovebaum (*Rhizophora Mangle* L.) zum erstenmale an. Auf den Zweigen und Blättern desselben sahen sie eine grosse Menge kleiner, grüner Raupen. Der Leib war sehr haaricht und sie sassen zu zwanzig und dreysigen auf den Blättern, eine neben der andern, so regelmässig und gerade, wie eine Reihe Soldaten nur immer stehen kann. Bey dem Berühren empfanden sie, daß das Haar auf ihren Leibern wie Brennesseln stach, ja einen noch weit durchdringendern, aber nicht so lange anhaltenden Schmerz verursachte.“ Man sieht hieraus, daß die Haare der Raupen in Südamerika eben die Eigenschaft, wie bey uns haben.

17. Die Wolfsmilchraupe. Tab. XII. Fig. 1.

Larva Sphingis euphorbiae, caudata, nigra, albo-punctata: linea dorsali sanguinea, laterali punctisq. flavicantibus. *Pupa* brunnea, stigmatibus nigris. *Sphinx* alis griseis, fasciis duabus virescentibus, posterioribus rufis, basi strigae nigris, antennis niveis.

Linn. Syst. N. T. I. P. V. p. 2383. n. 19. Faun. Suec. 1086. —

Habitat in Europae euphorbiis.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 353. Die Wolfsmilchraupe.

Borckhausen's europ. Schmetterl. Th. II. S. 139.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 592. n. 1. *le Sphinx du Tithymale*.

Drury Abbild. und Beschreibungen exotischer Ins. T. I. Tab. XXIX. Fig. 3.

Espers europ. Schmetterlinge, Th. II. S. 100. Tab. XI. Fig. 3. *Wolfsmilchraupe*.

Fabricii Mant. ins. II. p. 95. n. 30. Spec. Ins. T. II. p. 146. n. 32. Syst. Ent. p. 541. n. 17. *Sphinx Euphorbiae*.

Frisch's Ins. Teutschl. Th. II. T. XI. *Wolfsmilchraupe*.

Fuefslly's altes Magaz. d. Entomologie, B. I. S. 226. Verzeichn. Schweiz Ins. n. 620. *Sph. Euphorb.*

Geoffroy Hist. des Ins. de Paris. T. II. p. 87. n. 11. *le Sphinx du Tithymale*.

Ledermüller's Gemüths- und Augenergötz. Drittes Funftz. S. 48. Tab. XXVI — XXIX.

Merian Europ. Ins. 123.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 641. n. 19. *Wolfsmilchraupe*.

Museum Lud. Ulr. 356.

Onomatol. Hist. nat. P. VII. p. 241.

Panzer Faun. Ins. Germ. Heft XIII. *Der Wolfsmilchschwärmer, der Wolfsmilchvogel, de Wolfsmilch Pykstaart, de bonte Olifant-Flinder onrust*.

Reaumur Memoires Tom. I. P. I. Tab. XIII. Fig. 4 — 7.

Rösels Insektenbelustigung, Th. I. Nachtrög. Cl. I. Tab. III. Fig. 1. 2. S. 17. *Wolfsmilchraupe*.

Schaefferi Icon. Ins. Ratisb. Tab. 78. Fig. 1. 2. und Tab. 99. Fig. 3. 4.

Scopoli Entomologia Carniolica, p. 186. ic. 471. *Sph. Euphorbiae*.

Seba Thesaur. T. IV. Tab. 53. F. L. M. Tab. 60. Fig. 17. 18.

Sinap. Bresl. Nat. Gesch. 1721. Aug. Cl. IV. Art. 5.

Spielmanni Diss. de Animal. noc. Alsat. p. 52. Sulzers Geschichte der Ins. S. 114. Vignette.

Syst. Verz. d. Wien. Schmetterl. S. 42. n. 2. *Wolfsmilchschwärmer*.

Uddmanni Diss. 57.

Wagner in den fränkischen Sammlungen, B. II. S. 116.

Auf den beyden Wolfsmilcharten, der Wolfs- oder Teufelsmilch und der Cypresseneuphorbie (*Euphorbia Esula* und *Cyparissias L.*) findet man in den Sommermonathen eine Raupe, welche sich sowohl durch ihre ansehnliche Grösse, als durch die Schönheit ihrer Zeichnung und Farben auszeichnet und *Wolfsmilchraupe* genannt wird. Sie ist oft drey bis vier Zoll lang und einen Zoll breit, nimmt vom Kopf aus bis zum sechsten Ring allmählich an Dicke zu, bleibt dann in ihren fünf übrigen Ringen gleich stark und führt an der Rückenseite ihres letzten Rings eine horn- oder schwanzartige Spitze. In ihrer ersten Jugend ist sie blos grün und gelb von Farbe, nach mehreren Häutungen und hiermit erreichter vollkommenen Grösse aber, gewinnt sie an Schönheit und Mannigfaltigkeit der Farbenmischung. Die Grundfarbe ihrer glatten und glänzenden Haut ist schwarzgrün und mit lauter erhabenen, lichtgelben Pünktchen besäet, der Kopf an seiner

Vor

Vorderfläche roth und mit zwey runden, schwarzen Flecken versehen, welche man für Augen zu halten geneigt ist. Von der Mitte desselben an läuft längs der Mitte des Rückens bis zur Schwanzspitze ein carmesinrother Streif. Von gleicher Farbe sind die sechs hakenförmigen Vorder- die acht stumpfen Mittelfüsse, die zwey Nachschieber und die Hälfte des Schwanzhorns, welches sich mit einer schwarzen Spitze endiget. Zu beyden Seiten des Körpers sieht man, vom ersten Ringe an, eine Reihe lichtgelber Augen mit zwey darunter stehenden, zusammenfließenden milchweissen Punkten, auf schwarzem Grunde. Unter diesen Reihen von Augen folgt über den Füßen noch eine Reihe irregulärer, gelber, hellroth gefleckter Streife auf jeder Seite, die Bauchfläche aber ist roth und schwarz punktirt.

Im Herbste schickt sich diese Raupe zu ihrer Verwandlung an und verkriecht sich unter die Erde, wo sie nach einigen Tagen den Raupenbalg ablegt und nun als eine braungelbe, beynahe zwey Zoll lange und, wie die Raupe, mit einem Schwänzchen versehene Puppe zu finden ist. Sie überwintert so, und erst im Junius, bisweilen gar erst im zweyten Jahre, verläßt der Schmetterling die Puppenhülse.

Dieser ist nicht minder schön, als seine Larve. Die Rückenfläche des Kopfs und Bruststücks und alle weiß eingefassten Ringe des spitzig zulaufenden Hinterleibes, sind olivenfarb. Seine Vorderflügel haben an der Wurzel und gegen die Mitte drey Flecke, und eine schief laufende gezackte, dreyeckigte Binde auf einem fleischfarbnen Grunde, seine Hinterflügel aber ein rothes, mit zwey schwarz-blauen Binden durchzogenes Feld. Das sich durch seine Grösse und seinen dicken Hinterleib auszeichnende Weibchen legt seine Eyer in den Monathen Junius an die Wolfsmilch, und aus diesen kommen nach vierzehn Tagen die jungen Räupchen zum Vorschein, welche nach vier bis fünf Wochen ihr Wachsthum vollendet haben. Diese nähren sich von einer Pflanze, welche wegen des milchähnlichen, klebrichten Safts sehr bekannt ist, der aus ihren abgebrochenen Stengeln hervordringt, sehr bekannt ist, und eine so äzende Schärfe bey sich führt, daß er die Stellen der Haut, worauf er gebracht wird, angreift und daher zur Vertilgung der Mähler und Warzen gebraucht wird. Im Mund veranlaßt schon ein einziger Tropfen dieses Safts ein unleidliches Brönnen und wenn er vollends in stärkerer Quantität in den Magen und Darmkanal gelangt, so wirkt er wie ein drastisches Purgirmittel und ist im Stande, Entzündung zu verursachen. Kein Wunder ist es, wenn die von dem scharfen Saft der *Esula* ganz durchdrungene Raupe,

pe, ähnliche nachtheilige Wirkungen äussert. Wirklich ist nach *Sinap*, das Vieh auf der Weide an den verschluckten Raupen plötzlich gestorben. Auch bestätigt die Erfahrung, daß sie zu ihrer Vertheidigung einen grünen, scharfen Saft aus dem Maule spritzen, der so schwer, wie Dinte, wieder von den Händen und Fingern zu bringen ist, Jucken und Brennen der Haut veranlaßt, und wenn die verletzte Stelle nur etwas gekrazt wird, bald Entzündung nach sich zieht.

18. Die grosse Kühn- oder Fichtenraupe. Tab. XII. Fig. 2.

Larva Bombycis Pini, subcaudata, albo, griseo fuscoque varia: collaribus caeruleis, punctis utrinque rufis. *Pupa fusca. Phalaena* alis griseis: fascia ferruginea punctoque triangulari albo. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. V. p. 2410. n. 24. Faun. Suec. 1104. — Habitat in Europae pino.

Amoureux Notice p. 157 und 280. *Chenilles du pin.*

Amsteins Gesch. des Fichtenspinners in Fuesl. Ent. Mag. B. II. S. 234. und neues Mag. B. I. S. 44.

Bechsteins, J. M. Musterung schädlich geachteter Thiere, S. 172. Fig. 5. *Kiefernspinner.*

Beckmann. Epitom. S. L. p. 163. n. 24. *Ph. Pini.*

Berliner Magazin, B. II. S. 398. n. 5. *Fichtenmotte.*

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 356. *Der Fichtenspinner.*

Bonnet Observ. sur les Insectes et Tome premier de ses Oeuvres in 4. p. 305. *Chenille du Pin.*

Borkhausens Naturgesch. der europ. Schmetterl. Th. III. S. 78.

Espers Schmetterlinge, Th. III. S. 78. Tab. XII. Fig. 1 — 6. Tab. XIII. Fig. 1.

Fabricii Mant. ins. II. p. 113. n. 56. Spec. Ins. II. p. 117. n. 48. Syst. Ent. p. 565. n. 32.

Frisch Ins. Th. X. S. 13. T. X. *Die Kienbaumraupe.*

Fueslys Verz. Schweiz. Ins. S. 34. n. 641. *Fichteneule.*

Glabachs Verzeichniss, *die Tannengluck.*

Gleditsch Einleitung in die deutsche Forstwirtschaft, B. I. S. 399. *Die Fichten- und Tannenmotte.* Desselben vier hinterlassene Abhandl. das praktische Forstwesen betreffend, Abh. II. S. 68.

Göze entomol. Beytr. Th. III. B. II. S. 290. n. 24. *Der Fichtenspinner.* Geschichte einiger dem

Menschen etc. schädlichen Insekten, p. V. *Die grosse Kühn- und Fichtenraupe.*

Journal für das Forst- und Jagdwesen, B. IV. H. I. S. 78.

Jungs Verzeichniss europ. Schmetterlinge, S. 100. n. 769.

Merianni Europ. Ins. Tab. XXII.

Müllers Linn. N. S. d. Ins. B. I. S. 657. n. 24. *Der Fichtenoanderer.*

Naturforscher Stück II. S. 19. *Ph. Pini.*

Nau's Anleitung zur deutschen Forstwissenschaft, S. 298.

Onomat. Hist. nat. P. VI. p. 397: *Die grosse Waldraupe.*

Oekonomische Nachrichten der patriotischen Gesellschaft in Schlesien, Th. VI. S. 404.

Poda Ins. 84. n. 5.

Rösels Insektenbel. Th. I. Nachtvög. 2. Klass. S. 297. Tab. LIX. Fig. 1. *Die grosse Kien- oder Waldraupe.*

Schaeffer Icon. Ins. Ratisb. Tab. 86. Fig. 1—3.

Schwarz's Raupenkalender, S. 72.

Syst. Verz. der Schmetterl. Wiener Gegend, S. 56. Fam. J. n. 4. *Föhrenspinner.*

Tabellarisches Verzeichn. Brandenburger Schmetterlinge, Heft I. S. 37. n. 7.

Uddmanni, Diss. 60. *Pithyocampus.*

Uslar's, (J. v.) *Pyrallis Hercyniana.* S. 17. n. 1. *Der Kiefern- oder Föhrenspinner.*

Wilkes Papil. 29. Tab. III. b. 5.

Der ockerbraune Kopf dieser im ausgewachsenem Zustande vier Zoll langen und fünf bis sechs Linien breiten Raupe, ist ziemlich groß und rund, mit starken

ken Gebißwerkzeugen versehen, und mit einem weiß eingefalsten Dreyeck über dem Mund bezeichnet. Sie nimmt von vorne nach hinten in ihren elf Ringen allmählich an Dicke zu, und hat sechs Vorderfüsse, acht Mittelfüsse und zwey Nachschieber. Jeder Ring hat, ausser den Gelenkeinschnitten, noch besondere einförmige Furchen, der erste Ring gleich hinter dem Kopfe zwey Warzen mit starken, nach vorne gekehrten Haarbüscheln, der fünfte, sechste und siebente in der Mitte ein Paar kleine, mit schwarzen Haarbüscheln besetzte Erhabenheiten und der vorlezte Ring eine ähnliche, mit einem grösseren schwarzen Haarbüscheln versehene Warze. Überhaupt ist die ganze Raupe rau, von den grösseren und kleineren Filzhaaren, welche auf einem weissgrauen, braun und grau punktirten Boden stehen und hat sowohl längs des Rückens grosse, irreguläre, als an den Seiten des Leibes lange und schmale braune Flecken. Der zweyte und dritte Ring zeichnen sich noch besonders durch eine schwarze, glänzende, ins Blaue spielende Binde und unter derselben auf jeder Seite durch einen rosenfarbichten Fleck aus. Die krallenförmigen Vorderfüsse sind dunkel- die Mittelfüsse und Nachschieber licht- braun.

Man findet diese Raupe beynahe in allen Gegenden unseres Welttheils, zu jeder Jahreszeit auf der Fohre, ihrer gewöhnlichen Futterpflanze, in Ermangelung derselben aber, auch auf anderen Nadelholzarten und selbst im Winter in den Ritzen und Höhlungen der Bäume. Die ausgewachsenen Raupen dieser Art verpuppen sich im Julius und August in einem länglichrunden Gespinste, welches vorne und hinten offen zu seyn scheint, und unter den Ästen oder zwischen der aufgesprungenen Rinde der Fohre befestiget ist. Der Vordertheil der länglich-runden Puppe selbst ist dunkel aschgrau, der Hintertheil rothbraun. Nach drey bis vier Wochen kommt schon der Schmetterling aus derselben hervor, der von sehr verschiedener, und beynahe nie beständiger Zeichnung gefunden wird. Bald hat er braune, bald aschgraue, mehr oder weniger breite, mehr oder weniger gezackte Binden auf den grauen, oder braunen, immer mit einem dreyeckigten weissen Punkte bezeichneten Oberflügeln. Die Farbe der Unterflügel und des ganzen Körpers aber ist immer matt braunroth. Der weibliche Schmetterling legt gewöhnlich schon im August seine gelbbraunen Eyer auf die Föhrenbäume, und aus diesen kriechen nach acht bis zehn Tagen die jungen Räupchen aus, die im Herbste noch so lange wachsen, als es die Wärme der Jahrszeit gestattet, den Winter hindurch aber sich verbergen und erst im Sommer des künftigen Jahres ihre vollkommene Grösse erhalten.

Wenn

Wenn sie berührt werden, so schlagen sie mit Kopf und Leib gleich zu beyden Seiten um sich und verscheuchen hierdurch ihre Verfolger. Sonst aber werden sie jedem, durch ihre feinen, in die Haut dringenden und starkes Jucken und Entzündung veranlassenden Filzhaare schädlich. *Bonnet* versichert sogar, daß er auf die Berührung dieser Fichtenraupe eine Art von Erstarrung der Finger, hernach Jucken und sehr starkes Brennen bekommen habe, worauf Geschwulst erfolgt sey. Wird sie verschluckt, so äussert sie nach *Grevin*, den *Amoureux* anführt, eine solche giftige Beschaffenheit, daß davon Zunge, Mund und Eingeweide entzündet werden.

19. Die Klee- oder Quittenraupe. Tab. XII. Fig. 3.

Larva Phalaenae Bombycis Trifolii, solitaria pilosa dilute fusca, incisuris caerulescenti-punctatis, collari rubro. *Pupa* antierius flava, posterius brunnea. *Phalaena* alis ferrugineis, primoribus striga punctoque albis, posterioribus immaculatis. Linn. S. N. E. G. XIII. T. I. P. V. p. 2411. n. 496. — Habitat in Germaniae Trifolio.

Espers europäische Schmetterl. Th. III. S. 87.
Tab. XV. *Der Kleespinner*.
Fabricij Mantiss. Ins. II. p. 112. n. 46.
Jung's Verz. europ. Schmetterl. S. 147.
Maders Raupenkalender, S. 15. N. 17. *Ph. Du-*
meti.

Rösel's Insektenbel. Th. I. Nachtvög. Klass. II.
S. 201. *Die kleinere und schlankere, braungelbe, filz-*
haarige Quittenraupe. Tab. XXXV. b. Fig. 1. Tab.
XXXV. a. Fig. 2 — 5. *Die Grasmotte nach Kleemann*.
Syst. Verz. der Schmetterl. der Wiener Gegend. S.
57. n. 4. Fam. K. *Bomb. Trifolii*, *Wiesenkleespinner*.

Im Monat May findet man auf den Wiesen eine filzhaarichte, gelbe Raupe von der Grösse eines halben Zolls, welche sich vorzüglich vom Klee und Quittenblättern nährt und daher ihren Namen erhalten hat. Sie legt verschiedenemal ihren Balg ab, bis sie zu Ende des Junius und Anfang des Julius ihre vollkommene Grösse erreicht, und nun oft über drey Zoll lang und vier Linien breit gefunden wird. Der Kopf hat auf jeder Seite einen länglich-runden orangefarbenen Fleck auf schwarzen Boden, um welchen sich von hinten eine schmale weisse Einfassung herumzieht, die sich vorne in der Mitte des Kopfs theilt und dann gabelförmig gespalten, gegen die Gebißwerkzeuge herabläuft. Hinter dem Kopfe sieht man, am Vorderrand des ersten Rings, ebenfalls einen orangefarbenen Streif und zu beyden Seiten eine graue, warzenförmige Hervorragung. Alle übrigen Ringe haben auf der Rückenfläche eine glänzend ockergelbe, an den Seiten eine mehr braune Farbe, in den Einschnitten zwischen den Ringen sammetartige schwarze, lichtblau gefleckte, schmale Binden, und über den Füßen an jeder

Seite eines Rings, schmale, bläsgelbe Längsstreifen. Vor der Verpuppung macht diese Raupe um sich ein eyrundes, dichtes, haarichtes Gespinnst von dunkelbrauner Farbe, in welchem man sie nach einigen Tagen verwandelt in eine am Vordertheile bräunliche, am Hintertheile grünliche, kurze und dicke Puppe, antrifft. Die Phaläne bedarf zu ihrer Ausbildung in der Puppenschale nur drey Wochen und erscheint dann in röthlichbrauner Farbe, und in Rücksicht des Geschlechtsunterschieds in einem sonderbaren Verhältnisse. Das Weibchen ist nemlich bey nahe drey mal so groß, als das Männchen, hat übrigens schmale, fadenförmige Fühlhörner und einen sehr dicken Hinterleib, da letzteres mit sehr breiten, starkgefiederten Fühlhörnern und einen schmalen, am Ende etwas gespaltenen Hinterleib versehen ist. Beyde haben in der Mitte jedes Vorderflügels einen eckigten, dunkelbraunen eingefassten Punkt, und sowohl auf den Vorder- als auf den Hinterflügeln eine schmale, lichtgelbere, ausgeschweifte Binde.

Bey nahe noch leichter und in noch grösserer Menge, als von der grossen Fichtenraupe, dringen, die kurzen, brüchigen Filzhaare dieser Raupenart und ihres rauhen, von dem eingewebten steifen Haaren, bey nahe stachlichten Puppengehäuses, in unsre Haut ein, woran sie bey der geringsten Berührung kleben bleiben, und dann ein unleidliches Jucken und Brennen verursachen, welches selbst durch das Waschen mit Seifenwasser nicht gemindert werden kann.

20. Die Eichenraupe. Tab. XII. Fig. 4.

Larva Phalaenae Bombycis Quercus, pilosa grisea nigra annulata alboque maculata. *Pupa* dense folliculata, viridis, antierius fusca. *Phalaena* alis ferrugineis, strige flava, primoribus puncto albo. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2411. n. 25. Faun. Suec. 1106 —

Habitat in erica, pruno spinosa, betula, salice, quercu; femina pallidior.

Admiral Naawk. Waarn. p. 31. Tab. XXXI. de Jaager-rups.

Albin, a natural history of English Insects. Tab. XVIII. Fig. 25.

Beckmann. Epit. S. N. p. 163. n. 25. Ph. Quercus.

Berlinisches Magazin, B. II. S. 398. n. 4. Die Grasmotte.

Espers europ. Schmetterl. Th. III. S. 81. Der Eichenspinner. Quittenvogel.

Fabricii Mant. ins. II. p. 112. n. 47. Syst. Ent. p. 562. n. 24. Spec. ins. II. p. 175. n. 39. Bomb. Quercus.

Fuefsly's altes Magaz. d. Entomologie, S. 271. Schweizer. Ins. S. 34. n. 643. Der Heckenkriecher.

Geoffroy Histoire des Insectes de Par. Tom. II. p. 111. n. 13. La minime a bande.

Gleditsch Forstwissensch. Th. I. S. 548. n. 6. Ph. Quercus.

Goedart historische Beschryving van den oorspronk etc. der Wurmen, Rupsen etc. I. Tab. VII.

Göze entomol. Beytr. Th. III. B. II. S. 292. n. 25. Der Eichenspinner.

Jung's Verz. europ. Schmetterl. S. 121.

Kleemanns Raupenkalender S. 14.

Lister Johannes Goedartus de Ins. in methodum redactus, p. 203. n. 88. Fig. 88. *la piquante*.
 Merian in Europ. Ins. I. Tab. X.
 Mouffetti Theatr. Ins. 187. Fig. 2.
 Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 658. n. 25. *Der Eichensteiger*.
 Müller Faun. Fridr. p. 39. n. 353. Zool. Dan. Prodr. p. 117. n. 1353.
 Naturforscher Stück VIII. S. 102. n. 6. *Ph. Quercus*. St. XIII. S. 230. §. 9.
 Onomat. hist. nat. Pars. VI. p. 408. *Ph. Quercus*.
 Petiveri Gazophylacii Naturae et Artis decades decem, T. 45. Fig. 5. *Semicolon*.
 Poda Mus. graec. 85. n. 6.
 Raji Hist. Ins. p. 242. n. 2. *Ph. maxima fulva*.

Reaumur Mem. des Ins. Tom. I. p. 519. 529. Tab. 35. Fig. 7. 8.
 Rösels Insektenbel. Th. I. Nachtvög. Klass. 2. S. 193. *Die grosse, filzhaarige, gelbbraune Schlehen- und Quittenraupe*. Tab. XXXV. a. Fig. 1. und Tab. XXXV. b. Fig. 2 — 7. *Der Heckenkriecher*, nach Klee-
 mann.
 Schaefferi Icon. Ins. Tab. 82. Fig. 1 — 3.
 Scopoli Ent. carneol. p. 194. n. 487. *Ph. Quercus*.
 Syst. Verz. Wien. Schmetterl. S. 56. n. 3. *Eichen-
 chenspinner*.
 Uddmann Diss. 59.
 Wilkes Engl. Mots. and Butt etc. p. 22. Tab. III. a. Fig. 11. 12.

Fast einerley Eigenschaften, sowohl in Rücksicht der eben gedachten nachtheiligen Beschaffenheit der Haare, als der verschiedenen Verwandlungsgestalten vom Eye bis zum Schmetterling, hat gegenwärtige Raupe mit der Raupe der *Pha-laena Trifolii*. Daher kam auch Rösels Verwechslung der beyderseitigen Puppen und Schmetterlinge. Erst im Spätherbste kriecht sie aus dem länglichrunden, blaß-braunem Eye, welches das Schmetterlingsweibchen vierzehn Tage vorher gelegt hat. Sie erreicht kaum noch die Länge eines halben Zolls, wenn sie von Kälte und Futtermangel genöthiget wird, sich unter dem abgefallenen Laub der Hecken zu verbergen, und die Ankunft des Frühlings zu erwarten, wo sie die wärmere Luft und das junge Futter aus ihren Schlupfwinkeln hervorlockt. Sie vollendet nun nach einigen Häutungen schon zu Ende des Mays ihr Wachsthum und erreicht hiermit eine Länge von zwey bis drey Zoll. Ihr Kopf, so wie der Vorderrand des Halsrings, sind dann rothgelb, die Filzhaare des übrigen Körpers hell-ockergelb, die beyden Seiten des Leibes über den rothbraunen Füßen mit einem irregulären weissen, und hin und wieder gefleckten Streif eingefasst, aus dessen Mitte sich in jedem Ringe ein weisses kurzes Streifchen nach hinten zieht. Im Kriechen dehnen sich die Ringe weit auseinander und dann wird noch zwischen jedem Ring ein schwarzer Gürtel sichtbar, welcher oben auf dem Rücken der Raupe einen weissen Punkt führet. Sie läuft sehr schnell, und hat daher auch von Einigen den Nahmen *Jäger* erhalten. Wird sie aber berührt, so rollt sie sich eben sowohl, wie auf jedes Geräusche, zusammen. Sie wählt im Grunde keine Pflanze ausschliesslich zu ihrer Nahrung; denn ausser dem Eichenbaume findet man sie auch auf Schlehenstauden, auf Quittenbäumen, auf den Rosen- Brombeer- Hindbeer- Johannisbeerstauden, auf Heidel- und Schwarzbeersträuchen, auch auf den Birken, den Pfirsichbäumen und im Grase unter diesen Bäumen und Gesträuchen.

Mit vollendetem Wachstume macht sie aus den kurzen Filzhärchen ihres Balgs, mittelst ihres Spinnsafts, oft in einer Stunde, ein eyförmiges, sehr festes, braunes Puppengehäuse um sich, welches die am Vordertheile rothbraune, am Hintertheile ockergelbe Puppe, fast dicht ausfüllt. Die Phaläne kriecht bisweilen schon nach drey bis fünf Wochen aus, bisweilen überwintert sie auch in der Puppe. Sie kann sehr leicht mit der *Phalaena Trifolii* verwechselt werden, indem sie fast völlig gleiche Farbe und Zeichnung hat, nur ist die braune Grundfarbe des Männchens röther, und die schreg durch die Flügel laufenden Binden sind ungleich breiter, nach dem schmalen Flügelrand zu mehr vertrieben, und mehr orangegelb. Die Binden der Weibchen sind blasser, der weisse Punkt in den Vorderflügeln aber in beyden Geschlechtern wie bey der *Phalaena Trifolii*.

Noch verdient hier dasjenige eine besondere Erwähnung, was *Fuefsly* an gegenwärtiger Raupe beobachtet hat. „Mich wundert, schreibt er, daß weder *Reaumur* noch *Rösel* die von einer Seite zur andern im rothen Kreise unten am Halse liegende Spalte gesehen haben, aus welcher sehr oft ein kleines Tröpfgen eines hellen Wassers hervorquillt und die schon *Linne* gekannt hat, der in der *Fauna Suecica* p. 294 von dieser Raupe sagt: *Larva e propria vesicula exspuit liquorem lacessita longissime*. Diese Öffnung und das daraus kommende Wasser mögen mehr als einen Nutzen haben. Erstlich zur Vertheidigung. Da ich einmal die Raupe berührte, bin ich davon, doch nur sehr leicht beschädigt worden; denn sie spritzte den Saft einige Zolle hoch mir ins Gesicht, wovon mir die Haut auf den Stellen, welche es traf, juckte. Die Empfindung war merklich, dauerte aber nicht lange. Ich habe dieses gewaltsame Spritzen noch öfters wahrgenommen, aber allemal nur von Raupen, die bald ihr Häuschen bauen wollten. Ausserdem vertritt dieser Saft bey ihrem Baue die Stelle eines Gummi.“

21. Die Gabelschwanzraupe. Tab. XII. Fig. 5—9.

Larva Phalaenae Bombycis Vinulae, gibba, viridis, dorso fusco, cauda biseta, e rima sub capite humorem acrem exspuens. *Pupa* fusca. *Phalaena* alis subreversis fusco venosis striatisque corpore albo nigro punctato. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2412. n. 29.

Faun. Suec. 1112. — Habitat in salice, populo.

Albin natural history of Engl. Ins. Tab. XI. F. 15.
Aldrovandi de animalibus insectis, 268. F. 1. 8.
Amoureux Notice des ins. n. 282.
Beckmann. Epist. S. L. p. 163. n. 29. Gabel-
schwanz.

Berlinisches Magaz. B. II. S. 400. 433. n. 7. *Phal.*
Vinula. Gabelschwanz.
Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 356. n. 5.
Gabelschwanz, Hermelinvogel.
Bonnet, memoire sur la grande Chenille a queue
for-

fourchue du Saule, dans le quel on prouve que la Liqueur que cette Chenille fait jaillir, est une veritable Acide, et un acide très actif. V. Mem. de Math. et Phys. Vol. II. p. 276, und in Bonnets und einiger anderer Naturforscher auserles. Abh. aus der Insektologie, S. 106. *Die grosse Raupe der Saathweide mit gegabeltem Schwanz* und S. 320. Tab. III. F. 1 — 3. von der Eigensch. der grossen 14füssigen *Weidenraupe mit dem Gabelschwanz*, einen Saft von sich zu spritzen.

Borkhausen's Europäische Schmetterlinge, Th. III. S. 367.

Comment. Lips. in scient. nat. et med. Dec. I. Vol. I. p. 41. Vol. II. p. 578. Vol. VI. p. 519.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 595. n. 7. *la Queue fourchue*.

Degeer, de singulari proprietate majorum *Erucarum salicis*, quatuordecim pedibus duabusq. caudis instructarum, eiaculari liquorem. V. Mem. de Math. et Phys. présentés a l'Acad. Roy. des sciences de Paris. Tom. I. p. 530 et 106. Desselben Abh. zur Gesch. d. Ins. von Göze, B. I. Quartal I. S. 19 und 24. *Gabelschwanzraupe*; Quart. II. S. 81 und 84. Tab. XXIII. *zweygeschwänzte Weidenraupe*; Band II. Th. I. S. 224. *Phalene grande queue double, der grosse Doppelschwanz*.

Esper's europ. Schmetterlinge. Th. III. S. 95. Tab. XVIII. *Der grosse Hermelfalter*.

Fabricii Ment. ins. II. p. 113. n. 60. Spec. Ins. II. p. 178. n. 52. Syst. entom. p. 566. n. 36. *Bomb. Vinula*. Frisch's Ins. Th. VI. S. 18. Tab. II. Fig. 2. *Gabelschwanzraupe*.

Füesly's Verz. schweiz. Ins. S. 34. n. 647. *Gabelschwanz*.

Geoffroy Hist. des Ins. Tom. II. p. 104. n. 5. *la Queue fourchue*.

Gleditsch Einleit. in die Forstwissensch. Th. I. S. 643. n. 4. Th. II. S. 738. n. 19. *Gabelschwanz*, Goedarti Ins. Tom. III. Exper. 3. T. 37. 3. t. c. *la double - queue*.

Göze Entomol. Beytr. Th. III. B. II. S. 300. *Gabelschwanz*.

Jung's Verz. europ. Schmetterl. S. 151.
Leske Anfangsgr. d. Naturgesch. S. 459. n. 4. *Gabelschwanz*.

Lesser Theol. des Ins. par Lyonet. Tom. II. p. 48. *Chenille à queue fourchue*.

Listeri Goedartus in method. redact. T. XX. b. Merian in Europ. Ins. III. S. 59. Tab. XXXIX. Meyers Naturgesch. der gift. Ins. Th. I. S. 153.

Der Weidenspinner.

Mouffetti Theatr. ins. p. 183. Fig. 10. *Vinula*. Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. I. S. 659. n. 29. Tab. XIV. Fig. 2. *Gabelschwanz*.

Müller Faun. Frid. p. 39. n. 356. *Ph. Vinula*, Zoolog. Dan. Pr. p. 117. n. 1355. Dänisch *Hermelins - Phalaena*, norwegisch *Löv - Aame*, Abhandl. Tab. I. II. *Pile - Larven med dobbelt Hale*.

Naturforscher Stück XIII. S. 228. n. 6. *Der grosse Hermelinvogel*.

Onomat. Hist. nat. P. VI. p. 416. *Ph. Vinula*. Pontopidans Naturgesch. v. Dänemark. S. 219. n. 6. *Ph. Vinula*.

Raji Hist. ins. p. 153. n. 5. et larva n. 3. Reaumur Memoires Tom. II. Part. II. Mem. 6. p. 19. Tab. XXI. Fig. 1 — 3.

Rösel's Insektenbel. Band I. Nachtv. Class. II. S. 121. Tab. XIX. Fig. 1 — 6. *Die grosse zweygeschwänzte grüne Weidenraupe*.

Schaeffer Icon. Ins. Rat. Tab. 144. Fig. 1. 2. *Phal. pect. 29*.

Schröters Abhandlungen über verschied. Gegenst. der Naturgesch. Th. I. S. 177. *Ph. Vinula*.

Scopoli Ent. carn. p. 197. n. 488. *Ph. Vinula*. Sepp Nederlandsche Insecten Stück IV. Verhandl.

V. p. 25. Tab. V. *de Vlinder mit de Groote Twestaart-Rups: de Groote Hermelyn - Vlinder*.

Syst. Verz. der Schmetterl. d. Wiener Gegend, S. 64. n. 3. *Bandweidenspinner - Raupe*.

Wilkes the English Moths and Butterflies together with the Plants, Flowers, and Fruits etc. T. XIII. Fig. 1. e. 1.

Gegenwärtige, in mancher Rücksicht merkwürdige Raupe entsteht aus kaffeebraunen, oben gewölbten, unten aber, wo sie auf der obern Seite der Blätter aufliegen, flachen Eyern, die man in den Monathen Junius und Julius antrifft. Schon nach vierzehn Tagen kommen die jungen Räumchen aus denselben hervor, welche ihr Wachsthum sehr langsam und gemeiniglich erst im September vollenden. Sie sind anfänglich ganz braun und mit zwey haarichten, ohrenähnlichen Hervorragungen auf dem ersten Ring hinter dem Kopfe versehen, welche sich aber mit zunehmender Grösse verlieren, so daß man zuletzt an ihrer Stelle nichts mehr, als zwey grose schwarze Punkte (Tab. XII. F. 5.) sieht. Der grosse, vorne platt-

plattgedrückte, mit starken Gebißwerkzeugen versehene Kopf, steckt zum Theil in dem ersten Halsring und ist mit einer carmesinrothen, sich ins gelbe verlierenden Farbe umzogen. Bis zum dritten Ring, welcher oben eine pyramidenförmige Spitze hat, nimmt sie an Dicke zu, dann aber allmählich wieder ab, und endigt sich am letzten Ring mit zwey schwarzen, hornartigen, kleinen Spitzen, die mit zwey steifen Haaren besetzt sind, unter welchen sich der After befindet. Der ganze Körper der Raupe hat ein weichliches Ansehen, und schöne Traubenfarben, daher sie auch den Namen *Vinula* erhalten hat. Auf dem Rücken der Raupe zieht sich bis zu jener spitzigen Erhabenheit auf dem dritten Ring, ein kurzer, dreyeckigter und von da wieder ein viereckigter, langer Fleck hin, dessen zwey spitzige Winkel in der Erhabenheit des Vorderrückens und in dem Schwanzringe liegen, die zwey stumpfen Winkel aber sich an beyden Seiten des siebenten Rings etwas herabziehen. Diese zwey Flecke haben jedoch keine bestimmte Farbe, bald fallen sie ins Schwarze, bald ins Violette, bald ins Braune oder Grüne, immer sind sie aber mit einem schmalen, milchweissen Rand umzogen. Die Seiten des Leibes und die Bauchfläche deckt ein schönes, ins Gelbe spielendes Grün. Die sechs spitzigen Vorderfüsse sind schwarz und weiß gestreift, die acht dicken Mittelfüsse grün und braunfleckelt, und statt der zwey Nachschieber, hat diese Raupe einen gabelförmigen, ziemlich langen Schwanz, (Fig. 5. a. b. a. b.) der sie von allen andern Raupen auszeichnet. Dieser Schwanz besteht aus zwey schwarzbraunen, cylindrischen, überaus höckrichten, und mit steifen Härchen besetzten Scheiden (Fig. 9. a. b. a. b.), welche die Raupe nach allen Seiten herumbewegt, und aus welchen sie, auf besondere Veranlassungen, noch einmal so lange, hornartige, bey den jungen Raupen braune, bey den grösseren rosenrothe Fäden hervortreibt, (Fig. 5. b. b.), welche sie auf mancherley Art biegen und spiralförmig krümmen kann. Die weibliche Raupe unterscheidet sich von der männlichen blos durch die dunkleren Farben des ganzen Leibes, vorzüglich aber des Rückens, wo sie bey nahe dunkelviolet ist. Sie erreicht überhaupt eine Länge von dritthalb Zoll und eine im Verhältniß derselben beträchtliche Dicke. Viermal legt sie den Balg mit der Schaale des Kopfs ab und verzehrt ihn gemeinlich. In der Mitte des Julius, bisweilen auch erst im August und September, verliert sie ihre lebhaften Farben und sucht zu ihrer Verwandlung einen schicklichen Ort an dem Stamme oder an den stärkeren Ästen eines Baumes, nagt daselbst eine flache Vertiefung aus und macht sich nun in diese aus den feinsten Holzspänchen, die sie mit ihrem scharfen Gebiß abgenagt hat, mittelst ihres klebrichten Spinnsafts ein oval-

ovalrundes, überaus festes und durch keine Nässe zu erweichendes Puppengehäuse. In diesem liegt sie wohl noch vier Wochen, ehe sie sich in eine an beyden Enden stumpfe, rothbraune Puppe verwandelt. Erst im May oder Junius des kommenden Jahres durchbricht die Phaläne die Puppenschale und ihr festes Gehäuse, und erscheint in folgender Gestalt. Ihr ganzer Körper, vorzüglich aber die Brust und die Schenkel der Füße, und bey dem Männchen noch besonders beyde Fühlhörner, sind stark gefiedert, der weisse Rücken des Brustschilds noch besonders mit schwarzen, länglichten Flecken, gleich einem Hermelinpelz, bezeichnet, der Rücken des Hinterleibs ebenfalls mit schwarzen gezackten, niedlich geordneten Flecken gezieret, die aschgrauen, ins Silberfarbe spielenden, wenig bestaubten und daher beynahe durchsichtigen Flügel, mit starken rothen Adern durchzogen, und schwarz zackicht und wellenförmig gestreift, die Schienbeine und Fußblätter schwarz und weiß geringelt. Man findet sie so in den meisten Gegenden von Europa, wo sie als Larve auf den Pappel-Sahl- und Wollweiden, zuweilen auch auf den Eichen-Linden-Espen- und Ulmenbaume (*Populus nigra*) lebt.

Merkwürdig sind die Vertheidigungsarten dieser Raupe und die zurückschreckende Stellung (Fig. 5.), die sie dabey annimmt. Sie öffnet die Gebißwerkzeuge, strebt mit dem Vordertheile des Körpers und den sechs Vorderfüßen in die Höhe, schlägt zugleich das Schwanzende gekrümmt aufwärts und läßt aus den cylindrischen Scheiden die rothen Fäden hervorschiessen, mit welchen sie wie mit einer Peitsche, um sich hauet und welche sie nur dann spiralförmig gekrümmt und zitternd in die Scheiden zurück zieht, wenn sie bemerkt, daß die Gefahr vorüber ist. Wird sie aber länger gereizt; so fährt sie auch mit den Zähnen, worinnen sie eine ausserordentliche Stärke hat, um sich und beißt damit ziemlich nachdrücklich. Das Sonderbarste aber ist, daß sie zugleich eine klare Feuchtigkeit aus einer Spalte unter dem Kopfe (Fig. 6. a.) auf ihren Verfolger spritzt. *Bonnet* und nach ihm *Degeer* wurden dieses bey ihren Untersuchungen zuerst gewahr, und letzterer empfand von dieser ihm ins Gesicht und ins Auge gespritzten Feuchtigkeit einen brennenden Schmerz. Sie bemühten sich auch die Ab- und Ausscheidungswerkzeuge dieses stark riechenden, so wohl auf der Zunge, als in jeder Wunde eine äzende giftige Eigenschaft äussernden und eine, der Ameisensäure vollkommen gleichende Schärfe enthaltenden Safts zu entdecken, und fanden das Saftbehältniß unmittelbar unter dem Schlunde und dem Vordertheile des Magens, als eine ohngefähr vierthalb Linien lange, durchsichtige und in einen engen Hals übergehende Blase (Fig. 8. a.). Über den Hals der Blase weg und nach dem

dem Spinnwerkzeuge liefen zwey Seidengefäße (*b. b. b. b.*), der Hals aber selbst gieng allmählich in einen grünen, weichen und fleischichten Körper (Fig. 7.) über, der am Ende mit vier langen und spitzigen, wie eine Gießkanne, lauter feine Mündungen führende Warzen (*a. a. a. a.*) versehen war. Diesen Körper nun treibt die ergrimnte Raupe aus jener Querspalte (Fig. 6. *a.*) unter dem ersten Ringe hervor, indem sie dabey dem Kopf aufhebt, und spritzt so jene äzende Feuchtigkeit auf ihren Gegner los.

22. Die Processionsraupe. Tab. XII. Fig. 10.

Larva Phalaenae Bombycis Processionae, gregaria pilosa, fusco-cinerea: dorso nigricante verrucisque luteis, per paria numero inaequalia incedens, exuviis tactu inflammationem excitantibus. *Phalaena* alis cinereo fuscis; femina striga obscuriore, mare tribus.

Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2416. n. 37. — Habitat in Quercu magnitudinis mediae.

Berliner Magazin B. II. S. 402, n. 12. *Die Processionsmotte.*

Borckhausen's Naturgesch. der Schmetterlinge, Th. III. S. 132.

Brakenhausen's Beobachtungen bey den *Processionsraupen*. S. die Abhandlungen der Hallischen naturforsch. Gesellsch. B. I. S. 203.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 595. n. 4. *la Processionnaire.*

Espers Schmetterlinge, Th. III. S. 150. Tab. XXIX. Fig. 1 — 5. *Der Processionsspinner, la Processionnaire du Chêne.*

Fabricii Mant. Ins. II. p. 114. n. 65. Spec. ins. II. p. 180. n. 65. Syst. Ent. p. 567. n. 40.

Fuefslly's neues Magazin d. Entomol. B. II. S. 72 *Eichenspinner*. Desselben Verz. schweiz. Ins. S. 34. n. 655. *Die Processionsmotte.*

Gleditsch's Einleit. in die deutsch. Forstwirths. B. I. S. 644. n. 5. *Die Processionsraupe.*

Göze's entomologische Beyträge, Th. III. B. II. S. 319. *Der Processionsschwärmer*, desselben Gesch. schäd. Ins. Vorr. p. V.

Journal für das Forst- und Jagdwesen, B. IV. Heft I. S. 82.

Jungs Verz. europ. Schmetterlinge, S. 114.

Kühn von den Processionsraupen im Naturforscher Stück XIV. S. 60. Tab. II. Fig. 8.

Langs Verzeichniss seiner Schmetterl. S. 104. n. 804.

Leske's Anfangsgr. d. N. G. Th. I. S. 460. n. 6. *Der Processionsraupenspinner.*

Meyers Naturgesch. d. giftigen Ins. Th. I. S. 172. *Der Viereichenspinner.*

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. 1. S. 662. n. 37. Tab. XXII. Fig. 2. *Katzeneule.*

Nau's Anleitung zur deuts. Forstwissens. S. 290. *Onomatologia* Hist. nat. P. VI. p. 401. *Die Katzeneule.*

Reaumur Mem. des Ins. T. II. M. IV. p. 216. Tab. XI. *Chenille Processionnaire ou évolutionnaire.*

Sander's kleine Schriften 1784. n. 18. Derselbe in Fuefslly's neuen Magazin, B. I. S. 50.

Schreber in der Sammlung verschied. Schriften der größten Schwedischen Gelehrten etc. B. IV. S. 410.

Schwarz's Raupenkalender, Abth. I. S. 67. *Systematisches Verz.* Wiener Schmetterl. S. 58.

Fam. L. Sp. 10. *Viereichenspinner.*

Tabellarische Verz. Brandenburger Schmetterlinge, Heft I. S. 37. n. 18.

Uslar's, J. v. *Pyralis Hercyniana*, S. 20. *Processionsspinner, Viereichenspinner.*

Eine Phaläne mittlerer Grösse, welche aschgraue Oberflügel mit schreg durch dieselben sich ziehenden dunkelbraunen Binden, und weißlich- aschgraue Hinterflügel in der Mitte mit einem verloschenen braunen Bande hat, ist die Mutter die-

dieser Raupe, welche im May aus einem gelblichen, mit einem schwarzen Punkt versehenen Eye kriecht und dann auf Eichen und Nadelholz, vorzüglich auf Fichtenbäumen in den wärmeren Erdstrichen unsres Welttheils zu finden ist. Sie erreicht selten eine Länge von anderthalb Zoll, hat eine schwarzbraune Grundfarbe, die auf den Seiten des Leibes ins Weißlichte fällt, über jedem Ringe zwey graue Wärzchen mit Haarbüscheln, überhaupt einen filzhaarichten Balg, dessen feine Haarspitzen ins Rothgelbe fallen. An den Stämmen grosser Eichen legt sie gewöhnlich in Gesellschaft mehrerer Hundert aus einem feinen Seidengewebe Nester an, welche wohl 23 bis 24 Zoll lang und 8 bis 10 Zoll breit, in Form eines länglichten Sacks gewebt und oben mit einer Öffnung versehen sind, durch welche die Raupen aus und einzukriechen pflegen. Doch geschieht dieses nie am Tage, wo sie in traulicher Ruhe in ihrem Neste verweilen, sondern erst am Abend, und immer in langen, geordneten Zügen, wovon sie auch den Namen *Processionsraupen* erhalten haben. Eine Anführerin eröffnet den Zug, an welche sich erstlich eine Reihe einzelner Raupen, dann immer zahlreichere Reihen von zweyen, dreyen bis sechsen neben einander anschliessen, welche alle gleiche Geschwindigkeit im Marsche mit ihrer Anführerin halten, und, wenn sie endlich einen andern Baum erreicht haben, sich über denselben verbreiten und sein Laub aufzehren. Sind sie gesättiget, so beginnen sie unter gleicher Anführung und in gleicher Ordnung ihren Rückzug. Zur Zeit der Verwandlung in eine weiche, dunkelockergelbe Puppe, verfertigt sich jede ihr eignes Puppengehäuse und verwebt in dasselbe die Haare ihres Balgs. So liegen sie alle in Schichten neben einander und überwintern zusammen in einem grossen runden Klumpen, aus welchem die Frühlingswärme die Phalänen gemeinschaftlich hervorlockt.

Unvermerkt dringen die überaus feinen Haare der Processionsraupe bey der geringsten Berührung in die Haut des Menschen, und veranlassen Entzündung und Blasen, ausserdem aber treibt sie auch jede leichte Bewegung in die Luft. Dies ist besonders der Fall bey den weit lockerer liegenden Haaren alter Nester, in deren Nachbarschaft man oft mit einer Atmosphäre fliegender Haare umgeben ist, welche sich dann, nach *Reaumur's* und *Brakenhausen's* Erfahrungen auf die blossen Stellen der Haut absetzen. Ersterer empfiehlt deswegen alle Vorsicht bey der Entfernung der Nester, besonders, wenn die Phalänen ihre Verwandlungshülsen schon verlassen haben. Er empfand darauf an den Händen, besonders zwischen den Fingern, ein beschwerliches Jucken und Brennen, welches immer heftiger wurde, und welches er bald hernach auch an verschiedenen Stellen des Gesichts und

und hauptsächlich an den Augen, verspürte. Beyde Augenlieder waren in kurzer Zeit entzündet und er konnte kaum mit halbgeöffneten Augen sehen. Diese Beschwerden dauerten vier bis fünf Tage beym fruchtlosen Gebrauche verschiedener Mittel fort. Eben dieses widerfuhr auch andern Personen, welche die Nester berührt hatten, und sogar vier Frauenzimmern, die weder den Nestern, noch Hül- sen zu nahe gekommen waren und gleichwohl am Halse lauter Geschwülste und Blätterchen bekamen. Ähnliche Schilderungen macht uns auch *Sander* von der nachtheiligen Wirkung der Processionsraupenhaare, und liefert hiezu zwey merkwürdige Geschichten. „Im Sommer 1779, als die Bauern eben das Heu einsammelten, bemerkte man an einer freystehenden Eiche eine Menge haarichter Raupen, die dem Einspinnen nahe waren. Sie hatten Nester gemacht, die der Schulz zu vertilgen befahl. Der Schulzenknecht stieg auf den Baum hinauf und wollte die Raupen abkratzen. Es flog ihm aber dabey eine staubigte Ausdünstung ins Gesicht und drang ihm in die Haut. Er spürte ein heftiges Jucken und Beissen, die Augen wurden ihm so trübe, daß er nicht mehr sehen konnte. Er stieg also schnell von dem Eichbaum herab und machte unten Anstalt, die abgestreiften Raupen zu verbrennen. Sein Knabe, ein Kind von sieben Jahren, stand mit blossen Füßen neben dem Feuer. Dieser Junge fing plötzlich an über Schmerzen an den Füßen, bis an den Leib herauf, zu klagen, die Geschlechtstheile und benachbarte Gegend schwellen ihm so auf, daß er faßt nicht mehr von der Stelle gehen konnte. Man brauchte warme zertheilende Umschläge, und den andern Tag war der Knabe von seinen Leiden befreyt. Aber der Vater schwoll am Gesicht, an der Brust und am Leibe so sehr auf, daß man ihm schnell mit innerlichen und äusserlichen Mitteln zu Hülfe kommen mußte. Drey Tage dauerte das Übel, endlich setzte sich die Geschwulst, aber er empfand es doch noch einige Tage nachher. Von den am Baum sitzen gebliebenen Raupen blieb Gespinnst, Unrath, Staub, Koth, und eine Menge abgestreifte Häute hangen. Im Winter vor dem Jahre 1780 stieg ein Bauer auf diese Eiche, um ihre Äste, die ihm auf seine Wiese Schatten warfen, zu behauen. Auf dem Baume ward ihm schon die Brust enge, als er aber mit der Arbeit fertig war, rutschte er die Länge herab und streifte alles mit sich ab, was noch von den Raupen zurück war. Es flog ihm davon manches ins Gesicht und auf die Haut. Er wollte es zwar abschütteln, aber Gesicht und Hals schwellen ihm schnell so sehr auf, daß er erstickt seyn würde, wenn er nicht das Halstuch von dem Kragen am Hemde geschwind aufgerissen hätte. Die Geschwulst verlohr sich auch erst nach einigen Tagen wieder,

wieder, und er erinnerte sich, daß ihm das nemliche schon mehrmals an Eichen, die solche Raupen gehabt, begegnet sey.“

Hieraus folgt die Vorsichtsregel, sich so viel möglich zu hüten, die Processionsraupen, ihre Puppen, und Puppengehäuse mit blossen Händen zu berühren und den feinen Haarstaub ihrer Nester in Bewegung zu setzen. Sind aber schon Haare in die Hände eingedrungen, so muß man diese mit Oel und dann mit Seife waschen, um jene nicht unversehends im Gesicht und an andern Theilen zu verbreiten. Da die feinen Härchen auch an den Schnupf- oder Handtüchern hängen bleiben, welche man angefaßt, oder woran man sich abgetrocknet hat; so ist es nöthig, selbst diese Tücher in die Wäsche zu geben, um nicht die anklebenden Härchen ins Gesicht zu bringen und Bläschen zu veranlassen. Sind letztere aber schon zugegen, so muß man sorgfältig das Verbreiten der Haare durch das Kratzen vermeiden und lieber gehacktes oder gestossenes Petersilienkraut, oder mit goulardischem Wasser befeuchtete Compressen auflegen.

23. Die Pithyocampa. Tab. XII. Fig. 11.

Larva Phalaenae Bombycis Pithyocampae, pilosa caerulescens: maculis dorsi flavis capite atro. *Phalaena* alis griseis, strigis tribus obscurioribus, posterioribus pallidis, puncto anali fusco. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2416. n. 506. — Habitat in Austriae pinu, statura et magnitudine processionae.

Amoureux Notice p. 157 und 280. Tab. II. Fig. 24. 25.

Amstein in Fuefsly's neuen Mag. B. I. S. 44.

Bechsteins, J. M. Musterung schädlichgeachter Thiere, S. 174. Fig. 6. *Fichtenspinner*.

Borkhausens Naturgesch. der europ. Schmetterl. Th. III. S. 138.

Digestor, ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis, loco sub Carabo citato.

Espers Schmetterlinge, Th. III. Spinnerphalänen, S. 159. Tab. XXIX. Fig. 6. 7. *Der kleine Fichtenspinner, die Processionsraupe auf Fichten*.

Fabricii Mant. Ins. II. p. 114. n. 66. Spec. Ent. p. 567. n. 40.

Fuefsly's altes Magaz. d. Entomol. B. II. S. 232. Tab. III. Fig. 1—9. *Fichtenspinner* und neues Mag. Th. I. S. 44.

Göze entomol. Beytr. Th. III. B. III. S. 59. n. 17. *Fichtenspinner*.

Jonstoni Theatr. Anim. de Ins. L. II. p. 154. *Pityocampa*.

Journal für das Forst- und Jagdwesen, B. IV. Heft I. S. 85.

Jungs Verzeichniss europ. Schmetterlinge, S. 108.

Langius de Pityocampis, picearum Erucis. Epist. XV. p. 368.

Matthioli Comm. in Dioscoridis Lib. II. Cap. LIV et LV. Venet. 1565. *Fichtenwurm*.

Meyers Naturgesch. der giftigen Ins. Th. I. S. 177. n. 11. *Der kleine Fichtenspinner*.

Nau's Anleitung zur deutschen Forstwissenschaft, S. 290.

Plinii Hist. Mund. Lib. XXIII. Cap. II. Pinorum erucæ, quas *Pityocampas* vocant (von *πικρος*, der Pignolenbaum und *καμψη* die Raupe.)

Reaumur Memoir pour l'histoire des Insectes, T. II. P. I. p. 187. Tab. VIII. F. 1—12. *la Chenille du Pin*.

Schwarz's Raupenkalender, S. 11.

Syst. Verz. der Schmetterl. d. Wiener Gegend, S. 58. Fam. L. n. 11. *Ph. Bomb. Pityocampa*.

Tabellarisches Verz. der Brandenburger Schmetterlinge, Heft I. S. 38. n. 19.

Uslar's *Pyrallis Hercyniana*. S. 21.

Villers Entomol. Linn. Tom. II. p. 135. n. 26.

Gegenwärtige, nur in den mittäglichen Gegenden Frankreichs, Tyrols und der Schweiz, vorzüglich aber in Italien einheimische Raupe, lebt in den Fichtenwäldern, und in Italien, wo sie oft grosse Verheerungen anrichtet, auf der Pignole (*Pinus Pinea*) vom Monath April bis im September. Sie hat ohngefehr eine Länge von anderthalb Zoll, einen grossen schwarzen Kopf und immer am Hintertheil jedes Rings eine auf der Mitte des Rückens breite und an den Seiten des Leibes schmaler zulaufende, mit einem weißgelblichten Rand von vorne und von hinten eingefasste Wulst, welche von oben mit fuchsrothen, auf den Seiten mit weißgrauen Haaren besetzt ist. Der tiefere Zwischenraum zwischen den wulstigen Theilen der Ringe ist schwarz und fällt ins Blaue. Die sechzehn Füße und die Bauchfläche sind nach *Fuefslys* Beschreibung rothgelb, nach seiner Abbildung aber mehr weißgelb. Sie erreicht, nachdem sie durchwintert hat, erst im März ihre vollkommene Grösse, und verkriecht sich zu Ende dieses Monaths unter die Erde, wo sie erst ein Puppengehäuse um sich spinnt und sich dann in eine vorne spitzig zulaufende und hinten mit zwey kurzen Spitzen versehene, kastanienbraune Puppe verwandelt. Die Phaläne verläßt gewöhnlich zu Ende des Julius ihr Gehäuse. Der Vordertheil ihres Körpers fällt ins Braune, der Hinterleib ist bis auf das stumpfe, aschgraue Schwanzende ockergelb. Die zwey Vorderflügel führen schwarzbraune, zackigte Querstreifen auf einem grauen Grunde, die Hinterflügel aber sind weißgrau. Wie die Processionsraupen weben auch die Pithyocampen sich gemeinschaftliche Nester an den Enden der Aeste oder an den Gipfeln der Bäume. Diese Nester haben nach *Fuefsly* eine trichterförmige Gestalt, meistens die Länge eines und die Breite eines halben Schuhs und inwendig verschiedene Abtheilungen, worinnen über hundert Raupen ihren Anfehalt finden können. Abends gegen Sonnenuntergang ziehen sie, wie die Processionsraupen, in einem wohlgeordneten Zug aus ihrem Neste zur Fütterung, nach zwey Stunden aber in gleicher Ordnung in dasselbe zurück. Sind sie wieder in ihrer gemeinschaftlichen Wohnung beysammen, so verspinnen sie jedesmal die Öffnung derselben.

Sowohl diese, in den Fichtenwäldern von Italien oft in grosser Menge anzutreffenden Gewebe, als die umher angerichteten Verheerungen, machten die Pithyocampa schon in den ältesten Zeiten merkwürdig, noch mehr wurde sie es aber durch ihre in der Folge bekannt gewordene gefährliche Wirkung ihrer überaus feinen, spitzigen und brüchigen Haare auf die Gesundheit und das Leben der Menschen. Die Giftmischer des verfeinerten Roms suchten nemlich die schädliche Eigenschaft dieser Haare zu benutzen und sie pulverisirt im Getränke beyzubringen.

bringen, welches anfänglich ein gelindes Kitzeln verursachte, bald darauf aber heftige Schmerzen im Mund und Schlunde, Entzündung dieser Theile und den Tod zur Folge hatte. Der Diktator *Sulla* wurde daher bewogen, auch diese Vergiftungsart dem Gesez wider die Vergiftungen einzuverleiben. *Aetius* und *Paulus Aegineta* warnten in dieser Rücksicht noch besonders, unter den mit solchen Gespinsten behangenen Bäumen zu speisen, weil es leicht möglich wäre, daß eine solche Raupe in die Speisen fallen und mit verschluckt werden könnte. Allein, auch ohne diese Besorgniß, macht schon die nachtheilige Atmosphäre dieser Raupen, jedes Verweilen unter einem solchen Baume bedenklich, da nach *Bechstein* auch Jucken, Geschwülste und Geschwüre entstehen können, wenn man nur unter dergleichen Bäumen weggeht. *Amoreux*, der vom Jucken und Ausschlag im Gesicht bloß dadurch befallen wurde, weil er diese Raupen ohne sie zu berühren, in der Nähe untersucht hatte, schreibt ihnen deswegen noch eine eigne giftige Ausdünstung zu, *Fuefsly* hingegen, dem bey seinen Untersuchungen eben dasselbe begegnete, behauptet mit *Reaumur*, daß die Haarfloken, die zu Zeiten beym Kriechen und den verschiedenen Bewegungen der Raupe aus ihren Wülsten herausgeschleudert werden, sich in die Haut setzen und jene Zufälle verursachen. Nicht weniger schädlich ist es, die Nester und Puppengehäuse dieser Raupen mit blossen Händen anzufassen. Nach *Amsteins* Erzählung bekam ein Mädchen bloß dadurch einen Ausschlag, daß sie sich mit der Säuberung und Zubereitung der Seide dieser Gehäuse und Nester beschäftigte. Dieser Verfasser glaubt sogar, daß der pulverisirte Balg der *Pithyocampa*, zum Blasenziehen gebraucht, eine stärkere und schnellere Wirkung, als das Cantharidenpflaster hervorbringen müßte. Er gründet seine Meynung darauf, daß, ohngeachtet er einem Gehülften seiner Untersuchungen die Hände mit Öl bestreichen ließ, wenn er die Verwandlungshülsen dieser Raupen berühren mußte, dennoch die Hände in weniger, als einer Viertelstunde mit Bläsen, schmerzender Geschwulst und Röthe überzogen wurden, die erst nach drey bis vier Tagen wieder verschwanden. Man kann sich leicht vorstellen, daß diese Raupen einen heftigen, bald eine Entzündung bewirkenden Reiz veranlassen müssen, wenn sie durch Speisen in den Magen und Darmkanal gelangen, und daraus schliessen, daß die bey den Alten vorkommenden Erzählungen von den Vergiftungen durch die *Pithyocampa* keineswegs zu bezweifeln sind. Sie liessen dagegen Öl und Honig in solcher Menge nemen, daß Brechen darauf erfolgte und bedienten sich überhaupt gleicher Mittel, wie gegen das Cantharidengift. In äusserlichen Verletzungen empfiehlt *Amstein*, die Stellen der Haut einige Minu-

Minuten lang mit Petersilienkraut stark zu reiben, worauf das Brennen sogleich gelinder wird, und nach zwey bis drey Stunden gänzlich aufhöret.

24. Die schwarze Bärenraupe. Tab. XII. Fig. 12.

Larva Phalaenae Cajae, solitaria, hirta, nigricans, segmentis utrinque punctis tribus elevatis caerulescentibus. *Pupa* nigra, ovata. *Phalaena* alis fuscis, rivulis albis, posterius purpureis nigro punctatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2418. n. 38. Faun. Suec. I. p. 820. n. 1131. — Habitat in Europae et Sibiriae lactuca, aliisque oleribus.

- Albin natural hist. of Engl. Ins. Tab. XX. F. C. D.
 Aldrovandi de animalibus Insectis 246. F. 11. 12.
 Amoreux Notice des Ins. venim. p. 156.
 Beckmanni Epitom. S. Linn. p. 163. n. 33.
 Berlinisches Magazin, B. II. S. 404. n. 13. *Die braune Bärmotte.*
 Biblioth. reg. Parisiens, p. 13. F. 1—8. p. 16. F. 1.
 Blanckard Schouwburg van de Rupsen, Wormen etc. Tab. IX. F. A. C.
 Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 358. n. 8.
Die schwarze Bärenraupe.
 Borkhaussens Europäische Schmetterlinge, Th. III. S. 160.
 Brahm's Insektenkalender, Th. II. S. 217.
 Catholicon, p. 118. *Herissonne, Bärenraupe.*
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 596. n. 6. *la marte.*
 Deger's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. I. Quartal 1. S. 147. Tab. XII. F. 1. *Der Igel oder Marder.*
 Bd. II. Th. I. S. 215. *Phalene herissonne, die Igelphaläne.*
 Drury Illustr. of nat. hist. Tom. I. p. 100. not.
The great Tiger, le grand Tigre.
 Espers Europ. Schmetterl. Th. III. S. 167. Tab. XXX. Fig. 4. *Die Caia, der gemeine Bärflatter.*
 Fabricii. Mant. Ins. II. p. 128. n. 172. Spec. Ins. II. p. 198. n. 122. Syst. Ent. p. 581. n. 87. *B. Caia.*
 Fischers Naturgesch. v. Liefeland, S. 151. n. 349. *Der Bär.*
 Frisch's Beschreibung der Ins. in Teutschl. Th. II. p. 38 n. 10. Tab. XIII. *Bärenraupe.*
 Fuefsly's altes Mag. d. Ent. B. I. S. 285. Desselb. Verz. schweiz. Ins. S. 34. n. 656. *Die braune Bärenmotte.*
 Geoffroy Hist. d. Ins. T. II. p. 108. n. 8. *L'écaillé la marte, ou herissonne.*
 Gleditsch Einl. in die deutsche Forstwiss. Th. II. S. 976. n. 19. *braune Bärmotte.*
 Goedarti Ins. Tom. I. Tab. XVII.
 Göze's Entomol. Beytr. Th. III. B. II. *Bärvoget.*
 Hufnagel Ins. Tab. XIV. F. 11. Ed. alt. 3. 4. 9. *Jonstonii Hist. Ins. Tab. VII. XIX.*
 Jung's Verz. d. europ. Schmetterl. S. 24.
 Leske's Anfangsgr. der Naturg. I. S. 460. *Der Nesselspinner.*
 Listeri Ed. Goedarti p. 219. Fig. 99.
 Merianin Europ. Ins. I. p. 160. Tab. V.
 Meyer's Naturgesch. der giftigen Ins. Th. I. S. 161. *Der Nesselspinner.*
 Mouffetti Th. Ins. 93. Fig. 15. p. 186. Fig. 2.
 Müllers Linn. N. S. d. Ins. B. I. S. 663. n. 38. *Der Bär.*
 Mülleri Faun. Frid. p. 41. n. 371. Zool. Dan. Prodr. p. 118. n. 1359.
 Naturforscher St. II. S. 17. n. 4. Tab. I. Fig. 4.
 St. III. S. 14. St. VIII. S. 102. n. 13.
 Neue Berlin. Mannigfaltigkeiten, Jahrg. III. S. 98.
 Onomatol. hist. nat. P. VI. p. 329. *schwarzhaarige Bärenraupe.*
 Raji Hist. Ins. p. 151. n. 3. et larva p. 152. n. 7.
 Reaumur Mémoires Tom. I. P. II. Mem. 12. p. 219. Tab. XXXVI. Fig. 6. 7. *Herisson, Martre.*
 Rösels Insektenbel. B. I. Nachtvög. 2. Klass. II. S. 1. Fig. 1. *Bür-raupe.*
 Schaeffer Icon. Ins. Ratisb. Tab. XXIX. Fig. 7. 8.
 Scopoli Entom. Carn. p. 201. n. 503.
 Sepp Nederl. Ins. St. IV. Tab. IX. Fig. 2. *De Vlin-der uit de Grootte Beer - Rups.*
 Sulzer's Kennzeichen der Insekten. Tab. XVI. Fig. 94.
 Systematisches Verz. der Schmetterl. d. Wiener Gegend, S. 52. Famil. E. n. 1. *Die Nesselspinnerraupe.*
 Systeme naturel du regne animal, T. II. p. 144. n. 12. *Ours: Phalene de la Laitue.*
 Vieweg's Schmetterlinge der Mark Brandenburg. Heft I. S. 57.
 Wilkes, B. The English Mots and Butterflies together with the Plants, Flowers, and Fruits etc. 18. T. III. a. 1.

Beynahe überall in Europa, selbst in den kältern Erdstrichen, wird diese Raupe vom Frühling bis im Herbst einzeln auf Hecken auch auf dem Grase angetroffen. Sie lebt, ausser der Lactuka und der grossen Nessel, welche sie vorzüglich zu lieben scheint, von allerley Laub und Kräutern, selbst vom Grase. Mit Recht hat sie von ihren langen Haaren, wodurch sie sich vor allen andern haarichten europäischen Raupen auszeichnet, ihren Namen erhalten. Ihr Kopf ist klein und, wie der Grund des ganzen Körpers, glänzend schwarz, die tief eingeschnittenen Ringe ihres Körpers gleichen in ihrer Vereinigung beynahe einer Perlenschnur und jeder dieser Ringe ist in der Mitte mit einer Reihe glänzender, ins Blaue fallender Knöpfchen besetzt, unter und seitwärts welchen noch ein länglichtes, weisses, Fleckchen an jeder Seite des Rings durch die Haare hervorschimmert. Aus jenen Knöpfchen kommen die, auf dem Rücken oft über einen halben Zoll langen Haare in Büscheln hervor. Sie sind von verschiedener Farbe, oben schwarz und an den Spitzen grau, an den Seiten des Leibes aber fuchsroth. Die sechs spitzigen Vorderfüsse, sind wie die acht stumpfen Mittelfüsse und zwey stumpfen Nachschieber schwarzbraun, und die Länge des ganzen Körpers beträgt höchstens dritthalb Zoll. Ihren schnellen Gang hemmt jede kleine Berührung, worauf sie sich schneckenförmig zusammenrollt. Gemeiniglich überwintert sie, bisweilen aber vollendet sie noch in dem Jahre ihre Verwandlungsperioden, in welchem sie das Ey verlassen hat. Vor der Verpuppung umgiebt sie sich mit einem inneren und äusseren Gespinste, worein sie die, theils ausgegangenen, theils abgebissenen Haare ihres Balgs verwebt, so daß sie um diese Zeit nichts als abgestuzte Haare auf ihrer Oberfläche hat. Sie schrumpft nun zusammen und nimmt unter der Raupenhaut nach vierzehn Tagen die Gestalt der Puppe an, welche nicht über einen Zoll lang, sehr dick, ziemlich hart und ganz schwarz ist. Der nach drey bis vier Wochen auskriechende Schmetterling, ist auf dem Rücken, der Brust und an den mit weissen Binden durchschlängelten Vorderflügeln, kaffeebraun, an den Hinterleib und Hinterflügeln, welche mit dunkelblauen Flecken gezieret sind, menigroth. Das Weibchen legt runde, ins Grüne fallende Eyer, aus welchen nach drey bis vier Wochen die jungen Raupen auskriechen.

Da die Haare der Bärenraupe leicht ausgehen, so bleiben sie, wenn man sie bey denselben anfaßt, in der Haut hängen und machen ein heftiges Jucken. Vorzüglich geschieht dieses von ihren kurzen, steiferen Haaren, an welchen man unter dem Mikroscope feine Nebenspitzen erblickt. Öfteres Waschen mit Seifenwasser, oder mit Milch reicht hin, sich von diesem Jucken zu befreien.

25. Die graue Bürstenraupe. Tab. XII. Fig. 13.

Larva Phalaenae Bombycis Fascelinae, pilosa, rubro punctata, fasciculis quinque dorsis albis, capitis antique fuscis. *Pupa* brunnea, linea dorsali pilosa. *Phalaena* alis cinereis, antennis nigris strigisque duabus fulvis repandis. L. S. N. T. I. P. V. p. 2428. n. 55. Faun. Suec. I. p. 829. n. 1119. — Habitat in leontodonte, trifolio, rubo, populo.

Albin natural. hist. of Ins. Tab. XXVI.
 Bergmanni Epit. S. Linn. p. 146. n. 55.
 Berliner Magazin B. II. S. 422. n. 41. *Bürstenmotte*.
 Catholicon A. p. 359. *Antennulata*, die Löwen-
 zahn - Butterblum - Pfaffenührleinsraupe.
 Degeer's Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze Th. I.
 Quartal 2. S. 40. Tab. XV. F. 12. B. II. S. 230. *Pha-
 lene patte étendue agathe*, der achatsfarbige Streckfuß.
 Espers Europ. Schmetterl. Th. III. S. 275.
 Tab. LV. *Die schwarze Bürstenraupenphalene*.
 Fabricii Mant. Ins. II. p. 117. n. 88. Spec. ins.
 T. II. p. 184. n. 69. Syst. Ent. p. 571. Bomb. 51.
 Fuefsly's Magaz. d. Entomol. B. II. S. 4. Schweiz.
 Ins. S. 35. n. 678. *Die Bürstenmotte*.
 Gladbach's Verzeichniss. Das Bärge.
 Gleditsch's Einleit. in die Forstwiss. Th. I. S.
 683. n. 7. Th. II. S. 740. n. 28. *Das gestreifte Band*.
 Goedarti Ins. p. 1. Tab. XXXVI. Ed. Listeri
 Fig. 80.
 Göze's entomologische Beyträge, Th. III. B. III.
 S. 95. *Bürstenmotte*.

Jung's Verz. europ. Schmetterlinge, S. 53.
 Mader's Raupencal. S. 15 n. 18. *Bürstenmotte*.
 Merianin Europ. Insekt. Tab. VIII.
 Meyer's Naturgesch. d. giftigen Ins. Th. I. S. 167.
Der Kleeblumenspinner.
 Mouffetti Theatr. Ins. p. 189.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 669.
 n. 55. Tab. XIV. Fig. 6. *Der Büschelraupenvogel*.
 Mülleri Faun. Fridr. p. 40. n. 365. Zool. Dan.
 Prodr. p. 118. n. 1368.
 Onomatologia Hist. nat. P. VI. p. 470. *Antennulata*,
 die Löwenzahnraupe, die Butterblumraupe, P. VI. p. 365.
Der Büschelraupenvogel.
 Raji Hist. Ins. p. 186. n. 8.
 Rösel's Insektenbelust. B. I. Nachtv. Kl. 2. S. 217.
 Tab. XXXVII. F. 1 — 3. *Die graue Bürstenraupe*.
 Syst. Nat. du regne Animal. II. p. 147. n. 20.
 Ph. du Trefle.
 Systematisches Verz. Wien. Schmett. S. 55. Fam. G.
 n. 3. *Kleeblumenspinner-Raupe*. La Limaconne G. d.
 Wilkes engl. Mots. p. 30. Tab. III. C. 1.

Auch diese Raupe gehört unter die, unsre Oberfläche durch ihre gelblich-
 grauen und untermengten schwarzen Filzhaare vorzüglich verletzenden. Sie ist oft
 über anderthalb Zoll lang, hat einen schwarzen Kopf und hinter denselben auf
 dem ersten Ringe, zwey lange, gleich Hörnern zur Seite des Kopfs hervorragende
 Haarbüschel, (Tab. XII. Fig. 13. a. a.) welche, wie alle übrige Haare des Kör-
 pers, aus kleinen warzenförmigen Erhabenheiten der Ringe hervorkommen. Auf
 jedem der fünf Ringe vom vierten bis achten, steht ein mehr breites, als langes
 Haarbüschchen, welches zu beyden Seiten weiß, oben, hinten und vorne aber
 schwarz ist. Rösel vergleicht die ganze Reihe dieser Büschchen ganz richtig mit
 einer Zahnbürste. Der neunte und zehnte Ring führt zwey kleinere gelblich-
 graue Haarbüschel auf zwey pommeranzengelben Wärcchen, welche die Raupe
 bald einzieht, bald hervortreibt, der eilfte Ring aber einen langen, schwarzen, nach
 hinten gekehrten Haarbusch (b.). Ausserdem zeichnet diese Raupe noch eine
 Reihe orangenfarbichter Punkte auf jeder Seite über den gelblichgrauen Füßen
 aus.

aus. Sie verwandelt sich in einem, aus ihren Haaren zusammen gewebten, eyrunden Gehäuse, welches sie in einem grösseren Gewebe, wie in einer Hängematte aufhängt. Die nach einigen Tagen in jenem Gehäuse zu findende Puppe hat eine glänzend schwarze Farbe und auf dem Rücken braunrothe Filzhaare; der nach drey bis vier Wochen auskriechende Schmetterling aber ist aschgrau, am Kopfe, Körper und an den Füßen sehr behaart, und auf den Vorderflügeln mit verblichenen Binden, schwarzen und braunrothen, ausgestreuten Punkten gezieret. Im Herbst legt das Weibchen seine Eyer, aus welchen auch die jungen Räupchen noch auskommen, aber erst im kommenden Jahre ihr Wachsthum vollenden, nachdem sie sich den Winter verkrochen hatten. Sie nähren sich dann von Wegrich, Klee, Löwenzahn, Eichen- Wollweiden- Schlehen- Rosen- Weißdorn- Pflaumen- und andern Laub der Obstbäume, und werden bey nahe überall in Europa, selbst in den kältern Gegenden, gefunden.

26. Die grosse Holzraupe. Tab. XII. Fig. 14. u. 15.

Larva Phalaenae Bombycis Cossi, subpilosa, incarnata: dorso sanguineo capiteque nigri, Romanis olim in deliciis, farina etiam saginata (Plin. XVII. 24.). *Pupa* antierius brunnea, posterius flava. *Phalaena* alis nebulosis, thorace posterius fascia atra, antennis lamellatis. L. S. N. T. I. P. V. p. 2431. n. 63. Faun. Suec. I. p. 812. n. 1114. — Habitat in ligno putrescente.

- | | |
|--|--|
| Aeliani de Natura animalium Lib. XIV. C. 13. | Geoffroy Hist. des Ins. Tom. II. p. 102. n. 4. |
| Albin natural history of Ins. Tab. XXXV. F. 56. | le Cossus. |
| Beckmanni Epit. Syst. Linn. p. 165. n. 63. | Gladbach's Catholicon, <i>Der Holzvogel</i> . |
| ejusd. Physic. ökon. Bibl. Th. VII. S. 293. | Gleditsch's Forstwiss. Th. II. S. 742. n. 33. |
| Berlinisches Magaz. B. II. S. 410. n. 24. <i>Der Weidenbohrer</i> . | <i>Weidenbohrer</i> . |
| Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 359. n. 13. | Goedarti Hist. Ins. II. Tab. XXXIII. |
| <i>Weidenraupe</i> . | Göze's Entom. Beytr. Th. III. S. 19 n. 63. <i>Weidenbohrer</i> . |
| Börner's Sammlungen aus der Naturgesch. Th. I. S. 157. Naturg. des Weidenbohrers aus Lyonets Traité. | Gronovii Zooph. p. 204. n. 837. |
| Cuvier Tableau élémentaire, p. 596. n. 9. <i>La rougeuse de bois</i> . | Jung's Verz. europ. Schmetterl. S. 36. |
| Degeer's Abh. z. G. d. Ins. v. Göz. B. I. Quart. 1. S. 29. Tab. II. F. 9. 10. B. II. Th. I. S. 268. <i>Die Kossusphaläne</i> . | Leske's Anfangsgr. d. Naturgesch. S. 460. n. 9. <i>Holzbohrer</i> . |
| Esper's europ. Schmetterlinge. Th. III. S. 303. Tab. LXI. <i>Die Kossusphaläne, die Weidenbohrerphaläne</i> . | Lesser's Insecto-theologie, S. 357. |
| Fabricii Mant. ins. II. p. 116. n. 83. Spec. Ins. II. p. 182. n. 63. Syst. entom. p. 569. n. 48. | Listeri Goedartus in method. redact. Fig. 39. |
| Füeflsly's Verz. schweiz. Ins. S. 36. n. 678. <i>Der Holzbohrer</i> . | Lyonet Traité anatomique de la Chenille, qui ronge le Bois de Saule, à la Haye, 4. 1760. Chap. XVI. p. 409. Ejusd. Theologie des Ins. T. I. p. 312. Note 6. Ejusd. Notes sur Lesser. T. I. Fig. 17 — 22. |
| | Merian in Europ. Insekt. Tab. XXXVI. |
| | Meyer's Naturgesch. der gift. Ins. Th. I. S. 159. <i>Weidenbohrer</i> . |
| | Mouffetti Theatr. ins. p. 196. Müll. |

Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. I. S. 673. n. 63.
Der Holzdieb.

Mülleri Faun. Frid. p. 40. n. 358. Zool. Dan.
Prodr. p. 119. n. 1372.

Neuer Schauplatz d. Nat. Th. IV. S. 73. Holzraupe,
Holzdieb.

Onomat. Hist. nat. P. III. p. 444. Die grosse fleisch-
und wurmförmige Holzraupe. P. VI. p. 345.

Petiveri gazoph. Tab. LI. Fig. 9.

Plinli Hist. Nat. Lib. XVII. Cap. 24.

Raji Hist. Ins. p. 150. n. 2. et larva p. 351. n. 25.

Reaumur Memoires des Ins. Tom. I. Part. I. Tab.
XVII. Fig. 1 — 5.

Rösel's Insektenbel. Th. I. Nachtv. Class. II. S.
113. Tab. XVIII. Die grosse Holzraupe, der Winden-
bohrer, Holzbohrer, Brunnvogel.

Schaefferi Icon. Ins. Rat. Tab. LXI. Fig. 1. 2.

Scopoli Ent. carn. p. 200. n. 500.

Sebae Thes. Tom. IV. Tab. 49. F. A. 1. 6. Tab.
51. Fig. m. m. de willige haut. Vil.

Syst. Verz. Wien. Schmetterl. S. 60. n. 1. Kopf-
weidenspinner.

Syst. Nat. de regn. An. II. p. 142. n. 4.

Stralsunder Magaz. Th. I. S. 256. Weidenholzraupe.

Wilkes-English Mots a. B. p. 15. Tab. II. a. b.

Von beträchtlicher Grösse, und einen wilden, finsternen Aussehen ist die Phaläne, welche unserer Raupe ihre Entstehung verdanket. Ihr Leib ist dick und überaus haaricht, der Brustschild hinter dem, beym Männchen mit stark gefiederten Fühlhörnern versehenen Kopf, mit einer gelblichten, bandartigen Einfassung, und in der Mitte mit einem irregulären aschgrauen Schilde gezieret, welcher gegen den Hinterleib zu, wieder durch eine gelblichte, in die quere laufende haarichte Wulst begrenzt wird. Der bräunlich graue Hinterleib ist mattgelb bandirt. Ähnliche graue Grundfarbe haben die Flügel, welche von schwarzen, hin und wieder unterbrochenen Adern durchzogen und auf den Vorderflügeln noch besonders durch weisse verblichene Flecken marmorirt sind. Das überaus fruchtbare Weibchen legt oft tausend und mehr Eyer von länglichrunder Form und hellbrauner Farbe in die Ritzen der Eiche, aus welchen die, in verschiedener Rücksicht merkwürdig gewordenen Holzraupen hervorkommen. Rajus und andere Naturforscher hielten sie nemlich für die *Cossos*, deren *Plinius* und *Aelian*, als einer der köstlichsten Speisen der alten Römer und indischen Könige gedenken. Allein, ihre abschreckenden Eigenschaften rechtfertigen *Klemanns* Behauptung, daß der *Cossus* der Alten, weit wahrscheinlicher die oben beschriebene Larve des Hirschschroters gewesen sey. Ausserdem hat *Lyonets* äusserst mühsame Zergliederung, diese Raupe noch in einen besonderen Ruf gebracht, wenn sie auch nicht in Rücksicht des Schadens gekannt zu werden verdiente, welche sie den Bäumen und selbst dem Menschen zufügt. Doch! wir wollen sie näher kennen lernen.

Die *Cossus*larve gehört unter die grössten europäischen Raupen, indem sie oft vier bis sechs Zoll lang angetroffen wird. Ihr ziemlich grosser, mehr flacher als runder Kopf, besteht aus zwey gewölbten Erhabenheiten, und einem, sich an das scharfe, auf jeder Seite mit einer kleinen Fühlspitze versehene Zangengebiss, anschliessenden Dreyecke. Der nach dem Kopf folgende erste Ring, ist unter allen

allen der breiteste und mit zwey hornartigen, schwarzbraunen Flecken versehen. Alle auf ihn folgende Ringe werden immer schmaler, je mehr sie sich dem Schwanzringe nähern. Sie sind alle ziemlich flach, und nur auf dem Rücken wenig gewölbt, an jeder Seite über den Füßen, mit einem erhabenen Rand eingefasst, über welchem, in der Mitte jedes Rings, ein bräunlichter Punkt steht. Die Farbe des Kopfs ist schwarzröthlicht, die des ersten Rings, der Seiten des Leibes und der Bauchfläche, rothgelblicht, die des zackichten, mit dem zweyten Ring anfangenden, breiten, und durch gelbe Zwischenlinien unterbrochenen Rückenstreifs, bluthroth, die der sechs spitzigen Vorderfüsse mehr braun, der acht Mittel- und zwey Hinterfüsse rothgelb, wie die Grundfarbe des Körpers. Sie hat ein überaus hartes Leben, und kann nach *Blumenbach* etliche Stunden lang im luftleeren Raume und mitten im Sommer fast drey Wochen lang unter dem Wasser ausdauern. Zur Vollendung ihres Wachsthum und ihrer Verwandlung braucht sie zwey bis drey Jahre und häutet sich in ihrem Raupenstande achtmal. Das Gehäuse, worinnen sie die Puppengestalt annimmt, bildet sie mittelst ihres Spinnsafts aus den abgenagten und zermalmten Theilchen der Eichenrinde und giebt ihm hierdurch eine Festigkeit, die die ähnlicher Raupengespinste weit hinter sich läßt. Die Puppe selbst ist überaus höckericht, hat sehr tiefe Einschnitte zwischen den Ringen des Hinterleibes, an dem sehr festen und harten Vordertheile eine braunrothe, am Hintertheile eine goldgelbe Farbe. Ihre Bewegfertigkeit und Kraftäusserung zu der Zeit, wo die Phalene ihre Hülse verlassen will, welches gewöhnlich in der dritten, vierten Woche geschieht, verdient in der That Bewunderung. Sie besitzt nemlich das Vermögen nicht nur das überaus feste Puppengehäuse mit dem Kopfe zu durchbrechen und sich durch die gemachte Öffnung heraus zu drängen, sondern auch bisweilen einen langen Weg aus dem Inneren des Baumstamms, wo die Raupen gemeiniglich die Puppengehäuse anzulegen pflegen, nach aussen, gegen die Öffnung ihrer verborgenen Gänge in der Baumrinde, zurückzulegen. Hier durchbricht erst die Phalene die Puppenhülse und kommt in oben beschriebener Gestalt zum Vorschein.

Der gewöhnlichste Aufenthalt der Cossusraupen sind die Weidenstämme, ausserdem findet man sie aber auch in den Ulmen- Pflaumen- und Apfelbäumen, welche sie durhöhlen und unter der Eichenrinde, in deren festes Holz sie sich sogar einnagen. Sie leben von den zermalmten und mittelst ihres beygemischten Safts verdaulich gemachten Holztheilchen, und fressen sich unter einander selbst auf, wenn ihnen die angemessene Nahrung fehlt. Werden sie auf irgend eine

Art beunruhiget oder gereizt; so beissen sie nicht nur mit ihren starken Kinnlädern sehr empfindlich, sondern speyen auch einen dicken, öligten, braunrothen Saft (Tab. XII. Fig. 14. a.) aus, dessen äusserst ekelhafter Geruch oft zwey Tage nicht von den Händen zu bringen ist. *Lyonet* schreibt ihm eine corrosive Beschaffenheit zu, und glaubt, daß seine Bestimmung sey, das Holz zu erweichen, damit es leichter abgenagt werden könne und die Verdauung desselben im Nahrungskanale zu befördern. Dieser Saft ist in zwey länglichten wurstähnlichen Behältnissen (Fig. 15. c. c.) enthalten, welche unter dem grossen Darm liegen und wird durch zwey enge Kanäle (b. a. b. a.) in den Mund geführt. Zu dem andern Ende der Saftbehältnisse aber, gehen sehr feine weisse Gefässe (d. d.), welche wahrscheinlich die in jenen Saft zu verwandelnden Feuchtigkeiten zuführen. Einen ähnlichen, äusserst widerwärtigen Geruch, wie der Saft, verbreiten die Raupen selbst. Verflorbenen Sommer brachte man einige in einen ziemlich grossen Saal, um sie als unbekannte Thiere vorzuzeigen. Man sah sich aber genöthigt, Fenster und Thüren zu öffnen, um den hinterlassenen Gestank zu entfernen, und ohngeachtet die Stellen, wo sie ihren Saft hingespeyet hatten, mehrmals gewaschen und abgerieben wurden, so bemerkte man doch mehrere Tage noch in jener Gegend des Saals einen ekelhaften Geruch.

27. Die Sonderlingsraupe. Tab. XII. Fig. 16 — 19.

Larva Phalaenae Bombycis Antiquae, fasciculis pilorum, in dorso quatuor albis, antennarum et caudae obscuris, polyphaga. *Pupa* nigro luteoque varia, 14 dies quiescens. *Phalaena* alis primoribus ferrugineis, lunula alba anguli posterioris, femina aptera. L. S. N. T. I. P. V. p. 2439. n. 56. Faun. Suec. n. 1120. — Habitat in crataego, pruno, tilia, alno, mare feminam copula nexam in arborem portante.

Aeta Upsal. 1736. p. 25. n. 74.
Albin natural history of Ins. Tab. XXVI.
Atlas Hamburg. Magaz. B. I. St. 6. S. 167.
Beckmanni Epit. Syst. Linn. p. 164. n. 56.
Berlinisches Magaz. B. II. S. 408. n. 21. Der Lastträger.
Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 358. n. 11.
Ph. Antiqua.
Borkhausen's Europäische Schmetterlinge, Th. III. S. 333.
Brahm's Insektenkalender, Th. II. S. 411.
Catholicon Lit. A. p. 372.
Cuvier Tableau élémentaire, p. 596. n. 8. L'étoilée.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. I. Quartal 2. S. 33, Tab. XVI. F. 1. 2. 3. etc. B. II. Th. I. S. 208. Die schwarze Raupe mit vier gelblichen Rückenbürsten, fünf schwarzen Haarpinseln und rothen Knüpfen.
Phalene paradoxe, das Paradoxum.
Esper's Europ. Schmetterl. Th. III. S. 278.
Der antique Spinner, Spinner der Alten, der Sonderling.
Fabricii Mant. Ins. II. p. 130. n. 189. Spec. Ins. T. II. p. 201. n. 136. Syst. Ent. p. 584. n. 98.
Fuefsly's altes Magaz. B. II. S. 4. neues Mag. B. II. S. 73. Schweiz. Ins. S. 35. n. 673. Der Lastträger.
Geoffroy Hist. d. Ins. Th. II. p. 119. n. 23. L'étoilée.

Glad-

- Gladbach's Calend. *Das Esparcettvögelchen.*
 Gleditsch's Forstwiss. Th. I. S. 549. n. 4.
 Goedarti Ins. Ed. List. p. 185. n. 78. Fig. 78.
Eruca miranda.
 Jung's Verz. europ. Schmett. *Bomb. Antiqua.*
 Mader's Raupencal. S. 32. n. 79. *Lastträger,*
Sonderling.
 Merian in Europ. Insekt. Tab. VIII.
 Meyer's Naturgesch. d. giftigen Ins. Th. I. S. 169.
Der Apricosenspinner.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 670.
 n. 56. *Sonderling.*
 Mülleri Faun. Fridr. p. 41. n. 366. Zool. Dan.
 Prodr. p. 118. n. 1369.
Naturforscher Stück V. S. 253.
Onomatologia Hist. nat. P. VI. p. 316. *der Sonderling.*
- Raji Hist. Ins. I. p. 344.
 Reaumur Mem. T. I. S. 1. Mem. 7. p. 409.
 Tab. XIX. Fig. 4. 5.
 Rüssel's Insektenbelust. B. I. Nachtv. Kl. II. S. 225.
Die mit rothen Knöpflein gezeirte, graue Bürstenraupe.
 Tab. XXXIX. F. 4. u. B. III. S. 81. Tab. XIII. F. 3.
 4. Im B. II. Part. 1. Mem. 3. S. 292. nennt ihn Klee-
 mann das *Paradoxum*, weil das Weibchen keine Flügel hat.
 Schwanmerdam's Bib. d. Nat. S. 224. Tab.
 XXXIII.
 Scopoli Entom. carn. p. 198. n. 486.
 Syst. Nat. du regne Animal. II. p. 146. n. 18.
la Chenille à brosses sur le Prunier.
 Systematisches Verz. Wien. Schmett. S. 55. Fam. G.
 n. 5. *Aprikosenspinner-Raupe.*
 Wilkes engl. Mots. a. B. p. 30. Tab. III. C. 1.

Die Raupe der *Phalaena Antiqua* gehört ebenfalls unter diejenigen Schmetterlingslarven, welche in den meisten Gegenden unsres Welttheils, vorzüglich in den Monathen Junius und Julius zu finden sind. Sie ist überaus gefressig und nährt sich ohne Unterschied von Hasel- Pflaumen- Birn- Schlehen- Linden- Woll- und Bruchweiden- Ulmen- Erlen- Eichen- Himbeer- und Pfirsig- Blättern, und man trifft sie daher bald auf diesen, bald auf jenen Stauden und Bäumen an. Die männliche, blos durch ihre Grösse von der weiblichen unterschiedene Raupe, ist kaum einen Zoll lang, die weibliche hingegen erreicht oft eine Grösse von 16 bis 18 Linien. Der ganze Körper der Raupe hat vom Kopf bis zum Schwanzende beynahe gleiche dicke und eine fast viereckigte Gestalt, durch die leistenförmigen Einfassungen des Rückens und der Seiten des Leibes über den Füßen (Fig. 16). Die Farbe des Kopfs und der Rückenfläche vom vierten bis siebenten Ring ist sammetschwarz, von diesem bis zum eilften Ring rothbraun, die Grundfarbe des übrigen Körpers ein in's Violette fallendes Grau und die der Füße lichtbraun. Über dem Kopfe hängen die grauen Haare des ersten Rings herein, aus welchen zu beyden Seiten zwey lange schwarze Haarbüschel (*a. a.*) hervorkommen und noch über die zwey kleineren auf dem Kopf selbst stehenden grauen Haarbüschel nach vorne hervorragen. Die drey ersten Ringe sind von der Rückenseite mit Reihen hochrother Wärzchen umzogen, dergleichen Wärzchen auch an jeder Seite des Leibes in zwey Reihen bis an den Schwanzring fortlaufen. Dem Boden parallel stehen ganz unten auf jeder Seite des vierten Rings ein weißgelber (*b. b.*), und in eben der Gegend des fünften Rings ein ebenfalls auswärts gerichteter schwarzer Haarbüschel (*c. c.*), auf dem Rücken dieser beyden und der zwey folgenden Ringe aber vier gelbe kurze Haarbüschel. Oben auf dem neunten und zeh-

zehnten Ring sitzt eine hellrothe, konische Warze, welche die Raupe bisweilen einwärts zieht, bisweilen hervortreibt. Der eilfte Ring führt oben einen schwarzen ziemlich langen und dicken Haarbusch (*d.*), der, wie das Schwanzhorn der Wolfsmilchraupe, schreg nach hinten gerichtet ist, unten hingegen noch vier kürzere und dünnere Haarbüschgen. Übrigens ist auch der ganze Körper, ausser diesen Haarbüscheln und Bürsten, mit langen grauen Haaren besetzt.

Ehe sich die Raupe verwandelt, macht sie um sich ein graues, mit Haaren vermengtes Gewebe von eyrunder Form, und nach einigen Tagen findet man an ihrer Stelle die Puppe, welche von der männlichen Raupe, kleiner, gelb und rothbraun, von der weiblichen aber hellgelb und mit schwarzbraunen Binden umzogen ist. Die nach acht bis zehn Tagen auskriechende Phalene gehört unter die wenigen, welche in Rücksicht des weiblichen Geschlechts eine merkwürdige Abweichung machen. Nicht wie das Männchen, welches breite, stark gefiederte Fühlhörner, einen bräunlich grauen Körper, zwey dunkelzimmtbraune, mit zwey weissen Fleckchen bezeichnete Vorder- und zwey hellzimmtbraune Hinterflügel hat, ist auch das Weibchen mit einem vom Hinterleibe unterschiedenen Bruststücke und vier Flügeln versehen; sondern es hat, ausser dem Kopf, den zwey kurzen Fühlhörnern und den sechs Füßen, gar nichts ähnliches von einer Phalene. Der in eilf Ringe getheilte aschgraue und wollhaarichte Körper wird gleich hinter dem Kopf unförmlich dick und läuft gegen das Schwanzende etwas spitzig zu, wo er noch mit einer beweglichen Spitze versehen ist, welche die weibliche Phalene immer aus und einziehet. Bey der Begattung hängt sie in entgegengesetzter Richtung an dem Schwanzende des Männchens, und dieses schlept jene mit sich von einem Baume zum andern. Fünf bis sechs Tage nach der Begattung legt das Weibchen oft drey bis vierhundert weisse Eyer, aus welchen die jungen Raupen, bisweilen schon im Merz, gewöhnlich aber im May hervorkommen.

Die Haare gegenwärtiger Raupenart sind vorzüglich geschickt, sich in unsre Haut festzusetzen und, durch den Reiz auf die Hautnerven, ein unleidliches Jucken und Brennen zu verursachen. Sie sind nach *Degeer's* mikroskopischen Untersuchungen alle mit Nebenhaaren (Fig. 19.) versehen, die mit ihren Spitzen nach dem Ende des Stammhaares gerichtet sind. Noch längere Nebenhaare (Fig. 18.) als die übrigen Leibhaare, haben die auf den Wärzchen (Fig. 17. *a.*) stehenden langen Haarbüschel, an welchen sie (*b.*) schon durch die bloße Lupe sichtbar werden. Diese müssen nothwendig immer tiefer von allen Seiten in die Haut eindrin-

dringen und durch ihre kleinen Wiederhaken um so mehr den Reiz unterhalten, je mehr man sich, durch das Reiben der verletzten Stelle, Erleichterung zu verschaffen sucht.

28. Die Riesenwespe. Tab. XIII. Fig. 9—13.

Sirex Gigas, abdomine basi apiceque flavo, corpore nigro. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2671. n. 1. Faun. Suec. n. 1573. Act. Stockh. 1739. T. III. F. 7. —

Habitat in Europae arboribus coniferis.

Abhandl. d. kais. Akad. d. Naturforsch. Th. X. S. 252. Tab. H. Fig. 6. und Th. XIV. S. 82. *Insectum novum Czerkiense*.

Amoreux Notice des Ins. venim. p. 256.

Bechsteins Musterung schädlich geachteter Thiere, S. 179. *Die grosse Holzwespe, Riesenwespe, grösste Schwanzwespe*.

Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 368. n. 1.

Bomare Dict. T. XII. p. 317.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 508. *le grand urocère*.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze Th. I. Quartal 4. S. 19. Tab. XXXVI. F. 1—5.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 257. n. 1. Spec. Ins. I. p. 418. n. 1. Syst. Ent. p. 325. n. 1.

Fränkische Sammlungen, Band IV. S. 252.

Fuefslly's schweiz. Ins. S. 48. n. 930.

Geoffroy Hist. d. Ins. de Paris, T. II. p. 265. Tab. XIV. Fig. 3. *Uroceros*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 837. n. 1. *Die Riesenwespe*. Tab. XXVI. F. 1. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 70. n. 613.

Onomatol. Hist. nat. T. VII. p. 185. *Die grösste Holzwespe*.

Podá Mus. graec. p. 104. Tab. I. Fig. 6.

Reaumur Mém. pour Serv. à l'hist. d. Ins. Tom. VI. P. II. Mem. IX. p. 312. Tab. XXXI. Fig. 1. 2. 5.

Rösel's Insektenbel. B. II. Samml. der Hummeln, S. 37. Tab. VIII. IX. *Die grösste Holzwespe*.

Schaefferi Icon. Ins. Rat. Tab. X. Fig. 2. 3. Elem. Ent. Tab. I. Fig. 2. Tab. XIII. Fig. 7.

Scopoli Entom. Carn. p. 739.

Sebae Thes. Tom. IV. Tab. LIII. Fig. 15.

Sulzer's Gesch. der Ins. S. 186. Kennz. T. VIII. Fig. 114. *Die Riesin*.

Die Eyer, aus welchen dieses Insekt entstehet (Fig. 9.) sind blaßgelb und spindelförmig. Aus denselben entwickeln sich kleine madenförmige Larven, welche nach und nach zu einer Grösse von einem, bis anderthalb Zoll heranwachsen, und dann (Fig. 10.) einen runden Kopf, zwölf oben convexe und unten flache Ringe, ein dickes faltiges, mit einer kleinen Spitze versehenes Schwanzende, und sechs Vorderfüsse haben. Diese sich immer im weichen Holz der Tannen, Fichten und Föhren aufhaltenden Larven sind von blaßgelber Farbe und häuten sich einigemal vor ihrer Verpuppung. Sie umspinnen sich vor letzterer mit einem weißlichen Gewebe, nicht weit von der Rinde des Baums, in dessen Stamm sie sich aufgehalten haben. Die gelblichtbraunen Puppen (Fig. 11.) geben in ihrer Gestalt alle Theile des künftigen Insekts deutlich zu erkennen, zeitigen im Sommer schon nach drey Wochen, überwintern aber, wenn die Larven sich erst im Herbste eingesponnen haben. Das vollkommene Insekt (Fig. 12.) hat eine beträchtliche Grösse,

Grösse, einen grossen, schwarzen Kopf, der hinter den runden, erhabenen Augen gelb ist, und drey kleine glänzende Knöpfchen oder vielleicht kleine Augen, zwischen den grossen Augen und den zwey langen, orangengelben, zwey und zwanzig gliedrichten Fühlhörnern. An dem dicken, schwarzen und rauhen Bruststücke sind die zwey langen Vorder- und zwey kurzen Hinterflügel befestiget, welche sämmtlich bräunlichgelb, durchsichtig und mit starken Adern durchzogen sind. Der lange Hinterleib besteht aus zwey kurzen orangegelben, dann drey breiteren schwarzen, und eben so viel gleichfalls orangegelben Ringen, wovon der letzte in eine gelbe, spindelförmige Spitze ausläuft, unter welcher ein viel längerer dünnerer, sehr steifer, dunkelbrauner Stachel bey dem Weibchen hervorragt. Dieser Stachel (Fig. 13. c.) ist gegen die Spitze zu mit Wiederhäckchen versehen, und liegt zwischen den zwey rinnenförmig ausgehöhlten Blättern einer, an ihrem Grundtheile (a.) dicken und in der Mitte der Blätter zwey eckigte Hervorragungen (b. b.) führenden Scheide. Er fehlt dem männlichen Insekten, welches überhaupt um die Hälfte kleiner ist und am Schwanzring nur eine kurze Spitze hat. Übrigens findet in Rücksicht der Gestalt des Körpers und der Flügel, der sechs langen mit Krallen versehenen Füsse und der Farbe, keine besondere Verschiedenheit bey beyden Geschlechtern Statt, ausser daß die Ringe des Hinterleibes, welche bey dem Weibchen schwarz sind, bey dem Männchen gelb und umgekehrt die gelben schwarz sind, und daß die ganz gelben Füsse des Weibchens bey dem Männchen hin und wieder schwarze Stellen haben.

Die Riesenwespe kommt seltner in Frankreich, häufig in der Schweiz, in Teutschland, in Schweden, in den nordischen Ländern und, nach *Reaumur* vorzüglich in Lappland vor. Man kann annehmen, daß sie überall zu Hause ist, wo Fichten- Föhren- und Tannenwälder sind. Sogar hält sie sich in solchen Gegenden auf, wo bloß dergleichen gefälltes Holz liegt. Ihre Fühlhörner und Flügel sind, wie bey den Ichneumoniden, in einer beständig zitternden Bewegung, und ihr Flug ist geräuschvoller, als der der Hornisse und Hummeln.

Über die Schädlichkeit und Unschädlichkeit derselben sind die Meinungen der Naturforscher, wie bey vielen andern Insekten, ebenfalls getheilt. Enthusiastische Bewunderer der Natur, denen jeder Gedanke der Schädlichkeit eines Geschöpfs überhaupt unerträglich ist, erklären die Riesenwespe für völlig unschädlich, und halten den weiblichen Stachel, bloß für das Instrument, womit sie einen schicklichen Ort für ihre, zwischen der Schwanzspitze und dem Stachel hervorkommenden Eyer aussucht und zugleich eine Öffnung bohrt, in welche sie diese

Eyer

Eyer legte. Andere aber, die mit mehr Unbefangenheit ihre Beobachtungen unternommen, und bemerkt haben, mit welcher Wuth dieses Insekt seinen Raub verfolgt, wie es sich wendet, krümmt und zu stechen bemüht, wenn man es bey den Flügeln ergreift, konnten wegen seiner Schädlichkeit nicht zweifelhaft seyn. Im Voigtlande, war es zu der Zeit, als die Larve der *Phalaena Monacha* ihre Verheerungen in den Fichtenwäldern anrichtete, ein grosser Feind dieses Schmetterlings, den es im Flug begierig weghaschte, und es ist glaublich, daß dasselbe, wenn es sich zu einer heissen Jahreszeit, oder in einem wärmeren Klima in grosser Menge einfindet, ganz so nachtheilig werden kann, wie *Amoreux* versichert. „Der *Sirex Gigas*, schreibt er, verursacht durch seinen Stich eine Geschwulst, die so schnelle Fortschritte macht, daß sie in zwey bis drey Tagen die Verwundeten weggrafft. Man kann hier nur durch das Ausschneiden der verwundeten Stelle und das Scarificiren der Geschwulst, Hülfe leisten, die in eine starke Eiterung gesetzt werden müssen, um der Materie Ausgang zu verschaffen.“ Höchst wahrscheinlich war auch das *Insectum novum Czerkiense* nichts anderes, als unsre Riesenwespe, wenigstens kommen Beschreibung und Abbildung beyder Insekten beynahe ganz mit einander überein. In dem Städtchen *Czerko* an der schlesischen und polnischen Grenze, und in der umliegenden Gegend, fanden sich nemlich im Sommer des Jahres 1679 unbekannte Insekten ein, welche mit starkem Geräusch auf Menschen und Thiere fielen und sie tödtlich verwundeten. Es starben davon 35 Menschen und eine grosse Menge Ochsen und Pferde innerhalb vier Wochen. Sie verwundeten, ohne gereizt zu werden, die blosliegenden Theile des Körpers, z. E. das bey den Pohlen abgeschorene Haupt, Gesicht, Hals und Hände. Gleich auf dem Stich folgte eine harte Geschwulst, und wenn die Wunde nicht in den ersten drey Stunden besorgt und das Gift durch Scarification oder auf eine andere Art herausgezogen wurde; so war alle fernere Hülfe vergebens und die Verletzten starben in wenig Tagen.

29. Der gelbe Raupentödter. Tab. II. Fig. 2. 3.

Ichneumon luteus, thorace striato, abdomine falcato. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2706. n. 55. Faun. Suec. 1628. — Habitat in Europae, novae Hollandiae, novae Seelandiae larvis, praesertim phalaenarum, larva larvae adhaerente.

Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 369. n. 3. Cuvier Tableau élémentaire, p. 506. <i>L'ichneumon jaune</i>. Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, Band II.	Th. 2. S. 169. n. 5 Tab. XXIX. F. 15—26. <i>Ichneumon faucille jaune</i>, die gelbe Sichel schlupfwespe. Der Drontheimischen Gesellsch. Schriften, B. III. S. 380. n. 47. <i>Ichneumon luteus</i>.
---	---

- | | |
|---|--|
| <p>Fabricii Mant. Ins. I. p. 268. n. 113. Spec. Ins. I. p. 435. n. 95. Syst. Ent. p. 341. n. 75.</p> <p>Fischer's Naturgesch. v. Livland, S. 159. n. 393. <i>gelber Raupentödter</i>, <i>Gelbschnabel</i>.</p> <p>Fuefslly's Verz. schweiz. Ins. S. 49. n. 964.</p> <p>Geoffroy Hist. d. Ins. T. II. p. 330. n. 21. <i>L'Ichneumon jaune à ventre en faucille</i>.</p> <p>Goedarti Ins. Tom. II. Tab. XXXVII.</p> <p>Listeri Ed. Goedarti p. 59. Tab. XX. F. c.</p> | <p>Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 357. n. 55. <i>Der Gelbschnabel</i>.</p> <p>Mülleri Faun. Frid. p. 71. n. 620. Zool. Dan. Prodr. p. 158. n. 1843.</p> <p>Raji Hist. Ins. p. 253. n. 6. <i>Vespa-Ichneumon major</i>.</p> <p>Schaeffer Ic. Ins. Ratisb. Tab. I. F. 10. T. CI. F. 4.</p> <p>Sulzers Gesch. d. Ins. S. 190. <i>Der Gelbschnabel</i>.</p> <p>Kennzeich. d. Ins. T. XVIII. Fig. 118.</p> <p><i>Wittenbergisches Wochenblatt</i> aufs Jahr 1786. S. 193. <i>Kankerfliege</i>.</p> |
|---|--|

Man hat das ganze Geschlecht dieser Insekten mit den Namen *Ichneumon* oder *Raupentödter* belegt, weil es ihnen eigen ist, andere Insekten, und vorzüglich die Raupen, mit ihrem Stachel zu verletzen und in die gemachte Wunde ihre Eyer zu legen. Die aus diesen Eyern auskriechenden Larven nähren sich von den Säften und der Substanz der Raupen, worüber letztere nothwendig zu Grunde gehen. Auch unser *Ichneumon* hat diese Lebensweise. Seine Raupen tödten Larven sind länglichtrund, weißgrau von Farbe und längst dem Rücken mit einem dunkelgrünen Streif bezeichnet. Ihr runder unbeweglicher Kopf hat zwey kleine braungelbliche Zähne, womit sie sich in die Haut der Raupen einbeissen und diese dann aussaugen. Auf diese Art leben und gedeihen sie vorzüglich in dem Körper der Gabelschwanzraupe. Die Larven verwandeln sich in kurzer Zeit in Puppen, an welchen die Gestalt des *Ichneumon*s Körpers nicht zu verkennen ist. Das aus letzteren hervorkommende Insekt (Tab. II. Fig. 2.) hat zwey netzförmige, kupfergrüne Augen, zwey vor denselben stehende, lange, gegliederte braune oder ockergelbe Fühlhörner, ein dickes, nicht allzulanges Brustschild, einen, bey seinem Anfange am Brustschild, sehr dünnen, gegen das Ende aber immer breiter werdenden, und von beyden Seiten, wie eine Sichel, flachgedrückten Hinterleib, beyde von gleicher ockergelben Farbe, zwey lange durchsichtige, mit Adern durchzogene Vorderflügel, zwey ähnliche, kürzere Hinterflügel und sechs lange, ockergelbe Füße. Ausser seiner beträchtlicheren Grösse, unterscheidet sich das Weibchen noch besonders durch seinen braunen Schwanzstachel von dem Männchen. Dieser Stachel ist eine kegelförmige, einer Linie lange Spitze am letzten, oben mit zwey länglichten Warzen (*d. d.*) besetzten Ringe des Hinterleibes, und besteht aus drey Stücken (Tab. II. Fig. 3.), nemlich dem Mittelstücke, oder der eigentlichen Lanzette (*a.*), welche schon unter dem sechsten Ring (*b.*), ihren Anfang nimmt, hornartig und braunroth ist, und den zwey Seitenstücken (*c. c.*), die eine concave Innenseite haben und mithin geschickt sind, das Mittelstück wie in einer Scheide aufzunemen, wenn sie sich schliessen. Von aussen sind beyde

beyde Halbfutterale mit braunschwärzlichen Haaren bewachsen, und daher ziemlich rauh.

Wird das Insekt gereizt, so treibt es das im Ruhestand zum Theil noch im Hinterleibe verborgene und daselbst (b.) bogenförmig gekrümmte Mittelstück oder die Lanzette noch weit über die beyden Halbscheiden hervor, und sticht damit sehr empfindlich. Auch andere Ichnevmonsarten verletzen auf ähnliche Art und die *Kankerfliege*, welche sich bey Rathenow, im Havelländischen Kreise und in der Altmark im Jahre 1786 in ungeheurer Menge eingefunden hatte und von welcher man glaubte, daß sie durch den Wind aus einer entfernten Gegend herbeygeführt worden sey, war, nach aller Beschreibung, nichts als ein Ichneumon. Der Stich dieses Insekts war so giftig, daß gleich Knoten und Beulen darauf entstanden, und das gestochene Thier in vier und zwanzig Stunden sterben mußte, wenn es die schmerzhafteste Stelle beleckt hatte. Auch barfußgehende Menschen wurden davon gestochen, und es schwollen ihnen hierauf die Beine, manchen auch der Unterleib. Doch erholten sie sich nach etlichen Tagen ohne Mittel wieder. Zwey Mannspersonen im Havelländischen Kreise, die an dem Munde gestochen worden, mußten aber sterben, weil sie mit ihren Zungen die gestochenen Stellen berührt und also wahrscheinlich das von dem Insekte mit in die Wunde gelassene Gift eingesogen hatten.

30. Die Sandwölberin. Tab. II. Fig. 4. — 6.

Sphex sabulosa nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato, segmento secundo tertioque ferrugineis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2723. Faun. Suec. n. 1648. — Habitat in Europae terra sabulosa, ubi canis instar pedibus anticis cuniculum fodit larvamque phalaenae s. araneae semimortuam in eo sepe lit, cui ovulum concredit, quo facto orificium terra claudit.

Allgem. Magaz. der Natur, B. IX. S. 345.
 Altes Hamb. Magaz. B. I. St. 6. S. 171. *Sackwespe*.
 Cuvier Tableau Élémentaire, p. 499. *le Sphex du Sable*.
 Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. II. Th. I. S. 70. *Der Sandwölber*, B. II. Th. II. S. 148. Tab. 28. Fig. 7 — 17. *Guêpe - Ichneumon du Sable, der Sandraupentödtler*.
 Diction. des Anim. Tom. II. p. 25. *Mouche devorante*.
 Fabricii Mant. ins. I. p. 273. n. 1. Spec. ins. I. p. 442. n. 1. Syst. Ent. p. 346. n. 1.
 Frisch's Ins. Teutschl. Th. II. S. 6. Tab. I. F. 6. 7. 8. *Die Sandwespe der ersten Größe*.

Fuefsly's Verz. schweiz. Ins. S. 50. n. 992. *Der Sandgrüber*.
 Geoffroy Hist. d. Ins. Tom. II. p. 349. n. 63. *L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant et à long pédicule*.
 Goedarti Hist. Ins. P. I. Exp. 8. *Devorator*.
 Kob's Naturgesch. der Forlphaläne, S. 55. Tab. II. Fig. 15. *Die Sandbastartwespe*.
 Lister's Naturgesch. d. Spinnen von Martini und Göze, S. 49.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 864. n. 1. Tab. XXVI. Fig. 11. *Der Sandwölber*.

Müller's Fauna Fridr. p. 72. n. 627. Zool. Dan.
Prodr. p. 160. n. 1861.

Onomat. Hist. Nat. P. III. p. 613. *Devorator*. P. VII.
p. 228. *Die Sandwölberinn*.

Schaeffer's Elem. Ent. T. VIII. Fig. 2. Icon.
Ins. Rat. Tab. 83. Fig. 1.

Schwammerdam's Bib. d. Nat. S. 252. *Der
Verschlinger, Spinnenmörder*.

Scopoli Ent. carn. p. 770.

Sulzer's Kennzeichen der Insekten. Tab. XIX.
Fig. 120.

Viele Ähnlichkeit mit den Raupentödtern hat gegenwärtiges Insekt, (Tab. II. Fig. 4.), welches sich von jenem nur durch die Fühlhörner und den verborgenen weiblichen Stachel unterscheidet. Es ist ohngefähr zehn bis eilf Linien lang, hat einen ziemlich grossen Kopf, zwey zwölfgliedrichte, fadenförmige Fühlhörner zwischen den grossen netzförmigen Augen, einen aus zwey Klappen bestehenden, vor und rückwärts beweglichen Saugrüssel, ein dickes, schwarzes, rauhes Brustschild, an dessen obern und vordern Theil die zwey kurzen, bräunlichen Flügel sitzen und an dessen Bauch- und Seitenfläche die sechs schwarzen Füsse eingelenkt sind. Von diesen sind die vordersten die kürzesten, die mittlern etwas länger und die hintersten die längsten. Alle sind am letzten Gliede des Fufsblatts mit zwey Haken versehen. Der Hinterleib hängt mit dem Brustschilde durch einen, beym Weibchen braunröthlichen, beym Männchen ebenfalls schwarzen Hals oder Stiel zusammen, dessen Vordertheil kurz und rund, dessen Hintertheil aber lang und kolbenförmig ist. Auch der erste und zweyte Ring des Hinterleibes ist beym Weibchen braunröthlich oder rostfärbig, der hintere, spitzig zulaufende Theil aber schwarz. In letzterem (Fig. 5.) ist der Stachel (*b.*) verborgen, den sie mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit hervorstrecken kann. Er ist (Fig. 6. *a.*) weit länger als bey den eigentlichen Ichneumonarten, dünne, etwas nach unten gekrümmt, sehr spitzig, braun und hornartig, liegt im Leibe zwischen zwey gelblichen Halbscheiden (*b. b.*), die in der Mitte etwas dicke und aufgetrieben, am Ende abgerundet und behaart sind. Alle diese Theile stehen mit einem dicken muskulösen Theil (*c. d. e. f.*) in Verbindung, der den Stachel in Bewegung setzt. Dieser Stachel ist eigentlich selbst nur ein hornartiges Futteral welches zwey äusserst feine gebogene Stilets verbirgt, die sich noch hinter dem Grundtheile jener Halbscheiden, um jenen muskulösen Theil (*c. d. e.*) herumziehen. Will das Insekt seinen Stachel austossen; so öffnet sich der letzte, nach der Länge des verborgenen Stachels getheilte Ring des Hinterleibes (Fig. 5. *c.*), und das hervorgestossene Stilet bewegt sich nun rechts und links, und sticht so empfindlich in den ihm vorkommenden Theil der Haut, daß es gefährlich ist, dieses Insekt in die bloße Hand zu nehmen. Der Aufenthalt desselben sind alle

san-

sandige Gegenden unsres Welttheis; denn sein Instinkt bringt es mit sich, im sandigen Boden Löcher und Kanäle zu graben, in welche es die vorher getödteten Raupen, Spinnen und anderen Insekten und Insektenlarven schleppt, dazu seine Eyer legt, damit die aus demselben hervorkommende Nachkommenschaft gleich ihren Unterhalt findet, und nun das Loch wieder mit den Hinterfüßen zuscharret.

31. Die Hornisse. Tab. II. Fig. 7. 8.

Vespa Crabro, thorace nigro anterieus rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2750. n. 3. Faun. Suec. n. 1670.

Amoen. ac. Vol. III. p. 343. — Habitat in Europae arboribus cavis et sub earum radicibus, apibus insidians.

- | | |
|---|---|
| <p>Aldrovandi de animalibus Insectis, p. 225.
 Amoreux Notice des Ins. p. 99. und 250. <i>Guépe - Frelon</i>.
 Ardoynus de Venenis, Lib. VIII. Cap. 12.
 Berthelot diss. de venen. Gall. Animal. Monspel. 1763. p. 7 et 17.
 Blumenbach's Handbuch d. N. G. S. 371. n. 1.
 <i>Vespa Crabro</i>, die Hornisse, Engl. the Hornet.
 Catholicon A. p. 364. <i>Anthrène, Anthrenus</i>, die ungeflügelte Hornisse.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 495. <i>le Frélon</i>.
 Degeer's Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. II. Th. 2. S. 132. Tab. XXVII. F. 9. 10. <i>Grand-Frelon, Horn-eifs, Hornaufs, Hörlitze, Hornischer</i>; niedersächs. <i>Hornker, Negenmürder</i>.
 Eberhard's Versuch einer neuen Thiergesch. S. 214. §. 246. <i>Crabro</i>, Kolbenfliege mit kolbenähnlichen Fühlhörnern.
 Fabricii Mant. ins. I. p. 287. n. 9. Spec. Ins. I. p. 459. n. 8. Sect. Ent. p. 364. n. 8.
 Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 282. <i>Malebouse</i>.
 Fischer's Naturgesch. v. Livland, S. 159. n. 396. <i>Hornifs. Lett. Dunderis. Ehstn. Walane</i>.
 Frisch's Ins. Teutschl. Th. IX. S. 21. Tab. XI. F. I.
 Fuefsly's Verz. schweiz. Ins. S. 51. n. 985. <i>Hornisse</i>.
 Geoffroy Hist. des Ins. de Par. Th. II. p. 368. <i>la Guépe - Frelon</i>.
 Gmelin's Gesch. d. Gifte, Th. I. S. 298. <i>Hornüsse</i>.</p> | <p>Göze's Gesch. schäd. Insekten, S. 117.
 Maraldi in Mem. de l'Ac. R. des Sc. 1712. p. 303.
 Mouffetti Theatr. Ins. 50.
 Muralto Anatomia Crabronis in Eph. N. C. Dec. II. ann. 1. Obs. 56. p. 139.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 880. n. 3. Tab. XXVII. Fig. 2. <i>Hornisse</i>, Holl. <i>Hornaar</i>, Schwed. <i>Bolgetting</i>, Griech. <i>ὁ Σφήν</i>.
 Mülleri Faun. Fridr. p. 73. n. 634. Zool. Dan. Prodr. p. 162. n. 1886. <i>Gieding. Gede - Hams</i>.
 Neuer Schauplatz d. Natur, B. IV. S. 119. <i>Hornifs</i>.
 Onomat. hist. nat. P. I. p. 537. <i>Apis thorace nigro</i>.
 P. III. p. 456. <i>Vespa thorace nigro</i>. P. VII. p. 708. <i>Vespa Crabro</i>.
 Paré Lib. XXI. de Venen. C. XXXIII.
 Plinii Hist. nat. Lib. XXIII. C. 3. et Lib. XL. C. 21.
 Raji Hist. Ins. p. 250.
 Reaumur Mem. d. Ins. IV. Tab. X. Fig. 9. et Tom. VI. Tab. XVIII. Fig. 1.
 Schaeffery Icon. Ins. Rat. Tab. 53. Fig. 5. et Tab. 136. Fig. 3.
 Schmid's natürliche Gesch. der Hornisse: in den gemeinnützigen Arbeiten der Churf. Sächs. Bienenenges. in Oberlausitz, B. I. S. 84.
 Schammerdamm's Bibel d. Nat. Tab. XXVI. Fig. 9.
 Schwenkfeldi Theriotropheum Silesiae, p. 525. <i>Crabro, Anthrene; Aristot. Vespa coloris citrini, aculeo infectissimo; Hornisse, Hürnaus, Hörlitze</i>.
 Scopoli Entom. Carn. 824.</p> |
|---|---|

Die Hornisse, als die größte unter den Wespenarten, ist nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika zu Hause. Sie bauet gerne an die Dachgesimse, oder

oder in alte hohle Bäume, bisweilen auch in die Erde, wo sie oft Höhlen von einem Schuh im Durchmesser ausgräbt, ihr spährisches, aus mehreren, Papier ähnlichen Blättern und breiten Zellen bestehendes Nest. Da dieses, ausser seiner beträchtlicheren Grösse, gleiche Gestalt und Einrichtung, wie bey der gemeinen Wespe hat, auch die in demselben aufbewahrten Eyer, Larven und Puppen mit denjenigen der gemeinen Wespe überaus viel Ähnlichkeit haben; so verweile ich gegenwärtig nicht bey ihrer besonderen Beschreibung und gedenke nur noch, daß die Hornisse überhaupt in 35 Tagen ihre verschiedenen Verwandlungsperioden vom Eye an zurücklegt, und dann als vollkommenes Insekt in einer Grösse erscheint, die diejenige der gemeinen Wespe weit übertrifft und oft über anderthalb Zoll beträgt. Ihr länglichter Kopf (Fig. 7.) ist an den runden Seitentheilen und an dem mehr geraden Hinterhaupt, mit einer braunröthlichen Einfassung umzogen, die sich zwischen den schwarzen, netzförmigen Augen bis in die Mitte des Kopfs herabzieht und daselbst die dreyeckigte, mit drey kleinen glatten Ocellen besetzte Stirnplatte bildet. Vor den länglichrunden Augen stehen die gelbbraunen, aus einem kürzern, einfachen und aus einem längeren, zehngliedrichten Theil bestehenden Fühlhörner, und von da aus läuft der safrangelbe Vorderkopf mehr in eine stumpfe, die Fresszangen enthaltende Spitze zu. Unter diesen Fresszangen befindet sich, wie bey den Bienen, ein Saugstachel mit vier Fressspitzen zu beyden Seiten. Ein kurzer Hals verbindet den Kopf mit dem vorne runden und breiten, hinten aber schmal, wie in einem kurzen Stiel, zulaufenden Brustschild, dessen Grundfarbe schwarz ist und der, sowohl an seinem Vorder- als an seinem Hintertheile, mit einigen braunrothen Flecken bezeichnet ist. Die am Hinsertheile des Brustschilds befestigten und daselbst wie mit einer Schuppe bedeckten Flügel, reichen bis an die Spitze des Hinterleibes und haben einen starken gelbbraunen Anstrich. Im Fluge macht die Hornisse damit ein starkes Gesumme, wodurch sie schon in ziemlicher Entfernung ihre Ankunft verkündigt. Von den Füßen sind vier am Brustschilde, zwey am Vordertheile des Hinterleibes artikuliret. Sie führen sämmtlich am Ende der Afterschenkels zwey stachelförmige Auswüchse, Klauen an den Fußblättern und sind von gelbbrauner Farbe. Der Hinterleib selbst ist ziemlich lang, vorne dick und läuft hinten spitzig zu. Sein erster Ring hat eine braunrothe schmale, und eine darauf folgende breitere, schwarze Binde. Der zweyte Ring ist vorne ebenfalls schwarz, hinten aber safrangelb und stumpf gezackt. Eben so sind alle folgende Ringe, nur daß der schwarze Theil gegen den gelben immer mehr abnimmt. Die Schwanzspitze

spitze enthält den fürchterlichen, wie eine Säge gezähnten Stachel, den das Insekt im erforderlichen Fall aus dem Leibe herausstößt.

Viel kleiner, als die Weibchen (Fig. 7.) sind die Männchen (Fig. 8.) und die von letzteren in der Bildung wenig verschiedenen Bastarde, deren Verrichtung eigentlich die Herbeyschaffung der Baumaterialien und des Futters ist. Die Männchen haben am Hinterleibe einen Ring und an den Fühlhörnern ein Glied mehr, als die Weibchen und Bastarde, auch zeigt sich am Hinterleibe in Rücksicht der ins Schwarze auslaufenden Binden einige Verschiedenheit.

Die Hornisse lebt vom Raube anderer Insekten, und würde' nach ihrer Stärke und Gefressigkeit eine grosse Veheerung unter denselben anrichten, wenn die Natur ihren schweren, geräuschvollen Flug nicht zur Warnung vor der Annäherung ihrer furchtbaren Feindinn benutz hätte. Sie wagt sich an die größten Fliegen und Spinnen und ist die grausamste Verfolgerin der friedliebenden Biene, welcher sie das Honig raubt, und die sie selbst aufzehrt.

In Beziehung auf den Schaden, welchen sie dem Menschen zufüget, hat sie schon *Plinius* unter die giftigen Thiere gezehlt, überhaupt aber setzen sie Ähnlichkeit der Bildung und die Zeugnisse des *Ardoynus*, *Berthelot*, *Maraldi*, *Muralto*, *Paré*, *Reaumur* etc. mit den Bienen und Wespen in Rücksicht der Verletzungsart in eine Klasse. Sie verwundet nicht nur durch ihren Biß, sondern auch durch ihren Stich, weit gefährlicher, als andere Insekten dieser Ordnung, auch führet sie den böartigen Saft, womit sie die Wunde vergiftet und welchen sie nach *Reaumur*, mehrere Zoll weit spritzen kann, in weit grösserer Menge bey sich. Besonders gefährlich wird sie in der heissen Jahreszeit und in warmen Klimaten, wo sie selbst reizbarer und ihr Gift schärfer zu seyn pflegt. So versichert *Fermin*, daß die Hornissen in Surinam auf das geringste Geräusch, welches sie in der Ferne hören, aus ihren Nestern in den hohlen Bäumen hervorkommen und denjenigen stechen, der ihnen im Wege kommt. Er selbst hat die Nachtheile ihres Sticks öfters erfahren, wenn er in den Waldungen und längs der Seeküste auf die Jagd gegangen war, wo man zu allen Zeiten und, besonders in der regnichten Jahreszeit, eine erstaunende Menge Hornissen antrifft. Die gestochene Stelle schwillt gleich auf und der entzündliche Schmerz ist so groß, daß sich ein Fieber dazu gesellt. Ja man weiß Fälle, daß die Gestochenen augenblicklich das Bewustseyn verloren, sich nicht mehr aufrecht erhalten konnten und drey Tage an einem heftigen Fieber litten. Werfen sie sich in grosser Menge auf einen Menschen, so sind sie im Stande ihn zu tödten; denn man hat Beispiele, daß

daß sogar Pferde ihren Stichen unterlagen. Wegen der Nester, die sie öfters in der Erde anlegen und oben bisweilen nur leicht bedecken, kann man auch ganz unversehens auf seinem Pfade von ihnen überfallen werden. Einen Reisenden führte eine schmale Gebirgsstrasse, neben welcher sich ein tiefer Abgrund in ein weites Thal öffnete, an dem Ort seiner Bestimmung. Kaum hatte er die grösste Höhe des Bergs erreicht, als das eine an seinen Wagen gespannte Pferd in ein solches Nest trat, worauf die Hornissen sich mit solcher Wuth über die Pferde, den Reisenden und seinen Kutscher herwarfen, daß sie gewiß alle ins Thal hinabgestürzt und umgekommen seyn würden, wenn nicht die in der Nähe gewesenen Landleute herbeygeeilt wären, die Pferde aufgehalten und die Hornissen mit Tüchern und Sträuchen niedergeschlagen hätten. Überhaupt gehören die Hornissen und Wespen unter die gefährlichsten Insekten, und die surinamischen, vorzüglich diejenigen, welche unter dem Namen *Maribonses* bekannt sind, übertreffen in Rücksicht der nachtheiligen Folgen, noch weit die europäischen. *Drury* hat uns verschiedene derselben kennen gelehrt, vor deren Abbildungen man schon erschrickt.

Die Behandlungsart der Hornissenstiche ist die nemliche, welche bey den Verletzungen der Wespen und Bienen vorkommen wird, daher ich mich gegenwärtig nicht dabey aufhalte.

32. Die gemeine Wespe. Tab. II. Fig. 9—15.

Vespa vulgaris, thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2750. n. 4. Faun. Suec. n. 1671. — Habitat sub Europae tectis, muscas praedans, mel apum furens.

- | | |
|---|--|
| <p>Aldrovandi de animalibus insectis 198.
 Amoreux Notice des Ins. rep. ven. p. 100. u. 250.
 Blumenbach's Handb. d. Naturg. S. 371. n. 2.
 <i>Die Wespe</i>, Engl. <i>the Wasp</i>.
 Camerarius, J. R. de punctura vespae singulares historiae, V. Syll. Memorabil. Cent. X. Part. 42. p. 771.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 495. <i>la Guêpe commune</i>.
 Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. II. Th. II. S. 111. <i>Die schwarzgelbe Wespe mit ganz schwarzen Fühlhörnern</i>.
 Fabri, G. Epist. de Vespae punctura it. Seb. Schabingeri de ead. re Epist. exstant in Hildani Observ. Chirurg. Cent. IV. et V.
 Fabricii Syst. Ent. p. 364. n. 9.
 Fischer's Naturgesch. v. Livland, S. 139. n. 395. <i>gemeine Wespe</i>.</p> | <p>Frisch's Ins. Teutschl. Th. IX. S. 23. Tab. XII. Fig. 1. <i>Wespe</i>.
 Fritze, J. G. Medizinische Annalen für Aerzte und Gesundheitliebende, B. I. S. 266.
 Fuefsly's Verz. schweiz. Ins. S. 51. n. 986. <i>Die gemeine Wespe</i>.
 <i>Gazette de Santé</i>, n. 45. p. 185.
 <i>Gentlem. Magazin</i> 1765 Oct. p. 456. (Mittel.)
 Geoffroy Hist. d. Ins. Th. II. p. 369. n. 2. <i>la Guêpe commune</i>.
 Göze's Geschichte schäd. Ins. S. 104.
 <i>Hannov. Magaz.</i> 1771. S. 1327. (Mohnköpfe, als Mittel wider den Wespenstich).
 Hanow von den Wespen und Hummeln. Merkwürdigk. B. I. S. 388.
 Hildani Obs. Chirurg. Cent. IV. obs. 77. 78. 79. Hot.</p> |
|---|--|

- Hottaar's Ins. Tab. VII. Fig. 3. S. Naturfors. St. 9. S. 323.
 Lanzonii Oper. Obs. 188. Tom. II. und in Eph. N. C. Cent. I. et II. obs. 64.
 Lentilius in Eph. N. C. App. ad Cent. I. et II. p. 204.
 Mouffetti Theatr. Insect. 52.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 380.
 n. 4. Tab. XXVII. F. 3. *Die gemeine Wespe*.
 Mülleri Faun. Fridr. p. 73. n. 635. Zool. Dan. Prodr. p. 162.
Neues bremisches Magaz. B. I. S. 77. (Mittel).
Onomatologia Hist. Nat. P. I. p. 538. P. VII. n. 712.
Physik. Wkon. Auszüge B. II. S. 483. (Mittel zur Vertreib. der Wespen).
 Raji Hist. Ins. p. 250.
 Reaumur in Mem. de l'Acad. des Sciences 1719. Mem. d. Ins. VI. T. XVII. Fig. 7. 8.
 Schaefferi Elem. Ent. T. 130. Icon. Ins. Rat. Tab. XXXV. F. 4. und Tab. LXXXI. F. 5.
 Scherf's Archiv. der medicinischen Policey, B. I. S. 321.
 Schwammerdamm's Bib. d. Nat. Tab. XXVI. Fig. 8.
 Scopoli Entom. Carniol. 825.
 Valentini, J. E. Nidus vesparum admirandus in Eph. N. C. Vol. II. Obs. 127. p. 285.
 Welsch, G. H. de punctura Vespae in Eph. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 35. p. 65. (aufgelegte Salbeyblätter heilten den Wespenstich).
 Wittenberg. Wochenbl. B. IX. S. 320. und B. XVI. S. 313.

Wir kommen nun zu der bekanntesten europäischen Wespenart, welche ihr, hier verkleinert vorgestelltes, birnförmiges Nest (Tab. II. Fig. 9.) mit seinem breiteren oberen Theile (*a. b.*) an den Gesimsen der Dächer, an den Ästen der Bäume, auch in ledigen Bienenstöcken aufhängt, und am entgegengesetzten, unteren und schmalen Ende eine Öffnung (*d.*) läßt, durch welche die Wespen aus- und eingehen können. Dieses Nest ist von verschiedener Grösse und hat oft im langen Durchmesser sechs, im queren fünf Zoll. Es besteht von aussen aus mehreren über einander liegenden Schichten (*c. c.*) Löschpapier ähnlicher Blätter, welche die Wespen mit ihren Fresswerkzeugen und Füßen aus den zartesten Spänchen vom alten, dünnen, verwitterten Holze bereiten, die sie durch den ihnen aus dem Maule fliessenden, klebrichten und harzigen Saft vereinigen. Das Innere eines solchen Nests enthält meistens zwey unter einander hängende Scheiben (Fig. 10. *a. a. b. b.*), wovon die obere und grössere oft über 250, die untere und kleinere über 160 sechseckigte Zellen hat, deren Öffnungen alle nach unten gekehrt sind. Erstere hängt mittelst eines breiten Bandes (*c.*) von der nemlichen Papiermasse am Grunde des Nests, letztere mittelst eines ähnlichen Bandes (*d.*) an der obern Zellenscheibe. Die Zellen sind zur Aufnahme der Eyer, Larven und Puppen bis zur Zeit der Verwandlung bestimmt, daher auch die Mutterwespe immer die erste Anlage zum Neste macht, und in die zuerst fertigen Mittelzellen gleich solche Eyer legt, aus welchen Arbeitswespen hervorkommen, die ihren Bau ausführen und zur Ernährung der auskriechenden Jungen beytragen können. Nie legt sie mehr als ein Ey (Fig. 18.) in eine Zelle und befestigt dieses mit dem einen Ende durch ihren Kleber an eine Zellenwand. Die in einigen Tagen aus dem Eye hervorkommende junge Larve hängt mit ihrem Schwanzende ebenfalls

an

an dem Boden der Zelle und ist mithin immer mit dem Kopfe nach unten gekehrt. Sie ist nichts als ein milchweisses Würmchen, welches nach vollendetem Wachsthume etwan einen halben Zoll lang und an seinem breiteren Vordertheile drey Linien breit ist (Fig. 11.). Ihr hornartiger, hellbrauner, dreyeckigter Kopf hat zwey schwärzliche Augen, zwey gekerbte Zähne unter einer fleischichten Oberlippe und in der Gegend der Unterlippe die Spinnorgane, womit sie vor ihrer Verwandlung in eine Puppe, die Zellenöffnung mit einer weißgrauen Seide (Fig. 10. f. f. f.) zuspinnnt. Dieser Kopf ist einwärts gebogen und ruht auf der Brust. Der ganze übrige Körper der Larve besteht aus dreyzehn, mit einem aufgeworfenen Rande von beyden Seiten eingefassten Ringen, wovon der letzte zwey kleine zugespitzte Wärzchen hat. Die alten Wespen nähren ihre Larven mit einer Art von braunem Honig, auch mit Insekten, Fleisch und Stückchen Früchten, gegen den Herbst aber, wo Mangel an Nahrungsmitteln eintritt, tödten sie alle Larven und selbst alle Nymphen oder Puppen, welche vor Ende des Novembers nicht mehr auskriechen können. Letzere sind, wie die Larven, weißgelb (Fig. 12.), haben aber braune netzförmige Augen. Übrigens sieht man Fühlhörner, Flügel- und Fußscheiden an den Seiten ihres Leibes deutlich liegen. Hat die Wespe die Puppenhülle verlassen; so zernagt sie mit ihrem scharfen Zangengebisse den Dekkel der Zelle und erscheint nun unter folgenden drey Gestalten, je nachdem sie eine weibliche, oder eine männliche, oder eine Arbeitswespe ist.

Als Weibliche oder Mutter - Wespe (Fig. 13.) führt sie nemlich kleine länglichte Flecken hinter den netzförmigen Augen ihres schwarzen Kopfs und zwey kurze gegen das Ende dicker werdende, schwarze Fühlhörner. Der Brustschild ist ebenfalls schwarz, vorne mit gelben Seitenstreifen, an der Wurzel der Flügel mit kleinen gelben, und am Hintertheile des Brustschilds, mit drey ähnlichen dreyeckigten Flecken bezeichnet. Der lange und bauchigte Hinterleib besteht aus sechs Ringen, wovon der letzte sich mit einer Spitze endigt. Die Grundfarbe dieser Ringe ist ebenfalls schwarz, am Hintertheile jedes derselben zieht sich aber eine gelbe Binde hin, welche auf dem ersten Ringe vollständig, auf den übrigen aber in der Mitte ausgezackt ist. Ausserdem sind alle diese Binden noch mit kleinen schwarzen Flecken besetzt, welche an jeder Seite des Hinterleibes zwey Reihen bilden. Die zwey schmalen Vorder- und zwey kürzeren Hinterflügel haben eine ins Röthlichte fallende Farbe, und sind mit braunen Adern durchzogen. An den Schenkeln ist der größte Theil schwarz, das vordere Ende gelb, die Schienbeine, Afterschienbeine und Fußblätter sind aber ganz gelb. Die weiblichen

Wespen

Wespen verlassen das Nest nie, sondern warten in demselben immer die Begattung und das Eyerlegen ab.

Von dem Weibchen unterscheidet sich das Männchen (Fig. 14.) durch seine stärkern Fühlhörner, seinen mehr gelben, als schwarzen Kopf, seinen schmalern Hinterleib, der einen Ring mehr hat und am Ende nicht spitzig, sondern stumpf ist, und seine weit breiteren gelben Binden an den Ringen des Hinterleibes. Die Männchen nemen keinen Theil an der Arbeit, dem Baue und der Versorgung des Nests mit Lebensmitteln, und pflegen blos der Begattung, wohl aber die Geschlechtlosen oder Arbeitswespen.

Dieser thätige Theil der Bewohner des Wespennestes (Fig. 15.), weicht in Rücksicht seiner Bildung wenig von dem Weibchen ab, nur hat er längere und dickere Fühlhörner und am Hinterleibe sind die Binden mehr grade, als gezackt und weniger punktirt. Ihm sowohl, als den Weibchen, ist der gefährliche Stachel verliehen, der in seiner Bildung wenig von dem Bienenstachel verschieden ist, und den wir unten kennen lernen wollen. Sonderbar ist es, daß sowohl Männchen, als Geschlechtlose während dem Winter umkommen, und daß sich blos die zur Fortpflanzung des Geschlechts nöthigen Weibchen in dem Neste erhalten.

Die Wespen sind sehr gefressige und raubsüchtige Insekten. Sie stehlen den Bienen das Honig und leben ausserdem von andern kleinen Insekten, reifen Baumfrüchten und rohem Fleische. Dem Menschen werden sie vorzüglich durch ihren Stich gefährlich, der weit brennender, als der Bienenstich und mehr oder weniger nachtheilig nach der Menge und der von besonderen Umständen abhängenden Causticität des Gifts, nach der mit der Hitze des Klimas und der Jahreszeit vermehrten Wuth der Wespen selbst ist. *Faber*, *Hildanus* und *Lanzonius* versichern, daß auf dem Wespenstich die heftigsten Schmerzen, Entzündung und Geschwulst mit Ohnmacht, grosse Blasen und Abschälung der Haut beynahe am ganzen Körper, unreine Geschwüre, die nur mit Mühe, zum Theil aber auch auf keine Art zur Heilung zu bringen waren, erfolgten. *Lentilius* erzehlt, daß bey einer Frau auf dem Wespenstich an der Stirne, die ganze Stirnhaut in wenig Tagen bis auf den Knochen abgegangen ist, und die Wunde erst nach mehreren Wochen geheilt werden konnte. Eben derselbe gedenkt eines Jünglings und eines Bauern, die auf dem Wespenstich am Halse, eine Geschwulst bekamen, welche die ganze rechte Seite der Brust einnahm. In manchen Jahren wird, mit der ungewöhnlichen Vermehrung der Wespen, auch ihr Nachtheil auf die Gesundheit des Menschen auffallender. *Fritze* wurde dieses in der Gegend von

Halberstadt gewahr. „Eine ungeheure Menge von Wespen, schreibt er, belästigte uns im August 1780, ein Vorfall, der mir seit meinem zehnjährigen Hierseyn, völlig neu war. Einzelne sieht man jedes Jahr, aber heuer drängten sich diese ungebetenen Gäste in Häuser und Zimmer, wo man sie nie gesehen, in ungewöhnlicher Anzahl zu. Sie wurden durch ihre Stiche auch gefährlich. Stiche, die an dem Kopfe und Halse geschahen, erweckten ein Entzündungsfieber, und die verletzten Theile schwellen in wenigen Stunden ausserordentlich auf, die Kranken verloren die Kraft zum Schlingen und das Gesicht wurde braunroth. Legte sich die Geschwulst am Halse; so wurden Brust und Arme aufgetrieben, und so dehnte sich diese Geschwulst in vier und zwanzig Stunden über den Leib, die Schenkel, bis an die Knie aus. Bey diesen blieb sie bey einem Kranken stehen, der ganze Körper aber sah sehr unförmig aus.“ Überaus gefährlich ist es sich in der Nähe eines Nestes aufzuhalten, wo die Wespen aus- und einschwärmen, oder ein solches Nest zu beunruhigen, wenn sich auch keine Wespen sehen lassen. Mit fürchterlicher Wuth fallen sie auf ihren Ruhestörer und verfolgen ihn noch in ziemlicher Entfernung.

Reaumur will, belehrt durch Versuche, die er an sich selbst angestellt hat, die Wespe ruhig stechen zu lassen, weil alsdann der Stachel nie in der Wunde bliebe. Würde aber die Wespe genöthiget, sich zurückzuziehen, so müste der biegsame, nie eine ganz gerade, sondern krumm und zickzack laufende Wunde machende Stachel, nothwendig stecken bleiben und alle Zufälle müsten hierdurch verschlimmert werden.

Im ganzen finden bey der Heilung der Wespenstiche die nemlichen Mittel, wie bey den Bienenstichen statt. Einige empfehlen noch, als ein vortrefliches Mittel, den Saft vom Wegerich, andere Salmiakspiritus in damit befeuchteten Kompressen auf die Wunde zu legen. *Fritze* liefs bey allen von den Wespen gestochenen sogleich eine Aderlaß vornemen, und rohe, ungeschälte, in einen Mörsel zu einen Brey zerquetschte Kartoffeln, auf die geschwollenen Stellen des Kopfs, Halses, der Arme und Schenkel unmittelbar binden. Da dieser Brey sehr leicht warm wird, so liefs er ihn beynahe alle fünf Minuten erneuern. Wo dieses Mittel nicht so schnell, wie gewöhnlich zu geschehen pflegte, helfen wollte, liefs er mit Bleywasser fleissig befeuchtete Kompressen auflegen und dieses half gewiß. Einer Person, die bis zur Raserey phantasirte, zog man den Wespenstachel heraus, den man erst nach zwey Tagen entdeckte und so genas sie bald nachher. Auf die verwundeten Stellen wurde Weinessig, Baumöhl und Petersilie gelegt. Innerlich aber gab er Salpeter mit Theriak und Fliedermus, oder Hollundersaft.

33. Die Wandwespe. Tab. II. Fig. 16—20.

Vespa parietum, nigra, thorace punctis duobus, scutello bipunctato, abdomine fasciis quinque flavis, prima remotissima. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2751. n. 6. Faun. Suec. n. 1673 et 1679. — Habitat in Europae parietum ligneorum foraminibus.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 289. n. 37. Spec. Ins. I. p. 463. n. 32. Syst. Ent. p. 368. n. 26.

Fischer's Insekt. in Deutschl. IX. Tab. XII. F. 1.

Geoffroy Hist. d. Ins. de Paris, II. p. 367.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. I. S. 881. n. 6.

Die Wandwespe.

Onomatol. Hist. nat. P. I. p. 520 und 532. P. VII.

p. 710. *Die schwarze Wespe mit fünf gelben Bauchstrichen.*

Reaumur Mém. pour Serv. à l'Hist. d. Ins. Tom. T. VI. Mem. 6. p. 184.

Rösels Insektenbel. T. II. Samml. der Hummeln und Wespen, S. 29. Tab. VII.

Sulzer's Gesch. der Ins. S. XXVII. *Die Wandwespe.* Vignette S. 179.

Weibchen, Männchen und Geschlechtlose oder Arbeiter, machen auch bey dieser kleinen Wespenart die Bewohner eines Nestes aus; aber noch fehlt es uns an den eigentlichen Unterscheidungsmerkmalen dieser drey verschiedenen Geschlechter. Ihr Kopf (Fig. 16. a.) ist schwarz, mit zwey kurzen, kolbenförmigen, rothgelben Fühlhörnern, mit zwey gelben Querstrichen auf der Stirn, zwey dergleichen Punkten über den Fresszangen und, zwischen letzteren mit einer schwefelgelben Lippe versehen. An dem kurzen, erhabenen, schwarzen Brustschilde bemerkt man ebenfalls zwey Punkte und eine Linie von gelber Farbe. Er hängt mit dem langen, vorne bauchigten und hinten spitzig zulaufenden, mit fünf zackichten schmalen Binden auf schwarzen Boden gezierten Hinterleibe, durch einen dünnen Stiel oder Kanal zusammen. Die flach liegenden Vorderflügel sind an ihrer Wurzel überaus schmal und rothgelblich, werden aber nach hinten breiter und laufen in eine Spitze zu. Die sechs Füße sind an den Schenkeln schwarz, übrigen rothgelb.

Ihr Nest (Fig. 16. und 17.) besteht aus eben solchem Holzpapiere, wie das der vorigen Wespenart, ist aber ungleich kleiner, indem es selten mehr als vierzig bis funfzig sechseckigte Zellen hat, und selbst in der Form verschieden. Es hängt nemlich mit seinem obern, etwas gewölbten Theile (Fig. 16.) an einem schmalen Stiele und hat in der Mitte lange, rings herum aber kurze Zellen. Man trifft es so in den Löchern hölzerner Wände, unter den Verdachungen der Gartenmauern und Gartenwände, auch wohl an steifen Grasstengeln an, und findet in einigen Zellen Eyer, in andern Larven von verschiedener Grösse (Fig. 17. a.), in andern Puppen (b. b.). Immer sieht man eine (Fig. 16.), bisweilen aus zwey bis drey Wespen auf dem Neste aussen herumkriechen, entweder in der Absicht dasselbe zu bewachen, oder dasselbe auszubessern. Die Eyer (Fig. 18.), wovon das

Weib-

Weibchen immer nur eins in eine Zelle legt, sind strohfarbig, länglichrund und im Boden der Zelle angeklebt, damit sie bey der hängenden Lage des Nests nicht herausfallen. In wenig Tagen kriechen aus denselben kleine Larven, die in zwölf Tagen schon ausgewachsen sind (Fig. 19.). Sie füllen dann die Zellen ganz aus (Fig. 17. b. b.), in welchen sie mit den schwarzbraunen Köpfen nach unten gerichtet sind. Ihr vorne ziemlich dicker Leib läuft nach hinten spitzig zu, besteht aus 10 bis 11 ockergelben Ringen und hat längs dem Rücken eine feine dunkle Linie. Wenn diese Larven von den Wespen so lange mit dem Honigsafte der Blumen genährt worden sind, bis sie ihr Wachsthum vollendet haben; so schicken sie sich zur Verpuppung an und verschliessen die Öffnungen ihrer Zellen durch feine Gespinste. Die lichtockergelben Puppen (Fig. 20.) geben sehr deutlich Kopf, Brust und Hinterleib der künftigen Wespen zu erkennen, an den Seiten haben sie aber nur ganz kurze, aus einem dünnen Häutchen bestehende Flügelscheiden. Nur vierzehn Tage bedürfen sie zu ihrer Reifung und dann durchbricht das vollkommene Insekt nicht nur die Puppenschale, sondern auch den Deckel der Zelle.

Der an diesen Wespen zu fürchtende Theil ist der verborgene Stachel, womit sie den Menschen so gut beschädigen als die vorige Wespenart; denn Entzündung und Geschwulst begleiten auch ihre Stiche.

34. Die Honigbiene. Tab. II. Fig. 21 — 26.

Apis mellifica pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posterioribus ciliatis; intus transverse striatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2774. n. 22. Faun.

Succ. 1697. — Habitat in Europae arboribus cavis, frequentius culta hospitatur.

Aetii Tetrabl. IV. Serm. I. Cap. XI.
 Aldrovandi de Animalibus Ins. XX.
 Alsaharavius Pract. Tr. XXX. Sect. II. C. 29.
 Amoureux Notice des Ins. p. 89 et 241. Tab. I. F. 10.
 Ardoynus de Venen. Lib. VIII. C. 11.
 Aristoteles Hist. Anim. Lib. IX. Cap. 40.
 Baricellus de Apum natura; in Hortulo geniali,
 p. 332.
 Blumenbach's Handb. d. Naturg. S. 371. n. 1.
Apis Mellifica, die Honigbiene, Imme.
 Camerarii, J. R. Syll. Memorabil. Cent. VII. n.
 98. Cent. XIII. n. 49 et 55. p. 1401 et 1405.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 488.
 Degeer's Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. II. Th. I.
 S. 22.

Delaistre von der Wirkung des Mehnsaamensaftes bey Gelegenh. eines Immenstichs; in Roux's Samml. auserlesener Wahrnehmungen, B. IV. S. 351.

Desbrest, Journal de Médecine Mois d'Août, 1765. p. 183.

Dioscorides Theriac. Cap. XX.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 302. n. 42. Spec. Ins. I. p. 480. n. 37. Syst. Ent. p. 383. n. 30.

Frenzel von der Wuth der Bienen, der Gefährlichkeit ihres Stichs und den Mitteln dawider im Wittenbergischen Wochenbl. 1790. S. 321.

Fuefsly's neues Mag. B. II. S. 95. (Mittel wider den Bienenstich.)

Gar.

Garden Concerning the proboscis of bees. Phil. Trans. n. 175. p. 1156.

Gazette d'Agriculture n. 9. 1768. (Gebrauch des lebendigen Kalkes im Bienenstich.)

Geoffroy Hist. d. Ins. des environs de Paris, T. II. p. 399. n. 1. *Apis gregaria*.

Göze Gesch. schädli. Ins. S. 102.

Gothaisches Wochenbl. Jahrg. 3. St. 9. vom Bienenstich und den Mitteln dagegen.

Histoire naturelle des Abeilles, avec des Figures en taille-douce. Paris 1744. n. 12. Vol. II.

Hooke Rob. Observation of the sting of a bee, in ejus Micrographia, p. 163. c. Fig.

Hunter in philos. Transact. 1792. P. I. p. 128.

Jonstoni Hist. Ins. I. Tab. II.

Krönitz, J. G. das Wesentlichste der Bienen- geschichte und Bienenzucht für den Naturliebhab. Landmann und Gelehrten mit 20 Kupf. Potsd. 1783. 8 maj.

Kurze Geschichte der Drohnenmütter nebst einigen Anmerkungen über die andern Geschlechtsarten von Bienen. Bayreuth bey Lübeck 1797.

Ledermüller's mikroskop. Gemüths- und Augengergötzen, S. 78 und 79. Tab. XL. und XLI.

Leeuwenhök vom Bienenstachel in Leskens Uebersetz. der Phil. Transact. B. I. Th. I. S. 98. c. f.

Ludovici, D. Obs. de Apum ictu. Eph. N. C. Dec. I. an. 8. obs. 67. p. 111.

Lyonet Théologie Physique des Insectes Tom. II. p. 243.

Maraldi in Mem. de l'Acad. R. des Scienc. 1712 p. 303.

Mouffetti Theatr. Ins. II.

Müller's Linn Natursyst. d. Ins. B. II. S. 896. n. 22. Tab. XXVII. F. 5. *Die Honigbiene*.

Neueste Mannichf. Jahrg. III. S. 444. über die Wuth der Bienen.

Onomat. Hist. nat. P. I. p. 523. *Apis gregaria*.

Pare de Venenis Lib. XXI. Cap. 33.

Plinii Hist. nat. Lib. XI. Cap. 18 et Lib. XXIII. Cap. 8.

Raji Hist. Ins. p. 240. *Apis domestica sive vulgaris*.

Reaumur Hist. des Ins. Vol. V. p. 207. Tab. XXI. XXII. Fig. 1.

Reling's Versuche einer Universal-Bienenges. 1790.

Riem's, J. Phys. ökon. Biblioth. Bresl. 1776—78.

Riverii, L. Obs. de puncturis Apum in ejus observ. med. Cent. III. obs. 14. et in Operibus Lugd. 1679. edit. p. 519.

Rüsel's Insektenbel. Th. III. S. 183. von dem Weisel oder Bienenkönige.

Schwammerdam's Bibel d. Nat. Leipz. 1752. S. 149—219. Tab. XVII—XXVI.

Scopoli Entom. Carn. 811.

Spielmanni Diss. de animal. nociv. alsat. p. 42.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 196. Kennzeich. Tab. XIX. Fig. 123.

Staudigelii, V. Obs. de curiosis post apum ictus symptomatibus. Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. n. 7 et 8. Obs. 194.

Staudtmeister in Th. XIV. der Riem'schen neuen Sammlung.

Thouvenet Mémoire sur les principes et les vertus des substances animales médicamenteuses. Bordeaux 1779. p. 37.

Wittenbergisches Wochenblatt B. I. 1768. S. 143. Mittel wider den Stich der Bienen B. VII. 1774. S. 47.

Werkzeuge wodurch die Bienen verletzt.

Zacutus, Praxis admiranda, Lib. III. Obs. 83.

Kein Insekt hat Naturforscher und Ökonomen von jeher mehr beschäftigt, als die durch ihre unablässige Thätigkeit für menschliche Bedürfnisse, wohlthätig gewordene, und durch die Eigenheiten in ihrer thierischen und häuslichen Einrichtung lange Zeit räthelhaft gewesene Biene. Sie hat besonders in Rücksicht ihrer schwer zu erforschenden Fortpflanzungsart zu einer Menge Streitigkeiten Gelegenheit gegeben, welche erst in unsern Tagen entschieden und dennoch wieder zweifelhaft gemacht worden sind, ausserdem aber in Beziehung auf ihre künstliche Vervielfältigung und Benutzung, oder die Bienenzucht, eine Menge Schriftsteller in Thätigkeit gesetzt, deren vollständiges Schriftenverzeichnis allein ein kleines Bändchen ausmachen würde. Meiner Absicht gemäs, habe ich hier nur die in naturhistorischer Hinsicht und in Beziehung auf den Schaden, welche die Bienen durch ihre Verletzungen dem Menschen zuziehen können, merkwürdig gewordenen Schriften angegeben und wende mich daher zuerst zu ihrer Beschreibung.

Die

Die Biene gehört unter die Insekten mittlerer Grösse und hat eine Länge von 8 bis 14 Linien. Ihr ganzer Körper ist braun und rauhhaarig, ihr Kopf am vordern und untern Theile mit Fresszangen versehen, die sich von der Rechten zur Linken öffnen und schliessen. Über letzteren befindet sich der mit einer äusseren und innern Scheide umgebene Saugrüssel, womit die Biene den Honig aus den Honigbehältern der Blumen zieht. Am Obertheile des Kopfs sieht man die grossen, mit Haaren besetzten, netzförmigen Augen, zwischen denselben aber zwey bewegliche vielgliedrichte Fühlhörner. Der ovalrunde, kurze Brustschild ist ebenfalls sehr rauhhaarig, und enthält die Einlenkungen der zwey grösseren und starken Vorderflügel und der zwey kleineren und dünneren Hinterflügel. Letztere bedecken die zwey Luftlöcher, wodurch die Biene Athem holt und welche, nebst den Flügeln, das Summen und die Töne hervorbringen helfen, wodurch sie sich einander verständlich machen. Die am untern Theile des Brustschilds befestigten sechs Füsse führen am letzten Gliede des Fußblatts zwey grosse und zwey kleine Klauen, zwischen welchen sich ein weicher fleischigter Theil, oder Ballen befindet. Der braune länglichrunde Hinterleib, besteht aus sechs Ringen, welche das Insekt verlängern und verkürzen kann, und enthält in seiner Schwanzspitze den hornartigen Stachel verborgen, dessen natürliche Grösse (Fig. 24.) eine Linie beträgt. Vergrössert (Fig. 25.) erscheint er als eine, vom Grundtheile überaus schmal zulaufende Spitze, die entwickelt, (Fig. 26.) aus zwey Scheiden (*a. a.*), aus dem eigentlichen pfeilähnlichen, hohlen und an seiner Spitze mit einer Öffnung, an den Seiten aber mit Wiederhaken (*e. e.*) versehenen Stachel (*b.*); aus einem Giftbläschen (*c.*), zu welchem wieder ein zuführendes Gefäss führt, und aus verschiedenen, alle diese Theile in Thätigkeit setzenden Muskeln (*d. d. d. d.*) besteht. Diesen Stachel können die Bienen mit einer ausserordentlichen Geschwindigkeit herausstossen und wieder zurückziehen.

Soviel zur allgemeinen Beschreibung dieser Bienenart. — Jedermann weiss, dass sie in sehr zahlreichen Gesellschaften beisammen lebt und so zu sagen einen monarchischen Staat bildet, der auf eine besondere Art organisirt ist, und aus der *Königin* oder *Bienenmutter* (Fig. 23.), den *Drohen* oder *männlichen Bienen* (Fig. 22.), und den *gemeinen* oder *Arbeitsbienen* (Fig. 21.) besteht. Diese dreyerley Staatsbürger sind jedoch nur zweyerley Geschlechts, indem die Arbeitsbienen eigentlich auch Weibchen sind und die weibliche Brauchbarkeit bloß durch zufällige Bestimmung und die Entziehung der zur Entwicklung ihrer Zeugungsorgane nöthigen reichlicheren Nahrung verloren haben.

Die Königin (Fig. 23.), welche man auch unter dem Namen *Weisel*, *Mutterbiene*, *Zuchtbienne* (lat. *Regina*, *Femina*, franz. *la Reine*), kennt, ist das einzige fruchtbare Weibchen und die Alleinherrscherin im Staate, von deren Gegenwart der Muth, die Beständigkeit und Einheit des Willens aller übrigen Individuen abhängt. Verläßt sie ihre Wohnung, so folgen sie ihr alle, kommt sie um, so erfolgt die Auflösung der ganzen Gesellschaft. Sie trennet sich hoffnungslos, sich jemals wiederzusehen. Diese Königin hat einen ziemlich langen Kopf, zehngliedrichte, mit wenigen und kurzen Haaren versehene Fühlhörner, kurze, kaum die Hälfte des Hinterleibes bedeckende Flügel, welche verursachen, daß sie im Flug leicht ermüdet, aber ihrer Bestimmung, immer in der Wohnung zu bleiben angemessen sind, einen langen, hinten spitziger, als bey den übrigen zulaufenden Hinterleib und hochbeinige, gelbliche Füße. Überhaupt ist ihre Farbe lebhafter, gelbbrauner und mehr ins Röthlichte fallend. Giftbläschen und Stachel sind bey ihr noch einmal so groß, als bey der Arbeitsbiene, das Absonderungsgefäß, welches in das Bläschen geht, und der Ausführungskanal, welcher das Bläschen mit dem hohlen Stachel vereinigt, auch weit länger und von festerer Substanz. Ihr langer Hinterleib beherbergt in einem grossen doppelten Eyerstocke alle Eyer, die zur Bevölkerung des Stocks gehören. Zur Befruchtung derselben muß sie aber erst die sie zu vielen Hunderten umgebenden Männchen durch mancherley Liebkosungen reizen, und wegen des bogenförmig in die Höhe gehenden männlichen Glieds, die Männchen bey der Begattung besteigen. So oft befruchtet legt sie jährlich wohl 40000 Eyer, und zwar zuerst die der Arbeitsbienen, hernach die der Männchen und endlich die der Königinnen.

Die *Drohnen* oder *männlichen Bienen* (Fig. 22.) werden auch *Hummeln*, *Deck- oder Holmbienen* (lat. *Fuci*, *Mares*, franz. *Faux - bourdons*) genannt. Sie stehen der Königin an Grösse nach, sind aber beynahe um ein Drittheil dicker und länger als die Arbeitsbienen. Ihr grösserer und runderer Kopf ist mehr behaart, ihre Fühlhörner, welche die der Königin und Arbeitsbienen an Grösse übertreffen, haben elf, mit vielen und langen Haaren versehene Glieder; ihr kleines Zangengebiss liegt mehr verborgen; ihr Rüssel ist kürzer und zarter, ihre Augen sind grösser und dicker, als bey den Arbeitsbienen und nemen den ganzen oberen Kopftheil ein. Vorzüglich zeichnen sie die weit längeren und breiteren Flügel aus, über welche der Hinterleib nur mit seinen stumpfen, keinen Stachel enthaltenden Ende hervorragt. Diese Drohnen kriechen vom Ende des Aprils bis zum Ende des Junius in der Ordnung aus, in welcher ihre Eyer gelegt worden sind, und

und ihre Anzahl wächst im Verhältniß mit der Grösse des Stocks, so daß ein Stock von 8 bis 10000 Bienen ungefähr 300, ein Stock von 16 bis 18000 ungefähr 700 bis 1000, selten aber mehr als 1500 zu enthalten pflegt. Ohngeachtet ihre einzige Bestimmung die Befruchtung der Königin ist; so hat die Natur doch keinen eigentlichen Begattungstrieb in sie gelegt, und dieses wahrscheinlich deswegen, weil das einzige Weibchen durch so viel und häufige Begattungen bald zu Grunde gehen müßte, vielleicht aber auch, wegen des Vorgefühls ihres nahen Untergangs, welcher nach der Begattung bald zu erfolgen pflegt. Sie sterben nemlich nach *Riems* Meinung gleich nach Austretung des Begattungsgliedes oder sie kommen, wenn zu Ende des Sommers die Brutzeit vorbey ist, als überflüssige Bewohner des Stocks in der bekannten *Drohnenschlacht* um. In dieser fallen die Arbeitsbienen wüthend über sie her, morden sie auf eine grausame Art und werfen sie zu den Fluglöchern hinaus.

Weit kleiner als die Königin und die Drohnen sind die *gemeinen Arbeitswerk-* oder *geschlechtlosen Bienen* (lat. *Operariae*, *Spadones*, franz. *Abeilles ouvrières*, *Moulets* ou *neutres* Fig. 21), die sich von den andern noch besonders durch ihre kurzen, siebengliedrichten, wenig behaarten Fühlhörner, durch ihr viel größeres hervorragendes Gebiß, dessen sie zum Zellenbau, zur Entfernung mancherley Dinge aus dem Stock, zur Ernährung der Larven selbst bedurften; durch ihre ziemlich langen Flügel; durch eine löffelförmige Vertiefung an den Hinterfüßen, welche sie mit Blumenwolle und Blumenstaub anfüllen und sie zur Erbauung der Zellen zu verwenden; durch den kleineren Stachel und das kleinere Giftbläschen unterscheiden, deren sie sich, als Beschützerinnen des Stocks, zur Abhaltung aller Gefahr und zur Tödtung der nach der Begattung überflüssig gewordenen Männchen bedienen. Sie sind ursprünglich weiblichen Geschlechts und jede derselben kann, wenn sie als dreytägige Larve in eine königliche Zelle versetzt und gehörig genährt wird, eine Königin oder Mutterbiene werden. Ihre Anzahl belauft sich oft in einem grossen Stocke auf 20000, welche für alle Bedürfnisse des Staats sorgen und sich vorzüglich mit dem Eintragen des Honigs und Wachses, mit dem Baue und der Reinigung der Zellen und der Aufnährung der Nachkommenschaft der Königin beschäftigen. Die kleinen weissen, mit hornartigen Köpfen versehenen Larven, welche aus den Eyern kommen, bedürfen nemlich sieben bis acht Tage lang, welche zur Vollendung ihres Wachstums nöthig sind, der Fütterung, und diese besorgen die Arbeitsbienen mit einem honigartigen Brey. Nach dieser Zeit verschliessen sie die Zellen der Larven mit Wach-

dek-

deckeln, die Larven aber kleiden die Zellen von innen mit einem Gespinste aus und nemen nach dreyzehn bis vierzehn Tagen die Puppengestalt an. Das vollkommene Insekt verläßt die Puppenhülse den zwanzigsten oder ein und zwanzigsten Tag, nachdem die Larve das Ey verlassen hat, beißt in zwey bis drey Stunden den Zellendeckel durch und erscheint nun als junge Biene. Die alten Arbeitsbienen lassen sich hierauf sogleich die Säuberung der Brutzellen von dem Unrathe, und den zurückgelassenen Larven- und Nymphenhäuten angelegen seyn. Bald aber veranlaßt die junge Nachkommenschaft Uneinigkeit und Spaltung im Stocke und sie verläßt denselben unter Anführung der neuen Königinnen in mehreren Colonien, oder sie schwärmt nach der gewöhnlichen Sprache. Bemeistert man sich der Königinnen; so kann man diese Schwärme hinleiten, wohin man will, weil sie die Königin nie verlassen.

Die Honigbienen sind bekanntlich beynahe überall in Europa, vorzüglich aber in Pohlen zu Hause, wo sie noch mehr, als anderwärts, ihre ursprünglichen Wohnungen in den Wäldern behaupten, und in die hohlen Bäume nisten. In den größten Theil von Teutschland kennt man sie nur als zahme, an künstliche Wohnungen, die man Bienen - Stöcke oder Körbe nennt, gewöhnte Insekten. Sie bringen in denselben ihre Zellenkuchen (Tafeln, Scheiben oder Waben) vertikal, bisweilen auch schrage an. Der Stoff zu diesen Lagen oder Schichten sechseckiger, prismatischer Zellen, ist das Wachs, eine eigne Substanz, deren Grundstoff der in dem Leibe der Bienen eine besondere Veränderung leidende Blumenstaub ist, und welche dann zwischen den Ringen ihres Hinterleibes ausschwitset. Die Zellen selbst sind, nach Verschiedenheit ihrer Bestimmung, von verschiedener Grösse und Form. Die zur Aufbewahrung des Honigvorraths auf den Winter bestimmten, sind die tiefsten und oben mit einem kleinen Deckel versehen, die meistens am Rande des Kuchens stehenden Zellen der königlichen Larven, sind länglichrund und fünfzehn bis sechszehn Linien tief, die Zellen der Drohnenlarven sechseckigt und acht Linien, die der Arbeitsbienenlarven aber nur fünfund eine halbe Linien tief. Nicht in den Zellen selbst, sondern zwischen den innersten Zellenkuchen halten sich die Biener auf. Es hängt daselbst immer eine an der andern, indem die untere Biene mit den Vorderfüßen an den Hinterfüßen der obern Biene sich anklammert, und so nicht nur im Sommer ausruht, sondern auch den größten Theil des Winters hindurch schläft.

Die Bienen gehören wegen ihrer ungeheuren Vermehrung, die mit ihrer ökonomischen Benutzung unzertrennbar ist, unter diejenigen Insekten, welche den

Menschen öfter, als andere Insekten verletzen. Hierbey öffnen sich die Scheiden des Bienenstachels (Fig. 26. *a. a.*) und der zwischen denselben befindliche Stachel (*b.*) dringt in die Haut des Menschen. Geht der Stich nicht tief, so kann die Biene den Stachel unbeschädigt zurückziehen, sticht sie aber stark und zieht sich schnell zurück; so bleibt derselbe in der Wunde, wegen seiner Wiederhaken (*e. e.*), die sich nur langsam aus dem Fleische oder der Haut wieder entwickeln können. Der zurückbleibende Stachel zieht aber nothwendig das mit ihm zunächst verbundene Giftbläschen, und dieses selbst den mit ihm zusammenhängenden Theil der Eingeweide des Hinterleibes nach sich; die Biene stirbt daher nothwendig an Verletzung oder Verlust dieser Organe. Doch ist es nicht der mit Wiederhaken versehene, in der Wunde bleibende Stachel, welcher die Verletzungen der Bienen nachtheilig oder gefährlich macht; sondern die das Giftbläschen (*c.*) umgebenden Muskeln (*d. d.*) pressen in dem Augenblick eine giftige Feuchtigkeit aus dem Bläschen in die Wunde, als letztere von dem Stachel gemacht wird. Um sich hiervon zu überzeugen, darf man nur eine Biene an dem Hinterleibe zwischen den Fingern drücken, worauf man sogleich ein Tröpfchen jener Feuchtigkeit an der Spitze des hervorgetretenen Stachels gewahr werden wird. Bestreicht man nun mit diesem Gifte geschwind die Spitze einer Nadel und sticht sich damit, so erfolgen hierauf die nemlichen Wirkungen, wie vom Bienenstiche. Auch beweisen noch andere Versuche und Erfahrungen die giftige Beschaffenheit jenes Giftbläsensafts. *Schwammerdam* kostete etwas davon, empfand darauf einen bitteren Geschmack, der bald hernach schärfer und durchdringender wurde, sich bis im Schlunde erstreckte und ein beständiges Ausspucken veranlafste. Er fühlte zugleich eine Hitze im Munde, wie vom höchst rektifizirten Weingeiste. *Ludovici* ergriff verschiedene Bienen bey den Flügeln und hielt sie so, daß sie mit ihrem Stachel auf den Nagel seines Daumens stachen und einen kleinen Tropfen ihrer giftigen Feuchtigkeit darauf absetzten. Diese kostete er und verglich ihren, wohl zwey Stunden fortdauernden Geschmack auf der Zunge, mit dem vom Scheidewasser oder aufgelöstem Sublimate. Auch *Thouvenel* hat in den Bienen die Gegenwart eines sauren kaustischen Safts erwiesen und dargethan, daß er wegen seiner besonderen Verbindung noch kaustischer ist, als die Ameisensäure.

Da [die Königin mit einem weit stärkeren Giftbläschen und Stachel versehen ist, als die Arbeitsbienen; so pflegen auch ihre Verletzungen weit gefährlicher zu seyn. Doch sind die Bienenverletzungen überhaupt nicht zu allen Zeiten und unter allen Umständen gleich nachtheilig. Überaus viel beruht hierbey auf der

Em-

Empfindlichkeit und Reizbarkeit des verletzten Theils, auf der Menge und erhöhten Schärfe des Gifts. In letzterer Rücksicht sind die Bienen vorzüglich in der warmen Jahreszeit, oder zu der Zeit, wo sie schwärmen, um so mehr zu fürchten, wenn sie durch widerwärtige Ausdünstungen der Menschen, durch andere starke Gerüche, durch ein starkes Geräusch, durch das Schlagen unter sie, in Wuth gesetzt werden. Sie machen hierauf oft alle Bienen einer ganzen Gegend aufrührisch und locken sie durch ihre eignen Töne herbey. Sogar können sie durch gewisse Farben der Kleidungsstücke, durch ihnen ungewöhnliche Erscheinungen erzürnt werden. *Reaumur* versichert z. B. daß er allezeit von seinen Bienen davon laufen mußte, wenn er sich ihnen mit seiner Staatsperücke näherte, daß sie ihn aber im Schlafrocke sehr gerne litten.

Gewöhnlich folgt auf den Bienenstich augenblicklich heftiger Schmerz und eine rosenartige Gekwulst, die in ihrer Mitte sehr hart und weiß ist, und so lange dauert, als der Stachel in der Wunde bleibt. Doch ist ein einziger Stich selten von bedeutenden Folgen. Wird aber der Mensch von einem Schwarme Bienen mit Wunden bedeckt, so folgen hierauf Fieber, Ohnmachten, Zuckungen, ja er unterliegt oft der plötzlich entstehenden allgemeinen Entzündung, welche die Menge des in den Körper gebrachten Gifts veranlaßt. Beyspiele von leichteren entzündlichen Zufällen findet man häufig bey den angeführten Schriftstellern, vom Brand, der auf den Bienenstich erfolgte, bey *Zacutus*, vom Tode bey *Desbrest*, welcher erzählt, daß ein Landmann, der zweymal von den Bienen gestochen wurde, jedesmal in Ohnmacht fiel, das drittemal aber niedersank und kurz darauf starb. Ferner erzählt *Frenzel*, daß ein alter Bienenvater in der Oberlausitz bey seinem Bienenbesuche im Hausgarten von diesen Bienen, die ihn doch fast täglich zu sehen gewohnt waren, so wüthend und in solcher Menge befallen wurde, daß er nach etlichen Tagen, unter den grausamsten Schmerzen, seinen Geist aufgab. Eben dieser Schriftsteller führt ein Beyspiel an, wo vier an den Vorderfüßen gespannte Pferde auf der Huthung in der Mittagsstunde so wüthend von den Bienen angefallen und gestochen wurden, daß sie ungeheuer schwellen und das eine den zweyten, das andere den dritten Tag unter gewaltigen Hauen und Werfen umkam, die zwey übrigen aber nur mit Mühe gerettet wurden. Auch *Camerarius* erzählt, daß ein Soldat, welcher Honig stahl, mit dem Pferde von den Bienen getödtet worden sey.

Das sicherste Abhaltungs- und Verwahrungsmittel gegen den Bienenstich ist ohnstreitig der Rauch, wodurch sie auf kurze Zeit in eine gewisse Betäubung gebracht

bracht und ausser Stand gesetzt werden, ihre Wuth auszuüben. Der Rauch mancher Pflanzen, vorzüglich aber der Dampf vom Schwefel wird ihnen sogar tödtlich. Personen, welche genöthigt sind, sich Bienenstöcken zu nähern, haben besonders darauf zu sehen, Gesicht und Augen zu sichern, da man sogar Beyspiele vom Verluste der Augen durch den Bienenstich hat, auch als ein solches Beyspiel den berühmten griechischen Dichter *Homer* anführt, wenn nicht vielmehr sein Name zur Erdichtung dieses Ereignisses, oder des noch unwahrscheinlichen Umstands, daß er blind gebohren war, als diese Sagen zu seinen Namen Veranlassung gegeben haben. Man bedient sich gewöhnlich zur Abhaltung der Bienen vom Gesicht und Kopfe überhaupt, der Bienenkappen. Die Hände rath *Krünitz* zu beräuchern, oder mit Petersilie, Gartenmelisse, Fenchel abzureiben, oder mit einer Salbe aus dem Pulver der Spargelwurzel und Baumöhl zu bestreichen.

Die schon wirklich stechende Biene muß man nicht stören, weil sie selbst bemühet ist, den Stachel wieder aus der Wunde zu bringen, den sie aber abreißt, und sitzen läßt, so bald sie verjagt wird. Ist dieses schon erfolgt, so muß man alles Reiben sorgfältig vermeiden, um das mit dem Stachel zurückgebliebene Giftbläschen nicht noch mehr zu entleeren, vielmehr muß man so schnell wie möglich, den Stachel aus der Wunde entfernen, damit das Gift nicht vollends aus dem Bläschen in die Wunde übergeht und dadurch die entzündliche Geschwulst schmerzhafter und langwieriger macht. Bisweilen ist es nöthig, hierzu erst einen kleinen Einschnitt zu machen, um den Stachel mit einer feinen Nadel herausziehen zu können. Die Wunde wird sodann gelinde ausgedrückt und hierdurch ein Theil des Gifts aus derselben entfernt. Zur Entkräftung des in der Wunde bleibenden oder schon resorbirten Gifts selbst, hat man eine Menge, aber noch kein zuverlässig wirksames Mittel. Einige empfehlen Honig auf die ausgedrückte Wunde zu streichen und dieses zu wiederholen, so oft es trocken wird, andere Salzwasser, oder Öl, oder kühle Erde, oder ein Stückchen Zwiebel, oder gestossenes frisches Petersilienkraut, oder die zerschnittenen Köpfe des schwarzen Mohns aufzulegen. Die *Gazette d'Agriculture* rath die schmerzhafteste Stelle mit ungelöschtem, klar gemachtem Kalk zu reiben. *Krünitz* giebt noch eine Menge anderer Mittel an, die zum Theil schon deswegen weniger Werth haben, weil sie erst eine besondere Bereitung erfordern, und also nicht gleich bey der Hand seyn können. Die Verletzungen von vielen Bienenstichen erfordern Bähungen der Oberfläche des Körpers mit Öl und wenn die Entzündung stark ist, mit goulardischem Wasser, nach den Umständen auch Aderlassen und das innerliche antiphlogistische Verfahren.

35. Die schwarze Biene. Tab. III. Fig. 1—3.

Apis nigra, abdomine fasciis quatuor flavis: tribus primis interruptis. Linn. Faun. Suec. Ed. II. n. 1675. — Habitat in Europa.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. II. Th. II. S. 137. Tab. XXV. Fig. 10—15. *Guêpe-Ichneumon* à *trois Bandes interrompues, der Raupentödter mit drey unterbrochenen Binden.*
Onomatol. Hist. nat. P. I. p. 531. Die schwarze Wespe.

Fast von gleicher Grösse mit der Honigbiene ist gegenwärtige schwarze Biene (Fig. 1.), deren schwarzer, ungewöhnlich dicker Kopf mehr breit als lang und vorne etwas flach gedrückt ist. Oben auf der Stirne hat er drey kleine Ocellen, an beyden Seiten zwey grosse, ovale netzförmige Augen und zwischen denselben zwey, wie bey den Bienen gestaltete, kurze, am ersten Gliede gelbe, an den übrigen schwarze Fühlhörner. Die Fresszangen liegen zwischen zwey hornartigen Lippen und der Kopf hängt von hinten durch ein kurzes Hälschen mit dem Brustschilde zusammen. Dieser ist dick, fast ganz rund, schwarz und vorne mit zwey ovalen, gelben Flecken bezeichnet. Die an demselben befestigten Flügel, wovon die hintern kürzer als die vordern sind, sind ziemlich breit, von etwas bräunlicher Farbe und liegen horizontal auf dem Hinterleibe. Die ebenfalls am Brustschilde artikulirten Füsse haben schwarze Schenkel, gelbe Schienbeine und Fußblätter. Ein feines kurzes Stielchen macht die Verbindung zwischen dem Brustschilde und Hinterleibe aus. Dieser ist länglichrund, hat sechs Ringe und vier gelbe Queerbinden, wovon die drey ersten unterbrochen sind. Das Männchen ist so wenig, wie bey den Bienen, Wespen und Ichneumonien, mit einem verborgenen Stachel in der Spitze des Hinterleibes versehen, wohl aber das Weibchen. Drückt man den Hinterleib des letzteren, so geben sich die zwey hornartigen, inwendig konkaven Stücke des Schwanzrings (Fig. 2. a. b.) auseinander und es kommt ein krummer, zugespitzter Theil (c.) zum Vorschein, welches der Stachel (Fig. 3. a.) mit seinen zwey Halbscheiden (c. c.) ist, die dem Stachel noch zu einer besonderen Aussendecke im Unterleibe dienen. Der Stachel selbst aber besteht aus einem besonderen, ihn zunächst umkleidenden Futterale (Fig. 3. a.) und aus zwey feineren lanzettenartigen Instrumenten, die sich über den Grundtheil des Futterals verlängern (b. b.) und um einen runden muskulösen Theil krümmen. Das Insekt sticht mit diesen gefährlichen Instrumenten, wie die Bienen und Wespen, und ist im Stande hierdurch ähnliche schlimme Zufälle hervorzubringen.

Amei-

Ameisen überhaupt.

- Adanson Voyage au Sénégal, p. 175.
 Amoreux Notice des Ins. rep. ven. p. 83. et 235.
 Ardoyus de Venenis, Lib. VIII. C. 14.
 Arvidson et Oehrn. Diss. chem. de acide Formicarum, Lips. 1771.
 Banks und Solander in Th. III. Der Reisen im Südmeer, S. 227.
 Barrere natürliche Geschichte des mitternächtlichen Frankreichs, S. 198.
 Clauder, G. von heftigen davon entstandenen Schmerzen, dafs eine Ameise in das Ohr gekommen war, in Th. XIV. d. Abh. d. k. Akad. d. Naturf. S. 238.
 Deyeux über des Abts Fontana Abh. über die Ameisensäure, in Rozier Journ. de Phys. Nov. 1778.
 Esprit des Journaux Juillet 1781. p. 325.
 Fermín's Reise durch Surinam, Th. II. S. 295.
 Göze's Gesch. schäd. Insekten, S. 61.
 Hierne, Vrb. tentamen de duplici formicar. Sale, in Tentam. chemicis, To. II. c. annot. Walleri Stockh. 1753. p. 40.
 Marggraf Obs. de oleo ex formicis expresso acc. tentamina de acido horum insector. Acad. Reg. Berol. 1749. p. 38.
 Onomatologia Hist. Nat. P. III. p. 914.
 Plinii Hist. nat. Lib. XXIX. C. 4.
 Roux effect. singul. vaporis formic. in Vandermonde Journ. de Medec. Vol. XVII. p. 237.
 Schwammerdam's Bibel d. Nat. S. 121. Tab. XVI.
 Sperling, P. G. Diss. de Chemica formicar. analysi (Resp. Manitiüs) Witt. 1689. c. 8. Tab. aen.
 Spielmann Diss. de Anim. nociv. Alsat. p. 47.
 Thouvenel Memoire sur les principes et les vertus des substances medicamenteuses, Bordeaux 1779.
 Wray, de acido formicar. succo, Philos. Transact. n. 68. p. 263. Badd. I. p. 289. Leskens Uebers. B. I. Th. I. S. 96.

Die Ameise, oder Emse, griechisch *μύρμηξ*, lat. *Formica*, franz. *la Fourmi*, engl. *Ant*, *Emmete*, spanisch *Hermiga*, holländisch *Mier*, unterscheidet sich von andern Insekten durch einen grossen Kopf, kleine Augen, gebrochene Fühlhörner, starke Kinnladen und meistens noch durch den langen Stiel ihres Hinterleibes. Sie lebt, wie die Wespe und Biene, in grossen Gesellschaften, die ebenfalls aus Weibchen, Männchen und Geschlechtlosen zusammengesetzt sind. Erstere sind geflügelt, die Geschlechtlosen aber ungeflügelt. Hingegen sind letztere und die Weibchen, wie die Bienen, mit verborgenen Stacheln versehen. Die Geschlechtlosen werden auch *Arbeitsameisen* genannt, weil sie den Ameisenhaufen bauen, ihn mit den nöthigen Lebensbedürfnissen versehen, sogar die Ernährung und Pflege der Larven besorgen, die sie am Tage der freyen Luft aussetzen, und des Nachts wieder in die unterirdischen Gallerien des Häufens bringen, sie übrigens gegen alle feindliche Anfälle in Schutz nehmen. Ähnliche Sorgfalt beweisen sie für die Nymphen oder Ameisenpuppen, welche Unwissende für Ameiseneyer zu halten pflegen. Die Bestimmung der Weibchen ist blos die Abwartung der Befruchtung und des Eyerlegens. Ist dieses vorüber, so werden sie unbarmherzig fortgejagt und man sieht sie dann oft in grossen Schwärmen herumfliegen. Die Bestimmung der Männchen ist die Begattung. Da sie nie in den Ameisenhaufen kommen, so begnügen sie sich blos um denselben herumzufliegen und die Weibchen aufzusuchen. Die Geschlechtsameisen kommen bey einbrechender Kälte um,
 die

die Geschlechtlosen aber bringen den Winter erstarrt in den Ameisenhaufen zu. Ihre gesammelten Vorräthe von Lebensmitteln, sind daher keine Beweise ihrer Sorge für den Winter, sondern bloß ihres mechanischen Fleisses.

Auch das Ameisengeschlecht liefert eine Menge der Gesundheit des Menschen schädlicher Arten. *Plinius* gedenkt schon einer Art giftiger Ameisen und *Ardoynus* sagt, daß auf den Biss der Ameisen ähnliche Zufälle, wie auf den Bienen und Wespenstich erfolgten. Eigentlich aber schaden sie auf dreyerley Weise, jedoch immer mehr in ganzen Haufen, als einzeln, und immer nur dann, wenn sie in ihren Lagerstätten beunruhiget werden. Sie setzen sich hierauf mit bewundernswürdiger Kühnheit zur Gegenwehr, sprützen einen sauren Saft von sich, kneipen ziemlich starck mit ihren scharfen Fresszangen, beugen ihren Hinterleib und suchen mit ihren Stachel die Haut des Menschen zu beschädigen. Tödtet man auch Hunderte, so stürmen gleich noch zahlreichere Heere hervor, den Tod der erstern zu rächen. In diesem Zustande der Wuth bemerkt man, daß der saure Dampf, welchen die Ameisenhaufen von sich zu geben pflegen, ungleich stärker wird, zum Beweis der hierdurch vermehrten schädlichen Ausdünstung dieser Insekten. In der That ist es auffallend, daß letztere statt des alkalischen, urinösen Geistes anderer Insekten, einen sauern, unter dem Namen *Ameisensäure* bekannten, bey sich führen, der so scharf ist, daß die in einen Ameisenhaufen gesteckte Hand, anfangs Wärme, hernach Jucken empfindet, aufschwillt und sich entzündet, worauf das Oberhäutchen sich, wie nach der Application eines spanischen Fliegenpflasters, abzusondern pflegt, *Thouvenel* hat die Causticität der flüchtigen Ameisensäure an sich selbst erfahren. Er bekam an allen Spitzen seiner Finger grosse Blasen, nachdem er sie von den anhängenden Ameisen gesäubert hatte. Die Ameisen gehören auch unter diejenigen Insekten, welche öfter, als andere, dem Menschen ins Ohr zu kommen pflegen. Wegen ihrer schädlicheren Verletzungswerkzeuge können sie dann auch weit nachtheiligere Folgen nach sich ziehen, als die gewöhnlichen Ohrwürmer. *Clauder* erzehlt hiervon einen Fall.

Das bisher Gesagte bezieht sich mehr auf die europäischen Arten. Weit gefährlicher aber sind diejenigen, welche die Landplagen der heisseren Erdstriche der übrigen Welttheile zu seyn pflegen. *Adanson* erzehlt, daß von den giftigen Stichen einer rothen, sich in einem Baum aufhaltenden Ameisenart, Gesicht und Hände mit Blasen bedeckt wurden, die den Brandblasen glichen und deren Schmerz erst auf einen starken Regen bey eintretender Nacht nachliefs. *Banks* und *Solander* aber gedenken einer grasgrünen Ameisenart in Neu-Südwallis, welche

che auf Bäumen wohnt und sich Nester aus den Baumblättern baut. Tausende derselben fielen beyde Reisende augenblicklich an, als sie solche in ihrer Arbeit störten, und verursachten ihnen mit ihren Stacheln unerträgliche Pein. Am meisten mussten sie von denjenigen ausstehen, die sich an ihre Hälse und in die Haare setzten, weil sie sie an diesen Stellen fast gar nicht wieder los werden konnten. ihr Stich war bey nahe eben so empfindlich, als der Stich einer Biene; doch dauerte der Schmerz jedesmal nur eine Minute. Eine andere, ganz schwarze Ameisenart, wohnte in den Ästen eines besonderen Baums, welcher ganz ausgehöhlt war, weil sie das Mark desselben bis in die Enden der dünnsten Zweige ausgeleert hatten. Als die Reisenden einige Zweige davon abbrachen, sahen sie sich mit Legionen dieser Insekten bedeckt, die aus jedem abgebrochenen Zweige herausstürzten und sie unaufhörlich heftig stachen. Surinam, das Vaterland einer Menge schädlicher Insekten, hat auch eine Menge schädlicher Ameisen. *Fermin* erzehlt, daß auf den Stich einer giftigen Ameisenart dieser Provinz, ein Fieber gefolgt sey, welches einige Stunden dauerte. Unten werden wir noch eine andere Art Ameisen kennen lernen, die sich nicht begnügen sich im Freyen aufzuhalten, sondern zu gewissen Zeiten sogar die Häuser der Kolonisten besuchen und deswegen *Visitenameisen* genannt werden. So wohlthätig sie den Einwohnern dadurch werden, daß sie alles Ungeziefer, Spinnen, Ratten, Mäuse, vorzüglich die schädlichen Kakerlaken in ihren Wohnungen aufsuchen und vernichten, so lästig werden sie ihnen oft auf der andern Seite durch die Menge, welche sie nöthiget, die Wohnungen eine Zeitlang zu verlassen, um vor ihren Stichen und Bissen sicher zu seyn. Das im *Esprit des Journaux* zur Vertreibung der Ameisen aus den Zimmern empfohlne Mittel würde ihnen in solchen Fällen sehr nützlich werden. Es besteht in einer Auflösung eines Pfunds schwarzer Seife, die mit zwey Unzen Lavandelöhl vermischt worden ist, in drey pariser Pinten warmen Wasser. Hiermit bestreicht man die Bettstellen, Wände und Fußböden der Zimmer und Kammern, wo sich die Ameisen aufhalten.

Der Kürze wegen hebe ich noch die hieher gehörigen Stellen des schönen und gedrängten Auszugs der Schriften aus, welche die *Oxomatologia Historiae naturalis* zur Naturgeschichte der ausser-europäischen Ameisen enthält. „In Zeylon giebt es grosse rothe Ameisen, die man *Dimbios* nennt, und die auf den Zweigen grosser Bäume zwischen den Blättern nisten, die sie in der Grösse eines Menschenkopfs zusammenballen. Man bemerkt öfters viele Nester auf einem Baum und die Furcht, mit tausend gefährlichen Stichen empfangen zu werden, hält jeden ab,
auf

auf einen solchen Baum zu steigen. Die Ameisen, welche *Coura-Atches* heissen, sind groß und schwarz, leben auf der Erde und bohren Löcher in dieselbe, wie die Caninchen. Die Felder sind mit ihnen dergestalt angefüllt, daß das Vieh unaufhörlich in der Gefahr steht, um seine Füße zu kommen. Auch die *Coddias* Ameisen auf der Insel Zeylon von der Grösse der vorhergehenden sind sehr schön schwarz. Sie leben gleichfalls auf der Erde, sind aber gewohnt, Excursionen in zahlreichen Heeren zu machen, und beissen grausam, wenn man sie verwundet oder in ihren Trieben stört. Im westlichen Afrika giebt es rothe, den europäischen an Grösse nachstehende Ameisen in ungeheurer Anzahl auf Bäumen. Sie fallen durch die geringste Bewegung, z. B. vom Winde, zur Erde, und wehe dem auf den sie fallen: denn sie beissen sehr lebhaft und ihr Stich ist so giftig, daß er auf der Haut eine Blase zurückläßt, welche so sehr schmerzt, als eine gebrannte Wunde. *Labat* erzehlt, was ein gewisser *Brue* mit seiner Gesellschaft von diesen kleinen Geschöpfen erfahren hat. Der Mastbaum seines Schiffs berührte einige Zweige von den mit solchen Ameisen beladenen Bäumen, die sich über den Fluß ausgebreitet hatten, und sogleich fiel eine solche Menge jener Ameisen auf die in dem Schiffe befindlichen Personen herab, daß sie genöthiget waren, dasselbe wegen der Heftigkeit der Schmerzen, welche die Ameisenstiche veranlaßten, zu verlassen. Lezteres würden sie nicht nöthig gehabt haben, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, daß das gewöhnliche und beste gegenmittel das Bad ist, worauf nicht nur die Schmerzen aufhören, sondern auch die entstandenen Blasen in kurzer Zeit verschwinden. Auf den amerikanischen Inseln, giebt es nach *Merianens* Versicherung noch zwey Arten rother Ameisen, wovon die eine sehr beißt und wenn sie sich ins Hemde einschleicht, einen brennenden, sich in dem Umfang einer Hand zwischen Haut und Fleisch verbreitenden Schmerz veranlassen kann, der durch alles Kratzen nicht gemildert wird. Auch giebt es noch eine dritte Art, deren Stiche dem Menschen mehr zu schaffen machen, als Skorpionsstiche, ohngeachtet der Schmerz nicht viel länger, als eine Stunde dauert. Noch gedenkt *Barrere* einer Ameisenart, die sich auf der Insel Laymma aufhält und die er *Flamant* nennt. Sie wählt sich nur die Wälder zu ihrem Aufenthalte, und ihr Stich erweckt ein Fieber, welches vier und zwanzig Stunden dauert.

36. Die rothe Ameise. Tab. III. Fig. 4—14.

Formica rubra testacea, oculis punctoque sub abdomine nigris. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2799. n. 7. Amoenit. acad. Vol. III. p. 343. Faun. Suec. I. p. 305. n. 1022. H. Goth. p. 264. — Habitat in Europae silvaticis sub lapidibus, pessime rostratum pungens.

Blumenbach's Handb. d. Naturgesch. S. 375. n. 3.
Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze. B. II. Th. II. S. 300 und 328. Tab. XLIII. F. 1—14.
Fourmi rougeâtre à aiguillon, die rüthliche Ameise mit dem Stachel.
Fabricii Mant. Ins. I. p. 308. n. 11. Spec. Ins. I. p. 490. n. 9.
Fischer's Naturges. v. Livl. S. 167. *rothe Ameise.*
Fuefslly's schweiz. Ins. S. 52. n. 1030. *rothe Ameise.*
Leeuwenhoeck Opera Lugd. Bat. 1722. 4. Epist. d. 9. Sept. 1687. p. 107. 112. Fig. 8.

Martini's allgem. Gesch. d. Nat. B. II. S. 257.
Die kleine Garten- oder Wiesenameise, kleine rothe Feld- oder Hügelameise.
Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 913. n. 7.
Die kleine rothe Ameise.
Mülleri Faun. Fridr. p. 75. n. 658. Zool. Dan. Prodr. p. 166. n. 1936. Norv. *Eiter-Migmaur.*
Onomat. Hist. nat. P. III. p. 923.
Pontoppidan's Naturgesch. v. Dänemark. S. 228. n. 5. *Rubra. Pisse-Myren (Seichameisen).*
Raji Hist. Ins. p. 69. *Formica minima rubra.*
Schwed. Abh. III. p. 48. n. d. kleine rothe Ameise.

Gegenwärtige, beynahe überall in Europa sehr gemeine Ameisenart, wohnt in grosser Menge beysammen in der Erde, unter Grashügeln und Steinen. Die Eyer (Tab. III. Fig. 4.), aus welchen die Ameisenlarven erst im Frühjahr hervorkommen, haben die Grösse der Sandkörner, eine weiche, glänzend- weisse Schale und eine länglichrunde Form. Im April haben die grössten der ausgekrochenen Larven die Grösse der gegenwärtigen Abbildung (Fig. 5.), sind ebenfalls weiss, kurz und dick. Durch's Mikroskop entdeckt man an denselben (Fig. 6.) einen hornartigen, mit zwey Zähnen versehenen Kopf (a), und zehn Ringe, des gekrümmten, nach hinten dicker werdenden, mit feinen Härchen übersäeten Leibes. Sie liegen beynahe unbeweglich im Haufen und die Arbeitsameisen tragen sie mit den Zähnen wieder zusammen, wenn man sie zerstreuet. Es äussert sich an denselben kein Geschlechtsunterschied, wohl aber an den Nymphen, welche eine sonderbare Gestalt haben, und hier (Fig. 7. 8.) vergrössert vorgestellt sind. Die Nymphen der Arbeitsameisen (Fig. 7.) sind kleiner, haben einen grossen Kopf (a), der mit Zähnen (b.) versehen ist, und einen nach unten gebogenen Hinterleib (e). Auch erkennt man an denselben die Fühlhörner (c.) und die Füsse (d). Ihre Augen sind braun oder schwarz, die Farbe des ganzen Körpers anfangs milchweiss, gegen die Zeit des Auskriechens aber braunroth. An den grössern, weniger gekrümmten Nymphen der geflügelten Ameisen (Fig. 8.) bemerkt man ausser den bisher angegebenen Theilen, noch die Flügelscheiden (b.).

Das

Das aus der Nymphe kommende vollkommene Insekt (Fig. 9 und 14.) ist drey bis vier Linien lang und an allen Theilen des Körpers mit feinen Härchen besetzt. Der Kopf und die vordere Hälfte des Hinterleibes ist bey den Arbeitsameisen (Fig. 9 und 10.) rothbraun, der Brustschild, das Verbindungsstielchen und die Füße rothgelb. Bey den männlichen und weiblichen Ameisen (Fig. 13.) ist der größte Theil des Körpers schwarzbraun, bis auf den Hintertheil des Hinterleibes und die Fußblätter, welche ins braunrothe fallen.

Die mit keinen Flügeln versehenen Arbeitsameisen (Fig. 9 und 10.) haben einen langen eyförmigen Kopf, mit zwey schwarzen, netzförmigen Augen, zwey Zähnen (*b. b.*) und zwey langen Fühlhörnern (*a. a.*), die aus einem geraden, kürzern und ungetheilten, und aus einem langen, mit jenem unter einem stumpfen Winkel vereinigten, eilfgliedrichtigen Theile bestehen. Dieser Kopf hängt mit dem langen, vorne dicken und abgerundeten, in der Mitte schmälern, am Ende aber gleichsam quer abgeschnittenen und mit zwey Spitzen versehenen Brustschilde (*c.*), mittelst eines kleinen Halsgen, und der Brustschild mit dem dicken, ovalen Hinterleibe durch ein länglich rundes Verbindungsstielchen zusammen. Die sechs langen, am Brustschilde befestigten Füße aber haben nichts Auszeichnendes.

Die Männchen (Fig. 13.) sind mit den Arbeitsameisen von gleicher Grösse, weichen aber in der Gestalt sehr von ihnen ab. Ihr Kopf ist mehr rund, am Hintertheile mit drey kleinen glatten Ocellen versehen, der Brustschild vorne dick, hinten schmal und stumpf, das Verbindungsstielchen zwischen dem Brustschilde und Hinterleibe, ebenfalls dick, hoch und bukllicht. Am Brustschilde sind die zwey langen und breiten Vorder- und die zwey kurzen und schmalen Hinterflügel artikulirt, welche durchsichtig und mit einigen gelblichen Adern durchzogen sind.

Beynahe noch einmal so groß, als die männliche und die Arbeitsameise, ist das hier in seiner natürlichen Grösse vorgestellte Ameisenweibchen (Fig. 14). Es hat, die Flügel und Farbe ausgenommen, im Ganzen mehr Ähnlichkeit von den Arbeitern, als von den Männchen, am Kopfe drey kleine glatte Ocellen und am hinteren Ende des Brustschilds zwey Dornspitzen. Seine Flügel reichen weit über den Hinterleib hinaus und sitzen so lose am Brustschilde, daß sie bey der geringsten Berührung abfallen. Es begattet sich mit dem Männchen vorzüglich bey heissem Sonnenschein und man sieht sie dann vereinigt in der Luft herumschwärmen.

Leeuwenhök hat bey den Weibchen und Arbeitsameisen in der Schwanzspitze einen verborgenen Stachel (Fig. 11. *a.*) entdeckt. Dieser Stachel ist, unter dem

dem Mikroskop betrachtet (Fig. 12.), an der Wurzel dick und läuft allmählich in eine feine Spitze zu. Verschiedene Muskeln (*a. a. a. a.*) geben ihm die nöthige Richtung, und pressen wahrscheinlich eine giftige Feuchtigkeit durch den Kanal des Stachels in die Wunde. Denn, ohne das Eindringen eines gewissen feinen Gifts läßt sich wohl schwerlich aus der Gestalt des unbedeutenden Stachels, der auf den Stich folgende, lebhafte, brennende Schmerz erklären, welcher ziemlich lang anhält und allermeist eine entzündliche Geschwulst der Haut zur Folge hat.

37. Die Zugameise. Tab. III. Fig. 15. 16.

Formica cephalotes, thorace quadrispinoso, capite didymo magno, utrinque posterius mucronato. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2802. n. 15. — Habitat in America meridionali, ferrugineo-pubescent, abdominis petiolo bituberculato.

Berlinische Sammlungen Band VII. Stück 3. S. 232.
laufende oder wandernde Ameisen.

Blumenbach's Handbuch d. Naturgeschichte,
S. 376. n. 6.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze. B. III.
S. 392. Tab. XXXI. Fig. 11 — 13. *Fourmi de Visite*,
die Zugameise, *Formica migratoria*.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 310. n. 38. Spec. Ins. I.
p. 493. n. 31. Syst. Ent. p. 395. n. 22.

Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 295.
Die wandernde Ameise.

Hist. de l'Acad. des Sciences à Paris 1701. p. 16.

Lyonet sur Lesser. I. p. 195.

Martini's allgemeines Naturlexikon, B. II.
S. 239.

Markgravii Hist. rer. nat. Brasiliae, p. 232.
Formica magna.

Merianae Metamorphosis Ins. Surinam. Tab.
XVIII.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. Th. II. S. 915.
n. 15. Der Dickkopf.

Neue Mannigfaltigkeiten. Jahrg. III. S. 252.

Onomat. Hist. nat. P. III. p. 925.

Schwammerdam's Bibel der Nat. S. 124.
Tab. XVI. Fig. 16.

Sebae Thesaur. ins. IV. Tab. 99. Fig. 6.

Dieses ist die schon oben erwehnte Visitenameise der Madame Merian, welche in verschiedener Rücksicht merkwürdig ist und daher noch eine besondere Beschreibung verdient. Sie ist nicht nur im mittägigen Amerika, sondern auch auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und in Ostindien zu Hause, und von beträchtlicher Grösse (Fig. 15). Ihre Farbe ist kastanienbraun, ihr Äusseres rauh von der Menge braunrother Härchen, die alle Theile ihres Körpers bedecken. Vorzüglich zeichnet sie sich durch ihren grossen, in der Mitte ausgeschweiften und daher zwey Hügel bildenden Kopf (Fig. 16.) aus. Jeder dieser Hügel ist mit einer kleinen, nach hinten gekrümmten dornartigen Spitze versehen (Fig. 15.), am Vordertheile aber stehen die zwey Fühlhörner (Fig. 16. *a. a.*) und die kleinen, ovalen und schwarzen Augen. Das Zangengebiß dieser Ameise (Fig. 16. *b.*) besteht aus zwey gebogenen, von der Innenseite gezähnten und sich im Ruhestand kreuzenden Häcken. Ein überaus dünnes und kurzes Hälsgen verbindet den grossen Kopf

Kopf mit dem aus zwey bucklichten Abtheilungen bestehenden Brustschild. Auf der vordern Abtheilung stehen zwey nach hinten gekrümmte dornichte Spitzen weit auseinander, auf der hintern zwey ähnliche Spitzen dicht beysammen. Der Hinterleib ist kleiner als der Kopf, länglichrund und hängt mit dem Brustschilde durch ein zweygliedrichtes Stielchen zusammen. Von den sechs Füßen sind vorzüglich die hintersten sehr lang.

Diese Ameisen sind im Stande mit ihren scharfen Fresszangen die Bäume in einer Nacht so zu entblättern, daß sie den andern Morgen Besen gleichen. Ein ganzer Zug verbreitet sich auf einem Baum, beißt die Blätter ab, und viele Tausende fallen über die auf der Erde liegenden Blätter her und tragen sie in ihre Nester, welches überaus künstliche, oft acht Fuß hohe Höhlen in der Erde sind. Wo sie durch Gräben, Kanäle etc. abgeschnitten werden, machen sie sich eine künstliche Brücke. Eine Ameise beißt sich an ein Stückchen Holz fest, die zweyte hängt sich an die erste, die dritte an die zweyte u. s. w. und so lassen sie sich von dem Winde überführen, bis die letzte an der Kette sich auf der andern Seite befindet. Einige Tausend andere passiren nun über diese Brücke. Alle Jahre bisweilen auch erst alle drey Jahre, ziehen sie in grossen Heeren aus ihren Höhlen in die Häuser. Die Menschen selbst müssen sodann vor ihnen fliehen, indem sie truppenweise aus einem Zimmer ins andere ziehen und nur dann erst in ihre Höhlen zurückkehren, wenn alle Häuser vom Ungeziefer gereinigt sind.

Fliegen überhaupt.

Amoreux Notice. p. 120 et 261.
 Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 381. *Musca*,
Fliege.
 Bosse de Vermibus in pustulis cutis inventis.
 Foux. Jour. d. Med. V. XXVII. p. 336.
 Bressl. Natur- und Kunstgesch. Vers. 4. S. 963. von
 den schädlichen Fliegen in Servien.
 Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI. S. 4.
 Douglafs von den Würmern, die aus einem Ge-
 schwüre in der Schamseite herausgegangen. Edinburg.
 Vers. B. I. S. 289.
 Eberts Naturgesch. f. d. Jugend. Th. III. S. 124.
 Fabricii Syst. ent. p. 756. *Bibio*; p. 759. *Stratiomys*;
 p. 761. *Rhagio*; p. 762. *Syrphus*; p. 773.
Musca.
 Fuefsly's Verz. schweiz. Ins. S. 54.
 Geoffroy Hist. d. Ins. II. p. 475. *Stratiomys*;
 p. 483. *Mouches*.

Gleichen's Gesch. d. Stubenfliege v. Keller, S. 29.
 Homeri Ilias, Lib. XIX.
 Isib. ab Amelunxen Brevier. rer. memorab. n. 4. p. 12.
 Le Dran, von der Cur der Schufswunden, S. 178.
 Leeuwenhoeck Epist. de 17. Octb. 1687. n. 121.
 Leske's Anfangsgr. d. Naturgesch. S. 479. *Fliege*.
 Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 947.
Fliegen.
 Neuer Schauplatz d. Natur, Th. III. S. 122.
 Onomat. Hist. nat. Vol. V. p. 353.
 Paullini de Morte verminosa, p. 36. *Musca*.
 Derselbe von Würmern, welche aus den Schweisslö-
 chern der Haut gekommen und vorzüglich in den Kin-
 derblättern im Th. VI. S. 10. der Abh. d. k. A. d. N.
 und von wurmichten Massern im Th. XV. S. 488.
 Derselben Abhandlungen.
 Polisius de Muscis polonicis exitiosis. Eph. N.
 C. Dec. II. Ann. 4. Obs. 40. p. 98. c. Fig.

Rösel's Insektenbel. B. II. Mücken und Schnaken, S. 44.

Salzmanni Diss. de Verme Narium. Argentor. 1721.

Sauvages Nosol. method. Ed. Daniel. T. V. p. 199; p. 204. n. 8; p. 205. n. 9.

Schenkianus de Morbo novo Westphal. endem. Lib. VI. p. 919.

Schwammerdam's Bibel d. Nat. Regist. *Fliege*. Sulzer's Gesch. der Ins. S. 213.

Zachmanni Diss. de vermibus in vulnere. Basil. 1704.

Ehe *Linne* und *Geoffroy* den Geschlechtscharakter der Fliege festsetzten, belegte man mit diesem Namen mehrere, ganz verschiedene Insektengeschlechter, und verwechselte vorzüglich immer die Begriffe, von *Fliege* und *Mücke*. Letztere, oder die langbeinige Fliege, werden wir unten besonders kennen lernen. Erstere, welche griechisch *μύια*, lateinisch *Musca*, französich *Mouche*, engl. *Fly*, italienisch *Mosca* genannt wird, zeichnet sich vorzüglich durch die schaufelförmigen Fühlhörner und den langen beweglichen, am Ende mit zwey Fleischlippen versehenen Saugrüssel aus, der im Ruhestande doppelt zusammengeschlagen ist und in eine, unter dem Kopfe befindliche Vertiefung paßt. Die Larve, aus welcher die Fliege entsteht, führt überhaupt den Namen *Made*, ist weich, weiß und ohne Füße, und in Beziehung auf den Schaden, welchen sie dem menschlichen Körper zufügen kann, gleich merkwürdig mit dem vollkommenen Insekte.

Sowohl *Made*, als *Fliege* nähren sich von thierischen und vegetabilischen Säften und Substanzen, von Süßigkeiten, am meisten aber von den verworfensten faulenden Dingen, in welche sie zugleich ihre Eyer absetzen. Ungeheuer ist die Vermehrung dieser Insekten. Nur ein einziges Paar von der Brechfliege liefert nach *Rösels* Berechnung nach einer dreymaligen Paarung 444480 in einem Jahre, und ein einziges Paar von der Stubenfliege nach *Gleichen's* Berechnung 2208420. Ihre eigentliche Bestimmung machte aber eine solche Vermehrung nothwendig, und diese ist die Menschen und Thieren gleich wohlthätige Beförderung der gänzlichen Auflösung und Zerstörung faulender Substanzen, welche durch langes Verweilen unter freyem Himmel die Luft verpesten würden. Fehlen diese Substanzen, so werden die Fliegen nothwendig Menschen und Thieren durch die sie anlockende Ausdünstung lästig. Sie stechen mit ihren Saugrüssel und saugen damit Schweiß, Blut und andere Feuchtigkeiten ein. Dieses veranlaßt aber Jucken und Flecken auf der Haut wodurch sie jedoch im Ganzen mehr beschwerlich als schädlich werden. Am meisten leiden von ihnen ganz oder halb nackend gehende Menschen welche sich deswegen genöthiget sehen, zur Abhaltung dieser Insekten, ihre Oberfläche mit dem Saft gewisser Pflanzen, mit ölichten und harzichten Mitteln zu bestreichen. Ohngeachtet sie also an sich blos mechanisch schaden und keine,

keine, ihnen eigenthümliche giftige Feuchtigkeit in die Wunde lassen; so können sie doch gewisse schädliche Stoffe, und selbst Krankheitsmaterien, die sie oft an ganz entfernten Orten aufnehmen, auf uns wieder absetzen, und so die Verbreiterinnen hitziger und chronischer Hautausschläge, der Pest und anderer ansteckender Krankheiten werden. Sie besuchen ferner die Leichname der Thiere, die Cloaken und tausend in der Gährung und Fäulniß begriffene Dinge, kosten Gifte und für sie selbst bereitete Giftmischungen, und können also eine Menge ungesunder Theilchen auf unsern Körper und in unsre Speisen und Getränke übertragen.

Die Larven der Fliegen erscheinen nicht selten in hitzigen und chronischen Hautausschlägen. *Isib. v. Amelunxen* und *Paullini* wollen sie in den Masern und letzterer noch besonders in den Pocken beobachtet haben. Sie beschreiben sie als weisse Würmchen, welche schwarze Punkte auf den Köpfen hatten und aus den Schweißlöchern der Haut herausgekrochen sind. *Sauvages* schreibt „die Fleischfliegen hatten im vorigen Jahre beynahe alle der Luft ausgesetzte Blatterpusteln durchbohrt, ihre Eyer darinnen abgesetzt, und es entstanden daher weisse Maden von der Grösse eines Gerstenkorns wovon immer eine in jeder reifen Pustel gefunden wurde. *Razous* schloß diese Maden einige Tage in Gläser, wo sie sich in Fleischfliegen verwandelten.“ Auch die in vernachlässigten, unreinen Geschwüren, besonders im Sommer, entstehenden Würmer, verdanken ihren Ursprung einzig den Fliegen. Dieses war schon dem *Homer* bekannt, der dem Achilles befürchten läßt, die Fliegen mögten die Wunden des todtten Patroklos mit Würmern erfüllen, während er sich gegen den Hektor zu rächen suchte. Ehemals glaubte man, daß solche Geschwüre und Schäden, in welchen sich Würmer erzeugten, weit schwerer, als andere zu heilen wären. Aber *Le Dran* hat ganz recht, wenn er sagt „die zuweilen in den Wunden wachsenden Würmer bedeuten nichts Böses, auch ist es nicht wahrscheinlich, daß sie aus dem Blute abgesetzt werden, sondern daß sie vielmehr aus den Eyern sich entwickeln, welche während dem Verbande von einem Insekten in die Wunde gelegt worden sind.“ Lezteres hat auch *Leeuwenhöck* vollkommen erwiesen. Er meldet, daß man in den drüsichten Beulen, die eine Jungfer in der Wade hatte, Fliegenlarven gefunden habe, die er mit einem Stückchen Rindfleisch herauszog. Sie verwandelten sich alle in Fliegen, und waren also sicher von einer Fliege entstanden, die das Mittel gefunden hatte, ihre Eyer in jene Beulen zu bringen. Nothwendig mußten aber schon faulichte Säfte in der Beule stocken, da die Fliegen nie ihre Eyer in das gesunde Fleisch der Menschen und Thiere absetzen. Ähnliche faulichte Verderbnis der festen

Theile,

Theile, war auch in den Krankheiten zugegen, welche *Sauvages* unter *Malis Westphaliensis*, die um das Jahr 1596 in Westphalen, Geldern und Friesland, und unter *Malis Transylvanica*, beschrieben hat, die um eben diese Zeit in Siebenbirgen endemisch herrschte. Erstere Art war mit einer Geschwulst um die Gelenke verbunden, auf welcher in kurzer Zeit scorbutische Flecken erschienen. Wenn diese Geschwülste in Eiterung giengen, so liessen sie, besonders um die Füße, bösartige Geschwüre zurück, aus welchen den Ascariden gleichende Würmchen gezogen wurden. Bey letzterer Art aber kamen den Käsemaden ähnliche Würmchen aus den Fisteln der Knie und mit dem Urine zum Vorscheine.

Da es also eine sehr bekannte Erfahrung ist, daß Fliegen durch ihre Eyer, und noch mehr durch ihre Maden, Geschwüre und Wunden sehr verunreinigen können; so ist es wohl nicht allein wegen Abhaltung der Luft, sondern vorzüglich wegen Abhaltung der mancherley Fliegenarten, wohin vorzüglich die *gemeine Goldfliege* (Tab. III. Fig. 17.), die *Aasfliege*, die *Todtenfliege*, die *Brechfliege* (Fig. 22 und 23.), die *Fleischfliege* (Fig. 28 und 29), und die *Quarkfliege* (Tab. IV. Fig. 7.) gehören, in der wärmeren Jahrszeit nothwendig, Geschwüre und Wunden nicht lange offen und unbedeckt zu lassen, und desto fleissiger den Verband zu erneuern, je öfter er von stinkender Gauche durchnäst wird, weil selbst die Maden, welche sich aus den im Verband abgesetzten Fliegeneyern entwickeln, in das Geschwür gelangen können.

38. Die Stubenfliege. Tab. III. Fig. 30—33.

Musca domestica thorace lineato, abdomine tessellato subtus basi pallido. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2841. n. 69. Amoen. acad. III. p. 343. Faun. Suec. 1833. — Habitat in Europae, Americae domibus, larva in stercore, pupae parallelae cubantes.

Aldrovandi de Animalibus Insectis, p. 348. T. II. F. 13.

Beobachtung und Abbild. einer Stubenmücke mit vielen kleinen Insekten, Nürnberg. 1765. Fol.

Blumenbach's Handb. d. Naturg. S. 381. n. 3. Stubenfliege.

Bonnet's Betracht. d. Nat. S. 190. Considerat. sur les corps organisés Art. II. p. 295.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 608. la Mouche des maisons.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze B. VI. S. 35. Tab. IV. Fig. 1—10. Grande Mouche domestique, die grosse Hausfliege.

Fabricii Mant. Ins. II. p. 343. n. 9. Spec. Ins. II. p. 436. n. 7. Syst. Ent. p. 774. n. 5.

Fuefsly's schweiz. Ins. S. 55. n. 1102. Hausfliege. Geoffroy Hist. d. Ins. II. p. 528. n. 66. la Mouche commune.

Gleichen (W. F. v.) Gesch. d. gemeinen Stubenfliege nebst 4 Kupf. v. Keller, Nürnberg. 1764. gr. 4.

Göze Gesch. schädli. Ins. S. 108.

Joblot Observat. avec le Microsc. T. I. p. 1, Tab. 5.

LeDERMÜLLER's Gemüths- und Augenergötzungen, drittes Fünftzig, S. 61—67. und 80—85. Tab. 34—37. und Tab. 41. 42.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 976. n. 69. Stubenfliege.

Müller's Faun. Fridr. n. 732. Zool. Dan. Pr. n. 2103.

Muralto (J. de) Anatome musca vulgar. Eph. N. C. Dec. II. an. 1. obs. 64. p. 158.

- | | |
|--|--|
| <p>Olaffen's Reise durch Island, I. S. 322.
 <i>Olla putrida</i> 1780 n. 1. p. 87. Naturgeschichte der
 Stubenfliege.
 <i>Onomat.</i> Hist. Nat. V. p. 363. <i>Hausmilche, Stubenfliege.</i>
 Pontoppidan's Nat. Gesch. v. Dänemark, S. 229.</p> | <p>Raji Hist. Ins. p. 270. n. 2.
 Schaefferi Elem. Ent. Tab. LXXXV.
 Scopoli Entom. carn. p. 872.
 Watkins Exerc. du Microsc. à Londre. 1754.
 p. 322.</p> |
|--|--|

Die Stubenfliege (Fig. 53.) ist höchstens vier Linien lang, hat einen schwarzen Kopf, zwey rothbraune Augen, einen langen verborgenen Saugrüssel mit zwey gelben, wulstigen Lippen, zwey kurze, schwarze bärtige Fühlhörner, einen gewölbten und gegen den Leib spitzig zulaufenden, dunkelgrauen Brustschild, an welchem die langen, über den Hinterleib hinausreichenden, durchsichtigen und schwärzlichten, in vollem Lichte und in der Sonne aber mit Regenbogenfarben spielenden Flügel befestiget sind. Unter den Flügelgeweben befinden sich die Schallbläschen mit ihren Schlägeln, wodurch die Fliege das Gesumme macht. Die schwarzen, ziemlich behaarten Füsse haben ein ganz rauhes Fußblatt und zwischen beyden Krallen ein kleines Haarbürstchen, aus welchem eine klebrichte Feuchtigkeit ausschwitzt, wodurch sich die Fliege an der glatten Fläche der Spiegel und Glasfenster anhalten kann und wovon sie auch Flecken an derselben zurück läßt. Der vorne breite, hinten schmal zulaufende Hinterleib besteht aus vier Ringen, ist stark mit Haaren besetzt, braun und schwarz gefleckt. Beym Weibchen ist er viel dicker, heller und durchsichtiger. Dieses bringt bey der Begattung eine lange Röhre in eine Öffnung des Hinterleibes des auf ihm sitzenden Männchens so daß also die Befruchtung des Weibchens im Leibe des Männchens vorgeht. Durch eben diese Röhre legt es die befruchteten Eyer, welche weiß, länglicht und etwas krumm sind, immer neben einander, z. B. auf faulem Korn (Fig. 30.), auch auf andere faulende, aber immer feuchte Dinge, welche sie für Austrocknung sichern, und den auskriechenden Maden gleich Nahrung geben. Daher sind Miststätten, Schlachthäuser, Ställe etc. die gewöhnlichen Geburtsörter der Stubenfliegen. Schon nach vier und zwanzig Stunden kriecht die Made aus dem Eye. Sie (Fig. 31.) ist gelblich-weiß, durchsichtig und ohngefähr fünf Linien lang. Ihr Körper besteht aus zwölf Ringen, ihr Kopf ist spitzig, mit einem schwarzen Häckchen versehen, und ihr Hintertheil dick und abgestumpft. Nach vierzehn Tagen hat sie meistens ihre vollkommene Grösse erreicht. Sie verbirgt sich nun, und nach wenig Stunden hat sie schon die Puppengestalt (Fig. 32.) angenommen. Anfangs ist die länglichrunde Puppe weisgelb, aber nach wenig Stunden wird sie dunkelroth. Die nach vierzehn Tagen auskriechende Fliege stößt, auf eine ihr eigne Art, mit dem sich in eine Blase verlängernden Vorderkopf,

kopf, die Puppenhülse auf. Sie nährt sich dann von allerley Nahrungsmitteln, welche der Mensch zu sich nimmt, von Zucker und Fleisch, in den Wäldern und Gärten, wo sie ebenfalls häufig vorkommt, von den Säften der Blätter und Blüthen.

Nicht nur Europa, sondern beynahe die ganze Erde, ist ihr Wohnplatz. Man findet sie eben so wohl in Amerika, vorzüglich in Surinam, als in Taheiti, Neuholland, am Kap etc. in ausserordentlicher Menge. Bey uns ist sie in den Monaten Julius und August bis im September vorzüglich lästig. Sobald es aber kalt wird, sucht sie sich in den Rizen der Wände etc. zu verbergen. Am meisten sucht sie auf den Winter warme Ställe, oder solche Stuben auf, welche Tag und Nacht geheizt werden, wie z. B. die Wirthsstuben sind, worinnen man sie daher auch den ganzen Winter hindurch mehr oder weniger zahlreich antrifft.

Wenn gleich die Stubenfliege nicht mit solchen Instrumenten versehen ist, womit sie uns verletzen könnte, so belästigt sie uns doch durch das Saugen mit ihrem Rüssel und durch ihre mit steifen Borsten besetzten Fußblätter, womit sie uns unwillig macht, wenn sie beständig auf unsrer Haut, auf und abläuft oder sich in unsern Kopfharen verwickelt. Sie stört so den erquickenden Schlummer des Kranken und den festen Schlaf des Gesunden. Auch bey Tage beunruhiget sie uns in solchen Geschäften, welche Nachdenken, oder in der Bearbeitung eine gewisse Reinlichkeit erfordern. Vorzüglich besudelt sie uns unsre Speisen mit ihren Exkrementen, Eyern, Maden und Leichnamen, und raubt uns dadurch nicht selten den Appetit. Da sie uns beständig in Menge umgiebt, so trägt sie auch mehr als andere Fliegenarten und Insekten zur Verbreitung hitziger Hautausschläge bey. In der Pockenkrankheit sieht man sie zur Zeit der Abtrocknung beständig auf den stinkenden Blättern und Krusten herumirren, und das Blattergift einsaugen. Unaufhaltbar durch alle Absonderungsmittel und Pockenhäuser, wird also das Blattergift, blos durch die Stubenfliege, in ganz entfernten Gegenden verpflanzt, und dadurch erklärbar, wie Personen, die oft ganz abgesondert von aller menschlichen Gesellschaft und überdies in Gegenden wohnen, wo weit und breit kein Pockenkranker anzutreffen ist, auf einmal ganz unerwartet die Pocken bekommen können. Auch die Stubenfliege setzt ihre Eyer nicht selten auf dem menschlichen Körper ab. Sie legt sie oft in die Mundwinkel kleiner Kinder, und abergläubische Mütter und Wärterinnen sehen dann die daraus zum Vorschein kommenden Maden als Vorboten des Todes an, da sie doch blos einen Beweis von der vernachlässigten Reinigung des Kindes geben. Eben dieses ist der Fall, wenn neugebohrne Kinder in andern faltigen Theilen nicht gehörig ausgewaschen, nicht rein-

reinlich genug in der Wäsche gehalten und öfters lange auf den Küssen offen liegend gelassen werden. Die Fliegen haben dann Zeit in die wunden, faltigen, übelriechenden Stellen, vorzüglich um die Schenkel und Schamtheile, ihre Eyer abzusetzen und es wachsen nun, nach dem Ausdruck der gemeinen Leute, Maden in der Haut des Kindes, die eine sorgfältige Reinigung mit frischem Wasser bald vertreiben und auf die Zukunft verhüten kann.

39. Die Gewitterfliege. Tab. IV. Fig. 1. und 1*.

Musca meteorica, atra, abdomine cinerescens, alis basi subflavis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2848. n. 88. Iter Goth. p. 37. Faun. Suec. n. 1849. Amoen. Acad. III. p. 358 etc. — Habitat in Europa, ingruente pluvia choreas agens, et nebulae instar ora equorum, citissime sub aestivatione obvolitans, larvae interdum in ventriculo hominis medicamento Nufferiano expellendae.

Abhandl. über die Schädlichk. der Insekten. S. 43.	Fuefslly's schweiz. Ins. S. 56. n. IIII. Gewit-
Blumenbach's Handb. d. Naturgesch. S. 381. n. 5.	terfliege.
Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI.	Müller's Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 972.
S. 41, n. 14. Tab. V. Fig. 1. <i>Mouche des Vaches</i> , die	n. 88. <i>Gewitterfliege</i> .
<i>Kuhfliege</i> .	Mülleri Zool. Dan. Pr. n. 2064.
Fabricii Mant. ins. II. p. 347. n. 58. Spec. ins.	Panzers, G. W. F. Deutschlands Insekten, Heft
T. II. p. 445. n. 49. Syst. Ent. n. 36. p. 780.	I. <i>Gewitterfliege</i> .

Sowohl von dieser, als von der folgenden Fliegenart kennt man zur Zeit nichts, als das vollkommene Insekt. Die Gewitterfliege kommt nicht nur in Schweden, sondern auch in andern Gegenden unsres Welttheils häufig vor. Der Monath, wo sie sich bisweilen in ungeheuren Schwärmen einfindet, vorzüglich wenn es regnen will, oder ein Gewitter bevorsteht, ist der Julius. Sie flieht dann nicht selten in die Häuser, ohngeachtet sie sich gewöhnlich blos in den Gärten und Wäldern aufhält. In ihrer Bildung hat sie sehr viel ähnliches von der gemeinen Stubenfliege, nur ist sie viel kleiner und dunkler. Sie hat rothbraune Augen einen schwarzen Brustschild, einen aschgrauen, sehr haarichten Hinterleib und ziemlich breite Flügel, welche an der Wurzel gelb sind und an dem äussern Rande mit Regenbogenfarben spielen.

In schwülen Sommertagen verfolgt sie Menschen und Thiere auf dem Felde, setzt sich in die Augen und Ohren und wird dadurch oft überaus beschwerlich. Ihre Made will man auch in dem menschlichen Magen angetroffen und sich dagegen des Nufferischen Wurmmittels mit Nutzen bedient haben.

40. Die Papatasi. Tab. IV. Fig. 28. 29.

Musca Rhagio Papatasi antennis, corpore, alisque pilosis. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2866. n. 325. — Habitat in Italia, Insubriae potissimum aestiva et nocturna calamitas, vix lineam longa, oculis nigris, reticulatis, albo punctatis, quiescentis alis divaricatis, abdomine rubro.

Scopoli, J. A. Deliciae florae et faunae Insubricae seu novae aut minus cognitae species plantarum et animalium, quas in Insubria austriacae tam spontaneos quam exoticas vidit. Pavia 1786 — 1788. Pars I. p. 55. Tab. XXII. Fig. b. B. *Bivio Papatasi*.

Dieses Insekt kennen wir blos aus Scopoli's Beschreibung und Abbildung. Es ist überaus klein und zart, kaum einer Linie lang und haaricht. Die zwey Fühlhörner seines länglichrunden Kopfs sind lang, die zwey Fressspitzen bestehen aus sechs länglichten glatten Gliedern, der Saugrüssel ist lang, und erscheint roth, wenn er mit bewaffnetem Auge gegen das Licht betrachtet wird, die sehr langen Füße sind mit Krallen versehen.

Das Vaterland dieses Insekts ist Italien, vorzüglich die Gegend von Mayland, wo es unter dem Namen *Papatasi* bekannt ist. Es ist besonders in den Sommernächten die Plage der Menschen und scheint überhaupt in Rücksicht seiner schädlichen Eigenschaften mit dem *Culex pipiens*, *reptans* und *columbacensis* verwandt zu seyn.

41. Die Regenbreme. Tab. IV. Fig. 9.

Tabanus pluvialis oculis fasciis undatis, alis fusco punctatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2885. n. 16. Faun. Suec. n. 1887. Amoen. Acad. Vol. III. p. 343. — Habitat in Europa.

Degèer's Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VI. S. 89. n. 5. Tab. XIII. F. 1. 2. *Die grünäugigte Pferdefliege*.
Fabricii Mant. ins. II. p. 356. n. 26. Spec. ins. II. p. 459. n. 23. Syst. Ent. n. 16. p. 790.
Fuefsly's Schweiz. Ins. S. 56. n. 1134.
Geoffroy Hist. des. Ins. T. II. p. 461. n. 5. *le Taon à ailes brunes piquées de blanc*.
Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 987. n. 16. *Die Regenbreme*.

Mülleri Faun. Fr. n. 769. Zool. Dan. Pr. n. 2116. *Onomat. hist. nat. Pars. VII. p. 406. Die Regenbremse*.
Pallas Reisen, Th. I. S. 4.
Panzer's Faun. Ins. Heft XIII. *Die Regenbreme*.
Reaumur Hist. des. Ins. Vol. IV. Tab. XVIII. F. 1.
Schaefferi Icon. Ins. Ratisb. Tab. LXXXV. F. 8. 9.
Schränk, Enumeratio insector. indigenor. Austriae n. 978.
Scopoli Ent. carn. n. 1012.

Auch unter den Bremen giebt es einige, welche dem Menschen lästig werden. Es gehört hieher vorzüglich gegenwärtige europäische Breme mit walzenförmigen

migen Fühlhörnern, vier braunen, wellenförmig durch die grünen Augen laufenden Binden, einem aschgrauen, bräunlich gestreiften Körper und grauen, braunpunktirten Flügeln. Sie ist nicht viel grösser, als die gemeine Stubenfliege, und fliegt in den heissen Sommertagen häufig auf Wiesen und Viehweiden herum, setzt sich auf Pferde und das Zugvieh, vorzüglich vor eintretendem Regenwetter, und plagt sie ausserordentlich. Auch den Menschen sticht sie, wenn es sehr heiss ist, doch verursachen ihre Stiche kein anhaltendes Jucken und Brennen.

42. Die blinzäugichte Breme. Tab. IV. Fig. 10.

Tabanus caecutiens oculis viridibus nigro punctatis, alis maculatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2885. n. 17. Faun. Suec. 1888. — Habitat in Europa.

- | | |
|--|---|
| <p>Beckmann's phys. Bibl. B. VIII. S. 18.
 Cuvier Tableau élément. p. 616. <i>le Taon aveugle</i>.
 Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze. B. VI. S. 90. n. 6. Tab. XIII. F. 3—5. <i>Taon aveuglant, die Blindfliege</i>.
 Fabricii Mant. ins. II. p. 356. n. 31. Spec. ins. II. p. 459. n. 29. Syst. Ent. p. 790. n. 18.
 Fuefslly's schweiz. Ins. S. 57. n. 1135. <i>Das Blinzang</i>.
 Geoffroy Hist. d. Ins. T. II. p. 463. n. 8. <i>le Taon brun</i>.</p> | <p>Müller's Linn. Natur. d. Ins. B. II. S. 987. n. 17. <i>Der Blinzler</i>.
 Mülleri Faun. Fr. n. 77p. Zool. Dan. Pr. n. 2117.
 Pallas Reisen Th. I. S. 4.
 Panzer's Faun. Ins. Heft XIII. <i>Die buntaugichte Breme</i>.
 Raji Hist. Ins. p. 272. <i>Musca bipennis putera</i>.
 Schaefferi Ic. Ins. Ratisb. Tab. VIII. Fig. 1.
 Scopoli Ent. Carn. n. 1014.</p> |
|--|---|

Ein grauer Kopf mit drey glänzend schwarzen Flecken, drey glatten kleinen Ocellen am Hinterhaupte, zwey sehr schönen goldgrünen, mit feinen Pünktchen bestreuten Augen, zwey fadenförmigen, am Ende gegliederten, schwarzen, bey einigen aber rostfarbigen Fühlhörnern; ein gelbbrauner, oben mit drey langen, schwarzen Streifen bezeichneter Brustschild; Flügel, welche auf weissem Grunde schwarzbraune Flecken führen; ein schmaler, spitziger Hinterleib, dessen zwey ersten Ringe gelb, mit einem grossen, schwarzen, gabelförmigen Flecken bezeichnet, dessen übrige Ringe aber graugelb und mit zwey länglichten schwarzen Flecken so besetzt sind, daß in der Mitte aller Ringe ein leeres, mit der Spitze gegen das Schwanzende gekehrtes Dreyeck übrig bleibt, machen die Unterscheidungsmerkmale dieser Breme aus. Sie ist etwas grösser, als die Stubenfliege und zu Ende des Junius vorzüglich häufig, eine Plage der Pferde und Menschen, welche sie sehr empfindlich sticht.

43. Die blauäugigte Breme. Tab. IV. Fig. 11.

Tabanus caesus antennis nigris, oculis caerulescentibus fasciis undatis nigris, corpore luteo. Sulzers Gesch. d. Ins. S. 218. Tab. XXVIII. Fig. 13. d. *das Blauauge*. — Habitat in Europa.

Gegenwärtige Breme hat beynahe die Grösse der Wandwespen, einen gelblichbraunen Körper, schwarze Fühlhörner, blaue Augen, welche mit wellenförmigen schwarzen Querstrichen durchzogen sind. Sie ist in mehreren Gegenden unseres Welttheils, vorzüglich in der Schweiz, zu Hause. Wie die meisten kleineren Bremen, verfolgt auch sie den Menschen, da hingegen die grösseren Arten ausschliesslich das Vieh peinigen. Sie hat einen leisen Flug und setzt sich unvermerkt auf solche Stellen der Haut, wo man sie weniger gewahr wird und sie nicht so leicht verjagt werden kann. Begierig nimmt sie nun die Stellung zum Stich an, streicht noch einigemal mit den Vorderfüssen die Haut, als ob sie dieselbe erst untersuchen wollte, und schlägt nun plötzlich die lanzettenförmigen Instrumente ihres Gebisswerkzeugs ein, wodurch sie einen empfindlichen Schmerz verursacht. Wird sie nicht gestört, so saugt der dazwischen liegende Saugrüssel das hervordringende Blut begierig ein und die Breme verlässt nicht eher diese Stelle, als bis sie sich ganz voll gesogen hat.

Mücken überhaupt.

- | | |
|--|---|
| Barrere, P. Beschreibung von Guiana und aus dieser in den Götting. Sammlungen von Reisen, Th. II. S. 45. | Pluche, N. Spectacle de la nature. Tom. I. Utrecht 1735. |
| Barthii, J. M. de Culice dissertatio, Ratisbonae 1737. c. Tab. Cap. III. §. 4. | Reviglias (Diego) de Culicum generatione Eph. N. C. Vol. IV. obs. 3. p. 14. Tab. 1 — 5. |
| Baume's Reise nach den Salzgruben von Lorraine. Berlinische Sammlungen B. VIII. S. 458. | Riville (Godeheu de) de culicum coitu. Mem. de Math. et Phrys. présentés à l'Acad. Roy. des Sciences. T. III. p. 617. |
| Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. II. Th. I. S. 62. B. VI. S. 127. Tab. XVII. Fig. 1 — 12. | Sangallo (P. P. a) experimenta circa generat. Culicum. Florent. 1679. c. f. |
| Göze's Gesch. schädli. Insekten, S. 90. | Scheuchzeri, J. C. Physica sacra Aug. Vind. 1735. Fol. Tab. 126. |
| Hooke, Micrographia. p. 185. | Sulzer's Gesch. d. Ins. S. 218. |
| Leeuwenhoek obs. microsc. de proboscide Culicis in Phil. Trans. p. 2305. n. 307. | Vaillant, J. Hist. de son tems. L. VII. C. 101. |
| Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 989. | Wagner, J. J. de generatione culicum. Eph. N. S. Dec. II. ann. 3. obs. 188. p. 368. |
| Paullini de morte verminosa, p. 40. Culices. | |

Unter *Mücke*, griech. *κόρυψ*, lat. *Culex*, franz. *Cousin*, holl. *Mugge*, versteht man dasjenige kleine, oft kaum drey Linien lange Insekt, dessen Maul büstenartige Stacheln in einer biegsamen Scheide führet, welches gegliederte, sehr fein-

feinhaarige Fühlhörner, zwey dreygliedrichte Frefsspitzen, ein rundes, gewölbtes Brustschild, einen langen und schmalen Hinterleib hat, und nicht selten mit der *Schnacke*, oder der unschädlichen *langfüssigen Erdmücke* (*Tipula*), verwechselt wird. Es ist von der Mittagslinie bis fast zum Nordpol überall bekannt, und hält sich vorzüglich in wasserreichen Gründen, an Bächen, Sümpfen, Teichen, Seen und an den Ufern des Meeres auf. Gemeinlich erscheint es dann vor Untergang der Sonne an warmen Abenden und erfüllt oft die Luft in ungeheuren Heeren. Sein durch die Wärme des Klimas grausamer und giftiger werdender Stich, dringt durch die dicksten Stoffe und setzt den ganzen Körper in ein brennendes Feuer. Überaus leiden davon die Neger in Afrika, die Einwohner in Senegal, auf der Insel Barbados, Meris und auf allen Karaibischen Inseln, vorzüglich aber in Kayenne, wo man diese Insekten; als Nebenarten unsrer europäischen Mücken, unter den Namen *Muskiten*, *Maringuinen* und *Maks* kennt. Am meisten fürchtet man die Maks als die grössere Art, welche ihre zwey langen steifen Stacheln bis in das Fleisch sticht, worauf gleich entzündliche Knoten und unerträgliches Jucken erfolgen. *Barrere* glaubt, daß man keine schmerzhaftere Todesart erdenken könne, als wenn man einen Menschen nackend dem sich auf ihm ablagernden Heere dieser Insekten Preis gäbe, und dennoch sollen einige Einwohner ehemals so grausam gewesen seyn, ihre Sklaven unter dieser entsetzlichen Marter umkommen zu lassen. Sie verfolgen die Reisenden stundenlang auf ihrem Wege, und umgeben sie, wenn sie auch tausendmal verscheucht werden, in einem Augenblicke wieder in ganzen Wolken. Wahrscheinlich waren es auch diese Mücken, von welchen *Vaillant* meldet, daß sie bey der Armee des französischen Königs Philipp des Dritten, welche Girona, eine Stadt in Catalonien im Jahre 1285 belagerte, durch ihre giftigen Stiche Menschen und Thiere tödteten. Der übelriechende Schweiß mancher Menschen ist für sie das grölste Anlockungsmittel, daher auch schwitzende Personen überhaupt, mehr als andere ihren Verfolgungen ausgesetzt sind. Sie ziehen sogar in den warmen Sommerabenden den Ausdünstungen der Menschen in ihren Schlafzimmern und Kammern nach und plagen sie die ganze Nacht. Man ist deswegen in jenen Gegenden genöthigt, bey Sonnenuntergang gleich Fenster und Thüren zu verschliessen, sogar Feuer zu machen, um sie in die Flamme zu locken und zu verbrennen. In Amerika bedient man sich auch noch eines besonderen Mittels die grausamen Maringouinen aus den Wohnungen zu verjagen. Man bringt nemlich leuchtende Insekten, die man *Cucujous*, *Later-nenträger*, (*Fulgura laternaria* Linn.) nennt, in die Zimmer. Die Mücken, welche

die-

dieser Hellung nachgehen, werden von ihnen verschlungen und auf diese Art sichern die *Cucujous* die Ruhe ihres Wirths. Ein ähnliches Mittel ist dasjenige, welches *Baumé* angiebt. Man setzt nemlich einige Stunden vor Schlafengehen eine brennende Laterne in sein Schlafgemach, welche man vorher inwendig mit einer Auflösung von Honig in Wein oder Rosenwasser bestrichen hat und verschließt die Fenster, damit nicht noch mehr Mücken, als sich schon in der Kammer befinden, durch den Geruch des Honigs herbey gezogen werden. Die theils dem Lichte, theils dem Honig nachgehenden Mücken bleiben dann an letzteren kleben. Auch wird der Rauch von Limonien, von Pommeranzenblättern, von Toback zur Vertreibung derselben empfohlen. *Baumé* versichert, daß er sich gegen die Mückenstiche am besten dadurch bewahret habe, daß er sich Gesicht und Hände einige Augenblicke mit Tobacksrauch geräuchert und solchen auch alle Abende durch seine Schlafkammer gehen lassen. Kaum habe sich der Rauch verbreitet, so wären alle Mücken eilends zu den Fenstern hinausgezogen und auch nicht eine geblieben.

Wird man von einer Mücke gestochen, so muß man sie nicht auf der Haut todt schlagen, sondern sie satt saugen und wegfliegen lassen, ausserdem bleibt der Mückenstachel mit seinen Wiederhacken in der Wunde stecken, und diese wird dadurch mehr entzündet und schmerzhaft. Als Linderungsmittel, wird das Auflegen des Öls, des Fichtenharzes, auch des Zitronensafts empfohlen.

44. Die Singmücke. Tab. IV. Fig. 12 — 24.

Culex pipiens cinereus, abdomine annulis fuscis octo. Linn. Syst. Nat. Tom. I. P. V. p. 2886. n. 1. Faun. Suec. 1890. Fl. Lappon. 363. 364. Am. acad. T. III. p. 343. Habitat in Europae, et magis septentrionalis Asiae et Americae aquosis, paludosis, in regionibus magis australibus major, punctura violentius inflammante, lapporum calamitas felicissima, continuo susurro pipiens, punctura vix mas antennis pectinatis distinguendus molestissimus, in intestina pulmonesque mammalium interdum irrepens et inflammationem

4 — 5 horis aliquando lethalem ciens, fumo praesertim ex inula helenio et cannabi pellenda, nocte nonnunquam lucens.

Adanson's Reise nach Senegal, übers. v. Martini, S. 52. 207. 311. und 232.

Amoreux Notice des Ins. d. la France reputes venimeux. p. 30. et 118.

Bankrofts Naturgesch. v. Guiana, S. 147.

Barth Diss. de Culice. c. Tab.

Bauhin, J. Traité des Animaux ayant ailes, qui

nuisent par leurs piquûres ou morsures, avec les remèdes, outre plus, une histoire de quelques mouches ou papillons, non vulgaires, apperçus l'an 1593. qu'on a estimé fort venimeuses, à Montbeillard 1593.

Blanckard, Schouwburg van de Rupsen, Wormen etc. Tab. XV. Fig. A. B. C. D. E.

- Blumenbach's Handb. d. Naturgesch. S. 382.
n. 1. Engl. *the gnat*.
- Cuvier Tableau élémentaire, p. 607. *le Cousin commun*.
- Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. II. Th. I. S. 62. B. VI. S. 127. n. 1. Tab. XVII. Fig. 13—19. *Cousin commun, die gemeine Schnake*.
- Fabricii Mant. ins. II. p. 363. n. 1. Spec. ins. II. p. 469. n. 1. Syst. Ent. p. 799. n. 1. *Culex pipiens*.
- Fermin's Reise durch Surinam, Th. I. S. 40. Th. II. S. 288.
- Fuefsly's Verz. schweiz. Ins. S. 57. n. 1317.
- Geoffroy Hist. des Ins. T. II. p. 579. n. 1. Tab. XIX. Fig. 4. *le Cousin commun*.
- Goedartus de Insect. in method. redact. CXL. p. 337.
- Göze Gesch. schädli. Ins. S. 90. *Singmücke*.
- Hablizl in Pall. n. nord. Beytr. 4. S. 297.
- Hooke Micrographia, p. 185. Schem. XXVII. et XXVIII.
- Joblot Observ. d'hist. nat. faites avec le Microsc. Tom. I. app. 2. Tab. XIII. Fig. A. E. H. I. L.
- Kalm's Reise nach Nord-Amerika, Th. II. S. 268. *Musquetois*.
- Kleemann's Beyträge z. Rös. Insektenbel. Th. I. S. 125. Tab. XV. u. XVI. *Schnacken*.
- Kircheri Micrographia curiosa, p. 335. §. 6. Icon. Fol. 365. et 366. n. 1. 2. 3.
- Kniphof Diss. de pedic. inguin. §. XIX.
- Kranzen's Grönland, Th. I. S. 105.
- Leenwenhoeck Oper. Tom. II. p. 33. 139.
- Leder müller's Gemüths- und Augenergötzt. S. 154 und 167. Tab. LXXIX. und LXXXV. *Die Schnakenmücke*.
- Müller's Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 991. n. 1. *Die Singschnacke*.
- Mülleri Faun. Frid. n. 772. Zool. Dan. Pr. n. 2144.
- Onomatologia Hist. Nat. P. III. p. 500. *Die sumsende Mücke*.
- Osbeck's Reisen S. 176.
- Pausanias ou voyage historique de la Grece traduit en François par Gedoyn, T. III. p. 110.
- Reaumur Mem. pour serv. a l'hist. d. Ins. T. IV. Mem. XIII. p. 373 und 1396. Tab. 39 et 40.
- Riville (Godeh. de) sur l'accouplement des cousins in Mémoires de Matth. et de Phys. T. III. p. 617.
- Sachs, Ph. Jac. Messis observationum microscopiarum.
- Sangallo, P. P. Epistola, Florentiae 1679.
- Schaefferi Elem. Ent. Tab. LIV.
- Schwammerdamm's Bibel d. Nat. S. 144—148 Tab. 31. F. 4—8 und Tab. 32. F. 1—5. Ejusd. Hist. Gener. ins. Tab. II. III.
- Scöpoli Ent. Carn. 1017.
- Sulzer's Kennz. d. Ins. T. CXXI. F. a.
- Valmont de Bomare dictionnaire d'hist. nat. T. III. p. 434. *Marignous*.

Die bekannteste und vielleicht in allen Welttheilen einheimische Art dieses Geschlechts, ist die *Singmücke* (Tab. IV. 19. u. 21). Sie hat einen überaus kleinen, mit der Grösse ihres ganzen Körpers, und noch weniger mit der Grösse ihrer Augen, ihrer Fühlhörner und ihres Saugrüssels in keinem Verhältnisse stehenden Kopf. Ihre grünen, aus mehr als vierhundert Sechsecken bestehenden Augen (Fig. 23. b. b.), welche immer in der Mitte linsenförmige Erhabenheiten führen, decken den grössten Theil des Vorkopfs und seiner Seitenflächen, ihr Saugrüssel hat die Hälfte und ihre Fühlhörner über den dritten Theil der Länge des ganzen Körpers. Ein kurzes, schmales, nur unter dem Mikroskop sichtbares Hälschen (Fig. 23. a.) verbindet den Kopf mit dem kurzen, dicken, von der Rücken- seite erhabenen und haarichten Brustschild, und dieser hängt mit dem langen, schmalen aus acht Ringen bestehenden, und stark gefiederten Hinterleibe unmittelbar zusammen. Die mit feinen Äderchen durchzognen Flügel sind länglich- rund, stark ausgespannt, durchsichtig und spielen mit den schönsten Regenbo- genfarben. Unter denselben befinden sich die Balansirstäbchen (Fig. 24. a. a.), welche kleinen Trommelschlägeln gleichen und, indem sie das gespannte Flügel-

häutchen anschlagen, das diesen Mücken eigne, und dem Menschen im Schlafe beunruhigende Singen hervorbringen. Von den unten am Brustschilde sitzenden sechs langen und dünnen Füßen, sind die hintersten weit länger als die vordern, alle aber an den fünfgliedrigen Fußblättern mit scharfen Klauen versehen.

Das männliche Insekt (Fig. 21. und 22.) unterscheidet sich auffallend von dem weiblichen. Sein braun-grauer Kopf (Fig. 23.) ist am Hintertheile mit vielen weißlichten, locker herabhängenden Federchen gezieret, und seine, aus zwey flachen, zwischen und vor den Augen stehenden Erhabenheiten (*c. c.*) entspringenden Fühlhörner (*d. d.*) gleichen, durch die schön geordneten, langen Haare ihrer fünf bis sechs und dreysig Glieder, den schönsten Federbüschen. Zwischen diesen Fühlhörnern befindet sich der lange Saugstachel, welcher in einer braunhaarichten, an der Spitze pfeilförmig (*e.*) gestalteten Scheide verborgen ist. Die Spitze dieses Stachels (*f.*) ist sehr durchsichtig und mit einer Öffnung versehen, durch welche die Mücke die zu ihrer Nahrung dienenden Feuchtigkeiten einzieht, aber auch einen giftigen Saft von sich giebt, wenn sie den in dem Saugstachel, als in seiner Scheide steckenden, weit feineren und spitzigeren Wehrstachel (*g.*) hervorschiessen läßt. Noch länger als der Saugstachel sind die über ihm liegenden und ihn von beyden Seiten einschliessenden Fressspitzen (*h. h.*), welche, wie die Fühlhörner, mit vielen borstigen Haaren besetzt und an ihren stumpfen Enden auswärts gebogen sind. Ausser diesen Theilen des Kopfs, unterscheidet sich das Männchen noch durch seinen, gegen das Ende schmärer zulaufenden und am Schwanzende mit zwey gekrümmten Spitzen versehenen Hinterleib von dem Weibchen.

Bey letzterem (Fig. 19. und 20.) bestehen die Fühlhörner nur aus vierzehn Gliedern, welche nicht so buschicht sind, indem jedes Glied nur mit zwey kurzen Haaren auf jeder Seite besetzt ist, wodurch sie mehr einen doppelten Kamm ähnlich sehen. Auch die Fressspitzen sind weit kürzer, der Hinterleib aber ungleich dicker und die Farbe des ganzen Körpers überhaupt brauner.

Die Mücken paaren sich im Fluge in der Luft, daher man die Art ihrer Begattung noch nicht eigentlich kennt. Bald nach derselben begiebt sich das befruchtete Weibchen auf die Schleimhaut, ein Blatt, oder sonst ein schwimmendes Körperchen der Oberfläche eines stehenden oder fließenden Wassers, um seine Eyer zu legen. Es stützt sich mit den Vorderfüßen an, kreuzt die beyden Hinterfüße und legt in dem Winkel, welchen es mit diesen Füßen macht, das erste Ey, und an dieses gegen sich zu die übrigen, welche es alle unter einander mittelst

telst eines Klebers vereinigt. Hierdurch erhält das Eyerhäufchen (Fig. 12.) die Gestalt eines kleinen Kahns, der wegen seiner Leichtigkeit auf dem Wasser fortswimmt. Durch das Vergrößerungsglas erscheinen die Eyer (Fig. 13.) unten dick und abgerundet, oben schmaler und mehr spitzig zulaufend. Ein Theil davon hat unten erhabene Wärzchen (*a. a.*) mit schwarzen Punkten, andere (*b.*) aber sind an diesen Stellen glatt, und blos mit schwarzen Punkten versehen. Ihre Farbe ist braungrau, ihre Anzahl in einem Häufchen dreyhundert, und die Nachkommenschaft eines Mückenpaares in einem Jahre, nach *Klemanns* Berechnung 6750000.

Bey schöner warmer Witterung kriechen die Mückenlarven schon in drey Tagen aus. Hierbey öffnet sich der untere Theil des Eyes (Fig. 13. *c.*), wie der Deckel einer Kanne, und die ausgekrochene junge Larve (Fig. 14.) schwimmt gleich im Wasser auf und ab, ihre Nahrung zu suchen. Nach mehreren Häutungen erhält sie ihre vollkommene Grösse (Fig. 15.), hängt so unter der Oberfläche des Wassers und hebt sich, wenn sie Luft schöpfen will, mit dem Kopfe in die Höhe. Sie hat eine bräunlich-gelbe Farbe, einen grossen, mit zwey, durch's Mikroskop sichtbaren, Frefsspitzen (Fig. 16. *b. b.*) und zwey netzförmigen Augen versehenen Kopf, welcher durch einen kleinen Hals mit dem sechseckigten grossen, gewölbten Brustschilde (*c.*) zusammenhängt. In diesem Brustschild schimmern die schon im Kopfe ihren Anfang nehmenden Luftröhren (*d. d.*) deutlich durch, welche in dem Hinterleibe geschlängelt fortlaufen und in einem besondern Anhang (*g.*) ihren Ausgang nehmen. Der Hinterleib besteht überhaupt aus acht Ringen, wovon jeder, wie der Brustschild, mit Haarbüscheln auf beyden Seiten besetzt ist, und noch aus einem zweyten Anhang (*f.*), der mit vier blatförmigen Flossen versehen ist, und aus welchem der Koth zum Vorschein kommt.

Nach der letzten Häutung verwandelt sich die Larve in eine Nympe (Fig. 17. 18.), von ganz besonderer Gestalt. Sie besteht nemlich aus einem dicken, unförmlichen Theil, welcher den Vordertheil des künftigen Insekts enthält und oben mit zwey kleinen, Röhrchen versehen ist, womit sie an der Oberfläche des Wassers hängt, und aus dem, aus acht Ringen zusammengesetzten Hinterleibe, welcher am Schwanzende zwey runde, der Puppe zu ihrer Bewegung dienende Flossen hat. Die Nympe hebt sich damit bald gegen die Oberfläche des Wassers, um daselbst Luft zu schöpfen, bald senkt sie sich wieder gegen den Boden. Beydes verrichtet sie mit einer Geschwindigkeit, die sich kaum mit den Augen verfolgen läßt.

Sehr

Sehr schön beschreibt Göze den Akt, wo das vollkommene Insekt die Puppenhülle verläßt. „Mit einem male platzt die Haut und in eben dem Augenblicke ist auch schon die Mücke mit dem Kopf und den Vorderfüßen hervorgedrungen. Gleich darauf hebt sie sich mit letzteren und steht nun majestätisch auf ihrer Todeshülle, die sie abgelegt hat, sieht sich triumphirend um, und freut sich ihrer Auferstehung und ihres neuen Daseyns. Einigemal schüttelt sie noch ihre Flügel, und fliegt dann davon.“ Sie hält sich auch als vollkommenes Insekt häufig am Wasser auf, ohngeachtet sie es nie, als zur Zeit des Eyerlegens, wieder betritt.

Man findet die Singmücken nicht nur in den wärmern Erdstrichen unsres Welttheils, sondern selbst in kälteren Gebirgsgegenden, z. B. auf den Alpen. In China sollen sie, nach *Osbeck*, die Ursache unheilbarer Krankheiten und in Pensylvanien, nach *Kalm's* Versicherung, die Störerinnen aller nächtlichen Ruhe seyn. Überhaupt hält man sie für eine Nebenart der amerikanischen Moskiten und Marinquinen, wovon uns immer noch eine besondere Beschreibung fehlt. *Fermin* bemüht sich hierüber eine Erläuterung zu geben, die aber im Grunde keine ist, weil man nicht weis, was er unter dem Worte *Mücke* versteht. Er schreibt „die *Marinquinen* sind eine Art Mücken, die nach der Sonnen Untergang und vor Aufgang derselben, sehr empfindlich stechen. Sie fliegen in grossen Haufen beysammten, und kündigen ihre Ankunft durch ihr Singen an. Sie wissen sich auf eine so geschickte Art anzuklammern, daß sie sogleich ihren kleinen Stachel in eine Öffnung der unbedeckten Haut bringen, und wenn sie sodann eine Ader treffen, die Flügel zusammenziehen, die Füße anstämnen, und sich auf diese Art so voll Blut saugen, daß es ihnen sauer wird, wieder davon zu fliegen. Den Namen *Moskite* führt aber in Surinam, ein Insekt, welches eigentlich unsre europäische Mücke (?) vorstellt. Ihr Stich ist so empfindlich, daß man ihn etliche Tage lang fühlt. Es müssen sich hauptsächlich die Neuankommenden in diesem Lande gegen diese Thiere mit Geduld ausrüsten; denn die unsrigen kommen ihnen weder in der Menge, die unzählbar ist, noch in Ansehung des Stiches bey, der grosse Beulen und ein unerträgliches Jucken verursacht. Einige darunter sind von ausserordentlicher Grösse und mit einem langen, steifen und am Ende getheilten Stachel versehen, der wahrscheinlich inwendig hohl ist, mit welchem sie in die Schweisslöcher der Haut eindringen, um das Blut auszusaugen. Ihre Füße sind sehr lang. Ihr liebster Aufenthalt sind sumpfige Gegenden. Auf den neuen Pflanzungen findet man sie gewöhnlicher Weise so häufig, daß die Weissen, um Ruhe für ihnen zu haben, genöthiget sind, Pommeranzen- und Limonienblätter anzünden zu lassen,

sen, weil sie diesen Rauch nicht vertragen können und daher davon fliegen. Auch die Einwohner der Stadt *Paramaribo* empfinden viele Ungemächlichkeiten von diesen Insekten, welche sie quälen und am Schläfe hindern, insbesondere während der Regenzeit, in welcher sie sich bis ins Unendliche zu vermehren scheinen. Diejenigen, welche an die Mittagsruhe gewöhnt sind, können sie nicht anders los werden, als wenn sie während dieser Zeit einen Sklaven an ihre Hängematte mit einem Tuch in der Hand stellen, um sie fortzujagen. Des Nachts aber spannet man eine Decke von Gaze über die Hängematte aus, um diese Insekten davon abzuhalten. Dieses ist das einzige Mittel um ruhig für ihnen zu schlafen.

Man war bisher immer der Meinung, daß bloß die weibliche Singmücke steche. Da aber auch die männliche mit eben dem Saugstachel versehen ist, so ist nicht einzusehen, warum sie sich desselben nicht zu gleicher Absicht bedienen sollte, und es scheint daher jene Meinung auf einem unrichtigen, von den Wespen, Bienen und einigen andern Insektengeschlechtern hergenommenen analogen Schluß zu beruhen. Ist die Mücke im Begriff zu stechen, so zieht sie die Füße nahe zusammen, hält die beyden Flügel in die Höhe und senkt den Kopf vorwärts. Die Scheide des Saugstachels (Fig. 24. b.) zieht sich vom Stachel zurück und das eingesogene Blut dringt durch letzteren (c.) in die Höhe, daher derselbe auf einmal roth erscheint. Saugt sie begierig, so steckt sie den Stachel faßt bis an den Kopf in die Haut (d.), und dann schwillt der Hinterleib bis zum Bersten an, und erhält von dem durchschimmernden Blute ebenfalls eine rothe Farbe. Diese Art der Verletzung ist aber an sich immer noch nicht hinreichend, die darauf folgenden Zufälle zu erklären, wie *Reaumur* vortrefflich bewiesen hat. Er sagt: „Die Spitze der feinsten Nadel ist gegen den Stachel der Mücke das, was die Spitze eines Degens gegen eine Nadelspitze ist. Von einer so leichten Verletzung sollte man glauben, daß sie augenblicklich geschlossen und von keinem üblen Zufall begleitet seyn würde. Nichtsdestoweniger erheben sich aber bisweilen sehr beträchtliche entzündliche Geschwülste an der gestochenen Stelle. Die Ursache ist, weil die Wunde keine simple Wunde, sondern von einer reizenden Feuchtigkeit benetzt ist.“ Diese Feuchtigkeit, so unbedeutend auch ihre Menge seyn mag, geht sogar durch die Resorption ins Blut über; denn es entstehen auf diese Mückenstiche Wallung, Fieber und Schlaflosigkeit, welche durch das unerträgliche Jucken noch mehr vermehrt wird. Ja, man hat sogar Beyspiele, daß Personen von der entzündlichen Röthe und Geschwulst, welche auf die häufigen und wiederholten Stiche dieser Singmücken erfolgten, ganz verunstaltet worden sind,

und

und *Reaumür* hat an den Seeküsten und an sumpfigten Gegenden so üble Folgen davon beobachtet, daß man sich beynahe in die traurige Nothwendigkeit gesetzt sah, zur Abnahme der verletzten Glieder zu schreiten. Dieses alles beweist offenbar, daß die Singmücken ihre Stichwunden zugleich vergiften, und daß ihr Gift unter die in der kleinsten Quantität ausserordentlich wirksamen gehört. Kein Wunder ist es, wenn Menschen durch die Bösartigkeit der auf die Mückenstiche erfolgten Zufälle, sogar genöthigt worden sind, ihre Wohnungen zu verlassen, wie uns *Pausanias* erzählt: „In der Nachbarschaft der Stadt Mionta in klein Asien, befand sich ein kleiner Meerbusen. Der Meander, welcher nahe vorbeystieß, erweiterte sein Bette, trat weit aus und warf so viel Schlamm in den Meerbusen, daß das Wasser nicht mehr mit dem Meere in Verbindung stand, stehen blieb und einen Morast bildete, dessen Ausdünstung eine so grosse Menge Mücken herbey zog, daß die Einwohner genöthigt waren, Mionta zu verlassen und sich nach Miletus zu begeben. Eben dieses begegnete den Artarnitern, unter Pergamus,“ und wäre, nach *Bauhin*, den Einwohnern der Gegend um Lion im Jahre 1590 beynahe ebenfalls widerfahren.

Wie andere Insekten, werden auch diese Mücken durch den eignen Geruch der Ausdünstung mancher Menschen mehr herbey gezogen, demohngeachtet bemerkt man, daß sie dergleichen Personen nicht immer stechen, wenn sie auch noch zu sehr um sie herumschwärmen, sondern daß sie noch eine besondere Auswahl in Rücksicht der Beschaffenheit der Haut machen. Die Haut fetter Personen scheint ihnen, wahrscheinlich deswegen weniger anständig zu seyn, weil das ölichte Serum, welches sie mit ihrem kurzen Stachel in der dicken Fetthaut bloß erreichen können, ihnen weniger behagt, als das leicht zu erhaltende Blut in den freyer liegenden Hautgefäßen magerer Personen. Auch läßt der doppelte Stachel vermuthen, daß nur das gereizte oder im Saugen gestörte Insekt, sich des eigentlich gefährlichen Wehrstachels (Fig. 23. g.) bedient, ausserdem aber seinen unschädlichen Saugstachel (f.), nach Aufnahme des ihm angenehm schmeckenden Bluts, ruhig zurückzieht, ohne irgend eine Spur einer Verletzung auf der Haut zurückzulassen.

Die Verwahrungsmittel gegen die Stiche der Singmücken, sind die nemlichen, welche oben bey den Mückenverletzungen überhaupt angegeben worden sind. In Surinam lassen sich die Landes - Eingebornen mit *Roukou* oder *Orlean* (*Bixa Oriedi* Linn.), welcher mit dem Öle von dem Wunderbaum, (*Palma Christi* oder *Ricinus communis* Linn.) dem sogenannten *Karapatöl* angefeuchtet wird, reiben,

wodurch ihre Haut so hart wird, daß sie nichts von den Stichen der Moskiten empfinden. Die brennende Hitze in der Haut von dem zurückgebliebenen Mückengifte mässiget man durch das Auflegen von blossem frischen Wasser oder noch besser vom Salz- oder Goulardischen Wasser. Auch empfiehlt man den lebendigen Kalk. Das specifische Gegenmittel aber scheint das flüchtige Laugensalz (*Alcali volatile*) zu seyn.

45. Die Flohmücke. Tab. IV. Fig. 25—27.

Culex pulicaris fuscus, alis albis, maculis tribus obscuris. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2888. n. 4. Faun. Suec. 1892. Flora Lapp. n. 365. *Culex minimus lapponicus*. Amoen. acad. III. p. 345. — Habitat in Europa, America, Kinnim Moysis, reptans, mordendo punctum fuscum relinquens.

Amoreux Notice des Insectes venim. p. 118.
Bonnani Micrographia Tab. IV. *Culex Serapico*.
Derham's Physico-Theologie, übersetzt von Fabricius, Hamb. 1764. Buch IV. Kap. XI. S. 327. F. 5—7. *Culex minimus nigricans maculatus sanguisuga*, die ganz kleine schwarzlich-bunte Mücke, die Blut saugt.
Fabricii Mant. Ins. II. p. 364. n. 6. Spec. Ins. II. p. 470. n. 4. Syst. Ent. p. 800. n. 4.
Geoffroy Hist. d. Ins. II. p. 579. n. 2.

Göze Gesch. schädli. Ins. S. 100.
Leem's Nachrichten von den Lappen Leipz. 1771 S. 50.
Mouffetti Theatr. Insect. Lib. II. Cap. 13. p. 82. *Midges*.
Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 992. n. 4. *Die Flohmücke*.
Onomat. Hist. nat. P. III. p. 603. n. 3. *Die Flohmücke*.

Wenn es mit *Derham's* Beschreibung und Abbildung seine Richtigkeit hat; so, hat die Larve (Fig. 25.) des gegenwärtigen Insekts ungemein viel Ähnlichkeit von der menschlichen Askaride (Band II. Tab. II. Fig. 1.). Sie ist nemlich ein dünnes, kaum drey Linien langes, vorne dickes und stumpfes, und hinten spitzig zulaufendes Würmchen von schmutzig weisser Farbe, welches in stillstehendem Wasser sich aufhält und geschlängelt, wie ein kleiner Aal schwimmt. Die kleine Nymphe (Fig. 26.), in welche sich dieses Würmchen verwandelt, und welche *Derham* das Goldpüppchen, wahrscheinlich wegen seines Goldglanzes nennt, hat einen schwarzen Kopf, kleine kurze Hörner und einen fleckichten, schmalen und rauhen Bauch. Sie liegt ganz still auf der Oberfläche des Wassers und bewegt sich nur dann und wann ein wenig von einer Seite zur andern. Das Insekt selbst (Fig. 27.), welches in Essex *Nidiot* genannt wird, ist kaum zwey Linien lang und braun von Farbe, hat kurze Fühlhörner, welche bey dem Weibchen glatt, bey dem Männchen gefiedert und fast einer Bouteillenbürste ähnlich sind, und weisse, durchsichtige, mit drey blassen Flecken bezeichnete Flügel.

Amo.

Amoureux versichert, daß dieses Insekt in den mittägigen Provinzen Frankreichs auf den Viehweiden und um die Moräste überaus gemein und peinigend ist, und daselbst *Pibou* oder *Arabi* genannt wird. Die Landleute jener Gegenden sind oft bey heisser und regnerischer Witterung genöthiget, noch ehe es Feyera-bend ist, vom Felde nach Hause zu eilen, weil sie die Stiche der Pipenschwärme nicht aushalten können. Mehr als in südlichen Ländern scheinen sie aber in nördlichen zu Hause zu seyn. Dies ist z. B. der Fall in England, in mehreren morastigen Gegenden an der Themse, wo *Derham* selbst von ihnen geplagt wurde, welcher zugleich versichert, daß er Pferde gesehen habe, die von diesen Mücken so übel zugerichtet waren, daß sie über den ganzen Leib voller Blutstropfen hingen. Am meisten aber peinigen sie die Menschen in Lappland. Schaarenweise erfüllen sie nach *Leem's* Erzählung die finnmärkischen Wälder, wo man gleichsam in einem beständigen Insektennebel athmet. Menschen und Vieh werden von ihnen unablässig verfolgt. Die vom Felde zurückkehrenden Arbeiter sehen von ihren Stichen oft aus, als wenn sie die Krätze hätten, und die sich zum Holzfällen oder Baumrindesammeln in den Wald begebenden Lappen, können vor diesen Mücken kaum essen, weil sie nicht den Mund öffnen dürfen, ohne daß sich ein Schwarm hineinzieht. Glückliche schätzen sich die armen Bewohner dieses unglücklichen Landes, wenn sich ein Wind erhebt, der diese, die ganze Luft mit ihrem Summen erfüllenden Insekten, auf einige Zeit verscheucht. Ausserdem sind sie genöthiget bey nahe in einer beständigen Rauchwolke zu leben; denn nur Rauch ist im Stande die Verfolgungen dieser Mücken von sich und ihren Rennthieren abzuhalten. Sie zünden zu dem Ende Rasen und andere stark rauchende Materialien vorzüglich zu der Zeit an, wo sie ihr Vieh melken wollen. Müssen sie sich weit von ihren Wohnungen entfernen, so bestreichen sie Gesicht und Hände mit einer Mischung von Rohm und Theer, um sich einigermaassen vor den Stichen dieser Insekten zu sichern. In der That ist es zu bewundern, wie ein so kleines Insekt, welches bey der geringsten Berührung zerdrückt wird, dennoch im Stande ist, durch die Haut des Viehes, durch grobe wollene Strümpfe und andere Kleidungsstücke zu stechen, und an den gestochenen Stellen gleich braune, juckende Flecken, weisse Blasen und Geschwüre zurückzulassen. Als Gegenmittel dieser Verletzungen empfiehlt Göze den äusserlichen Gebrauch des Baumöls.

46. Die Kriechmücke.

Culex reptans niger, alis hyalinis, pedibus nigris, annulo albo. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2888. n. 5. Faun. Suec. n. 1893. Mantiss. Plantar. II. p. 541. *Culex lunio*. — Habitat in Europa boreali, frequentissimus, tempore sereno vespertino reptatu molestissimus, *Kinnim* Moysis.

Amoureux Notice des Ins. p. 119.

Blumenbach's Handb. d. Naturgesch. S. 383. n. 2.

Die Beißfliege, Kolumbachische Mücke.

Fabricii Mant. Ins. II. p. 364. n. 7. Spec. Ins. II.

p. 470. n. 5. Syst. Ent. p. 800. n. 5.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 992.

n. 5. Der Kriecher.

Onomat. Hist. nat. T. III. p. 501. Die kriechende Mücke.

Pallas Reisen durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, Th. I. S. 193. u. Anhang S. 475.

Bibio Sanguinarius, Russ. *Mockara*, Magnitudo pulicis majoris. Thorax gibbus, canescens, maxime lateribus. Abdomen fusco-annulatum. Alae lactescenti pellucidae. Os obtusum sine aculeo: tamen cutim vulnerat, relinquens punctum sanguineum. Ad Vogam Majo et Junio praesertim infesta. Ferner in den neuen Nordischen Beyträgen B. XI. S. 249. *Moschkoka*, *Beißmücke*.

Schoenbauer, J. A. Geschichte der schädli. Kolumbatzer Mücken im Bannat. Mit 1 illum. Kupfert. Wien 1795. 4. p. 20.

Kaum eine Linie lang und dabey überaus schmal ist die Kriechmücke — die kleinste aller Mückenarten. Sie hat einen schwarzen Kopf und schwarze Augen; blasse, fadenförmige Fühlhörner; einen bläulichgrauen, am Hintertheile öfters ins Weißlichte fallenden Brustschild; einen dunklen, länglichtrunden Hinterleib; weißlichte, durchsichtige, so übereinander liegende Flügel, daß sie nur einen auszumachen schienen, wenn sie nicht am Hinterrande etwas auseinander wichen, und schwarze, mit einem weissen Ringe umzogene Füße. Pallas hält diese *linné'sche Kriechmücke*, die *russische Moschkoka* oder *Beißmücke*, und die *bannatische* oder *kolumbatzer Mücke* für ein und dasselbe, nur in Rücksicht der Grösse, nach Verschiedenheit des Klimas, von einander abweichende Insekt. So gewiß aber auch dieses von beyden ersten Arten seyn mag, so ist doch die Verschiedenheit des kolumbatzer Insekts schwerlich zu bezweifeln, wie *Schönbauer* hinreichend erwiesen hat. Lezteres ist nemlich grösser und in allen Theilen merklich stärker, als die Kriechmücke, hat dunkelkastanienfarbne Augen, da diese schwarze hat, ist nur mit einem einfachen Saugrüssel (*Haustellum*) versehen, da die Kriechmücke einen zusammengesetzten Saugrüssel (*Haustellum cum Proboscide*) führt. Ferner bemerkt man am kolumbatzer Insekte dreygliedrige Fühlspitzen (*Palpi*), die weit länger als das *Haustellum* sind, hingegen bey der Kriechmücke fünfgliedrige Fühlspitzen von der Länge der *Proboscis*. Überdies weicht die schwarze und weisse Zeichnung der Füße in beyden Arten ganz voneinander ab, so wie sie auch in Rücksicht der nachtheilign Verletzung und des Aufenthalts verschieden sind; denn der Biß der Kriechmücke ist nicht so schmerzhaft, wie der Stich der ko-

humbatczer Mücke, und diese setzt sich nicht, wie jene, zwischen die Haare und die Federn des Viehes und der Vögel fest.

Der Aufenthalt der Kriechmücke sind vorzüglich die kalten Gegenden von Europa, Schweden und das gebürgte Lappland, wo sie sich bey Untergang der Sonne oft legionenweis finden, und mit ihren unangenehmen Summen die Luft erfüllen. Doch hat sie *Pallas* auch an der Wolga und im südlichen Siberien, *Schönbauer* sogar in Böhmen bey Pardubitz an den Ufern der Elbe, in gebüschartigen, feuchten Gegenden gefunden. Weil sie aber hier nur sparsam und einzeln vorkommen, so sind sie von keiner schlimmen Seite bekannt. Sie kamen einzeln auf ihm zugeflogen, suchten die entblößte Haut und versetzten Stiche, wenn er sie nicht abhielt. Sonderbar ist es, daß sie nach *Amoureux* auch im mittägigen Frankreich zu Hause seyn sollen. Vielleicht hat aber dieser Naturforscher mehrere Mückenarten mit einander verwechselt.

In Lappland und Siberien, wo sie vorzüglich einheimisch zu seyn scheinen, werden sie den Menschen hauptsächlich gegen Sonnenuntergang durch ihr Kriechen auf der Haut und dadurch höchst beschwerlich, daß sie bald in die Augen, bald in die Nase, bald in den Mund zu kommen suchen und sich auf keine Art weder durch Blasen, noch mit den Händen verscheuchen lassen. Die Verletzungen mit ihrem stumpfen Rüssel, sind beynahe nicht zu achten. Sie hinterlassen zwar einen blutigen Punkt, der aber weder vom Jucken noch sonst von einer entzündlichen Geschwulst begleitet ist. Leute, die über Land gehen oder sich sonst im Freyen aufhalten müssen, stürzen, wie *Pallas* erzählt, Netzkappen über den Kopf, welche mit dem, diesen Insekten unangenehmen Birkenöle bestrichen sind. Auch das Vieh und die Vögel werden von ihnen verfolgt. Sie setzen sich bey diesen zwischen den Haaren und den Federn fest, und laufen auf demselben wie die Läuse herum. Diese Menschen und Thieren in jenen Gegenden zugetheilte Plage, dauert bis in die Mitte des Junius, sodann aber verschwindet die Moskara gänzlich.

47. Die kolumbatczer Mücke. Tab. XV. Fig. 8 — 10.

Culex Columbatczensis: muscoides; caeruleo - aut nigro - cinerescens; alis hyalinis; pedibus nigris; annulis albis; oculis obscure castaneis. *Schönbauer's* Geschichte der schädlichen kolumbatczer Mücken im Bannat. p. 26. — Habitat in Temisia, Servia.

Beckmann's Physikalisch-ökonomische Bibliothek B. XI. S. 206.

Fabricii Mantiss. Ins. II. p. 333. n. 15. *Rhagio Colombaczensis*.

Götzens entomol. Beyträge Th. III. B. II. S. 294.

Griselini, F. Versuch einer politischen und na-

türlichen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte. Th. II. S. 125. *Orstrus columbacensis*, die Kolumbacher Bremse.

Linnei Syst. Nat. Tom. I, P. V. p. 2866. n. 324. *Musca colombaschensis atra*, abdominis incisuris tibiis tarsisque albis.

Nah-

Nahrung und Aufenthalt der Larve und Nympe, Bildung des Saugrüssels und Lebensart des gegenwärtigen Insekts, geben offenbar zu erkennen, daß es weder unter das Bremsen- noch unter das Fliegen- sondern unter das Mücken-geschlecht gehöre, so abweichend auch die äussere Gestalt von der, der meisten Mückenarten ist. Das Männchen ist kaum anderthalb Linien lang und eine halbe Linie breit, das Weibchen (Fig. 8.) etwas grösser und dicker. Der an sich kleine Kopf (Fig. 9.) hat von vorne betrachtet (Fig. 10.) eine länglichrunde, schmale, aschgraue Stirne und zwey grosse, die Seitenflächen des Kopfs einnehmende, dunkelkastanienbraune Augen. Die aschgrauen, fadenförmigen, achtgliedrigen, nach aussen gekrümmten Fühlhörner, nemen ungefehr in der Mitte der Stirne am Vorderkopf ihren Ursprung, die zwey dreygliedrigen, nach unten gekrümmten Fress- oder Fühlspitzen aber, stehen dicht zu beyden Seiten des viel kürzern Saugrüssels. Lezterer ist cylindrisch, vorne gerade abgeschnitten und bestehet aus lauter spizigen, von einer Scheide umzogenen Stechborsten. Von dem Kopfe aus steigt das kurze, runde Brustschild in einem Bogen in die Höhe und giebt dadurch der Mücke ein bucklichtes Ansehen. Es ist aschgrau, mit einem feinen Wollhaare bedeckt und von hinten noch mit einem kleinen Anhang oder Schildchen versehen, welches zugleich den grössten Theil der Verbindung zwischen dem Brustschilde und dem Hinterleibe ausmacht. Dieser ist noch einmal so lang, als der Brustschild, aber weit schmaler, besteht aus fünf Ringen und ist oben bräunlich, unten gelblichweiss, bisweilen auch, von dem eingesogenen, durchschimmernden Blute, roth. Über den Hinterleib hinaus reichen die am Hintertheile des Brustschilds entstehenden, schmalen, durchsichtigen Flügel, welche flach und so über einander liegen, daß ein Flügel beinahe den andern bedeckt. Durch die unter denselben befindlichen Schwingkölbchen verbreiten diese Mücken ein Summen in der Luft. Die Schenkel der zwey Vorderfüsse sind weiss, die der vier Hinterfüsse halb weiss, halb schwarz, die Afterschenkel aller sechs langen und starken Füsse schwarz, die Schienbeine aber weiss. Die aus vier Gliedern bestehenden, und sich mit zwey Klauen endigenden Fufsblätter sind am Vorderpaare ganz schwarz, an den vier Hinterfüssen halb schwarz halb weiss.

Gleich andern Mücken legt das Weibchen der kolumbatczer Mücke ihre Eyer auf die Oberfläche des Wassers, wo sich die aus denselben hervorkommenden Larven bis zu ihrer Verwandlung in Nymphen nähren. In der Mitte des Aprils aber verlassen bey günstiger Witterung, die vollkommenen Insekten die Puppenhülsen.

Das

Das Vaterland dieser Mücken ist vorzüglich derjenige Theil des Temeswarer Bannats, welcher zwischen Uypalanka und Orschowa an die Donau gränzet und die Gegend bey *Kolumbatcz*, einem alten Schlosse, welches, nebst dem Dorfe gleiches Namens, an den rechten Ufern der Donau in Servien lieget, und wovon die Mücke selbst ihren Namen erhalten hat. Diese Gegend ist sehr warm, wasserreich und gebüschicht, dabey voll weidender Viehheerden, und mithin mit allem versehen, was diese Mücken herbeyziehen und ihre Vermehrung begünstigen kann. Zwar will *Skönbauer* auch sie, wie die Kriechmücke, in Böhmen an den gebüschichten Ufern der Elbe angetroffen haben, aber nur bisweilen einzeln, und daher nicht als nachtheilig bekannt. Selten entfernen sie sich aus den mit Sümpfen, Bächen und Flüssen durchzognen kolumbatczer Thälern, es müßte denn seyn, daß sie durch Viehherden, welche sie verfolgen, über die Gränze gelockt oder durch heftige Sturmwinde dahin getrieben würden. Lezteres war der Fall im Jahr 1785, wo ein sehr grosser Schwarm in der Gegend von Deva in Siebenbürgen ankam und in wenig Stunden eilf Stück Ochsen und Kühe tödtete, glücklicherweise aber bald durch einen auf den Sturmwind folgenden Wolkenbruch zerstreuet wurde und umkam. Überaus kommen ihnen, bey dergleichen ihr Leben in Gefahr setzenden Luftveränderungen, die in der Gegend von Kolumbatcz häufig vorkommenden Höhlen und Klüfte der Felsen, auch hohle Bäume zu statten, in welche sie sich bey Sturm und Regenwetter, so wie bey Kälte und heissen Sonnenschein, verbergen. Sind sie lange durch eine ihnen ungünstige Witterung in denselben zurückgehalten worden; so kommen sie vorzüglich am Morgen oder Abend schöner lauer Tage, wie ein dichter Rauch aus jenen Schlupfwinkeln hervor und verfolgen dann desto wüthender alles, was ihnen im Wege kommt.

Die Jahrszeit, wo sie sich zuerst zeigen, ist die Mitte oder das Ende des Aprils, und schon zu Anfang des Mays nehmen sie so sehr überhand, daß man nicht mit offnem Munde athmen kann, ohne eine Menge derselben mit einzuziehen. Sie bilden dann oft ganz dichte, in der Ferne Wolken gleichende Schwärme, bey deren Anblick Menschen und Vieh das Feld verlassen und ihren Wohnungen zueilen, weil sie vorzüglich in dieser Vereinigung äusserst gefährlich werden, und oft mit einemale herabstürzen. Zum Glücke schränkt sich aber ihre Schwärmzeit nur auf den Frühling ein; denn zu Ende des Junius vermindern sie sich schon so sehr, daß man sie nur noch einzeln gewahr wird.

Die Werkzeuge, wodurch diese kleinen, unbedeutend scheinenden Insekten, Menschen und Thieren furchtbar werden, sind die Stechborsten ihres Saugrüs-

rüssels. Mit diesen verwunden sie nicht nur, als mit lauter feinen Lanzetten die Haut, sondern saugen sich auch, als mit eben so viel feinen Haarröhrchen, voll Blut, und lassen höchst wahrscheinlich, wenn sie in Wuth sind, einen feinen Giftsaft in die Wunde, auf dessen Reiz die Säfte mehr herbeygezogen werden, und mit einemmale eine juckende, schmerzhaftige Geschwulst an der verletzten Stelle entstehet, welche so hart ist, daß sie oft kaum nach acht bis zehn Tagen ganz vergehet. Viele Stiche erregen ein heftiges Entzündungsfieber und in reizbaren Körpern, Krämpfe und Convulsionen. *Schönbauer* liefert hiervon eine überzeugende Beobachtung. „Ich wurde, schreibt er, einmal zu einer Frau gerufen, die unzählige Stiche im Gesicht, vorzüglich aber an den Füßen, Schenkeln und Unterleibe von ihnen bekommen hatte. Sie lag in einer brennenden Hitze, sprach sehr verwirrt, klagte über unausstehlichen Durst und Brennen der gestochenen Theile. Der Puls war geschwind, bald heftig und stark, bald unterdrückt und ungleich, woraus ich auf Entzündungsfieber und Krämpfe schloß. Die geschwollenen Theile waren sehr roth und die Haut gespannt und heiß. Nach wiederholten Aderlassen, erweichenden, warmen Bädern und Umschlägen, dem innerlichen Gebrauch der Mandelmilch mit Salpeter, verschwanden alle diese Symptome den dritten Tag, nur die Haut der gestochenen Theile blieb hart und gleichsam knotig. Diese Knoten, welche nichts als Überbleibsel der durch die Stiche entstandenen Geschwulst waren, verloren sich erst nach drey Wochen gänzlich. Dergleichen Fälle, setzt er hinzu, sind in diesen Gegenden nicht selten. Ja man hat sogar Beyspiele, daß kleine Kinder durch diese Mücken getödtet worden sind, wenn die auf dem Felde arbeitenden Mütter sie im Grase liegen liessen, oder sie in zu grosser Entfernung von sich in einem Tuche, wie in einer Schaukel, aufgehangen hatten.“ Dem Viehe, welches ihren Verletzungen alle Theile bloßgeben muß, werden sie aber durch die, meistens an den weicheren Stellen der Haut angebrachten Stiche, sehr oft tödtlich. Im Jahre 1783 kamen nur in den zum Bergwesen des kolumbatzer Distrikts gehörigen Domainen 30 Pferde, 32 Füllen, 60 Kühe und Ochsen, 71 Kälber, 130 Schweine und 310 Schaaf durch diese Mückenstiche um.

So empfindlich und weich dieses Insekt an sich ist, da ein starker Wind, ein heftiger Regen ihm schon das Leben zu rauben vermag; so erfordert es doch sehr wirksame und in mehr als einer Hinsicht lästige Verwahrungsmittel. Am gewöhnlichsten bedienen sich die Bewohner jener Gegenden des Rauchs. Sie zünden so wohl um ihre Häuser, als auch auf den Hutungen Stroh, Heu, Baum-

laub,

laub, gedörrten Mist etc. an. Reisende bedienen sich stark rauchender, aus Harz, Kühnholz, Werk, Stroh gemachter Fackeln. Doch schützet dieser Rauch nicht vor einem plötzlichen Überfall. Daher empfiehlt *Schönbauer* eine Salbe, welche auf folgende Art bereitet wird. Zwey Pfund Tabacksblätter werden mit zwanzig Pfund Wasser bis zur Hälfte eingekocht und dieser Absud bis zur Honigdicke abgedampft. Sodann wird diesem Extrakte ein Pfund altes Schmerfett und ein halbes Loth Steinöl beygemischt. Diese Salbe wird dem Vieh jedem dritten Tag an den zarten und mit Haaren weniger bedeckten Theilen eingerieben, und kann wahrscheinlich auch von den Menschen als Verwahrungsmittel der unbedeckten Theile mit Nutzen gebraucht werden.

Gegen die üblen Folgen des Stichs selbst, empfiehlt *Schönbauer* Bähungen der gestochenen und geschwollenen Theile mit lauer Milch; Auflegen des frischen Leinöls oder frischer Butter, welche das Brennen sehr lindern und der Geschwulst vorbeugen; laue, erweichende Bäder; Aderlassen, wenn das Fieber heftig, Schlaflosigkeit, Verwirrung der Sinne, oder eine allzugrosse Schläfrigkeit vorhanden ist; erweichende Klistire, besonders bey stark aufgetriebenem Unterleibe; innerlich Salpeter mit kühlenden Getränken, an deren Stelle aber wohl weit vortheilhafter die Vitriolsäure in starker Quantität wirken mögte; endlich noch bey Krämpfen und Convulsionen, wiederholtes Aderlassen und Opium.

48. Die braungrauliche Tanzfliege. Tab. V. Fig. 1. 2.

Empis livida, thorace lineato, alis basi pedibusque ferrugineis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2889. n. 3. Faun. Suec. 1897. — Habitat in Europa frequens in floribus heraclei sphondylii, abdomine supra magis fusco, alis oblongis, venis fuscis.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI. S. 101. n. 1. Tab. XIV. F. 14 — 16. *Empis livide*, die grünlichte Tanzfliege.

Fabricii Mant. ins. II. p. 365. n. 6. Spec. ins. II. p. 471. n. 5. Syst. Ent. p. 801. n. 4. *Empis livida*.
Göze, Geschichte schäd. Insekten, S. 117.

Müller's Linn. Natur. d. Ins. B. II. S. 995. n. 3. Der Grauhüpfer.

Mülleri Faun. Fr. n. 777. Zool. Dan. Pr. n. 2140. Onomat. hist. nat. P. III. p. 786. Der blasse Schnacke.
Schaefferi Elem. Ent. Tab. LXI. F. 14. Icon. Ins. Ratisb. Tab. 192. F. 1.

Ungewiß in der charakteristischen Bestimmung dieses Geschlechts, verwechselte man ehemals die verschiedenen Arten desselben bald mit den Fliegen, bald mit den Schnacken, bald mit den Mücken. Der Name *empis* bedeutet im Grunde selbst nichts als eine Mücke, womit diese Insekten auch dem ersten Anscheine nach die meiste Ähnlichkeit haben. Ihr Saugrüssel (Fig. 2.) aber hat eine ganz

an-

andere Bildung und sehr viel Ähnlichkeit von einem Schnepfenschnabel, daher diesem Geschlechte auch von einigen Naturforschern der Name *Schnepfenfliege*, la *Mouche Becasse*, beygelegt worden ist. Mit den Mücken haben sie gemein, daß sie ebenfalls gegen Abend in ganzen Haufen herumschwärmen, im Fluge aber eine gewisse tanzende Bewegung äussern, wodurch sie sich von andern Naturforschern den Namen *Tanzfliege* erworben haben, von den Holländern aber *Drillmuggen* genannt werden. Die Bildung ihres Saugrüssels macht sie alle zum Stechen geschickt, daher sie auch dem Menschen alle mehr oder weniger nachtheilig werden können. Vorzüglich verdient gegenwärtige Art in dieser Rücksicht eine nähere Betrachtung.

Die *braungrauliche Tanzfliege* (Fig. 1.), ein europäisches Insekt, ist ungefähr einen halben Zoll lang, mithin grösser als die Stubenfliege, und viel grösser und dicker als die Mücke. Ihr Kopf ist im Verhältniß ihres langen Körpers überaus klein und rund, mit zwey grossen, die Seitenflächen desselben ganz bedeckenden Augen (Fig. 2. b.) versehen. Zwischen denselben stehen mehr nach vorne die zwey Fühlhörner (c. c.), welche aus zwey kürzern, mehr walzenförmigen und aus einem langen, am Ende zugespitzten und etwas gebogenen Gliede bestehen. Am vordern und untern Theil des Kopfs, dicht neben den Saugrüsseln, befinden sich die an ihrer Wurzel fadenförmigen, am Ende mehr Löffel bildenden Bartspitzen (d. d.). Der hornartige Saugrüssel selbst besteht aus fünf Theilen (Fig. 2. f. g. h. i. l.), die bey der geringsten Berührung aus einander treten und sich wie der Schnabel eines Schnepfen öffnen. Von diesen Theilen ist der oberste (e. f.) an seiner Wurzel breit, wird hernach schmaler und läuft in eine unterwärts gebogene Spitze zu. Er ist zugleich mit einer Rinne versehen, um mit dem untersten Theil ein gemeinschaftliches Futteral zur Aufnahme der Mittelstücke des Saugrüssels zu bilden. Dieser unterste Theil (k. l.) ist viel länger, als der oberste, fängt am Kopfe mit zwey kleinen Gliedern an, wird hernach platt und breit, dann wieder schmaler und zuletzt löffelförmig stumpf. Den eigentlichen Saugrüssel machen die drey übrigen, dünnen, flachen und durchsichtigen Mittelstücke (g. h. i.) aus, wovon das obere das längste und, wie das untere, lanzettenförmig ist, das mittlere aber mehr einem Stachel gleicht. Mit dem Kopfe ist der kurze, runde, etwas bucklichte Brustschild durch einen kurzen, dünnen Hals verbunden. Er ist braungraulich von Farbe und mit drey schwarzen Strichen der Länge nach bezeichnet. Der ziemlich lange ins gelblichte fallende Hinterleib ist bey dem Männchen schmal, mehr cylindrisch und hinten rundlicht abgestutzt, bey dem Weibchen aber dicker und am Ende mehr kegelförmig zugespitzt.

Die

Die Flügel sind länglichtrund, durchsichtig, braungeadert, mit Balanzirstangen versehen und bedecken einander im Ruhestande; die Füße sind röstfärbig, sehr lang, haben fünfgliedrichte Fußblätter mit zwey kleinen Ballen und Haken.

Bey der Begattung sitzt das Männchen auf dem Rücken des Weibchens. So vereinigt bleiben sie auch im Fluge an einander hängen. Übrigens aber ist von der Verwandlung des ganzen Tanzfliegengeschlechts noch nichts bekannt.

Mit den scharfen und spitzigen Instrumenten, die die schnabelförmigen Halbfutterale ihres Saugrüssels verbergen, macht gegenwärtige Art ähnlichen Gebrauch, wie die Bremsen. Sie durchbohret damit die Haut der Thiere, und besonders der Menschen, saugt sich vom Blute oft strotzend an, und bewirkt durch ihre Stiche entzündliche Röthe und Geschwulst der verletzten Stellen.

49. Die Wadenstecherin. Tab. V. Fig. 3 — 6.

Conops calcitrans, antennis subplumatis, cinerea glabra ovata. Blumenbachs Handb. d. Naturgesch. S. 383. n. 1. — Habitat in Europa.

- | | |
|---|---|
| Amoreux Notice des Ins. rep. ven. p. 264. | Linnaei Amönit. acad. VIII. p. 343. |
| Cuvier Tableau élémentaire. p. 617. <i>le Stomoxe piquant</i> . | Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 997. n. 2. <i>Der Wadenstecher</i> . |
| Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze. B. II. Th. I. S. 63. B. VI. S. 39. n. 11. Tab. IV. F. 12 — 18. <i>Mouche piqueuse, die Stechfliege</i> . | Mülleri Faun. Fr. n. 779. Zool. Dan. Pr. n. 2120. |
| Fabricii Syst. Ent. p. 798. n. 3. <i>Stomoxis calcitrans</i> . | Murray de verm. in lepra obviis. p. 25. in der Note. |
| Fuefsly's schweiz. Ins. S. 57. n. 1140. <i>Wadenstecher</i> . | Schaefferi Elem. Ent. Tab. 119. <i>Stomoxys, Stechfliege</i> . |
| Geoffroy Hist. d. Ins. T. II. p. 538. n. 1. Tab. XVIII. F. 2. <i>le Stomoxe</i> . | Sulzers Kennzeich. Tab. XXI. F. 138. Gesch. d. Ins. S. 223. Tab. XXVIII. F. 18. <i>Die Wadenstecherin</i> . |
| Göze, Geschichte schäd. Ins. S. 110. <i>Der Wadenstecher</i> . | Wittenbergisches Wochenblatt auf das Jahr 1786. S. 393. |

Zwey rothbraune Augen, zwey federartige Fühlhörner, ein aschgrauer, ins grünlichte fallender Brustschild, ein eyförmiger, mit schwarzen Punkten der Länge nach auf den gelben Ringen bezeichneter Hinterleib, und ein Saugstachel von besonderer Bildung, machen vereinigt die Unterscheidungsmerkmale des gegenwärtigen Insekts aus. Der Saugstachel (Fig. 4.) liegt im Ruhestande schräg unter dem Kopfe, ist lang, steif und bey nahe walzenförmig. Sein kürzeres Wurzelglied (a. b.), auf welchem zwey gefiederte Bartspitzen (c.) sitzen, liegt in einer Vertiefung unter dem Kopfe, und bildet mit dem längeren Gliede dieses Saugstachels (b. d.) einen Ellenbogen. Lezteres Glied hat an seinem Ende zwey kleine, mit fei-

feinen Härchen besetzte Fleischlippen (*d.*), welche dem Insekto zum Saugen dienen. Öffnen sich diese Fleischlippen und dieses ganze lange Glied des Saugstachels an seiner schmalen Oberseite (Fig. 5.), so kommt ein langer, beweglicher lanzettenförmiger Theil (*c. d.*) zum Vorschein, welcher unten konkav und nicht, als die Scheide eines andern, noch zarteren, hornartigen, oder des eigentlichen verletzenden Stachels (Fig. 6. *c.*) ist. Übrigens trägt gegenwärtige Stechfliege die Flügel mehr auswärts und hat einen kürzeren Leib, als die Stubenfliege, mit welcher sie um so leichter verwechselt werden kann, da sie sich in ihrer Gesellschaft häufig aufzuhalten pflegt, wenn nicht vorzüglich auf ihren vorwärts ausgestreckten, einer Ahle gleichenden Saugstachel Rücksicht genommen wird. Auch in der Naturgeschichte dieser überall in Europa zu findenden Stechfliege ist man noch so weit zurück, daß man mit ihrer Verwandlung gänzlich unbekannt ist. Murray hat sie in Göttingen häufiger als in Schweden angetroffen. Gewöhnlich hält sie sich auf dem Felde und in den Gärten auf, bey bevorstehendem Regen kommt sie aber auch in die Häuser. Die Jahrszeit, wo sie meistens erscheint, ist das Ende des Sommers und der Anfang des Herbsts.

Ihr niedriger Flug macht, daß sie Pferde und Rinder, die sich im Freyen und auf der Weide aufhalten, beständig in die Beine sticht und daher das unablässige Stampfen derselben veranlaßt. Hauptsächlich ist dieses der Fall, wenn es regnen will. Sie setzt sich dann auch an unsre Waden, sticht uns empfindlich und saugt Blut aus. Wir hören dann gemeiniglich sagen: die Fliegen stechen, es wird anderes Wetter. Erscheint diese und andere Stechfliegenarten in Menge wie es in mehrern Jahren zu geschehen pflegt; so können sie ebenfalls sehr nachtheilig werden. Dieß war z. B. der Fall in der Gegend von Magdeburg, wo den 22. April 1786 eine Stechfliegenart, welche man *Kankerfliege* nannte, wahrscheinlich aber *Conops ferruginea* L. war, schwarmweise erschien, so daß alles Vieh, welches auf der Weide oder vor dem Pfluge gewesen, davon gleichsam überdeckt wurde. Es schwoll davon am ganzen Leibe und konnte kaum mehr gehen. Wenn es sich leckte, so lief die Zunge ebenfalls an, wurde blau, der Hals schwoll und in ein Paar Stunden war es todt. Dieses beweist offenbar, daß auch die Stechfliegen ihre Wunde mit einer äzenden Feuchtigkeit vergiften können.

50. Die gelbe Raubfliege. Tab. V. Fig. 7. 8.

Asilus flavus, hirsutus niger, thorace posterius cinereo, abdomine supra hirsuto fulvo.

Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2897. n. 8. Faun. Suec. 1911. Iter. Gothl. 327. —

Habitat in Europa boreali, capitis barba albida.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI. S. 96. n. 3. Tab. XIII. F. 10 — 14. *Asille jaune*, die gelbe Raubfliege.

Fabricii Mant. ins. II. p. 359. n. 14. Spec. ins. II. p. 462. n. 12. Syst. entom. p. 793. n. 10. *Asilus flavus*.

Müllers Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1004. n. 8. Der Gelbrücken.

Schaefferi Icon. Ins. Rat. Tab. LI. F. 2.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 224. Tab. XXVIII. F. 20. Die Gelbe.

Das ganze Geschlecht der Raubfliegen ist, vermöge seines ahlenförmigen Saugstachels, im Stande, Menschen und Thiere zu verletzen. Gegenwärtige Art ist hauptsächlich in den nördlichen Gegenden unsers Welttheils, besonders in Gothland zu Hause und hat die Grösse der gemeinen Wespe. Der schwarze Kopf ist gegen dem Körper von mittlerer Grösse, mit runden, grossen, netzförmigen Augen, mit vielgliedrichten, fadenförmigen Fühlhörnern, zwey kleinen, walzenförmigen, gegliederten Bartspitzen und einem Saugstachel von besonderer Form versehen, die der eines Trökers nicht unähnlich ist. Er besteht nemlich aus einer gerade vorwärts gekehrten und im Stande der Ruhe allein sichtbaren Scheide (Fig. 8. a.), welche von gleicher Dicke, am Ende abgestutzt und mit einer Öffnung versehen ist. In der Rinne dieser Scheide ist ein Stilet (b.), oder der eigentliche Stechstachel dieses Insekts verborgen, welchen es, auf gegebene Veranlassung, aus einer Öffnung hervorstößt. Dieser Stachel ist gelbbraun, hornartig, durchsichtig und scheint in der Mitte gespalten zu seyn. Ein sehr kleines Hälschen macht die Verbindung des Kopfs mit dem Brustschilde aus, welcher rund, von der Rückenseite vorzüglich gewölbt, schwarz, am Hintertheile aber gelb, auf den Seiten und unten weißlich gefiedert ist. Der Hinterleib ist ziemlich lang, beym Weibchen kegelförmig, am Ende mit einem sehr zugespizten, hornartigen Stücke, beym Männchen aber mit einem Rehfuß ähnlichen, schwarzen, ebenfalls hornartigen Anhang und drey Lamellen versehen, zwischen welchen sich zwey grosse bewegliche, hornartige Krallen, zum Anhalten bey der Begattung, befinden. Diese Theile hat Sulzer in seiner Abbildung unbemerkt gelassen. Übrigens hat der Hinterleib eine dunkelgelbe Farbe und goldgelbe, glänzende Seidenhaare. Die meistens auf dem Rücken liegenden Flügel sind ziemlich lang, und fallen ins Bräunliche und verbergen unter ihren Wurzeln zwey Balanzirstangen. Die vier Vorderfüsse sind kurz, die zwey Hinterfüsse sehr lang, die Fußblätter fünfgliedricht,

am

am Ende mit zwey langen, spitzigen Klauen und zwey ovalen Ballen, wie die Fliegen versehen. Alle sind, bis auf die rostfärbigen Schienbeine, schwarz und rauh von den gelben Härchen, womit sie bestreut sind.

Die Larven dieser Insekten haben eine madenförmige Gestalt, zwölf Ringe, einen kleinen, hornartigen Kopf mit zwey beweglichen Haken, die ihnen im Kriechen forthelfen, und womit sie sich in der Erde, ihrem gewöhnlichen Aufenthalte, weiter graben. Sie verwandeln sich in Nymphen, welche fast überall gleich dick sind, und am Ende kegelförmig zulaufen. Der Kopf dieser Nymphen ist dick und rund, der Brustschild ebenfalls rundlicht, und mit den Umrissen der Füße und Flügel bezeichnet. Alle Ringe, so wie das Kopf- und Schwanzende, sind mit harten, borstenartigen Stacheln besetzt.

Das vollkommene Insekt lebt vom Raube, verfolgt andere Fliegen und Erdmücken, fängt sie im Fluge und saugt sie aus. Es bewirkt dieses mit seinem spitzigen Saugstachel, womit es auch in die Haut des Menschen dringt, hierdurch einen empfindlichen Schmerz veranlaßt, und das Blut aussaugt.

51. Die fliegende Pferdelaus. Tab. V. Fig. 9. — 11.

Hippobosca equina, alis obtusis, thorace albo variegato, pedibus tetradactylis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2904. n. 1. Faun. Suec. 1921. Amoen. acad. III. p. 344. —

Habitat in Europa et America, equis pecoribusque molesta, vitae tenacissima, pupipara, alis cruciato-complicatis.

- | | |
|--|--|
| Blumenbach's Handb. d. Nat. Gesch. S. 384. n. 1. <i>Die Pferdelaus</i> , (Engl. <i>the horseleech</i> .) | Mouffetti Theatr. Ins. p. 59. |
| Catholicon H. p. 194. | Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1009. n. 1. <i>fliegende Pferdelaus</i> . |
| Cuvier Tableau élémentaire, p. 619. <i>L'hippobosque du cheval</i> . | Mülleri Faun. Fr. n. 791. Zool. Dan. Pr. n. 2153. Dan. <i>Heste - Flue</i> . |
| Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI. S. 110. n. 1. Tab. XVI. F. 1 — 20. <i>Hippobosque des Chevaux, die Pferdespinnfliege</i> . | Onomat. Hist. Nat. IV. p. 180. |
| Fabricii Mant. Ins. T. II. n. 1. p. 367. Spec. Ins. T. II. p. 474. n. 1. Syst. Ent. p. 803. n. 1. | Panzer, Faunae Insect. Germ. initia, Heft VI. <i>Die fliegende Pferdelaus</i> . |
| Frisch's Ins. Teutschl. V. S. 43. Tab. XX. <i>Die fliegende Pferdelaus, Ricinus volans</i> . | Reaumur Mem. pour serv. à l'Hist. d. Ins. VI. Tab. 48. <i>La Mouche araignée (Spinnfliege)</i> . |
| Fuefsly's schweiz. Ins. S. 58. n. 1156. | Schaefferi Ic. Ins. Ratisb. Tab. 178. Fig. 8. 9. |
| Geoffroy Hist. des Ins. T. II. p. 547. n. 1. Tab. XVIII. F. 6. <i>La Mouche à chien</i> . | Schrank, Enumeratio insector. indigen. Austriae n. 1007. |
| Göze's Gesch. schädli. Insekten S. 42. <i>Die geflügelte Pferde- oder Rehtaus</i> . | Scopoli Ent. Carn. n. 1022. |
| | Sulzers Kennzeichen, Tab. XXI. Fig. 141. |

Die größte Art ihres Geschlechts ist die *fliegende Pferdelaus* (Fig. 9.), welche vom Kopfe bis zum Schwanze vier bis fünf Linien lang, und über zwey Linien breit

breit ist. Sie hat eine lederartige Haut und läßt sich daher kaum zerdrücken, einen plattgedruckten Körper, dessen untere Fläche alle Gegenstände berührt, an welchen sie sich mit ihren weit auseinander gesetzten Füßen anklammert. Selbst ihr kleiner brauner und runder Kopf (Fig. 10.) ist oben und unten platt. Er hat zwey grosse, netzförmige, dunkelbraune Augen (*a. a.*), zwischen welchen sich eine doppelte Binde durchzieht, und am Vordertheil eine gelbgefleckte Hervorragung mit einem gelben Knöpfchen (*b. b.*) auf jeder Seite. Diese Knöpfchen sind mit einigen Haaren besetzt, wovon die zwey längern, dickern und borstenartigen (*c. c.*), wahrscheinlich die Stelle der Fühlhörner vertreten. Vor denselben entsteht die Rüsselscheide (*d. d.*), als ein schwarzer, konischer, beweglicher und mit kurzen Härchen bewachsener Theil, der aus zwey, inwendig hohlen dicht aneinander schliessenden Halbscheiden (Fig. 11. *a. a.*) besteht. Der in jener Scheide verborgene, und, wenn das Insekt saugen will, hervortretende Rüssel selbst (Fig. 10. *e.* und Fig. 11. *b.*), ist ein langer, gelblichter, hornartiger Faden, welchen die Fliege nach allen Richtungen herum drehen kann. Das buntfärbige Brustschild ist ziemlich groß, länglichtrund, breit und flach, am Hintertheile mit zwey Balanzirungen unter zwey hornartigen, platten, behaarten Erhöhungen versehen. Nicht viel grösser, als dieses Brustschild, ist der runde braune Hinterleib, wenn das Insekt seine Eyschaale verlassen hat. Er wird aber beym trächtigen Weibchen ungeheuer dick. Die Flügel sind braun, adericht, pergamentartig, und so groß daß sie weit über den Hinterleib hinausreichen. Selten bedient sich die Fliege derselben zu ihrem sehr leisen Fluge. Die sechs rostfärbigen Füße sind sehr lang, und haben dicke, behaarte Schenkel. Ihre fünfgliedrichten Fußblätter führen zwey grosse, stark gebogene, schwarze Krallen, wovon jede wieder einen doppelten, beym ersten Anblick ebenfalls einer Kralle gleichenden Anhang hat. Hierdurch vermag sich dieses Insekt so fest allenthalben anzuklammern, daß man dasselbe nur mit Mühe losreißen kann.

Seine Entstehung hat vor der aller andern Insekten eine merkwürdige Eigenheit. Das Mutterinsekt legt nemlich ein Ey, welches rund, linsenförmig flach, am Ende ausgeschweift mit einem schwarzen Fleck versehen, und beynahe so groß, als der ganze Hinterleib selbst ist. Dieses anfangs gelblichte Ey, wird in wenig Stunden kastanienbraun, und den folgenden Tag glänzend schwarz, und hornartig fest. In demselben geht, nach *Reaumur's* Beobachtung, die Verwandlung der Larve in eine Nymphe vor und das aus letzterer entstehende Insekt stößt nach vier Wochen den Deckel der Eyschaale am breiteren Ende auf, und erscheint gleich
ohne

ohne ein weiteres Wachsthum nöthig zu haben, in der Grösse und Gestalt der vollkommenen Pferdefliege.

Das Vaterland dieses Insekts ist, ausser Europa, auch Nordamerika, wo es sich häufig in Wäldern und bey Morästen aufhält. Gewöhnlich sucht es die weichen, weniger behaarten Stellen der Haut an Hunden, Rindern, vorzüglich aber an Pferden auf, und plagt diese Thiere durch seine Stiche. Auch dem Menschen wird sie hierdurch lästig. Mir selbst, schreibt Göze, ist es in den Wäldern des Unterharzes oft begegnet, daß ich aus den Büschen solche geflügelte Läuse mit nach Hause brachte, die mich ausserordentlich peinigten. Denn sie graben sich, wie Sulzer versichert, mit ihrem Saugstachel so tief in die Haut, daß sie mit Kopf und Brust darinnen stecken und halten sich so fest, daß man sie oft eher entzwey reißt, als daß man sie heraus bringt. Sie saugen da in einem fort, und lassen nicht ab, bis ihr Bauch ganz angefüllt ist.

52. Die fliegende Vogellaus. Tab. V. Fig. 12. 13.

Hippobosca avicularia alis obtusis, thorace unicolore. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2904. n. 2. Faun. Suec. 1922. — Habitat in hirundinibus aliisque avibus, equina dimidio minor, alis corpore dimidio longioribus, vasis lateralibus atris, abdomine posterius retuso punctato, unguibus binis duplicatis.

Catholicon, H. p. 195.	Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1010.
Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VI. S. 114. n. 2. Tab. XVI. F. 21 — 27. <i>Hippobosque des Oiseaux, die fliegende Vogellaus.</i>	<i>fliegende Vogellaus.</i>
Fabricii Syst. Ent. p. 804. n. 2. <i>Hipp. avis. Spec.</i>	<i>Onomat. Hist. Nat. IV. p. 180.</i>
Ins. II. p. 475. n. 2. Mant. ins. II. p. 367. n. 2.	Slabber, M. Obs. de pediculo avium alato 36 cingulis instructo, in comment. Societ. Harleimens. T. X. P. II. p. 413.
Fuefsly's schw. Ins. S. 58. n. 1157.	Sulzers Gesch. d. Ins. S. 228. Tab. XXVIII. F. 24. <i>Die Vogellausfliege.</i>
Mülleri Zool. Dan. Prodr. n. 2154.	

Um die Hälfte kleiner, als vorhergehende Pferdelaus ist die geflügelte Vogellaus (Fig. 12.), deren kleiner sphärischer Kopf mit zwey grossen braunröthlichen Augen, und vor denselben, dicht am Rüssel, mit zwey länglichtrunden häufigen, stark behaarten Lappen (Fig. 13. a. a.) versehen ist, wovon jeder einen schwarzen, länglichten Fleck hat. Degeer glaubt, daß diese Theile die Stelle der Fühlhörner vertreten. Vor denselben ragt der Saugstachel (c.) hervor, an welchem die zwey Halbscheiden (b. b.) locker anliegen. Beyde, so wie der Stachel, selbst, sind von der nemlichen Bildung, wie bey der Pferdelaus. Das Brustschild ist länglichtrund und hat in der Mitte eine leichte Vertiefung. Der Hinterleib, noch

noch einmal so lang, als das Brustschild, hat am stumpfen Hintertheile einen etwas aufgeworfenen Rand. Die durchsichtigen, mit schwarzen Adern durchzogenen, und an einigen Stellen behaarten Flügel, haben die Länge des ganzen Körpers. Von besonderer Bildung sind noch die Füße, welche sehr dicke Schenkel und fünfgliedrichte Fußblätter haben. Hiervon sind die vier ersten Glieder kurz, das fünfte aber so lang, als die vier übrigen zusammen genommen. Am Ende des Fußblatts sieht man noch zwey Krallen, wovon jede zwey Anhänge und, wenn man diese ebenfalls für Krallen annimmt, jedes Fußblatt mithin vier Krallen hat. Unter diesen Krallen befinden sich noch zwey ovalrunde, haarichte Ballen, und zwischen denselben noch ein besonderes federbärtiges Haar. Kein Wunder ist es, wenn sich dieses Insekt, bey einer solchen Bildung der Füße, überaus fest in die Haut einsetzen und in den Federn und feinen Hauthaaren verwickeln kann. Die Farbe des ganzen Körpers ist gelbbraun und die der Füße fällt mehr ins Grüne.

Man trifft die fliegenden Vogelläuse nicht nur in Schweden, sondern auch in andern Ländern unsres Welttheils häufig an. Gewöhnlich sitzen sie zwischen den Federn der Sperlinge, Rothschwänze und anderer, oft noch ganz junger, erst ausgeflogener Vögel, aber auch an anderem Geflügel. Sie fliegen und kriechen sehr geschwind, vor- und rückwärts, gelangen daher auch nicht selten auf den menschlichen Körper und bohren sich schmerzhaft mit ihrem Stachel in dessen Haut ein.

53. Die Krieger-Termite. Tab. V. Fig. 14—21.

Termes bellicosus corpore fusco, alis fusciscentibus; costa ferruginea, stematibus subsuperis oculo propinquis, puncto centrali prominulo. Smeathmann's, H. Sendschreiben an den Baronet J. Banks über die Termiten Afrika's und anderer heissen Klimate. Aus dem Englis. v. Meyer. Götting. 1789. S. 23. n. 1. Tab. I. — Habitat in Indiae et Africae aequinoctialis umbrasis locis.

Adanson Voyage to Guinea p. 179—337. *Vague's* Voyage au Sénégal p. 83. 99.
Allgem. Magaz. der Natur. B. V. S. 69.
Barrere Reisebeschreibung. S. 47.
Berlinische Sammlungen, B. VII. St. 1. S. 232.
Blumenbach's Handbuch d. Naturgesch. S. 376.
n. n. *Termes fatalis*. Desselben Abbildungen Naturhistorischer Gegenstände. Heft I. Tab. 9. Die *altverheerende Termite*. Tab. 10. Gebäude der Guineischen Termiten.

Bosmann Description of Guinea p. 247—493.
Clusii, C. curae posteriores, Antwerp. 1611. 4.
p. 123. (Beschreibung d. Termitenhügel.)
Cuvier Tableau élémentaire, p. 477. *de Termite Belliqueux* (Termes fatale.)
Dapper, Description de l'Afrique, p. 459. *Acolan*.
Deger's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 25. n. 3. Tab. XXXVII. F. 1—8. *Termes destructeur, der Verwüster*.

Du Tertre (J. B.) Histoire générale des Antilles, Vol. II. p. 334.

Fabris geogr. Leseb. B. V. Naturgesch. eines Ins. aus dem Termitengeschl. vornehm. in Afrika.

Fabricius, F. C. von der weissen Ameise (*Termes fatale*) in den Beschäft. d. Berlin. naturf. Gesells. B. I. S. 177.

Fabricii Mant. ins. I. p. 243. n. 1. Spec. Ins. I. p. 395. n. 1. Syst. Ent. p. 390. n. 1. *Termes fatale*.

Fermius Reise durch Surinam, Th. II. S. 292.

Forskael Descr. Animal. p. 86. Tab. XXV. F. A.

Fuëlsly's neues Magaz. B. II. S. 109.

Hughes, G. natural. history of Barbados, p. 93.

John's Bemerkungen auf einer Reise von Tranquebar nach Tauschaur, Tirutschinapalli und Madras im Februar bis zum May 1795, im 28. St. des Naturforschers 1799.

Iserts, P. E. Reisen, Kopenh. 1788. S. 279 und 286. *Die Folttern.* (Term. fatale.)

Kaempffer, E. History of Japan, Vol. II. p. 127.

König, von der weissen Ameise, in den Beschäft. d. Berl. naturf. Gesellsch. B. IV. S. I. Tab. I. F. 1—5.

Kolben, P. Cape of Good Hope 8vo Vol. II. p. 173.

Labat Description de l'Afrique T. III. p. 298.

Ejusd. Voyage aux Isles de l'Amerique, T. II. p. 331.

Laet (J. de) Novus Orbis, s. descript. Indiae occident. p. 333.

Leske's Handb. d. Naturges. 2te Aufl. 1784. S. 351.

Ligon's Barbadoes, p. 64. 65.

Linnaei Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. T. I. P. V. p. 2911. n. 1. *Termes fatale* supra fuscum, thorace segmentis tribus, alis pallidis, costa testacea.

Marcgravii (G.) Histor. Rer. natural. Brasiliae p. 56.

Martini's Naturlexikon, II. S. 249. 263.

Moore's Travels, p. 221.

Müller's Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 1022. n. 1. *Der Verwüster.*

Oonomat. Hist. nat. P. III. p. 934. VII. p. 475. *Termes fatale, die schädliche Holzlaus.*

Philosophical Transactions Vol. LXXI. Part. I. p. 139—192. n. 11.

Pisonis, G. de Indiae utriusq. re naturali et medica Lib. I. p. 9. Lib. V. p. 291.

Purchas's Pilgrims, Vol. II. p. 1510.

Rochfort's Gesch. der caraischen Inseln, S. 149. *Holzläuse.*

Sloane Voyage to the Island Madera and Jamaica, Vol. II. p. 193.

Smith's Voyage to Guinea.

Sparmann's Reisen, Forstersche Ausgabe, Berlin 1784. S. 191.

Sulzer's Gesch. d. Ins. S. 239. *Holzlaus, Pou de bois.*

Voigt's Magazin für das neueste aus der Physik und Naturgesch. B. IV. Stück 1. S. 46. von den Holzläusen und weissen Ameisen, Negerengl. *Koffre*, in Surinam. B. IV. St. 3. Einige Nachrichten von den Termiten in Afrika und in den heissen Erdstrichen, B. V. St. 1. S. 78. *Holz- oder Erdlaus.*

Gleich merkwürdig in Rücksicht seiner Verwandlung, Lebensart, Verheerung, und selbst des Schadens, welchen es dem menschlichen Körper zufügen kann, ist das Geschlecht der Termiten, welche auch unter dem Namen *weisse Ameisen*, *Holzemsen*, *Holzläuse* bekannt sind. Die Franzosen nennen sie *Fourmis blanches*, in Westindien *Poux de Bois*, in Senegal *Vague-Vagues*, die Engländer in Westindien *Wood-Lice*, *Wood-ants*, *White-ants* auch *White mier*, worunter sie besonders die Krieger-Termiten verstehen, in den windwärts gelegenen Gegenden Afrika's aber *Bugga-Bugs*. Die Portugiesen, in Brasilien haben sie mit dem Namen *Coupée* oder *Cutters* (Schneider) belegt, weil sie vorzüglich Kleidungsstücke, leinene Waaren etc. in kleine Stückchen zerschneiden. Die *Balms* oder das *Scherbro-Volk* in Afrika nennt sie *Scantz*. Auch kennt man sie noch unter den Namen *Piercer* (Durchbohrer) und *Eater* (Fresser) in verschiedenen Gegenden der tropischen Länder. Ohngeachtet nur ein oberflächlicher Überblick sie mit den Ameisen verwechseln konnte, von welchen sie sich durch die gebrochenen, einen Winkel machenden Fühlhörner, durch den ohne Zwischenhals oder Verbindungs-

dungsstiel mit dem Hinterleibe zusammenhängenden Brustschild, durch die abweichenden Theile des Mundes, durch den Mangel der Flügel bey dem Weibchen, und durch die weichere Substanz und Haut ihres ganzen Körpers unterscheiden: so weist ihnen doch natürliche Ordnung und systematische Eintheilung ihren eigentlichen Platz zunächst nach den Ameisen an. Ihr Wohnplatz schränkt sich blos auf das heisse Klima der aussereuropäischen Welttheile, mithin auf die Länder zwischen beyden Wendecirkeln ein, daher sie vorzüglich in beyden Indien, in dem unglücklichen Kayenne und auf den afrikanischen Küsten zu Hause sind. Es giebt überhaupt sechs Arten dieser Termiten, welche *Smeathmann* unter den Namen *Termes bellicosus*, *mordax*, *atrox*, *destructor*, *arborum* und *viarum* aufführt, und welche nach Bildung, Lebensart, Nutzen und Schädlichkeit vieles mit einander gemein haben, aber in Rücksicht der Bauart ihrer Wohnungen und der Wahl der Baumaterialien sehr von einander abweichen. Jede Termitenart hat wieder drey Unterordnungen, nemlich die der Arbeiter, der Soldaten, und der geflügelten Insekten. Die Arbeiter sind nichts anders, als die Larven dieses Insektengeschlechts, und einzig im Stande zu arbeiten und die ungeheuren Gebäude, worinnen sie alle beysammen wohnen, aufzuführen. Die Soldaten aber, oder die Nymphen, welche sich von jenen durch ihren sehr dicken Kopf, ihre langen spitzigen Kinnladen unterscheiden, sind zwar auch thätig, aber nur zur Vertheidigung jener Gebäude gegen feindliche Anfälle geschickt. Sowohl Arbeiter, als Soldaten bleiben immer unter der Erde, sind daher mit keiner, oder wenigstens, wie die Maulwürfe, mit kaum bemerkbaren Augen versehen, und setzen sich nur dann der freyen Luft aus, wenn sie über der Erde Beute suchen. Die geflügelten Termiten sind die vollkommenen, zur Fortpflanzung geschickten Insekten dieses Geschlechts. Als Männchen und Weibchen können sie zu Königen und Königinnen gewählt werden, ihre Flügel aber machen sie zur Auswanderung und Errichtung neuer Königreiche geschickt.

Unter allen Termiten ist die *Krieger - Termit* (Fig. 14.) die größte, gemeinste und furchtbarste Art. Sie ist ungefehr einen Zoll lang, hat einen runden Kopf, mit zwey grossen Augen (Fig. 18.), zwey gleich dicken, paternosterartigen Fühlhörnern (Fig. 17. f. f.), welche aus siebenzehn rundlichten, fein behaarten Gliedern zusammengesetzt und mit einem kürzeren geraden Theil unter einem Winkel verbunden sind. Der platte, dünne, vorne abgerundete Oberkiefer (Fig. 18. a.) ist weich und stellt mehr eine Lippe vor, der Unterkiefer (Fig. 17. a. a. b.) aber, welcher nicht weit vom Halse (c.) seinen Anfang nimmt, ist zangenförmig und
wird

wird von der Lippe des Oberkiefers zum Theil bedeckt. Er ist sehr zusammengesetzt und besteht aus vier einwärts gebogenen Zähnen (*a. a.*), welche sehr breite Grundtheile haben, schwarzbraun und vorne sehr zugespitzt sind. Hinter diesen Zähnen stehen zwey kleine dreygliedrichte (*d. d.*) und zwey lange Bartspitzen (*e. e.*), zwischen diesen vier Bartspitzen aber befinden sich noch einige andere, kürzere und stumpfere Läppchen. Der Brustschild (Fig. 14. 15. 16.) ist zweymal länger aber schmaler als der Kopf, überhaupt aus drey bauchichten Ringen zusammengesetzt, wovon jeder die Artikulationen eines Fußpaars enthält. Er geht unmittelbar in den etwas längeren, breiteren und ovalen Hinterleib über, der viel ähnliches von dem Hinterleibe der gewöhnlichen Läuse hat. Die Füße dieses Insekts sind ziemlich lang, haben starke Schenkel, feine Härchen und zwey Krallen am Fußblatte. Ehe die Kriegertermite in ihrem vollkommenen Zustande zum König, oder zur Königin, je nachdem sie männlichen oder weiblichen Geschlechts war, gewählt worden ist, führt sie noch vier lange, breite, bräunliche Flügel, welche überaus fein, durchsichtig, und von einer Spitze zur andern über dritthalb Zoll lang sind.

Ganz abweichend von der gewöhnlichen Larvengestalt anderer Insekten, sind die Larven der Termiten überhaupt, und der Kriegertermiten insbesondere. Diese Larven oder sogenannten *Arbeiter* (Fig. 19 und 20.) sind ungefehr einen Viertelzoll lang und so leicht, daß fünf und zwanzig etwa einen Gran wiegen. Sie haben einen grösseren, mit zwey weit längeren und schärferen Gebißzangen (Fig. 20. *a. a.*) am Unterkiefer versehenen Kopf, ein kürzeres, aus fünf schmalen Ringen bestehendes Brustschild und einen längeren und breiteren Hinterleib. Ihre Füße sind weit länger, als die der vollkommenen Termiten. Sie laufen schnell, machen ein grosses Geräusch bey der Vollbringung ihrer Verrichtungen und sind der zahlreichste Theil der Bewohner eines Termitennestes, indem bey den Kriegertermiten immer hundert Arbeiter auf einen Soldaten kommen.

Leztere oder die Termitennymphen (Fig. 21.) sind weit grösser, als die Arbeiter, über einen halben Zoll lang und ganz verschieden in Rücksicht der Bildung des Kopfs und der Gebißwerkzeuge. Jener ist grösser und dicker, als der ganze übrige Körper, hornartig und nufsbraun, diese aber sind wie Krebsseehren gekerbt, sehr scharf und hart, mithin mehr zur Vertheidigung und zum Kneipen eingerichtet.

Ungeheuer und alles verheerend würde die Vermehrung der Termiten seyn, wenn die Natur ihre Begattung nicht äusserst erschwert hätte. Sobald sie nemlich,

kurz vor eintretender Regenzeit, in den geflügelten Zustand gekommen und mit hin ihre vollkommene Ausbildung erreicht haben; so findet man oft am andern Morgen eine, alle Vorstellung übersteigende Menge dieser geflügelten Termiten auf der Erde und der Oberfläche des Wassers, mit und ohne Flügel, welche überhaupt so locker am Brustschilde eingefügt sind, daß sie nur für wenige Stunden geschaffen zu seyn scheinen. Alle diese Termiten kommen unter den Verfolgungen ihrer zahllosen Feinde um, worunter viele Vögel, fleischfressende Amphibien und vorzüglich alle Ameisenarten, nach *Larts*, *Markgravs*, *Pisos* und *Sloanes* Versicherung aber, auch die Einwohner verschiedener Gegenden von Südamerika gehören, die sie als ein sehr wohlschmeckendes Gericht geniessen. Unter Millionen trifft kaum ein einziges, dem Tode entgangenes Paar so zufällig zusammen, daß es durch die Begattung die Absicht seiner Bestimmung erreichen und ein neues Reich begründen kann. Gewöhnlich suchen die Arbeiter selbst in ihren unterirdischen Höhlen noch einige dieser, in ihrem vollkommenen Zustande hülflos gewordenen Insekten, zu retten, zurückzuhalten und hiermit zu Königen und Königinnen zu machen. Kaum haben sich diese begattet; so fängt der Unterleib des Weibchens (Fig. 16. a. b.) an, ausserordentlich zu schwellen. Hierdurch werden nicht nur die Ringe des Hinterleibes, sondern auch die Haut zwischen denselben ungemein ausgedehnt und erhalten eine Durchsichtigkeit, welche die Eingeweide und die beyden Eyerstöcke durchschimmern läßt. Er wächst so zu einer Grösse an, die diejenige des unbefruchteten Weibchens oft zweytausendmal übertrifft, und ist dabey in beständiger wurmförmiger Bewegung. Es zieht sich nemlich ein Theil desselben zusammen, während sich der andere erweitert, und bey dieser wechselseitigen Bewegung, stößt das Weibchen oft in einer Minute 60 und in vier und zwanzig Stunden wohl 80000 Eyer aus. Kaum sind der Königin einige Eyer entschlüpft, so werden sie schon von den Arbeitern aufgefangen und in die Ammenstuben gebracht, wo die ausgebrüteten Jungen so lange von den Arbeitern gepflegt und genährt werden, bis sie keine weitere Unterstützung mehr bedürfen, und als vollkommene Larven oder Arbeiter die ihnen zukommenden Verrichtungen versehen können.

Das Vaterland der Kriegertermiten ist, ausser dem südlichen Amerika und den umliegenden Inseln, die ganze afrikanische Küste, vorzüglich Guinea, die Bananas - Insel und der angränzende Theil des festen Landes von Afrika. Man findet daselbst ihre, wegen der ausserordentlichen Grösse, Festigkeit und weisen inneren Einrichtung, bewundernswürdigen Gebäude, oft in so zahlreichen Haufen bey-

sam-

sammen, daß sie in der Ferne Dörfern von Negerhütten gleichen. Diese Gebäude führen sie von fettem Thon oder Letten, oft zehn bis zwölf Fuß hoch über der Erde auf, und bey nahe eben so tief erweitern sie dieselben unter der Erde. Sie geben ihnen überhaupt eine konische Form, doch so, daß der Hauptkegel in verschiedenen Abständen von unten hinauf, ringsherum mit lauter zuckerhutförmigen Spitzen besetzt ist. Sie verfahren hierbey auf folgende Art: Zuerst werfen sie einen oder zwey kleine, etwann einen Fuß hohe konische Erhabenheiten über der Erde auf, bald darauf nahe an diesen andere, und so vermehren sie ihre Anzahl in der Basis immer mehr, während sie die ersten immer grösser machen, bis die unterirdischen Arbeiten der Termiten mit diesen Thürnen ganz bedeckt sind. Alle diese grösseren und kleineren Thürne vereinigen sie dadurch mit dem Hauptthurn oder dem Dom, daß sie die Zwischenräume ebenfalls mit Letten ausfüllen. Das auf diese Art vollendete Gebäude, welches oft drey bis vier Jahre Zeit erfordert, besteht aus dem äusseren Theil oder dem Dom, welcher ungewein dicke, mit weiten Gängen durchzogene Wände hat, und dem vom Dome umfassten inneren Theile, oder dem eigentlichen Wohnhause. Lezteres enthält eine unendliche Menge zirkelförmiger, elliptischer, oder ovaler, gewölbter Zimmer, wovon die in der Mitte zur Residenz des Königs und der Königin, die zunächst angränzenden zu den Wohnungen der Soldaten und Arbeiter bestimmt sind, an welche wieder die mit allerley Lebensbedürfnissen angefüllten Magazine und die, Eyer und Junge beherbergenden, Ammenstuben stossen. Die unterirdischen Gänge, welche oft so weit, als die Mündung einer grossen Kanone sind, laufen unter den untersten Zimmern im Hügel in einem weiten Umfange nach verschiedenen Richtungen. Diese weiten Gänge stehen wieder durch schmalere mit den verschiedenen Gegenden des Gebäudes in Verbindung. Auch giebt es brückenartige kleine Verbindungsgänge zwischen den über der Residenz befindlichen Wohnungen und den in den inneren säulenförmigen Abtheilungen befindlichen Zimmern. Schon nach zwey bis drey Jahren ist ein solcher kahler Lettenhügel, in jenen fruchtbaren Gegenden, mit Gras bewachsen, wodurch er noch mehr an Festigkeit gewinnt, die so groß ist, daß er von Menschen bestiegen werden kann, ohne einzubrechen. Wirklich versichert *Smeathmann*, daß er mit vier Mann auf den Gipfel eines solchen Hügel gestiegen sey, und in dieser beträchtlichen Höhe eine ziemlich weite Aussicht genossen habe.

Mit Recht zehlt *Linné* diese Termiten unter die größten Plagen beyder Indien, wo sie wegen des unermesslichen Schadens, den sie jährlich anrichten, ausser-

serordentlich gefürchtet werden. Unbemerkt führen sie, als lichtscheue und der freyen Luft ungewohnte Insekten, ihre Gänge unter den Grundmauern und Pfosten der Häuser weg, in das Innere derselben, fressen Löcher in das Balkenwerk und höhlen, immer gewohnt von innen fortzuarbeiten, dasselbe in kurzer Zeit so aus, daß nichts, als die dünne, äussere Schaale übrig bleibt. So gelangen sie oft bis unter das Dach. Ist dieses von Schilf, ihrem Lieblingsfutter; so schaffen sie sogleich Thon herbey und bauen ihre Rinnen und Galerien durchs Dach in verschiedenen Richtungen so lange fort, als dasselbe ihre Werke nur tragen kann. Die in der Regenzeit unter solchen Dächern Schutz suchenden Ratten, helfen noch mehr die Zerstörung derselben befördern, und so bewirken sie gemeinschaftlich, oft in nicht langer Zeit, den Einsturz eines Hauses. Eben so verderben sie alle Möbeln, bey deren Berührung man gleich gewahr wird, daß die Holzstücke aus welchen sie zusammengesetzt sind, ganz ausgehöhlt sind, und auf den geringsten Stofs in kleine Stücken zerfallen werden. Aber nicht nur Mobilien, sondern auch alle Arten von Kaufmannsgütern, Kleidungsstücken, leinene, baumwollene und seidene Waaren, werden von ihnen angegriffen und zernichtet. Nach *Barrere's* Versicherung sind sie im Stande, einen Kleiderschrank, so sehr er auch mit Kleidungsstücken angefüllt seyn mag, in vier und zwanzig Stunden in kleine Zäserchen zu verwandeln, und man ist daher, wie *Sparmann* meldet, oft genöthiget, Kisten und Waaren an Stricken frey aufzuhängen. Sie sollen sogar das Kupfer benagen, und durch eine Feuchtigkeit, welche sie von sich geben und durch welche sie einen unleidlichen Gestank verbreiten, selbst das Eisen angreifen, in dessen Rost sie sodann Gänge wühlen.

Auf der Küste von Guinea tödten sie oft Ziegen und Schafe und werden dem Menschen selbst lästig und gefährlich. Sie verjagen oft, wie *Smith* versichert, die Europäer aus ihren Betten und verzehren bis am Morgen alles, was sie von Eßwaaren zurückgelassen haben. Dieses begegnete *Adanson* in Senegal, der von den Termiten im Bette angegriffen und auf die empfindlichste Art gebissen wurde, nachdem sie alles um ihn zerfressen und zerstört hatten. Merken sie, daß man ihre Hügel beunruhigen will, so machen sie durch lautes Zischen Lärm und geben dadurch das Signal zur Rettung des Hülflösen Theils der Bewohner in die unterirdischen Gänge und zur Herbeyeilung der Soldaten zur Vertheidigung. Wagt man es wirklich einen Hügel zu öffnen; so stürzen diese Soldaten mit einer unbeschreiblichen Hitze und Wuth in ungeheurer Menge auf ihren Feind los, schlagen ihre Klauen tief ein, saugen ihm das Blut aus, und verlassen die Stelle, wo sie
sich

sich festgesetzt haben nicht, wenn man sie auch in Stücken zerschneidet. Zieht man sich aber zeitlich zurück, so begeben sich die Soldaten bald wieder in ihre Kammern, und an ihrer Stelle kommen die Arbeiter mit Letten in ihrem Zangengebisse hervor, um die gemachte Öffnung wieder auszufüllen. Ihr Biß in die Haut ist nicht eigentlich entzündlich; aber überaus schmerzhaft und zieht eine Sugillation nach sich. Auch als Speise werden sie öfters schädlich, und König versichert, daß ihr häufiger Genuß in einigen Gegenden von Ostindien eine epidemische Kolik und Dysenterie zu erzeugen pflege, die in zwey bis drey Stunden tödte.

Die gefährlichsten Feinde der Kriegertermiten sind, wie schon oben erwehnt worden, die rothen Ameisen. Man benutzt diese daher zur Verminderung und Ausrottung derselben dadurch, daß man ihnen Zucker streut, um sie zur Hülfe gegen die Termiten herbeyzulocken. Barrere empfiehlt als das beste Mittel, diese schädlichen Insekten los zu werden, weissen Arsenik auf ihre Gänge zu streuen, dessen Geruch ihnen schon so sehr zuwider ist, daß sie hiernach auf lange Zeit verschwinden. Andere wollen den ungelöschten Kalch eben so nützlich gefunden haben. John meldet, daß das in der Gegend von Tanschaur gebräuchliche und bewährte Gegenmittel wider diese alles verwüstenden Insekten ein Öl sey, welches aus der Schale bereitet wird, die den auf der fleischigen Frucht des Nierenbaums oder *Katschu's* (*Anacardium occidentale*) sitzenden Kern umgiebt. Man bestreicht damit alles Holzwerk, welches man gegen die Angriffe dieser Insekten schützen will.

54. Die beissende Termite. Tab. V. Fig. 22—24.

Termes mordax, nigricans, antennnis pedibusque testaceis, alis fuliginosis; area marginali dilatata: costa nigricante, stematibus inferis oculo approximatis, puncto centrali impresso. *Smeathmanns* Sendschreiben über die Termiten Africa's S. 13. n. 2.

Tab. II. Fig. 10 — 13. — Habitat in Africa aequinoctiali.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 279. *le termite mordant*.

Fabricii Mant. ins. I. p. 397. n. 4. Spec. ins. I. p. 248. n. 4.

Linnaei Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. P. V. p. 2913. n. 6. *Termes mordax* nigrum, abdomine segmentis apice albis, pedibus nigris.

Nach den verschiedenen Veränderungen, welchen dieses, ebenfalls in Afrika einheimische Insekt, vom Eye bis zu seinem vollkommenen Zustande unterworfen ist, kommt es nach Bildung und Ökonomie, beynahe ganz mit der Kriegertermite über-

überein, nur in der Grösse und in dem Baue seiner Nester weicht es merklich davon ab. Seine Länge beträgt als Arbeiter (Fig. 23.) kaum zwey, als Soldat (Fig. 24.) kaum drey, und als geflügeltes Insekt (Fig. 22.) etwas über vier Linien. Auch die Königin oder das befruchtete Weibchen ist höchstens anderthalb Zoll lang, fördert aber übrigens seine Eyer durch die nemliche wurmförmige Bewegung seines monströs angeschwollenen Hinterleibes zur Welt, wie das Kriegerterminen-Weibchen. Seine Unbehüllichkeit verstattet es ebenfalls nicht, sich der Pflege der Eyer und Aufnährung der Jungen anzunehmen, daher die Arbeiter mit dem Instinkt begabt sind, sie in die angewiesenen Zellen zu bringen und für sie zu sorgen. Mit der Grösse dieser Termitenart, steht auch die Grösse ihrer Wohnungen im Verhältniß, die aber in der Gestalt und in der minder kunstreichen inneren Einrichtung sehr von den Hügeln der Kriegerterminen verschieden sind. Sie bauen dieselben aus einem schwarzen Leimen, jedoch nicht konisch, sondern cylindrisch, versehen sie aber oben mit einem konischen Dache, so daß sie runden Windmühlen oder kleinen Thürnen gleichen, und daher auch mit dem Namen *Thurmnest* belegt worden sind. Sie beißen ebenfalls und wahrscheinlich mehr, oder empfindlicher, als die andern Termitenarten, da sie den Beynamen *Mordax* erhalten haben.

55. Die grimmige Termiten. Tab. V. Fig. 25—27.

Termes atrox nigricans, segmentis abdominalibus margine pallidis, antennis pedibusque testaceis, alis fuliginosis: costa nigra, stigmatibus inferis, puncto centrali impresso. Smeathmann's Sendschreiben über die Termiten Afrika's. S. 13. Tab. II. 14 — 18. — Habitat in Africa aequinoctionali,

Cuvier Tableau élémentaire, p. 479. *le termite atroce.*

Fabricii Mant. ins. I. p. 248. n. 3. Spec. Ins. I. p. 397. n. 3.

Linnaei Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2913. n. 4. *Termes arda* nigrum, abdominis segmentis apice albis, pedibus pallidis.

Etwan einer halben Linie grösser, als die Arbeiter und Soldaten der vorhergehenden Art, sind die der gegenwärtigen, und das geflügelte Insekt mißt von einer Flügelspitze zur andern fünfviertel Zoll. Die Arbeiter (Fig. 26.) haben weisliche Köpfe und Füße, aschgraue Brustschilde und Hinterleiber, die Soldaten (Fig. 27.) überaus grosse braune Köpfe, dergleichen Fühlhörner und Füße, ganz kurze Brustschilde und kurze, schmale, länglichtrunde Hinterleiber, beyde von aschgrauer Farbe. Das vollkommene Insekt (Fig. 25.) ist mit braunen Fühlhörnern

nern und Füßen, an den aschgrauen Ringen des Hinterleibes mit weißlichten Rändern, und auf den rusigen Flügeln mit schwarzen Adern versehen.

Diese Termesart baut ihre Nester aus schwarzen, mit Gras und Kräutern vermischten Thon und giebt ihnen die nehmliche äussere Gestalt und innere Einrichtung, wie die beissende Termite, mit welcher sie wahrscheinlich auch in Rücksicht des Schadens, welchen sie dem menschlichen Körper zufügen kann, übereinkommt.

56. Die Baumtermite. Tab. V. Fig. 29—32.

Termes arborum corpore testaceo, alis fusciscentibus, costa lutescente, capite nigricante, stigmatibus inferis oculo approximatis, puncto centrali impresso. Smeathmann's Sendschreiben über die Termiten Afrika's S. 14. n. 5. u. S. 68. Tab. II. F. 21 — 25. —

Habitat in insulis Americae meridionali oppositis, Africa, India.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 480. *la termite des arbres.*

Fabricii Mant. ins. I. p. 248. n. 2. Spec. ins. I. p. 396. n. 2.

Hunters Evelyn's Silva, p. 17.

König in den Beschäftig. d. Berlin. Gesellsch. na-

turforschender Freunde, B. IV. Tab. I. F. 5. *Termes monoceros.*

Linnaei Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2912. n. 4. *Termes destructor* supra testaceum, capite atro, antennis flavis.

Long's Jamaica, Vol. III. p. 887.

Sloan's Jamaica, Vol. II. 221.

Viel ähnliches hat das geflügelte Insekt der Baumtermite (Fig. 29.) mit dem der grimmigen Termite nach seiner äusseren Gestalt. Nur sind die Flügel bräunlich mit gelben Adern durchzogen, etwas länger, der Körper aber etwas kürzer. Die Arbeiter und Soldaten aber weichen sehr in der Grösse und Bildung ab. Jene (Fig. 30.) haben einen länglicht-runden, schwarzen Kopf, einen sehr schmalen Brustschild, und einen dicken plumpen Hinterleib. Diese (Fig. 31.) hingegen haben nicht den gewöhnlich grossen Kopf der Soldaten anderer Termitenarten, aber ebenfalls, wie die Arbeiter, einen ziemlich langen und dicken Hinterleib, und, mit ihnen, gleiche blaßbraune Farbe. Die trächtigen Weibchen (Fig. 32.) sind einen Zoll lang und haben die Gestalt der übrigen Termitenköniginnen.

Das Vaterland dieser Insekten ist vorzüglich Amerika, wo sie beynahe so viel Schaden anrichten, als die Kriegertermiten in der alten Welt. Sie legen ihre Nester unter den Dächern, auch an andern Orten der Häuser, gewöhnlich aber in Baumstämmen oder zwischen den Ästen und Stämmen der Bäume, auch oft rings um einen Ast, wie ein grosses Zuckerfaß, oder eyrund, und oft auf siebenzig bis achtzig Fuß hohen Baumästen an, wohin sie durch eine Menge verdeckter Wege, die

die längs den Stamm in die Höhe und herablaufen, gelangen. Die Materialien woraus sie diese Nester bauen, sind kleine Stücken Holz, verschiedene Gummarten, die Säfte der Bäume und wahrscheinlich dieser Insekten selbst, welche ihnen dazu dienen, diese verschiedenen Bestandtheile in einen Teig zu vereinigen, aus welchem sie die unzähligen, kleinen Zellen von verschiedener und unregelmässiger Form im Inneren der Nester bilden. Werden sie nicht zeitlich vertilgt, so verderben sie Häuser und Bäume, an welchen sie sich angesetzt haben, und sind um so schwerer auszurotten, da ihre Nester so fest angekittet sind, daß sie nur mit Mühe stückweise abgeschlagen werden können, wenn man nicht Balken oder Äste mit aussägen will.

Als eine fünfte Art stellt *Smeathmann* den *Termes Destructor* auf (Tab. V.F. 28.), von welchem er aber keine besondere Beschreibung beygefügt hat, und der sich überhaupt nur durch seine Grösse von dem *Termes arborum* zu unterscheiden scheint. Er charakterisirt ihn auf folgende Art:

Termes destructor nigricans; abdominis linea laterali lutea, antennis testaceis, alis hyalinis: costa lutescente, stematibus subsuperis, puncto centrali oblitterato.

57. Die wandernde Termit.

Termes viarum seu *capensis* luteus, alis hyalinis: margine fusco. Linn. Syst. Nat. Tom. I. P. V. p. 2913. n. 7. — Habitat in India et Africa meridionali, antennis filiformibus, larva sub diu formicae instar turmatim migrante, oculis binis nigris instructa.

Barrere, Reisebeschreibung in der götting. Samml. merkw. Reisen zu Wasser und zu Lande 1751. Th. II. S. 47. *Marching ants, termes viarum.*

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 24. n. 2. Tab. XXXVIII. Fig. 1 — 4. *Termes du Cap de bonne esperance, die capensische Holzlaus.*

König in den Beschäftigungen der Berl. Gesellschaft naturforschender Freunde, B. IV. Tab. I. F. 8. *Termes viarum.*

Smeathmann's Sendschreiben über die Termiten Afrika's. S. 87. der wandernde *Termes* und S. 91. der wandernde *Bugga-Bug*.

Kleiner, aber breiter als die Krieger-Termiten, sind die wandernden, welche im südlichen Afrika und in Ostindien zu Hause sind. Sie unterscheiden sich vorzüglich dadurch von den übrigen Termitenarten, daß sie schon im Larven- und Nymphenstande, mit eben so schönen, der Grösse ihres Körpers angemessenen Augen versehen sind, als andere Termiten im geflügelten Zustande. Sie bedurften diese aber auch zu ihren Wanderungen über der Erde, welche sie bey Tage in freyer Luft unternehmen. Ihre Fühlhörner sind fadenförmig und haben ungefehr die

die Länge des Kopfs, ihre schwarzen Fresszangen so gekrümmt, daß sie sich im Ruhestande kreuzen, und ihre Farbe ist milchweiß; am Kopfe aber dunkler. Das geflügelte Insekt ist fast einen halben Zoll lang, mit einem runden Kopfe, zwey netzförmigen Augen, zwey rothbraunen Fühlhörnern, zwey rostfarbigen Lippen und Bartspitzen versehen, zwischen welchen sich zwey Zähne befinden. Es hat einen kurzen Brustschild, aber einen ziemlich langen, vielringichten Hinterleib, sechs kurze, braunröthliche Füße; vier grosse, mit dunkelbraunen Adern durchzogene, weisse Flügel, ohne Falten.

Ganz irrig verwechselt *Barrere* gegenwärtige Termitengattung mit den oben angeführten Zug- oder Visitenameisen. *Smeathmann* aber macht von ihren Wanderungen, welche zu dieser Verwechslung wahrscheinlich Gelegenheit gegeben haben, folgende, hier abgekürzte Beschreibung: Ich sah ein Heer Termitenarbeiter aus einer vier oder fünf Fuß breiten Höhle unter der Erde ausziehen, immer zwölf bis vierzehn in einem Gliede, so dicht hinter einander, wie eine Heerde Schaaf, gerade vorwärts, ohne rechts oder links auszuweichen. Zu beyden Seiten dieses Heeres marschirte eine Colonne Soldaten, wovon einer von dem andern immer einen bis zwey Fuß entfernt war. Diese gaben von Zeit zu Zeit mit ihren Fresszangen ein gewisses Signal, welches die Armee mit einem lauten Zischen beantwortete, und darauf ihre Schritte mit der größten Schnelligkeit verdoppelte. Nach dem der ganze Zug einen ziemlich weiten Weg zurückgelegt hatte, kehrte er wieder durch zwey oder drey Höhlen in die Erde zurück.

Ohngeachtet *Smeathmann* nicht des Schadens gedenkt, den sie dem menschlichen Körper zufügen können, wenn sie vorzüglich beunruhiget und in ihrem Marsche gestört werden; so lassen doch ihre Gebißswerkzeuge erwarten, daß er dem der Kriegerterminen nicht viel nachgeben wird.

58. Die Fufslaus.

Pediculus ricinoides, abdomine orbiculato, linea alba, scutello trilobo, rostro albo. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2915. n. 3. — Habitat in America, obambulantium pedes intrans sanguinemque, hauriens, in iis ova deponens, et ulcera maligna causans, rufescens, rostro cylindrico longo, subtus hamulis armato. Rolander.

Müller's Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 1029. |
n. 3. Die Fufslaus.

Onomatologia Hist. Nat. P. VI. p. 229.

Noch nicht genug bestimmt ist der Charakter dieses Insekts, und daher noch ungewiß, in welches Geschlecht dasselbe eigentlich gehört. Es hat einen langen cylindrischen, weissen Saugrüssel, welcher unten mit Häckchen besetzt ist, ein dreylappiges Schildchen, einen runden, mit einer weissen Linie umzogenen Hinterleib und sechs Füße, die, wie der Körper, roth sind. Es setzt sich den Fußgängern in Amerika an die Füße, saugt sich voll Blut und legt seine Eyer in die Haut, wodurch es böartige Geschwüre veranlaßt.

59. Die Reduviusmilbe. Tab. VI. Fig. 7—9.

Acarus Reduvius obovatus, macula baseos obovata. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2925. n. 3. Faun. Suec. 1966. Jt. oel. 62. 126. — Habitat in silvis, bobus, canibus, ipso homine, spiritu vini occidendus.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 44. Tab. VI. F. 1—8. *Mitte Redue, die Schafticke.*

Fabricii Mant. ins. II. p. 371. n. 3. Spec. Ins. II. p. 485. n. 3.

Frisch's Insekt. Teutschl. V. S. 40. 2 Pl. Tab. XVIII. *Schaaflaus.*

Friesly's Verz. schweiz. Ins. n. 1176. *der Holzbock.*

Leske's Anfangsgr. d. N. G. I. S. 486. *Hundsmilbe.*

Müller's Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 1045. Tab. XXX. F. 2. *Hundsmilbe.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. n. 2209.

Onomat. Hist. nat. P. I. p. 35. *Die Schaaflaus.*

Pallas Reisen durch Rußl. I. S. 158.

Raji Hist. Ins. p. 9. Tab. XIX. *Pediculus ovinus.*

Zetzell, P. über des Acari Reduvii Tödtung mit Brandtwein. Neue Abh. d. Schwed. Akad. B. I. S. 228.

Die Alten nannten diese Milbe (Fig. 7. 8.) *Reduvius*, in Schweden ist sie unter dem Namen *Festing* bekannt. Ihre Grösse beträgt vierthalb Linien in der Länge und anderthalb Linien in der Breite. Ihre Haut ist überaus fest, lederartig und das Insekt daher nicht leicht zu zerdrücken. Der Kopf ist klein und kurz, der Saugrüssel (Fig. 8. a. und Fig. 9. a.) um die Hälfte länger, als der Kopf, mit Widerhaken an den Seitenrändern versehen. Auch stehen diesem Rüssel zwey löffelartige, auf einem kurzen, runden Gliede (Fig. 9. c. c.) ihren Ursprung nehmende Theile (b. b.) zur Seite, welche am Rande behaart, und wahrscheinlich dazu bestimmt sind, die Widerhaken des Saugrüssels im Zustande der Ruhe zu decken. Der Körper selbst ist flach, länglichtrund, doch gegen die Mitte von beyden Seiten etwas eingezogen (Fig. 8.). Auf seiner Rückenfläche sieht man, gleich hinter dem Kopf, eine hornartige Platte, die, wie dieser, ganz schwarz ist. Der übrige größte Theil des Körpers hat vorne drey, hinten aber nur zwey flache Furchen. Am Vordertheile desselben sind die acht langen Füße artikulirt, deren Fußblatt aus einem Bläschen mit zwey Krallen besteht, welches durch ein feines Stielchen

chen mit dem vorletzten Fußgliede zusammenhängt. Diese Bildung des Fußblatts setzt die Milbe im Stande, sich auch auf der glättesten Fläche festzuhalten und ihrem schweren Körper, wiewohl immer nur langsam, fortzuhelfen. Die Farbe ist, nach dem verschiedenen Aufenthalte dieses Insekts, verschieden. Einige, und zwar gewöhnlich die größten, sind schiefergrau, andere gelblich und blaßroth. An beyden Arten aber sind Kopf, Saugrüssel, Rückenplatte und Füße immer schwarz. Jene, oder die grauen, halten sich in der wärmeren Jahreszeit auf den Rindern und Hunden, diese oder, die rothgelben, auf den Schaafen auf, und von diesen Thieren gelangen sie nicht selten auf den Menschen, in dessen Haut sie sich ebenfalls auf eine schmerzhaft Art mit ihrem Rüssel eingraben. Sie sind in vielen Gegenden unsres Welttheils zu Hause, wenn gleich nicht überall bekannt.

60. Die Egelmilbe.

Acarus Hirudo ovatus planus niger, abdomine ferrugineo, antennis clavatis. Linn.
Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2926. n. 47. — Habitat in Norwegiae animalibus,
hominibus.

Fabricii Spec. ins. II. p. 485. n. 5. Mant. ins. II. p. 372. n. 6.

Ausser den vom Linné angegebenen Merkmalen der Art und seiner Bemerkung, daß diese Milbe, welcher er wahrscheinlich, von ihrer Begierde Blut zu saugen, den Namen gegeben hat, auch an den Menschen gefunden werde, ist von derselben zur Zeit nichts weiter bekannt.

61. Die rothe amerikanische Waldmilbe. Tab. VII. Fig. 10—13.

Acarus americanus obovatus rubicundus, Scutello geniculisque pedum albis. Linn.
Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2926. n. 5. — Habitat in Americae bobus,
equis, acrotophagis devoratur.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 37.
63. n. 1. Tab. XXXVII. F. 9—13. *Mitte Pique,*
der amerikanische Pih.

Fabricii Mant. ins. II. p. 372. n. 16. Spec. ins.
II. p. 486. n. 13. Syst. Ent. p. 812. n. 9. *Acarus*
americanus.

Kalm's, P. Beschreibung eines nordamerikanischen

Insekts *Waldlaus* genannt, in den Abh. d. Schwed.
Acad. B. XVI. S. 21.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1046.
n. 5. *Die Waldmilbe.*

Sammlung neuer Reisen, Gött. II. 276.

Ulloa Voyage en Amerique, T. I. p. 58. *Nigua*
Pique.

Viele

Viele Reisebeschreiber haben dieses Insekt mit dem Sandfloh (*Pulex penetrans*) verwechselt und daher eine grosse Verwirrung der Begriffe und Namen in Beziehung auf dasselbe veranlaßt. Es hält sich in Neu jersey, Pensylvanien, Maryland und in den Wildnissen von Canada, im Ganzen aber doch immer häufiger im südlichen, als im nördlichen Amerika auf. In Karthagena nennt man es *Nigua*, in Peru *Pique*, in Pensylvanien und Neu-Jersey, *Holzlaus* (*Pou de bois*) auf Martinique und andern Inseln *rothes Thier* (*bête rouge*). Die Engländer nennen es noch besonders *Tiks* oder *Seed-Tiks*, die Schweden *Skogs Lus*, die Holländer *Tekken*, oder *Houtluis* und *Woudluis*; auch ist es noch unter dem Namen *Agu-thische Laus* bekannt. Der Körper dieses Insekts ist beynahe ganz rund (Fig. 10), flach von der Rücken- und Bauchseite und umzogen mit einem erhabnen Rande. Man findet es von verschiedener Grösse, bisweilen so klein, daß es kaum zu entdecken ist, meistens aber einer Linie lang und drey bis vier Linien breit. Ist es ganz mit Blut angefüllt, welches oft erst nach Verlauf eines Monats geschieht, so schwillt es zu einer monströsen Grösse (Fig. 11.) an und ist dann fünf bis sechs Linien lang und drey bis vier Linien breit. Es fällt dann von dem Ort, wo es sich festgesogen, von selbst ab und ist so unbehülflich, daß es sich nicht wieder umwenden kann, wenn man es auf den Rücken leget, und in dieser Lage, wie es (Fig. 13) vergrößert vorgestellt ist, wohl über einen Monat bleibt auch wohl mehrere tausend Eyer legt. Seine Farbe ist nun glänzend dunkelroth, da es im blutleeren Zustande fast ganz weiß ist und blos auf dem Brustschilde einige braune Pünktchen hat.

Was die besondere Bildung der Theile dieser Milbe betrifft; so ist ihr kleiner Kopf mit einem etwas niederhängenden, hornartigen, stumpfen Rüssel versehen (Fig. 12. a.), der wahrscheinlich einen verborgenen Saugstachel hat, und zwischen zwey etwas längeren Fühlhörnern (b. b.) steht. Der kleine, dreyeckigte, oben mit einem weissen, glänzenden Fleck versehene Brustschild, nimmt den Kopf in einem halbmondförmigen Ausschnitt auf. Der Hinterleib ist gegen dem Kopf und Brustschild überaus groß und hinten breiter, als vorne. Auf seiner Rückenfläche ist bisweilen ein weißlicher Fleck (Fig. 10. 11.) sichtbar. An seiner Bauchfläche bemerkt man aber (Fig. 13.) eine kleine runde Erhabenheit, die vielleicht die Mündung des Afters enthält, und die acht rothgelben, ziemlich langen Füße, welche fünf Glieder und am Ende zwey kleine Krallen haben. Sie bewegen sich mit diesen Füßen nur schleppend und langsam fort. In Rücksicht ihrer Fortpflanzung sind *Kalm's* und *Ulloa's* Behauptungen sehr widersprechend und geben keine wahre Aufklärung über diesen Gegenstand. Ihre Eyer, deren Anzahl überaus groß

groß ist, sollen aus dem oben erwähnten Flecken auf dem Rücken des Hinterleibes kommen. Sie haben übrigens eine sehr feste, lederartige Haut und ein überaus zähes Leben. Rüssel, Kopf, Füße dürfen ihnen nach *Kalm* abgeschnitten werden und dennoch leben sie wohl noch eine Stunde lang fort.

Die Waldungen sind ihr gewöhnlicher Aufenthalt. Schon im Frühjahre kommen sie in denselben unter dem Schnee hervor, und halten sich den ganzen Sommer hindurch im Grase, an Gebüsch und Pflanzen, besonders aber unter den dicken Schichten des abgefallenen und verfaulten Laube, in ungeheurer Menge auf. Sie verbreiten einen unangenehmen Geruch und werden eine wahre Geißel für Thiere und Menschen, die sich in den Wäldern aufhalten oder durch dieselben reisen müssen. *Kalm* erzählt, daß sie sich oft so dicht an die Weichen der Pferde setzen, daß man nicht mit der Spitze des Messers zwischen sie kommen kann, wodurch die Haut hart, wie eine Rinde wird und viele werden davon so ausgemergelt, daß sie endlich unter den heftigsten Schmerzen sterben. Menschen dürfen es nicht wagen, sich im Holze niederzusetzen, oder gar barfuß in demselben zu gehen. Unvermerkbar kriechen sie an den Leib, und bald ist der ganze Körper damit bedeckt. Das schlimmste ist, daß sich diese Gäste durch ihre feinen, kaum fühlbaren Stiche nicht eher verrathen, als bis sie sich schon zur Hälfte in die Haut und das Fleisch eingegraben haben, und nun erst starkes Jucken, empfindlichen Schmerz und eine Entzündung von der Grösse einer Erbse im Umfange verursachen. Reist man sie, vom Schmerze verleitet, ab; so bleiben Rüssel und Kopf allezeit stecken, die verletzte Stelle wird noch schmerzhafter und schwillt zu einer grossen Beule auf, welche sich oft in ein zolltiefes, bösartiges Geschwür verwandelt. Läßt man sie aber ungestört ganz voll Blut saugen; so fallen sie endlich von selbst ab. Demohngeachtet bleiben die kleinen, juckenden und schmerzhaften Knoten, deren man von einem einzigen Gange im Walde oft hundert erhalten kann, bisweilen noch sechs Wochen zurück. Kommen sie ins Ohr, wie es nicht selten zu geschehen pflegt; so schwillt dasselbe oft zur Grösse einer Faust auf, weil man nicht im Stande ist, die Milbe herauszubringen, wenn sie sich tief im Ohre festgebissen hat.

Zur Entfernung derjenigen Milben, welche sich in Menge an den Körper angesogen haben, und zur Vermeidung des daraus erwachsenden Nachtheils, wird das Waschen mit warmen Wasser und das Einreiben des Zitronensafts empfohlen. Vielleicht wäre aber das allen Insekten tödtliche Öl ein weit schicklicheres und zweckmässigeres Mittel. Hat sich eine Milbe tief in die Haut oder ins Fleisch einge-

eingebohrt; so ist es nöthig die Stelle ringsherum zu skarificiren und das Insekt mit einer Kornzange herauszuziehen, wobey oft selbst ein Stückchen Haut oder Fleisch mit abreißt, weil es sich gewöhnlich lieber tödten, als den Theil fahren läßt, an welchen es sich festgesogen hat.

62. Der Blutsauger.

Acarus sanguisugus abdomine posterius crenato, scutello ovato subfulvo, rostro tripartito. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2926. n. 6. — Habitat in America, sanguinem in tibiis obambulantium hauriens, vix extrahendus, pedibus anticis ad exortum spinis brevibus munitis. Rolander.

Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 291.

Marcgravii Hist. Rerum natural. Brasiliae, Lib. VII. p. 245. *Jatebucu*.

Müllers Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1046. n. 6.
Der Blutsauger.

Sauvages Nosologia methodica Ed. Daniel, T. V. p. 204. n. 7. *Malis pratensis. Bêtes rouges des Savanes.*

Ebenfalls ein amerikanisches Insekt, das in Brasilien unter dem Namen *Jatebucu*, in Martinique unter dem Namen *Bêtes rouges des Savanes*, oder rothe Thiere der Wiesen, welche man Savannen nennt, bekannt ist, von welchem aber die Naturforscher selbst noch keine nähere Kenntniß haben erhalten können. Es soll überaus klein seyn, einen rothen Kopf, ein rothgelblichtes Brustschildchen und einen gekerbten Hinterleib haben. Sein beständiger Aufenthalt sind das Gras und die Kräuter der Wiesen, wo es besonders in der Regenzeit häufig vorkommt und überaus beschwerlich wird. Es setzt sich an die Füße, dringt so tief in die Haut, daß man es kaum mehr herausziehen kann und saugt sich voll Blut. Hierdurch veranlaßt es nicht nur ein unausstehliches Jucken, sondern auch Beulen.

Fermin versichert, daß es nie auf der bloßen Haut haften, und daß er daher, wenn er auf die Jagd ohne Strümpfe gieng und bloß Schuhe anzog, nie von diesen Milben geplagt wurde. Behielt er aber die Strümpfe an, so waren seine Füße in kurzer Zeit ganz von diesen Insekten bedeckt. Hieraus würde das natürliche Verwahrungsmittel folgen, immer in jenen Wiesen barfuß zu gehen. Als Heilmittel empfiehlt er, die Füße mit heissem Wasser zu waschen und dann mit Limoniensaft zu reiben. Nach *Sauvages* werden diese Milben durch einen Absud von Pomeranzenblättern, von andern wohlriechenden Kräutern, vom Weinlaug und vorzüglich von den Blättern des *Mombaibaums* getödtet.

63. Die Hundsmilbe. Tab. VI. Fig. 14—16.

Acarus Ricinus, globoso-ovatus, macula baseos rotunda, antennis clavatis. Linn. Syst. N. T. I. P. V. p. 2926. n. 8. Faun. Suec. 1967. Amoenit. acad. Vol. III. p. 342. — Habitat frequens in bobus, canibus.

- | | |
|--|---|
| <p>Aldrovandi de animalibus insectis, p. 550.
 Barrere, P. Beschreibung von Guiana.
 Berlinische Sammlungen B. VII. Stück I. S. 234.
 Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S. 388.
 Der Holzbock.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 623. <i>la Tique</i>.
 Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII.
 S. 42. Tab. V. F. 16—19 <i>Acarus ricinoides</i>.
 Fabricii Mant. Ins. II. p. 371. n. 2. Spec. Ins.
 II. p. 484. n. 2. Syst. Ent. p. 810. n. 2.
 Frisch's Beschr. v. allerl. Ins. Teutschl. Th. V.
 S. 41. Tab. XIX. <i>Die Hundslaus</i>.
 Fuefslly's Verz. schweiz. Ins. n. 1177. <i>Hundsbock</i>.</p> | <p>Geoffroy Hist. des Ins. II. p. 627. n. 1. <i>la Tique des Chiens</i>.
 Göttingische Sammlung von Reisen, Th. II. S. 45.
 Müller's Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1047. n. 7.
 <i>Kuhmilbe</i>.
 Mülleri Faun. Fr. n. 814. Zool. Dan. Pr. n. 2210.
 Naturforscher N. XIV. S. 101. Tab. V. F. 5. <i>Holzbock</i>.
 Onomat. Hist. nat. P. I. p. 31. <i>Die Hundslaus</i>.
 Raji Hist. Ins. p. 10. <i>Ricinus caninus</i>.
 Schwenkfeld Theriotr. Siles. p. 551.
 Scopoli Entomol. Carn. 1057.
 Sulzer's Gesch. d. Ins. S. 245. Tab. XXIX. F. 7.
 <i>Acarus marginatus, die Gesümmte</i>.</p> |
|--|---|

Bey den Griechen war gegenwärtiges Insekt unter dem Namen *κρότων* bekannt, die Holländer nennen es *Tek* oder *Hondsluis*, die Schweden *Flott*, die Teutschen bald *Hundslaus*, bald *Holzbock*, von seinem verschiedenen Aufenthalte, bald *Waldzücke* oder niederdeutsch *Tücke* vom altteutschen Worte tacken oder ankleben. Man findet es (Fig. 14. 15.) von der Grösse eines Hanfkorns bis zur Grösse einer Haselnuß. Die Haut des Körpers ist fest und lederartig, die Gestalt desselben vollkommen eyrund. Der Kopf ist überaus klein, und sehr beweglich. Er läuft in einen, bey dem ersten Anblick bloß gespalten scheinenden Rüssel aus, der aber unter dem Mikroskope (Fig. 16.) ganz anders erscheint. Der alsdann in der Mitte sichtbare Rüssel (*a.*) ist weit länger als der Kopf, hornartig, mit einer stumpfen Spitze und zu beyden Seiten mit rückwärts gekehrten Widerhaken versehen. Dicht an seiner Wurzel sieht man zwey Knöpfchen (*c. c.*), auf welchen die zwey löffel- oder kolbenförmigen Arme (*b. b.*) stehen, die gleiche Länge mit dem Rüssel haben, sich an denselben bald mehr anschliessen, bald mehr von demselben entfernen, und von vielen für Fühlhörner gehalten worden sind. Ein kleiner Einschnitt unterscheidet den Kopf vom kurzen, leicht gefurcheten Brustschilde, welcher ohne eine besondere Absonderung mit dem länglichtrunden Hinterleibe zusammenhängt. Die acht sechsgliedrichtigen Füße haben am Fußblatt, wie die Krätzmilbe (Fig. 19. *b. b.*), kleine Bläschen mit Krallen. In der Farbe ist nichts beständiges. Sie scheint von dem Aufenthalte der Milbe auf verschiedenen Pflanzen und Thieren abzuhängen. Gewöhnlich ist sie blaßgelblich, hat sich die Milbe aber

aber voll Blut gesogen, so fällt vorzüglich der Hinterleib mehr ins Röthliche und Aschgrau. Auf dem Rücken derselben sieht man verschiedene Zierrathen, und eine gestreifte Einfassung um den ganzen Rand des Hinterleibes. Sie legt eine Menge Eyer, welche nach *Frisch* den Läuseeyern ähnlich seyn sollen.

In Teutschland sind diese Insekten sehr gemein, und auch in andern Ländern unsres Welttheils bekannt. Sie halten sich ebenfalls im Holze, und auf den Blättern verschiedener Gewächse auf, und gehen von da auf Schaaf und Kühe über, auf welchen sie überaus groß und dick zu werden pflegen. Am häufigsten bringen sie die Jagdhunde mit aus dem Walde. Auch Eichhörnchen, Erdschwalben und andere, vorzüglich junge Vögel, werden davon geplagt. Dem Menschen werden sie oft von diesen Thieren mitgetheilt, aber auch unmittelbar hängen sie sich leicht an ihn, wenn er zum Beyspiel nur durch das Gesträuche im Walde streift. Jägern, Hirten, Waldarbeitern, besonders Weibern, an deren nackende Füße und Schenkel sie sich setzen, sind sie daher wohlbekannt. Sie bohren sich mit dem Rüssel so tief in die Haut ein, daß der Kopf gemeiniglich stecken bleibt, wenn man sie los machen will. Ihr Stich hinterläßt kleine Entzündungen und öfters einen, mehrere Tage anhaltenden, stumpfen Schmerz. Göze versichert, daß sie gleich von der Haut abfallen, wenn man sie mit einem Tropfen Baumöl berührt.

64. Die Ruhrmilbe.

Acarus dysenteriae pedibus setis duabus, abdominis ovati posteriore setis quatuor longitudine corporis horizontalibus. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2929. n. 17. Ejusd. Diss. Exanthemata viva (Resp. Nyander) Upsaliae 1757. in Amoen. acad. Vol. V. p. 97. — Habitat in doliis ligneis, cerevisia acida infectis, imprimis in stillicidio siphonis vasis, saepe in cantharis ligneis ad rimas aestate, ab hora 10 noctis ad 10 diei supra cerevisiam obambulans, ceterum latitans sub cerevisia in rimis, hyalinus.

Fabricii Mant. ins. II. p. 373. n. 28. Spec. Ins. II. p. 490. n. 24. Syst. Ent. p. 814. n. 117.

Müller's Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1059. n. 18. Die Ruhrmilbe.

Murray, de vermibus in lepra obviis, p. 13.

Dieses nur mit bewaffnetem Auge zu bemerkende Insekt, soll einen glasartigen, glatten, eyrunden Körper der am After mit vier borstenartigen Härchen besetzt ist, ausserdem aber an jeder Fußspitze zwey ähnliche Härchen haben, und sich

sich durch diese unbedeutenden Merkmale vorzüglich von der Käsemilbe unterscheiden. *Linné* will es sogar als Ursache der Dysenterie angesehen wissen, worunter er nichts anders, als eine innerliche Darmkrätze versteht. Er erzehlt, daß *Rolander* dreymal hinter einander, beynahe immer nach acht Tagen, die jedesmal geheilte Ruhr wieder erhielt, und als Naturforscher dadurch bewogen wurde, die Abgänge zu untersuchen. Zu seiner grossen Verwunderung entdeckte er in denselben Myriaden von Milben, die den Mehlmilben ähnlich waren. Gewohnt des Nachts öfters aus einem Becher von Wacholderholz zu trinken, untersuchte er auch diesen, und fand in einer Ritze desselben unzehlige Milben von gleicher Art. Eben diese Milben entdeckte er nachher auch in andern, und vorzüglich in solchen Gefässen, worinnen saures oder übernächtiges Bier gestanden war, und schloß daher, daß die Ruhr vom Nachtrinken und von dem Gebrauch solcher Gefässe herrühre, worinnen saure Getränke aufbewahrt worden sind. Er wurde in dieser Meinung noch mehr durch die Versuche befestiget, die er mit verschiedenen Flüssigkeiten anstellte, welche er auf die Milben goß, um das sie tödtende, und somit das wahre, seiner Theorie entsprechende Ruhrmittel zu entdecken. Wirklich fand er, daß, ausser dem Weingeiste, nichts im Stande war, sie schneller zu tödten, als die Rhabarbertinktur, woraus er nun die heilsame Wirkung dieses Mittels in der Ruhr herleitete. Wie sehr er sich hierinnen geirrt habe, bedarf in unseren Tagen, wo man mit der Theorie und Heilung der Ruhr ganz aufs Reine gekommen ist, wohl keines weiteren Beweises. Was aber die eigene Art dieser Milben selbst betrifft, so glaubt *Murray*, daß es damit wohl ähnliche Bewandniß, wie mit den Würmern haben möchte, die sich in ungeheurer Menge unter den Ausleerungen eines an der Ruhr kranken Mädchens fanden. Diese Würmer waren den im Aussatze befindlichen sehr ähnlich, aber erst aus dem Unrathe des Fußbodens um und unter dem Bette, in das Nachtgeschirr gekrochen. Weit wahrscheinlicher ist es daher, daß *Linnés* Ruhrmilbe keine besondere Art, sondern die bekannte, in jene Gefässe zufällig gekommene *Mehl-* oder *Käsemilbe* war, welche nach der Beschreibung so sehr mit jener übereinkommt, und die wir daher jetzt näher kennen lernen wollen.

65. Die Käsemilbe. Tab. XIII. Fig. 18.

Acarus Siro albidus, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine setoso. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2928. n. 15. Faun. Suec. 1975. Amoenit. acad. VIII. p. 342. — Habitat in farina, caseo, diutius asservatis.

Blankard Schouwborg van de Rupsen etc. Tab. XIV. Fig. A. B.

Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 388. Die Käsemilbe, Miete.

Bonanni Micrographia curiosa, F. 112.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 42. n. 3. Tab. V. F. 15. *Acarus farinae*.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. app. p. 34. Tab. VI. F. 13 — 15.

Fabricii Mant. ins. II. p. 373. n. 24. Spec. Ins. II. p. 489. n. 21. Syst. Ent. p. 813. n. 16.

Fuefsly's neues Magazin, B. III. S. 18.

Ledermüller's mikroskop. Gemüths-Ergötz. S. 68. Tab. XXXIII. Fig. 2. a.

Leeuwenhoek Epist. 77. Tab. 370. F. 10.

Moder über die Milben im Mehl, im 36sten Bande der Schwed. Abhandlungen.

Müller's Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1049. n. 15. Die Käsemilbe.

Oonomat. Hist. Nat. P. I. p. 33. Käswurm, Mehlwurm.

Diese schon den Alten unter dem Namen *Siro* bekannte Milbenart, welche die Franzosen *le ciron*, *la mite*, die Engländer *the mite*, die Holländer *Sierje* und *Kaasmyt* heissen, ist sowohl in Europa, als in Amerika überaus gemein, nach *Degeer* noch kleiner, als die Krätzmilbe und kaum mit blossen Augen zu entdecken. Der Kopf (Fig. 18.) ist rostfärbig, hinten breit, rund, mit zwey hellen Augen versehen, läuft aber nach vorne schnabelförmig zu und führt einen verborgenen Saugrüssel. Der vorne schmale, hinten breite Brustschild geht unmerklich in den langen Hinterleib über, welcher hinten dick und rund ist. Brust und Hinterleib haben eine weisse, ins Gelbe fallende Farbe und eine Haut, die, wie Glas, durchsichtig ist und glänzt. Doch richtet sich die Farbe nach dem Aufenthalte und ist daher dunkler bey den Milben, die man im Rockenmehle findet. Auf dem ganzen Körper stehen hin und wieder einige steife Haare, wodurch diese Milbe ihre Gegenwart im Mehle zu verrathen pflegt, weil diese borstenartigen Haare, die fast länger, als der ganze Körper sind, bey der geringsten Bewegung des Insekts, auch ringsumher die Mehltheilchen mit in Bewegung setzen. Für die Milbe scheinen sie den Nutzen zu haben, daß das mehl sich nicht zu fest an dieselbe anlegt, und Bewegung und den Zutritt der Luft hindert. Auch die sechs Füße haben solche Haare, sind rostfarbig, ziemlich lang und mit zwey Krallen versehen. Sie kriecht damit sehr schnell, selbst mit einer Beute, die sie weit an Grösse übertrifft.

Am liebsten hält sich diese Milbe an etwas feuchten Orten auf, und kommt, wo es sehr trocken und warm ist, um. Vom Käse, auf dessen mehlichter Rinde sie unter dem Mikroskope in unglaublicher Menge sichtbar wird, hat sie ihren Namen

Namen erhalten, findet sich aber eben so häufig auch im Reis, auf den Mandeln, alten gebackenen Pflaumen, Rosinen, Prunellen, trockenen Feigen, durren Kleister, und andern trocknen, saueren und fetten Dingen. Unter zwey Pfund Mehl will *Ledermüller* zwey Drittel Milben angetroffen haben. Die Müller und Melber nennen ein solches Mehl lausig und dieses wird es, wenn es in den Monathen Junius und Julius nicht täglich einigemal gewendet wird. Es bekommt davon einen bittern, widernatürlichen Geschmack, und ist wahrscheinlich der Gesundheit nachtheilig. Doch fehlt es uns sowohl hierüber, als darüber an Beobachtungen, ob die in Menge, vorzüglich mit dem Käse verschluckten, lebendigen Milben, einen besondern Einfluß auf unsere Gesundheit zu haben pflegen? Dafs sie wenigstens keine Ruhr hervorzubringen fähig sind, beweist die tägliche Erfahrung an solchen Personen, die keine Mahlzeit beendigen können, ohne den Magen, wie sie sich ausdrücken, mit Käse zu schliessen, und gleichwohl das ganze Jahr nichts, weder von Diarrhöen, noch Ruhren, wissen.

Giftkanker überhaupt.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Aelianus de animal.</i> L. XVII. C. 40.
 <i>Agatharchides v. Phot. biblioth.</i> p. 1358. ed. Paul. Stephan 1611. Fol. It. Geogr. min. edit. Hudson. Oxon. 1698. Oct. p. 43.
 <i>Aristoteles Histor. anim.</i> Lib. IV. Cap. 11. L. V. C. 4, 8, 19, 20, 27. L. IX. C. 1, 39.
 <i>Cetti Naturgeschichte v. Sardinien</i>, Th. III. S. 55.
 <i>Cuvier Tableau élémentaire</i>, p. 470. <i>les Faucheurs</i>.
 <i>Diador. Sic. Biblioth. hist.</i> L. III. p. 114. ed. Stephan. et p. 196. ed. Wesseling.
 <i>Herbst, J. F. Natursystem der ungeflügelten Insekten</i>, Heft I. Berl. 1797. gr. 4.</p> | <p><i>Levit.</i> XI. 29. עכבר Achbar. I. Sam. V. und VI. Es. XLVI. 17.
 Mose Buch III. Kap. 11. V. 29. Buch. V. Kap. 28. V. 27.
 <i>Nikander theriac.</i> X. 716.
 <i>Plinii Hist. nat.</i> Lib. II. C. 24. Sect. 28 et 29.
 L. VIII. C. 29. Sect. 43 und 47.
 <i>Pallas nordisch. Beyträge</i>, Th. II. S. 345.
 <i>Samuel I.</i> Kap. 5 und 6.
 <i>Solinus Polyhist.</i> Cap. IV. p. 18. et C. XII. vergl. <i>Salmas. exerc. Plin.</i> p. 100 et 101.
 <i>Strabo Geograph.</i> L. XVI. p. 1118. ed. <i>Almeloven</i>.
 <i>Xenophon memorabil. Socrat.</i> Lib. I. Cap. III.</p> |
|---|---|

Herbst's seltenen entomologischen Kenntnissen und unermüdetem Forschungsfleisse verdanken wir die nähere Bestimmung des Geschlechts und die Aufklärung der Naturgeschichte dieses merkwürdigen Insekts. Daher auch das meiste was ich hier liefere, im Grunde nur ein kurzer Auszug von dieser Materie aus seinem Meisterwerke ist.

Phalangium, *Tetragnathium* und *Solpuga* waren die Namen, unter welchen dieses Insekt bey den Alten bekannt war. *Pallas* belegte dasselbe wegen der Ähnlichkeit seiner Kinnladen und Lippen mit denjenigen der Skorpionen und seines übrigen Körpers mit dem der Spinnen, mit dem Namen *Skorpionsspinnen*, *Herbst* aber

aber wählte vorzugsweise *Solpuga* oder *Giftkanker*, zur Bezeichnung des Geschlechts. Das Gemeinsame, worinnen alle Solpugen oder Giftkanker in Rücksicht der äusseren Gestalt übereinzukommen pflegen, ist ein länglichter, von oben niedergedrückter, wollhaarigter, und schwerfälliger Körper, welcher dennoch eine hüpfende Bewegung zulässt. Der Kopf hat, bey den meisten Arten, eine schildförmige Bildung, welche auch Veranlassung gegeben hat, denselben mit dem Brustschilde zu verwechseln. Er ist sehr hart, vorne mehr oder weniger abgestumpft, hinten aber herzförmig und umzogen mit einem aufgeworfenen Rande. An seinem vorderen Theil, welchen man die Stirne nennen könnte, stehen, durch einen unbedeutenden erhabenen Zwischenraum getrennt, zwey runde, hervorragende Augen. Statt der Fühlhörner haben sie nach *Herbst* vier Fühlspitzen von ungleicher Länge und Dicke, welche unten am Kopfschilde zwischen den Kinnladen und Maxillen entstehen und in deren hohlen Knopf an der Spitze, der Sitz ihres überaus scharfen Geruchs liegen soll. Diese Fühlspitzen sind aber von *Pallas* für Füße gehalten worden, wozu ihn wohl die Ähnlichkeit der Solpugen mit den Spinnen berechnete, und sind vielleicht auch wirklich Füße, weil Standort, Mangel der Fußblätter und Krallen, noch immer nicht den nach ihrer übrigen Gestalt und Richtung einleuchtenden Gebrauch derselben widersprechen. An die Stirne schliessen sich ohne ein besonderes abgesondertes Gelenk, die Fresswerkzeuge an, deren obere Kinnladen (Tab. VIII. Fig. 8. und Tab. XV. Fig. 2.) mit den durchs Mikroskop vergrösserten Mandibulen der Skorpionen (Tab. X. Fig. 3.) sehr überein kommen, ausser daß letztere ihnen weit an Grösse nachstehen. Dieses ist auch die Ursache daß nach *Pallas* Versicherung mehrere Skorpionen einer Solpuge im Streite unterliegen, welche jenen die Schwänze abbeißt und sie dann aufzehrt, und daß schon eine sehr überlegene Anzahl Skorpionen dazugehört, um eine Solpuge zu besiegen. Jene oberen Kinnladen (*Mandibulae*) liegen ganz frey, sind krebsscheerenförmig, bauchicht und auf den Seiten etwas zusammengedrückt, übrigens rauhhaarig, mit zwey bogenförmigen, an der innern Seite scharf gezähnten Fingern versehen, wovon der unterwärts stehende, oder der Daume, beweglich ist. Die unteren Kinnbacken hingegen sind ganz schwach, oben zusammengedrückt und sichelförmig. Zwischen denselben und den zwey obern Kinnladen befindet sich die Saugstachellippe (Tab. XV. Fig. 2. c.), welche an ausgetrockneten Exemplaren viel Ähnlichkeit mit der Lippe des Hirschröters (Tab. XIII. Fig. 1. a.), hat nur daß sie stachelförmiger ist. Der mit dem Kopf unmittelbar zusammenhängende Brustschild ist klein, weich, etwas gegliedert, und leicht für den vordern Theil

Theil des länglichtrunden, aus neun Ringen bestehenden, rauhaarigen Hinterleibes anzusehen. Die nach den vier Fühlspitzen, oder wahrscheinlicher Vorderfüßen, folgenden sechs Hinterfüße, sitzen am Brustschilde, haben an ihren Enden Fußballen, und neben denselben zu beyden Seiten eine lange, dünne und spitzige Krallen. Das hinterste Paar dieser Füße, welches länger als die übrigen und daher zur Hervorbringung des hüpfenden und tanzenden Gangs dieses Insekts geschickt ist, hat an jedem Schenkel fünf fächerförmige Anhängsel (Tab. VIII. Fig. 7.) von unbekannten Nutzen, welche aber die Solpuge von allen andern Insekten auszeichnen.

Schon in den ältesten Zeiten kannte man die Giftkanker als überaus schädliche und furchtbare Geschöpfe. *Moses* verbot sie den Israeliten als eine unreine Speise unter dem Namen *Achbar*. Der Verfasser des ersten Buchs *Samuelis* klagte eben diese Insekten als Ursache einer mit Beulen an den verborgenen Theilen verknüpften Seuche an, womit schon *Moses* sein Volk als mit einer über dasselbe von der Vorsehung zu verhängenden Landplage bedrohte. (Auch die alten Griechen gedenken dieser Giftkanker. „Bedenkest du nicht, sagt *Sokrates* zum *Xenophon*, daß die Phalangien, welche nicht so groß, wie ein Dreyer sind, auch wenn sie nur den Mund berühren, die Menschen vor Schmerzen ganz ausser sich bringen und der Vernunft berauben? Ja, bey *Jupiter*, antwortet *Xenophon*, die Phalangien flößen bey ihrem Biß noch etwas Besonderes (nemlich Gift) in die Wunde!“ *Aristoteles* kannte sie wahrscheinlich auch, und gedenkt zweyer Arten beisender Kanker. *Agatharchides* aber schreibt in seinem fünften Buche vom rothen Meere. „Nahe bey den Akridophagen, (einer ostafrikanischen Nation, welcher noch unten bey einer andern Gelegenheit gedacht werden wird) ist eine weite Strecke Landes, welche vortrefliche Weideplätze enthält, aber ganz verlassen liegt, und von allen rings umher wohnenden Völkern unbesucht bleibt. Nicht, als ob sie vom Anbeginn ohne Menschen gewesen wäre, sondern wegen einer unglaublichen Menge von Skorpionen und Phalangien, welche einige Tetragnathen nennen. Denn man sagt, diese Art von Ungeziefer habe einst, bey einer langwierigen Regenzeit, überhand genommen, und da die Einwohner dieser Landplage nicht Einhalt thun konnten, so hätten sie das Entrinnen aus dem Verderben, dem Vaterlande vorgezogen, und auf diese Art sey jene Gegend von dem menschlichen Geschlechte verödet gelassen worden.“ Eben dieses erzählen *Diodor von Sicilien*, *Strabo*, *Plinius* und *Älianus* beynahe mit denselben Worten. Am weitläufigsten unter den alten Griechen handelt jedoch *Nikander* in seinem schätzbaren Lehrgedichte über

über die giftigen Thiere, von diesen Solpugen. Ausserdem aber verdient hier noch bemerkt zu werden, was *Solinus* und *Cetti* von den Giftkankern schreiben. Ersterer nennt sie *Solifugae*, weil sie das Sonnenlicht scheuen und sagt: „Sardinien ist zwar ohne Schlangen, doch was die Schlange an andern Orten ist, das ist der Giftkanker für die Sardinischen Ländereyen. Dieses ist ein kleines Thier von der Gestalt einer Spinne. Es kriecht in verborgenen, und tödtet die Unversichtigen. Letzterer aber fragt: Sind etwa die zwey Arten der *Solifuga* fabelhaft? Sind sie nicht in der ganzen Insel bekannt genug? Muß man nicht zur Heilung ihres Bisses die kräftigen Mittel, Mist und Backofen, ergreifen? Ist ihr Biß nicht wirklich tödtlich, wenn die Hülfe ausbleibt, oder schleppt man sich nicht wenigstens lebenslang mit dem Schaden, wenn man noch gerettet wird?“

Das Vaterland der Solpugen sind die heisseren Erdstriche der alten Welt, Sie verweilen daselbst am Tage an finsternen, dumpfigten Örtern, wo salzige Feuchtigkeiten ausschwitzen, z. B. in Bergwerken, Erdhölen und Abtritten. Des Nachts aber schleichen sie einzeln herum, suchen Raub, nähern sich daher den Wachtfeuern der Heere und Caravanen. Ihre gewöhnliche Nahrung sind die Insekten und vorzüglich die Skorpionen. Sie gehen aber auch den scharfen, alkalischen Ausdünstungen der Thiere und Menschen nach, und werden daher den stark duftenden und bärtigen Lippen der viel Caviar und gesalzene Fische geniessenden Kosaken, und vornemlich den weiblichen Geschlechtstheilen, durch ihre Bisse gefährlich.

Sehr treffend schildert *Herbst* die Art und Gefahr ihrer Verletzung. „Die Solpuge hat das fürchterlichste Gebiß unter allen Geschöpfen; nach Verhältniß schrecklicher, als der Tiegier, das Krokodill, die Brillenschlange und der Hayfisch. Die in den Kinnladenscheeren vertheilten Muskeln, treiben die beyden Finger derselben, wie ein Paar Sägen gegen einander. Sie zerschneidet, zermalmet und zerreiſset daher durch ihren Biß Fleischfasern, Gefässe und Nerven, und bewirkt hierdurch eine gefährliche Entzündung. Doch hiermit noch nicht zufrieden, steckt dieses schreckliche Ungeheuer seine saugstachelförmige Lippe noch in die gräßlich zerrissene Wunde und träuffelt in dieselbe ein Gift, wovon ein halber Tropfen hinreicht, einen ganz gesunden, aber hilflosen Menschen, in wenig Stunden Vernunft und Leben zu rauben.“ Am meisten schaden wohl die Nymphen und Männchen der Solpugen, besonders bey schwülen, ihre Vermehrung begünstigenden Regenwetter in den Monathen Junius und Julius. Hiervon, so wie von der körperlichen Constitution des Verwundeten, und der Beschaffenheit der verletzten

Stel-

Stelle, hängt nothwendig die Verschiedenheit der Gefahr der auf den Solpugenbisse erfolgenden Zufälle ab. Verletzungen der Lippen pflegen Schmerzen bis zum Wahnsinne nach sich zu ziehen. Weniger gefährlich sind Verletzungen der Ohren, am gewöhnlichsten und nicht minder gefährlich Verletzungen an den Geschlechtstheilen. Auf letztere erfolgen Beulen, welche allermeist aufbrechen, hässliche Geschwüre bilden, die sich von den venerischen bloß durch die sie begleitenden heftigen Nervenzufälle, Convulsionen, Veitstanz, unterscheiden. Nicht selten ziehen die Solpugenbisse auch den Tod nach sich, welcher entweder plötzlich oder langsam zu erfolgen pflegt. Dieses war wahrscheinlich der Fall bey den Philistern, die nach der Behauptung der Hebräer von einem Thier, welches sie *Achbar* nannten und wahrscheinlich eine im mittleren Asien wohnende Solpugenart war, gebissen wurden, davon Beulen oder Bubonen bekamen und haufenweise wegstarben.

66. Die tödtliche Solpuge. Tab. XV. Fig. 1. 2.

Solpuga fatalis chelis horizontalibus, clypeo Subtriangulari antice latissimo, subdepresso canaliculato; abdomine depresso undique villosa. Herbsts Natursyst. der ungeflügelten Insekten. Heft. I. p. 32. n. 1. Tab. I. Fig. 1. und A. — Habitat in Bengala.

Nicander Theriac. 725. Φαλάγγιον κυανέον.

Plinii Hist. nat. Lib. XXIX. C. 27. Araneus la-

nuginosus grandissimo capite et Tetragnathium capitibus medio linea alba et transversa altera.

Die größte von den zur Zeit bekannt gewordenen Giftkankerarten ist die *tödtliche Solpuge* (Fig. 1.), welche eine Länge von zwey Zoll und einer Linie hat. Ihr fünf und eine halbe Linie langer, vorne sieben und ein Viertel, hinten fünf Linien breiter Kopfschild (*d. d.*) bildet ein stumpfes Dreyeck, welches in der Mitte durch eine Längsfurche getheilt, übrigens etwas platt gedruckt und am Rande abgerundet ist. An seinem vordern und mittleren Theile sind auf einer kleinen, länglichtrunden Erhabenheit die zwey Augen, als zwey schwarze Punkte sichtbar. Von den an der Stirne oder dem Vordertheile des Kopfschildes artikulirten, horizontal liegenden Kinnladenscheeren (*a. a.*), ist die Länge neun, die Breite vier und eine halbe Linie. Diese mit der Seite ihres beweglichen Daumens auswärts gekehrten Scheeren sind mit steifen glänzenden Borsten besetzt und kaffeebraun an den Spitzen ihrer Finger. Sie bedecken ganz die weit kleineren, flachen, sichelförmigen und etwas behaarten unteren Kinnladen (Fig. 2. *b. b.*), in deren Mitte die

etwa

etwa zwey Linien lange und nur einer halben Linie breite, saugstachelförmige Lippe (c.), als eine mit feinen Härchen besetzte Spitze hervorragt. Weit schmaler als der Kopfschild, ist der mit dem Hinterleibe unmerkbar zusammenfliessende Brustschild (Fig. 1.), welcher sich blos durch seine kreisförmigen Erhabenheiten und Vertiefungen auszeichnet. Der Hinterleib ist acht Linien lang und sechs und eine halbe Linie breit, etwas platt gedruckt und rauhhaarig. Die vorderen Fühlspitzen, oder, nach *Pallas*, die zwey Vorderfüsse (Fig. 1. b. b.), haben vier Glieder und eine Länge von zwey Zoll ein und einer Viertellinie, die zwey hinteren Fühlspitzen, oder das zweyte Paar Füsse (c. c.), fünf Glieder und eine Länge von anderthalb Zoll. Alle vier haben nur stumpfe Enden ohne Krallen. *Herbsts* erstes und zweytes, oder *Pallasens* drittes und viertes Paar Füsse, sind sechsgliedricht, ersteres einen Zoll vier Linien, letzteres anderthalb Zoll lang. Das hinterste Paar Füsse aber ist neungliedricht, hat dritthalb Zoll in der Länge und macht mit seinen Afterschenkeln und Schienbeinen einen nach oben gekehrten stumpfen Winkel, wodurch diese Solpuge, doch minder als die Heuschrecken, zum Springen, oder vielmehr zum Hüpfen, geschickt ist. Die Anhängsel an den drey Schenkelwurzelgliedern der Hinterfüsse, sind anfänglich nicht sonderlich groß, werden aber allmählich unterwärts grösser. Sie sind beynahe ohne Stiel und sitzen ziemlich weitläufig auseinander. Übrigens sind alle Füsse, selbst an den Schenkeln, ziemlich dünne und nehmen gegen die Spitzen der Fußblätter, welche an den drey Hinterpaaren Krallen führen, sehr allmählich ab. Die Farbe des ganzen Insekts ist graugelb und seine Haare sind rostfärbig. Es gehört unter die furchtbarsten Arten dieses Geschlechts und ist vorzüglich in Bengalen zu Hause.

67. Die spinnenartige Solpuge. Tab. VIII. Fig. 6—10.

Solpuga arachnoides chelis verticalibus, clypeo angusto convexo, thorace brevissimo subtereti, abdomine tereti nudiusculo. *Herbsts* Natursyst. d. ungeflügelten Insekten. Heft. I. p. 37. Tab. I. F. 2. — Habitat in Italia Africaque meridionali, Tauria, Persia, ad Volgae australe littus, morsu dolores atrocissimos, tumores lividos, deliria, rarius mortem ciens, molle, luridum, lanuginosum, chelis ventricosissimis.

Aelian's *Thiiergegeschichte*, B. III. Kap. 136. B. XVII. Kap. 40. *Tetraguathon*.

Bell voyage de Russie, Vol. III. p. 53.

Blumenbach's *Handb. d. N. G. S.* 389. n. 3. *Phalangium Araneoides*.

Fabricii *Mant. Ins.* I. p. 347. n. 11. *Spec. ins.* I. p. 549. n. 10.

Gmelin's *Reise durch Rußland*, Th. III. S. 484. Tab. XXXV. *Phalangium Bychorcho*.

Linnaei *Syst. Nat.* T. I. P. V. p. 2945. n. 15. *Phalangium araneoides*, chelis dentatis villosis, corpore oblongo.

Listers *Naturgesch. der Spinnen*, S. 223. *Die spin-*

spinnenartige Afterspinne, oder die allergiftigste Skorpionspinne.

Müller's Suppl. und Reg. Band. S. 341. *Phal. Bychorcho*, die Giftspinne.

Olearii Moskowitische und Persische Reisebeschreibung. Schlefw. Fol. 1656. S. 496.

Pallas Reisen durch Rußland, Th. I. S. 385. Anh. n. 80. *Phalangium Calmucc. Bychorcho* und Th.

III. S. 650. Ejusd. Spicil. Zool. Fasc. III. F. 7—9. Die langhaarige, höchstgiftige, milbenförmige Skorpionspinne. Desselben neue nordische Beyträge, Th. II. S. 345.

Petiverii gazophylacium Catal. 410. Tab. 85. F. 9. *Proscarabaeoides capensis*, pedibus plumosis.

Schaw Voyage, T. I. p. 335.

Nach Pallas Vermuthung ist gegenwärtige Solpuge das giftige Insekt der Libischen Wüste, welches unter dem Namen *Boola-Kaz*, oder *Bula-Kas* bekannt ist, und Schaw für *Aelians* Rhax hält. Auch scheint *Alians* Tetragnathon, wovon er erzehlt, daß es eine ganze Stadt entvölkert habe, eben diese spinnenartige Solpuge zu seyn. Die Perser kennen sie unter dem Namen *Enkurek*; die Kalmücken unter den Namen *Bö-Chorchoi*, Zauberwurm, *Mandschi-Bö-Chorchoi*, gemeiner Zauberwurm, *Mandschi-Abagai*, gemeines Großmütterchen; die Kirgisen aber unter dem Namen *Kara-kurt-Bie*. Sie ist viel kleiner als die tödtliche Solpuge, das Männchen (Tab. VIII. F. 6. 7.) nemlich achtzehn, das Weibchen (Fig. 10.) aber fünf und zwanzig Linien lang, weichlich, gelbgrau, fein behaart, und ihr ganzes Aussehen zurückschreckend und giftig. Der Kopfschild (Fig. 6.) ist dritthalb Linien lang, vorne zwey und drey Viertel, hinten zwey Linien breit, am vordern und dicksten Theil abgestutzt, am hintern eyrund, oben hochgewölbt, in der Mitte durch einen leichten Eindruck getheilt, überhaupt hartschalichter als der übrige Körper. In der Mitte des Vorderrands stehen bey dem Weibchen auf einer dunkelbraunen Erhabenheit, bey dem Männchen aber ohne Erhöhung dicht neben einander zwey schwarze Augenpunkte. Die breiten, bauchichten Kinnladenscheeren haben eine vertikale Lage, sind etwas zusammengedrückt, hornartig und ganz behaart. Jede besteht aus einem obern, kurzen, und einem untern, beweglichen Finger (Fig. 9.). Beyde sind bogenförmig und an der innern Seite gezähnt. Bey dem Weibchen beträgt ihre Länge nicht über vier und ihre Breite nicht über zwey und eine halbe Linie. Ohngeachtet Pallas an den Spitzen der Scheerenfinger nicht die Giftöffnungen, wie am Skorpionstachel, Vipernzahn und an den Fangklauen der Spinnen entdecken konnte; so vermuthet er doch, daß im Grundtheile der Kinnladenscheeren das Giftbehältniß verborgen, und in dem Winkel zwischen den beyden Scheerenfingern die Giftöffnung zu suchen sey, aus welcher längs der, zwischen den Zähnen der Scheerenfinger befindlichen, kleinen Rinne, das Gift während des Bisses in die Wunde fließet. Eben so wahrscheinlich kann aber auch die Solpuge durch die ein und drey Viertel Linien lange, und eine halbe Li-

nie breite Saugstachellippe (Fig. 8. a.) das Gift in die mit den Scheeren gemachte Wunde ergiessen. Die unteren Kinnladen haben nichts Auszeichnendes, sind zwey Linien lang und drey viertel Linien breit. Das Brustschild ist sehr kurz, schmaler als der Kopfschild und etwas zusammengedrückt. Der zehn und eine halbe Linien lange und eine halbe Linie breite, länglicht - runde, weichhäutige und wenig behaarte Hinterleib hat neun Einschnitte, oder Ringe, an deren letzten die Afterritze deutlich zu sehen ist. Beym Weibchen (Fig. 10.) ist der erste Bauchring etwas gespalten und mit einer Öffnung (b.) unter jener Spalte versehen, durch alle übrige Ringe aber läuft in der Mitte eine Furche. Beym Männchen hingegen ist der erste Bauchring unten nur wenig getheilt und keine Höhle zu entdecken, hingegen sieht man am Rande des zweyten und dritten Rings eine gekerbte, hornartige Querlinie, unter welcher eine mit zwey Warzen versehene Öffnung ist, die kaum eine Borste einläßt. Die vordern Fühlspitzen oder *Pallasens* Fangarme (Fig. 7. b. b.) sind dreygliedricht, am Ende mit einem stumpfen Ballen versehen, einen Zoll lang und eine Linie dick, das zweyte Paar Fühlspitzen, oder die Fühlarme (c. c.), sind jenen ganz ähnlich, nur daß sie dünner und kürzer, nemlich acht Linien lang und kaum einer halben Linie dick sind. Stärker als diese Fühl- und Fangarme sind die am Brustschilde befestigten, ziemlich hartschaalichten, mit weichen, zarten Milchhaaren und dazwischen mit Borsten besäeten sechs Lauffüsse, wovon das erste Paar (Fig. 7. d. d.) neun Linien lang und eine halbe Linie breit, das dritte Paar sechszehn Linien lang und drey Linien breit ist. Alle diese Füße haben sechsgliedrichte Fußplätter und am Ende zwey Nägel an einem gespaltenen Balln, das letzte Paar die diesen Insekten eignen Anhängsel an den Schenkeln, welche ziemlich klein und gestielt sind.

Überaus groß ist die Bewegfertigkeit dieser Füße, indem die Solpuge in einem Augenblick an dem ihr vorgehaltenen Stock hinanläuft und den Menschen in die Hand beißt. Geht sie ihrer Nahrung nach, die hauptsächlich in Spinnen und andern weichen Insekten besteht; so hält sie ihre vier vordersten klauenlosen Fühlfüße beständig halbaufgerichtet voraus und bewegt sie hin und her. Sobald sie auf etwas stößt, was ihr zum Raube dienen kann, so schießt sie mit Hefigkeit zu, schlägt die Kinnladenscheeren ein, zerfleischt und verzehret so die Beute.

Ihre Vermehrung muß sehr beträchtlich seyn. *Pallas* schätzte die Anzahl der Eyer, die er im Monath Junius im Leibe eines Solpugenweibchens gefunden hatte, auf einige Hundert und fand im August schon ziemlich erwachsene Junge. Wahr-
schein-

scheinlich erreicht also dieses gefährliche Insekt schon in Jahresfrist seine ganze Vollkommenheit und ist daher fähig durch seine Menge unter Menschen und Thieren ausserordentliche Niederlagen anzurichten. Aber auch hier wußte die für die Erhaltung des Gleichgewichts unter allen lebenden Wesen stets besorgte Natur, ein Mittel zu finden, dem nicht beabsichtigten Schaden dieses Ungeheuers Einhalt zu thun. Sie gab ihm ein so zartes Leben, daß es von der unbedeutendsten Wunde, die ihm ein giftloses Insekt beybringt, ja sogar von einem Nadelstiche sogleich ohnmächtig wird, und unter leichten Zuckungen hinstirbt.

Man findet die spinnenartige Solpuge nicht über den funfzigsten bis ein und funfzigsten Grad der Breite, südwärts aber scheint ihr die Natur keine Gränze gesetzt zu haben; denn sie verbreitet sich vom wärmeren Asien über ganz Afrika bis an das südliche Vorgebürge. Zuerst findet man sie in der Krimmischen Steppe, zwischen dem Dnieper und Don, und auf der krimmischen Halbinsel selbst. Um Asof und Taganrok ist sie in den Steppen so gemein, daß die, seit dem letzten Kriege Rußlands mit den Türken in diese Örter gelegten russischen Besatzungen sie genug haben kennen lernen. In der ganzen salzigen, durren und leimichten Steppe vom Don bis an die Wolga und das kaspische Meer, ferner zwischen der Wolga und dem Jaik oder jetzigen Uralfluß, und jenseits desselben in den kirgisischen Steppen bis an die Bucharey und das altaysche Gebürge hin, ist diese Solpuge ebenfalls einheimisch und den Steppenvölkern, die bey ihrer Lebensart ihren Verletzungen täglich ausgesetzt sind, so bekannt, als fürchterlich. Gewöhnlich hält sie sich in Erdlöchern und schilfigten Gründen auf, und läuft auch am Tage zwischen dem Schilfe herum. In der um Taganrock am asowischen Meere sehr schilfigten Gegend wird sie daher mit dem Schilfe, welches man sich zur Feuerung bedient, sehr oft in die Hütten gebracht. Auch schleicht sie sich einzeln in die Häuser und Keller, und *Pallas* selbst hat sie auf seiner Steppenreise 1773 einmal in seinem Zelte an den Kleidern bemerkt, seine Begleitung aber einige derselben getödtet, ehe sie Schaden thun konnten.

Bey Tage verweilt sie in ihren Schlupfwinkeln in den Erdritzen und von andern Insekten verlassenen Höhlen. Diese Vorsicht macht ihr überaus weichlicher Hinterleib nothwendig, mit welchen sie den Stichen der auf den Steppen herumschwärmenden Raubwespen und den Verfolgungen der Vögel bald unterliegen und ihr ganzes Geschlecht bald ausgerottet seyn würde. Am Abend aber, vor oder nach Untergang der Sonne, wenn der größte Theil ihrer Feinde schon zur Ruhe ist, kommt sie aus jenen Schlupfwinkeln hervor, und scheint sich in den

Step-

Steppen durch den Schein von Feuer und Licht anlocken zu lassen, und deswegen sich vorzüglich bey Karavanen einzufinden. Doch entgeht sie dabey nicht immer den Verfolgungen einiger nächtlicher Weile auf sie lauernden Feinde, wozu besonders eine grosse Art schwarzer, gut geharnischter Raubkäfer und die beisende Skolopender (Tab. XI. F. 11.) gehören. Ohne diese Feinde, schreibt *Pallas*, würden sich die Solpugen vielleicht dergestalt vermehren, daß kein Mensch, und wenig Thiere, auf den Steppen vor ihren Bissen sicher wandeln könnten.

Wegen der grösseren Kinnladenscheeren ist vermuthlich der Biss der männlichen Solpuge gefährlicher, als der der weiblichen. Doch erfolgen ihre Verletzungen immer nur zufällig, es sey nun, daß man ihnen unversehens zu nahe kommt, wenn sie z. B. auf dem Nachtlager kriechen, oder sich in die Kleider verkrochen haben u. s. w. und dann gedrückt oder sonst gereizt werden: oder daß man sie vorsezlich reizt. In letzterem Fall setzen sie sich mit einer Wuth zur Gegenwehr die in der That ausserordentlich ist und Bewunderung verdient. Sie erregen zugleich durch das Aneinanderreiben ihrer Kinnladenscheeren eine Art von Gezwitzcher, und sind in lauter heftigen und grimmigen Bewegungen. Beissen sie wirklich, so entsteht im Augenblicke des Bisses ein unbeschreiblich heftiger Schmerz, den einige mit dem Schmerze von dem Stiche mit einer glühenden Nadel verglichen haben. Schlafende Personen schrecken davon mit lautem Geschrey auf, und Empfindliche fallen in Ohnmacht. An der gebissenen Stelle zeigen sich so viele kleine Wunden, als die Kinnladenscheeren Zähne haben, und es erhebt sich eine stark entzündete, überaus schmerzhaftige Geschwulst, die oft vier bis fünf Zoll im Durchschnitte hat. Dabey sind die Augen des Verwundeten erhitzt, der Puls voll und geschwind, der Durst heftig, Beängstigung, Unruhe, Kopfschmerzen und brennendes Reissen im leidenden und geschwollenen Theile, und der Kranke, bey verzögerter Hülfe, meistens ein Opfer dieses schrecklichen Ungeheuers. Kein Wunder! wenn selbst die Kalmücken von ihnen so sehr in Furcht gesetzt sind, daß sie sich gleich aus der Gegend entfernen, wo sie eins dieser Insekten erblickt haben, und wenn sie einer ungewöhnlichen Überhandname dieser Solpugen, sie erfolge nun aus Mangel ihrer natürlichen Feinde, oder aus einer ihrer Vermehrung begünstigenden Witterung, die Bewohner ganzer Ortschaften und Gegenden, durch die Gefahr, welcher sie täglich, ja stündlich ausgesetzt sind, endlich bewogen werden, ihre Wohnplätze zu verlassen, wie dieses von der am Kumafluß sonst blühenden tartarischen Stadt *Madshary*, von welcher noch die merkwürdigen Ruinen zu sehen sind, eine alte Sage bezeuget.

Als ein Mittel sich im Schlafe vor den Solpugenbissen zu sichern, empfiehlt *Pallas*, daß man einen noch neuen haarichten Filz von Schafwolle, unter seinem Lager auf der Erde ausbreite, oder einen aus Pferdemähnen geflochtenen Strick, in einen geraumen Kreis um sich her auf den Boden lege. Lezteres Mittel hat er selbst bewährt gefunden, als er sich in *Zarizyn* aufhielt, wo die Solpugen häufig vorkommen, und sich bis in die Festung verlieren. Hier legte er einmals einen Haarstrick im Kreise auf einen Busch und lies eine mit der Insektenzange gefangene Solpuge innerhalb des Kreises laufen. So oft aber das Insekt mit den Fühlarmen an die hervorstehenden Haare des Stricks stieß, stuzte es und lief zurück.

Zur Heilung bestreichen die Kalmücken die Wunde mit der Milch einer jungen Frau, die vor der Ehe keusch gelebt hat und im ersten Kindbette ist, oder sie hauen, wenn diese nicht zu bekommen ist, ein schwarzes Thier, es sey Hund, Katze, u. s. w. lebendig auf, reissen Herz und Lungen heraus und legen diese Eingeweide auf die Wunde. Abgerechnet das Abergläubische in der Behandlungsart der Kalmücken, so können ihre Mittel, als ölichte Bähungen, allerdings Nutzen leisten. Weit vorzüglicher ist aber das vom *Pallas* empfohlene Verfahren. Es wurde nemlich an der gebissenen Stelle gleich etwas mit Kupfer gesättigtes Baumöl warm eingerieben, die Geschwulst gut scarificirt, mit dem Öle nochmals bestrichen und mit Diachylonpflaster bedeckt, am Arme Ader gelassen, und von einer aus Weinessig, Zucker und Kampfer bereiteten Mixtur alle zwey Stunden ein Eßlöffel voll gegeben, wobey das Bestreichen der kranken Stelle mit dem Öle alle drey Stunden wiederholt wurde. Auf den Gebrauch dieser Mittel liessen alle Zufälle merklich nach, und der Kranke war nach dreymal vier und zwanzig Stunden wieder hergestellt.

68. Die afrikanische Solpuge. Tab. XV. Fig. 3.

Solpuga africana chelis verticalibus ovato compressis, clypeo cordato, latius marginato, canaliculato, thorace brevi, lato, obcordato, abdomine ovato, subtrigono, hirsuto.

Herbsts Natursyst. der ungeflügelten Ins. Heft I. d. 44. n. 5. Tab. II. F. 2. —

Habitat in Africa australi.

Aelians Thiergeschichte, Buch XVII. Cap. 40.
Agatharchides de mari rubro, Lib. V. *φαλάγγιον τετραγνυδον*.

Petiverii gazophylacium, Tab. XII. Fig. I. Tab. LXXXV. F. 9. *Proscarabaeoides capensis pedibus plumosis*.

Plinii Hist. nat. Lib. VIII. Sect. 43. *Solpuga*.
Lib. XXIX. Sect. 27.

Valentini Kunstkammer, Th. II. Tab. XXXIV.
Fig. 5.

Von

Von dieser sich im mittägigen Afrika aufhaltenden Solpuge haben wir, ausser der unvollständigen Nachricht, die uns *Agatharchides* davon hinterlassen hat, und ausser *Petivers* hier entlehnten Zeichnung, zur Zeit keine nähere Kenntniss. Es ist hieraus zu vermuthen, dass dieses, seiner ganzen Bildung nach, gewiss sehr gefährliche Insekt, wenigstens nicht nahe bey der Kapstadt häufig vorkommen kann, weil es sonst sicher bekannter und in den holländischen Cabinetten nicht so selten seyn würde. Es ist beynahe so groß, als die tödtliche Solpuge, hat einen herzförmigen Kopfschild, mit zwey grossen Augen an der Stirne, einer in der Mitte durchlaufenden Furche, und einem breiten Rand, der mit *Plinius* Schilderung des giftigen *Tetragnathium*s sehr übereinkommt. Die vertikal stehenden Kinnladenscheeren, sind am Vordertheile durchbrochen, spitzig, und an den Seiten zusammengedrückt. Der Brustschild ist kurz, vorne schmal und hinten breiter als der Hinterleib, letzterer ziemlich lang, länglichrund, beynahe vierseitig, am Ende mit drey Spitzen versehen und mit kurzen Haaren überwachsen. Die Schenkel der Hinterfüsse sind an beyden Seiten gemähnt, verrathen aber, wie die ganze Figur, und vorzüglich die übrigen Füsse, den ungeschickten und ohne alle entomologischen Kenntnisse arbeitenden Zeichner.

Wegen seiner beyden Doppelscheeren verdient gegenwärtige Solpuge am meisten den Beynamen *Tetragnathon*, und es ist wahrscheinlich, dass es dieselbe ist, welche, nach *Aelians* Erzählung, durch ihre starke Vermehrung in Verbindung mit den Skorpionen, die Bewohner einer Stadt am See Arrhatan in Indien vertrieb, an deren Stelle man gegenwärtig nichts als eine Wüste antrifft.

Phalangien überhaupt.

Clerk, C. *Aranei Suecici descriptionibus et figuris illustrati*. Stockh. 4. 1757. p. 113. Schwedisch *Somkallias*.

Dresdner Magaz. II. S. 499. *Springspinnen*.

Herbst's *Natursyst. d. ungeflügelten Insekten*. Heft I. S. 65. *Phalangien*.

Imperati (Ferrandi) *histor. natur.* 4. Colon. 1695. p. 901. 920. *Phalangium*, *genus araneae venenatae*.

Jonstoni *Hist. Ins.* p. 137. de *Phalangiis*. Noxi

Phalangia dicuntur, a *φάλαγξ*, quod digitorum internodium significat.

Linnaei *Syst. Nat.* T. I. P. V. p. 2942. n. 267.

Phalangium.

Listers *Naturgesch. d. Spinnen* v. Göze, S. 193.

Springspinnen.

Müller's *Linn. N. S. d. Ins.* B. II. S. 1059.

Krebsspinnen.

Onomat. Hist. nat. P. VI. p. 420. *Afterspinnen*.

Plinii *Hist. Nat. Lib. XI. Cap. 24. Lib. XXIX. C. 4.*

Phalangien werden diese Insekten wahrscheinlich wegen der langen Glieder ihrer Füsse, und *Afterspinnen* wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Spinnen genannt.

nannt. *Plinius*, der einen Unterschied zwischen unschädlichen und schädlichen Spinnen machte, belegte letztere mit diesem Namen. Andere alte und neuere Schriftsteller haben sie ebenfalls mit den Spinnen, vorzüglich aber mit den Solpugen verwechselt. Von letzteren unterscheiden sie sich jedoch dadurch, daß sie keinen abgesonderten Kopf haben, und die Augen und Fresswerkzeuge vorne auf der Brust führen, von ersteren aber durch ihre langen fußähnlichen Fressspitzen oder Palpen, und durch ihre weit längeren Beine.

Der Brustschild der Phalangien hat meistens eine runde, flache, fast nierenförmige Gestalt und einen schmalen Rand, der ihn, bis auf den Vordertheil, ganz umzieht. Letzterer ist der gewöhnliche Standort der vier Augen, wovon zwey dicht neben einander in der Mitte des Vorderrandes, und zwey mehr seitwärts stehen. Alle Phalangien haben Palpen und Maxillen, ohne Kinnladen und Lippen zu ihren Fresswerkzeugen. Die Palpen, wovon auf jeder Seite der Maxillen eine steht, sind lang, dick, dornig und bestehen aus vier Gliedern, wovon das erste kurz und dick, das zweyte und dritte sehr lang, das vierte wieder kürzer, dornicht und am Ende mit einer langen, scharfen, zugespitzten Klaue versehen ist. Viele haben diese Palpen blos für Fangwerkzeuge gehalten, sie scheinen aber ausserdem noch die Bestimmung der Palpen anderer Insekten zu haben, nemlich das Futter zum Munde zu führen, und es während des Fressens festzuhalten. Ihre verschiedene Länge, ihre glatte oder stachlichte Beschaffenheit bestimmt fast nur allein die einzelnen Arten dieses Geschlechts. Die Maxillen stehen in der Mitte vor dem Brustschilde neben einander, sind kurz, hornartig, zusammengedrückt und bilden am Ende eine scharfe Klaue. Hinter den Palpen folgen die zwey Vorderfüsse, oder *Herbsts* Cirren, welche von den sechs übrigen Füßen dadurch abweichen, daß sie ungleich dünner sind, und nur aus vier Gliedern bestehen, wovon das letzte überaus lang und aus einer Reihe allmählich an Grösse abnehmender, kleiner Glieder zusammengesetzt ist, wodurch es das Ansehen der Fühlhörner anderer Insekten erhält und wahrscheinlich auch ähnliche Bestimmung hat. Die hinter diesen Cirren am Brustschilde eingelenkten sechs wahren Füße bestehen aus mehreren Gliedern von ungleicher Grösse, wovon das Schienbein bey den meisten Arten noch einmal durch ein Gelenk getheilt ist. Der Hinterleib ist eyrund aus vielen Ringen zusammengesetzt, die sich übereinander schieben lassen.

Alle alten Schriftsteller haben den Biß der Phalangien für sehr gefährlich erklärt und ohngeachtet in den neuen Zeiten die Naturgeschichte dieser Insekten
noch

noch wenig Aufklärung erhalten hat, so berechtigt schon ihr ganzer Körperbau und die starken Waffen, womit sie versehen sind, sie für giftige Insekten zu halten, und die Erfahrungen die man von einigen Arten derselben hat, sie wirklich darunter zu zählen.

69. Der Bücherskorpion. Tab. VII. Fig. 20—23.

Phalangium cancroides abdomine obovato depresso, chelis laevibus, digitis pilosis. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2944. n. 4. Faun. Suec. 1968. Iter oel. 24. *Acarus cancroides*. — Habitat in Europae suffocatis, umbrosis, cistis, cellulis mephiticis, retrogradus, termitibus, acaris victitans, herbariis invisum, cutem quoque intrans, summo cum dolore papulam pisi magnitudine excitans.

Albin of Spiders p. 56. Tab. XXXVI. F. 131.
Aldrovandi de Insectis, p. 227.
Beckmanns Anfangsgr. d. Naturgesch. S. 118.
Berlinische Sammlungen, B. VII. S. 388. *Der deutsche Skorpion*.
Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 389. n. 2. *Der Bücherskorpion*.
Bonnetts Abhandl. aus der Insektologie, S. 352.
Clerk Aran. Suec. Pl. VI. Tab. X. F. 1. 2.
Cuvier Tableau élémentaire, p. 470. *le Scorpion des livres*.
Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 138. n. 2. Tab. XIX. Fig. 14. 15. *Faux-Sorpion d'Europe, der europäische Bastardskorpion*.
Eberhards Thiergeschichte. S. 225.
Fabricii Mant. ins. I. p. 348. n. 8. *Scorpio abdomine ecaudato ovato depresso fusco*. Spec. Ins. I. p. 551. n. 7. Syst. Ent. p. 400. n. 7.
Frisch's Beschreib. v. allerl. Ins. in Deutschl. Th. VIII. S. 3. Tab. I. *Die Ritzenspinne*.
Fuefslly's Verz. Schweiz. Ins. n. 1189.
Gleichen, Supplem. seines Neuesten aus dem Reiche der Pflanzen, Tab. VIII.
Geoffroy Hist. des Ins. II. p. 618. n. 1. *le Scorpion - araignée*.

Geschichte der Optik, S. 480. *Der Läusekönig*.
Gesneri, C. Historiae Insect. libellus, qui est de Scorpione, p. 3. *Vinula*.
Hannover. Magazin 1774. S. 1460.
Hooke, R. Micrographia, Tab. XXXIII. F. 2.
Leske's Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 487. n. 2.
Müller's Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1062. n. 4. Tab. XXX. F. 4. *Die Skorpionspinne*.
Mülleri Faun. Fridr. n. 815. Zool. Dan. Pr. n. 2293.
Naturforscher Stück III. S. 77. Der Bücherskorpion. Neuer Schauplatz d. Nat. I. 1028. VIII. 56.
Onomat. Hist. nat. P. I. 36. VI. 421. Die Skorpionspinne.
Rösel's Insektenbel. Th. III. S. 361. Tab. LXIV. *Der kleinste Skorpion*.
Scaliger, J. C. Exotericarum exercitationum libri quindec de subtilitate. Exercit. CXCVI.
Schaefferi Elem. Entom. Tab. XXXVIII. Icon. Ins. Ratisb. Tab. CXXXIV. F. 3.
Schwammerdam's Bib. d. Nat. S. 24. *Der kleinste in Holland wohnende Skorpion*.
Scopoli Entom. carniol. 1067.
Seba Thesaur. T. I. Tab. 70. F. 11. *Der allerkleinste in Holland wohnende Skorpion*.

Der Name Skorpion kommt diesem Insekte (Fig. 22 und 23.) sehr uneigentlich zu, da ihm Schwanz und Stachel fehlen, und es im Grunde nichts, als die Scheeren mit ihm gemein hat. Wegen seines Aufenthaltes in engen Ritzen haben es daher andere *Ritzenspinne* genannt, welche Benennung in soferne passender zu seyn scheint, da es wirklich unter die Afterspinnen oder Phalangien gehört. Doch ist es unter dem Namen *Bücherskorpion* am meisten bekannt. Wenn es seine

seine Scheeren zusammenzieht und an den Körper anschliesst, so lassen es Grösse und Gestalt beym flüchtigen Überblick sehr leicht mit einer Bettwanze verwechseln. Es hat aber nicht, wie diese Wanze, einen vom Brustschild deutlich abgesonderten Kopf; sondern Kopf und Brustschild bestehen zusammen aus vier Ringen, wovon der am Hinterleibe anschliessende, der breitste und längste ist, die drey übrigen aber nach vorne allmählich abnehmen. Am vordersten kürzten und abgerundeten Ring, sind nach *Degeer* die zwey Augen, als kleine erhabene, hellgelbliche Punkte sichtbar, in seiner Mitte aber ragen die zwey kurzen, behaarten Maxillen hervor. Zwischen dem ersten und zweyten Ringe sind zu beyden Seiten die langen, sechsgliedrichten Palpen eingelenkt, deren letztes und grösstes Glied den Scheeren unsres gewöhnlichen Flußkrebsses vollkommen ähnlich sieht, und nur darinnen von ihnen abweicht, daß, wie bey den Skorpionen, der äussere Finger der bewegliche ist. Der eyrunde, ziemlich breite und etwas platt gedruckte Hinterleib bestehet aus eilf Ringen, welche so übereinander liegen, daß die hervorstehenden Ecken der mittleren Ringe zu beyden Seiten einen gezähnten Rand bilden. Die unten am Brustschild eingelenkten acht Füsse sind sechsgliedricht und haben am Ende etwas behaarte Klauen. Wie der Krebs kriecht dieses Insekt sowohl vor- als rückwärts und seitwärts, mit ziemlicher Geschwindigkeit, und bewegt dabey seine beyden Palpen, wie zwey Sensen, immer hin und her. Es hat im ganzen die rothbraune Farbe der Wanzen, nur sind die acht Füsse heller und fallen mehr ins Gelbliche, die zwey Palpen aber sind hellroth. Das Weibchen ist dem Männchen vollkommen gleich, und unterscheidet sich blos durch die Dicke des Hinterleibes. Es legt nach der Begattung seine weissen, ins Grüne und Braune spielenden Eyer auf ein Häufchen (Fig. 20.) beysammen, welches unter dem Vergrößerungsglase (Fig. 21.) wie eine unreife Holbeere erscheint.

Das Vaterland dieser Bücherskorpione ist bey nahe ganz Europa, vorzüglich aber in südlichen Gegenden. Der Kälte ungewohnt, erstarren sie gleich in einer etwas rauhen Luft. Sie halten sich daher auch meistens in alten Büchern und andern bestaubten Papieren, in lange verschlossenen Schubladen und Schränken, in Holzritzen und unter den Rinden der Bäume verborgen, nähren sich daselbst von Staubläusen und andern kleinen Insekten, die sie mit ihren Palpenscheeren fangen und zum Munde führen. Gelangen sie an den menschlichen Körper, so pflegen sie bisweilen in die Haut einzubohren und Pusteln von beträchtlicher Grösse mit heftigem Schmerz des ganzen Gliedes zu veranlassen.

70. Die Milbenspinne. Tab. VIII. Fig. 1—3.

Phalangium acaroides abdomine cylindrico, chelis laevibus, capite appendiculato. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2944. n. 5. — Habitat in Americae meridionalis suffocatis, morsu periculoso, cancroïdi simillimum, sed duplo majus, flavescens, chelis ovatis.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Gütze, B. VII. S. 137. n. 1. Tab. XLII. F. 1—5. *Chelifer americanus*, *Faux-Scorpion d'Amerique*, der amerikanische Bastardskorpion.

Fabricii Mant. ins. I. p. 348. n. 9. Spec. Ins. I. p. 552. n. 8.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 10627 n. 5. Die Milbenspinne.

Onomat. Hist. nat. P. VI. p. 420. Die Milbenspinne.

Mit dem Bücherskorpione kommt gegenwärtiges Insekt (Fig. 1. 2.) der Gestalt nach sehr überein, nur ist es noch einmal so groß, als ersterer, nemlich vier Linien lang und beynahe anderthalb Linien breit. Sein vom Brustschilde durch einen leichten Quereinschnitt unterschiedener Kopf, hat nach Degeers Beschreibung vorne zwey kleine gezähnelte Sägen oder Maulscheeren (Fig. 3.), an den oben convexen Brustschilde selbst aber, sollen vorne die zwey langen, aus fünf Gliedern bestehenden, krebsscheerenförmigen Palpen artikulirt seyn, deren innerer Finger beweglich, der äussere hingegen unbeweglich ist. Das nächste Glied an der sehr bauchigten Scheere (Fig. 2.) hat an der Innenseite einen dicken konischen Höcker, alle Glieder aber sind mit Haaren besetzt. Sowohl diese Palpen, als Kopf und Brustschild sind rothbraun, der lange walzenförmige Hinterleib aber ockergelb. Letzterer besteht aus elf Ringen, wovon jeder oben und unten mit einer hornartigen, lichtgelberen Querbinde eingefasst ist, welche alle durch eine längs der Mitte des Rückens und zwey längs den beyden Seiten des Hinterleibes fortlaufenden Binden unterbrochen werden. An den abgeründeten Ende des Hinterleibes sieht man noch eine kurze runzlichte Röhre, welche vielleicht der After ist. Die acht Füße aber sind von denen der vorhergehenden Art wenig verschieden. Man trifft diese Phalangien vorzüglich in den mittägigen Gegenden von Amerika an, wo sie wegen ihres gefährlichen Bisses bekannt sind.

71. Das Phalangium mit halbmondförmigem Brustschilde.

Tab. VIII. Fig. 4. 5. und Tab. XV. Fig. 4—6.

Phalangium lunatum brachiis longissimis apice spinosis, thorace reniformi. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2945. n. 14. — Habitat in America meridionali.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 347. n. 10. Spec. ins. I. p. 549. n. 9. Entomol. emendata II. p. 432. n. 3.

Tarantula palpis longissimis apice spinosis, thorace reniformi.

Herbsts

Herbsts Natursyst. d. ungefl. Ins. Heft I. S. 77.
Tab. III und VI. *Phalangium lunatum*.

Listers Naturgesch. der Spinnen, S. 222. Die
surinamische Skorpionspinne mit halbmondförmigen Brust-
schild und den längsten Fangarmen.

Pallas Spicilegia Zoologica Fascicul. IX. p. 35.
Tab. III. F. 5. 6. *Phalangium lunatum*, nach des Verfas-
sers eigener Uebersetzung Samml. IX. S. 46. Die lang-
armige Skorpionspinne mit halbmondförmigen Brustschild.
Sebae Thesaur. Tom. IV. Tab. 99. F. 13. Species
aranei perquam rara.

Die Grösse dieses Insekts scheint sehr verschieden zu seyn und läßt sich daher nicht genau angeben. Pallas, der wahrscheinlich das Männchen (Tab. VIII. F. 4.) abbilden liess, giebt die Länge des ganzen Körpers von den Maxillen bis ans Ende des Hinterleibes zu elf Linien an, nach Herbsts Abbildung (Tab. XV. F. 4.) aber, welche wahrscheinlich das Weibchen vorstellt, beträgt sie wohl achtzehn Linien. Das Brustschild hat eine mehr halbmondförmige, als nierenförmige Gestalt, ist nach Pallas sechs und eine Drittellinie breit und drey und eine halbe Linie lang, nach Herbst acht Linien breit und fünf Linien lang. An seinem Vorderrande ist es gerade abgeschnitten, am Hinterrand aber concav. Von oben ist es etwas platt gedruckt, doch so, daß es an den Seiten abhängig abläuft. Seine Oberfläche hat verschiedene Erhöhungen und Vertiefungen, die sich nach hinten wie Strahlen ausbreiten. Auch ist sie, wie der schmale Saum, der den ganzen Brustschild umzieht, überall mit kleinen scharfen Körnern besät. Der Vordertheil dieses Brustschilds vertritt zugleich die Stelle des Kopfs. Er hat nemlich in der Mitte seines Vorderrandes ein, mit einer Vertiefung umzogenes Hügelchen (Tab. XV. Fig. 4. a.), welches mit zwey kleinen, gelblichen Augen besetzt ist. Nicht weit von diesem Hügelchen rückwärts und mehr zur Seite stehen aber zwey grössere Augen (b. b.) auf kleinen warzigen Erhöhungen. Ausser diesen vier Augen enthält der Vordertheil des Brustschilds noch die Einlenkungen der Maxillen. (Tab. XV. Fig. 4. c. c.), welche klauenförmig, wie bey den Spinnen sind, und wovon eine hier (Fig. 5. a. b. c.) vergrössert und von der Seite vorgestellt ist. Jede dieser Maxillen hat ein kurzes Einlenkungsglied (a.), auf welches das zweyte, weit längere, hinten bauchichte, vorne schmälere, überall gekörnte und an der untern Seite mit fuchsrothen Haaren besetzte Glied (b.) folgt. Dieses enthält, ausser einer gezähnten Falz, in welche sich das letzte Glied, wie die Klinge eines Messers einlegen kann, zugleich die Einlenkung dieses letzten klauenförmigen, an der concaven Seite gezähnten, und oben und unten mit rothen Haaren besetzten Gliedes (c.). Zwischen beyden Maxillen oder Maulzangen steht noch am Brustschilde ein langer spitziger Stachel (Tab. VIII. Fig. 5. a.), welcher ähnliche Bestimmung, wie die Saugstachellippe der Solpugen zu haben scheint, nemlich Gift

in

in die mit den Maxillen gebissene oder geschlagene Wunde zu flößen. Die Beute zu fangen, festzuhalten und den Maxillen zu nähern, sind zu beyden Seiten derselben die Palpen (Tab. XV. Fig. 4. *d. d.*) angebracht, welche *Pallas* Fangarme nennt. Sie sind ein und dreyssig Linien lang und überaus stark, entstehen am Brustschilde mit einem kurzen, dicken Einlenkungsgliede (Fig. 5. *d.*), welches sich nach innen in eine abgerundete, häutige und behaarte Spitze (*e.*) verlängert. Auf dieses folgt das zweyte, etwas längere, ebenfalls dicke, stark gekörnte, an den scharfen Rändern aber gezähnte Glied (*f.*), an welches das dritte (*g.*) artikulirt ist, welches eine Länge von anderthalb Zoll, eine cylindrische, etwas gebogene Form, und eine rauhe gekörnte Oberfläche, wie das vierte und letzte Glied, hat. Dieses ist funfzehn Linien lang, gerade, am Ende sehr dick und mit verschiedenen Spitzen oder Dornen versehen (Fig. 6.). Zwey dieser hornartigen, stark gekrümmten Dornen (*a. a.*) stehen unterwärts, zwey viel längere (*b. b.*) oberwärts und ein mehr zusammengesetzter auswärts. Lezterer besteht aus einem cylindrischen Theil (*c.*), der einen dornichten Anhang (*d.*) an der Wurzel hat, und aus einer klauenförmigen Spitze (*e.*), die das Insekt wahrscheinlich einschlagen kann.

Um den dritten Theil länger als die Palpen, sind die hinter denselben befindlichen fühlhornförmigen Füße oder *Herbsts* Cirren (Tab. XV. Fig. 4. *e. e. e. e.*), deren drey ersten Glieder, mit dem drey ersten der Palpen, der Bildung nach sehr übereinkommen, nur daß sie viel dünner sind, deren leztes und längstes Glied aber aus fünf, unmerklich in einander übergehenden Abtheilungen von immer kleiner werdenden Gliedern besteht, und höchst wahrscheinlich die Stelle der Fühlhörner vertritt. Die sechs Lauffüße haben ihre Artikulationen in der Mitte des Brustschilds mit kurzen konischen Gelenkstücken, sehr dicke gekörnte Schenkel, zwey Klauen am Fußblatte, und eine Länge von zwey und zwanzig bis sechs und zwanzig Linien. Der Hinterleib ist länglichtrund, blasenförmig aufgetrieben, nach *Pallas* nur sechs und ein viertel, nach *Herbst* aber eilf Linien lang. Ersterer giebt ihm nur acht, letzterer zehn Ringe. Hiervon machen die ersten beyden, überaus schmalen und kurzen, gleichsam den Stiel aus, durch welchen der Hinterleib mit dem Brustschilde zusammen hängt. Auf jedem der sechs mittleren Ringe stehen nach *Pallas* zwey kleine Grübchen, nach *Herbst* aber decken den mittleren Theil aller Ringe, so wohl von der Rücken- als Bauchseite, zwey hornartige Platten, welche sich um den After oben und unten vereinigen. Das Ende des Hinterleibes ist in dem Exemplar (Tab. VIII. Fig. 4.), welches *Pallas* abbilden liefs, schmal und abgerundet, am *Herbstischen* Exemplar aber (Fig. XV. 4.) mit einem kleinen röh-

röhrenförmigen Theile (f.) versehen, der wahrscheinlich der Eyergang des Weibchens ist. Jener meldet, daß die Farbe der Maxillen, Palpen und des Brustschilds dunkelbraun, die des Hinterleibes blaßgrau, die der Füße gelbgrau, und die Verbindungshäute zwischen den ersten Gelenken der Palpen, Fühlarme und Füße milchweiß sind. Nach *Herbst* aber haben alle diese Theile eine schmutzibraune, ins schwärzliche fallende, und die Verbindungshäute eine rothgelbe Farbe. Doch glaubt er, daß die Farbe im Leben lebhafter sey, und also mehr der Beschreibung des *Pallas* gleich komme.

Surinam ist das Vaterland dieses grossen, furchtbaren Insekts, von dessen Lebensart und Nachtheil uns nichts weiter bekannt ist, dessen Verwundungen *Herbst* aber mit Recht, wegen seiner grossen und starken Waffen, für sehr gefährlich, ja wohl für tödtlich hält. Ähnliche Beschaffenheit mag es auch mit dem Insekte haben, welches Göze in seiner Übersetzung von *Listers* Naturgeschichte der Spinnen (Tab. V. Fig. 11.) unter dem Namen *Phalangium cancriforme*, die *Krebsscheere*, nach *Albin* (*natural History of Spiders* Tab. XXXVI. Fig. 178.) hat abbilden lassen, und welches ich, wegen der von andern Phalangien abweichenden Bildung seiner krebsscheerenförmigen, und am ganzen innern und untern Rande mit langen und spitzigen Zähnen besetzten Palpen (Tab. VIII. Fig. 11.) ebenfalls aufgenommen habe.

Spinnen überhaupt.

Abregé de l'histoire des Insectes à Paris 1764. p. 139.
 Albin, E. *natural history of the Spiders*, Lond. 1736. c. Tab. aen. 4. maj.
 Amoureux Notice des Insectes venim. p. 54. 205.
 Arthaud, sur les effets de la piquere de l'araignée - Crabe des Antilles, Journ. de Phys. T. XXX.
 Baker, H. *the Microscope made Easy*, Lond. 8. 1769. Chap. XXV. p. 196.
 Berner, G. E. de Araneae punctura, ejusque medela. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. obs. 49. p. 131.
 Bibliothèque universelle, Tom. II. p. 266. La liqueur d'une araignée fait perdre la vue.
 Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 389. n. 81.
 Boccone de Araneis, Tarantulis, P. I. Vol. I. p. 250.
 Bomare Dictionnaire des Animaux, I. p. 338.
 Borelli, P. Historiar. et Observ. Cent. I. Obs. 81. Cent. III. Obs. 19. Cent. IV. Obs. 56.
 Boyle, R. Specificor. remed. c. corpusculari philosophia concordia Lond. 1686. 12. Tentam. Physiol. p. 38.

Breslauer Sammlungen 1725. April. S. 416. von Spinnenfressern.
 Brückmann, F. E. Epistolar. itinerar. Centur. II. Ep. IX. p. 69.
 Buffons allgemeine Naturgesch. übers. v. Martini Th. VI. S. 314. von Spinnenfressern, Th. VII. S. 171.
 Burel von carbunkelartigen Zufällen im Journal des découvertes pour Fourcroy, Tom. XXX.
 Camerarius, J. R. Aranei venenati indeprehensavis. Syll. Memorabil. Cent. IX. P. 34. p. 665.
 Clerk, C. Schwenska Spindlar s. aranei suecici figuris et descriptionibus illustrati, Stockh. 1757. 4.
 Clusii, C. Exotica, p. 353. Aranei mali citrei magnitudine, admodum virulenti.
 Commentarii Lips. Vol. IV. p. 229. n. 31. Araneus ingens venenata testacea.
 Commercium litt. Norimb. 1734. p. 318 und 1735. p. 23.
 Crüger, D. de veneno Araneae Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. Obs. 66. p. 144.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 467.

- Degeer's Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, VII. S. 72.
- Derham's Physikotheologie, S. 399. vom Gifte der Spinnen.
- Dictionnaire raisonne et universel des Animaux*, 4. Paris 1759. T. I. p. 157. Gift der Spinne.
- Encyclopedie ökonomique*. Tom. II. p. 147. Venin d'Araignée, 148 Remedes contre les Piquures des Araignées.
- Fairfax, N. Toads and Spiders innoxious and the latter tinge water of a sky colour. Phil. Trans. n. 21. p. 391. Badd. I. p. 71.
- Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 272.
- Florentinus, Nic. Sermon. IV. Tr. IV. C. 23.
- Fortis (Abbate Alberto) Reise in Dalmatien, Bern 1776. Th. II. S. 40. von einer schädlichen Spinne, Pauk.
- Fourcroy *medecine éclairée par les sciences physiques*, T. III. 1792. p. 11.
- Frenzel, im Wittenbergischen Wochenbl. 1791. S. 259.
- Gazette Salut*. 1768. n. 16. p. 127.
- Geoffroy Hist. des Ins. de Paris, T. II. p. 629.
- Göze Geschichte schädlicher Ins. S. 81.
- Hannemann, J. L. Araneorum innoxius esus et venenum Eph. N. C. Dec. II. an. 5. obs. 116. p. 231. et Dec. III. an. 3. obs. 55. p. 64.
- Hannoversches Magazin* 1770. n. 33. p. 526. wiefern die Spinnen giftig und schädlich sind?
- Herbst's Natursyst. d. ungeflügelten Ins. Heft I. S. 48.
- Harvey de generatione animal. Exerc. 57.
- Heucher, J. H. Diss. de Araneo homini pernicioso et salutari. Resp. Heusinger. Wittenb. 1691 et 1701. 4.
- Histoire générale des Voyages*, ou nouvelle Collection de toutes les relations de Voyages par mer et par terre, Tom. VIII. Liv. I. p. 548. oder Allgem. Histor. der Reisen zu Wasser und zu Land, VIII. S. 515. Le *Democulo*, araignée terrible.
- Hombert's Anmerk. über die Spinnen im I. Band des alten Hamb. Mag. S. 53. F. 1, 2, 3, 5, 6. Spinnenzangen.
- Journal Encyclop.* 1768. Tom. II. p. 128. 1769. Tom. VI. p. 286. de Arachnophagis.
- Kundmann's, J. Chr. Seltenheiten der Natur und Kunst, Fol. Brefs. 1737.
- Lamaron (Chevalier de) im Journal de Physiq. Liv. XXIV. Part. I. Janvier 1784. p. 17.
- Leeuwenhoek Contin. Arcanor. Nat. detector. p. 335. F. 3. Das Giftloch in der Fresszange.
- Linnaei Amoenit. Acad. T. III. p. 344.
- Lesser, F. C. Insecto-theologia, Francof. et Lips. 1740.
- Listers, M. Naturgesch. der Spinnen überhaupt und der Engländischen insbesondere, übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von Martini und mit neuen Zusätzen versehen von Göze, Quedlinb. 1778. 8. maj. mit 5 Kupfertafeln, S. 266. *Die Kurakavische Spinne*. Mercurialis de Venenis, Lib. II. Cap. 5.
- Moufetti Theatr. Ins. p. 227. 237.
- Müller's Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1066.
- Müller's, D. A. L. Suppl. und Regist. Band, S. 342. n. 49. *Der Tollmacher*.
- Naturforscher* Stück III. S. 269. Stück IV. S. 223. Die Fühlhörner sind die Geschlechtstheile der Spinnen, *Neue Berlin. Mannigfaltigkeiten*, Jahrg. III. S. 236. Die Fühlhörner sind die Geschlechtstheile der Spinnen, *Onomat. Hist. Nat.* Pars I. p. 661.
- Optik*, vollständiges praktisches Werk von der ganzen Optik. Lübeck und Altona 1758. 4. S. 483. mikroskopische Versuche mit allen merkwürdigen Theilen der Spinnen.
- Panarolus araneorum morsus lethalis. *Fatrológismor*. Pent. I. p. 27.
- Plinii Hist. nat. Lib. VIII. Cap. XXIV. et L. XL. C. XXIV.
- Preusius, Eph. Nat. Cur. Cent. III et IV. Obs. 15.
- Quatremere-Disjonval Araneologie oder Naturges. der Spinnen nach den neuesten bis jetzt unbekannten Entdeckungen vorzüglich in Rücksicht auf die daraus hergeleitete Angabe atmosphärischer Veränderungen, Frankf. 1798.
- Reichs-Anzeiger* vom Jahre 1800. n. 141. S. 1818.
- Reiselius, in Eph. N. C. Dec. II. An. IV. Obs. 87. p. 176. von einem tödtlichen Spinnenstich.
- Rhodii Observ. Cent. III. Obs. 90.
- Riedlinus Linn. Med. A. I. Jun. Obs. 3.
- Robie Th. de Araneae ictu cum magnis inde symptomatibus, Phil. Trans. n. 382.
- Rösels Insektenbelust. IV. S. 247. Kleemanns Beytr. Th. I. S. 87. 88.
- Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande*, 8. Götting. Th. III. S. 134. von einer giftigen Spinne in den Wegen in Peru.
- Schlözers, A. L. neue Erdbeschr. v. ganz Amerika, aus dem Engl. Götting. 1777. B. III. Kap. II. Absch. II. S. 279. §. 19.
- Scholzius in Eph. N. C. Dec. I. An. II. Obs. 10. vom unschädlichen Genuß der Spinnen.
- Schulze, Godofr. de Ictu araneae, Eph. N. C. Dec. I. An. 2. Obs. 10. Dec. III. an. 2. Obs. 73.
- Schwenkfeld Theriotr. Silesiae. Lignic. 1603. 4. p. 508. Aranei venenum. p. 509. Aranei morsus. Schwammerdamm's Bibel der Nat. S. 22.
- Segerus in Eph. N. C. Dec. I. ann. IV. obs. 85.
- Sennerti Opera Tom. III. Cap. 24. p. 656.
- Spielmanni Diss. de Animal. noc. Als. p. 43.
- Sulzers Geschichte der Insekten, S. 248.
- Tourner, *Maladies de la Peau*, Tom. II. p. 292.

Unzers Arzt, Th. III. S. 221. Th. IV. S. 505.
 Spinnenfresser, medic. Handb. 1789. S. 646.
 Velschius, G. H. de punctura vespae et araneae,

praesentaneo veneno curata, Eph. N. C. Dec. I. ann.
 8. obs. 35. p. 65.

Wiel (Stalpart van der) de Araneis comesis, in
 obs. Cent. posterioris, P. I. obs. 22. Leidae 1727. 8vo.

Ich begnüge mich, hier blos diejenigen Schriften angeführt zu haben, in welchen die Naturgeschichte der Spinnen überhaupt oder einzelne Theile derselben, vorzüglich gut abgehandelt, und welche besonders in Rücksicht der Schädlichkeit und Unschädlichkeit dieser Insekten, und in Rücksicht einiger minder bekannten und gefährlichen ausländischen Arten merkwürdig sind. Ein ausführliches Verzeichniß der meisten Schriftsteller, welche von den Spinnen gehandelt haben, findet man in der Gözischen Ausgabe von Listers Naturgeschichte der Spinnen.

Dieses überaus zahlreiche, über den ganzen Erdboden verbreitete und die mannigfaltigsten Arten befassende Insektengeschlecht, kannten die alten Griechen unter den Namen *αράχνης*, oder *αράχνη*, die alten Römer unter den Namen *Aranea* oder *Araneus*. Die Teutschen nennen die Spinne auch *Kanker*, die Franzosen *araignée*, die Engländer *Spider*, die Italiäner *Ragni*, die Schweden *Spinael*, die Holländer *Spinnekop*. Alle Spinnen kommen darinnen mit einander überein, daß sie aus zwey Haupttheilen bestehen, wovon der vordere und härtere, Kopf und Brustschild vereinigt enthält, und mit dem hintern und weicheren durch einen Verbindungskanal oder Stiel zusammenhängt. Auf dem vorderen Theil des Brustschilds sind die acht Augen angebracht, welche nicht, wie bey den meisten Insekten, netzförmig, oder mit Facetten versehen sind; sondern blos durch die grössere Anzahl den Mangel der Beweglichkeit ersetzen. Ihre Grösse, Farbe und Stellung sind überaus verschieden und letztere bestimmt vorzüglich den Unterschied der Arten. Immer liegen sie auf und vor der Stirne so vertheilt, daß sie zu gleicher Zeit nach allen Seiten hinsehen können. Die Fresswerkzeuge, ebenfalls am vorderen Theile des Brustschilds, bestehen aus zwey starken Maxillen, welche auch *Fänger* genannt werden. Diese haben die Form zweyer, mit der Spitze nach unten gekehrter Haken oder Klauen, welche von oben nach unten, und von der rechten zur linken beweglich, inwendig hohl und an der Spitze mit einer fast unsichtbaren Öffnung versehen sind, wodurch die Spinne einen sehr scharfen, giftigen Saft in die Wunde fliessen läßt. Sie sind überhaupt die Werkzeuge, womit sie ihre Beute fängt, tödtet und aussaugt, und welche sie ausser der Zeit ihres Gebrauchs einzieht, oder, wie die Klinge eines Taschenmessers, auf dem Grundtheil der Fänger einschlägt. Vor den Augen und zur Seite der Maxillen stehen die

die aus mehreren Gliedern zusammengesetzten Fressspitzen oder Palpen. Sie sind bey dem Weibchen länger als bey dem Männchen, und endigen sich bey letzterem in einen runden, knopfförmigen Theil, aus welchem im Augenblicke der Begattung die männlichen Geschlechtstheile hervortreten, und sich der vorne und unten am weiblichen Brustschilde befindlichen Spalte nähern, welche sich zu gleicher Zeit erweitert. Ausser diesen Eigenheiten in Rücksicht der Lage der Geschlechtstheile, zeichnen sich die Spinnen auch noch durch ihre Spinnwarzen aus. Sie liegen fünf bis sechs an der Zahl, am Ende des Hinterleibes und bestehen aus vielen kleineren Wärzchen, deren Spinnöffnungen sie willkürlich öffnen und verschliessen können. Ersteres geschieht, wenn sie anfangen zu spinnen, wo alsdann ein klebrichter Saft aus jenen Öffnungen fließt, der sich an der Luft zu einem Faden verdickt. Hat dieser Faden eine bestimmte Länge erreicht, so zieht die Spinne die Spinnöffnungen wieder zusammen und bleibt am Ende des Fadens hängen. Die verschiedene Entfernung, in welcher sie die Längsfäden befestiget und in welcher sie diese wieder mit Quersfäden durchzieht, bestimmt die abweichende Gestalt und Grösse des Netzes jeder Spinnenart, dessen kunstvolles Gewebe eben so viele Bewunderung verdient, als der Fleiß, welchen sie darauf verwendet. Unten am Brustschilde sind die acht Füße eingelenkt, wovon jeder aus dem Schenkel, dem Schienbeine und dem Fußblatte besteht, letzteres aber wieder mit zwey kleinen krummen Krallen versehen ist, womit die Spinne sich anhält, wenn sie auf ihrem Gewebe hin und her läuft.

Die Nahrung der Spinnen sind allerley Insekten, vorzüglich die Fliegen. Auch sind sie so grausam, sich, in Ermangelung anderer Beute, unter einander selbst aufzufressen.

Die Alten, welchen noch *Linneé* beypflichtete, hielten das ganze Spinnengeschlecht für giftig und gingen sogar so weit in ihrer Behauptung, daß sie dem Gifte jeder Spinnenart besondere Zufälle zuschrieben, die sie vom leichtesten Hautjucken durch alle Grade des Schmerzes, bis zu den heftigsten Convulsionen und endlich zur gänzlichen Fühllosigkeit und zum Absterben der Theile steigen liessen. Das Gegentheil nam, wie gewöhnlich, die Extremitätenliebe der Neuern an. Wie kommt es, sagten sie, daß die für giftig anerkannten Spinnen, bey der Menge, in welcher sie sich überall in der Nachbarschaft des Menschen aufhalten, dennoch so selten Beyspiele ihrer Schädlichkeit liefern? daß *Quatremere - Disjonval*, der in seinem Gefängnisse beständig mit Spinnen umgeben war, und sie beständig beobachtete, nichts von irgend einem Nachtheile erwähnt, den sie ihm zugefügt hät-

hätten? daß das Gelüsten schwangerer Weiber, die Spinnen sogar zu einen wohlschmeckenden, und unschädlichen Leckerbissen gemacht hat, und daß es, nach *Clerk, Borcellus, Hannemann, Fairfax, Frenzel, Redi, Rhode, Riedlin, Rösel, Robert Boyle, Scholz, Seger* u. a. m., so viele Menschen gab, welche leidenschaftlich, oder blos zur Befriedigung der Neugierde anderer, Spinnen assen, welche sich sonst mit ihnen beschäftigten, sie sogar zum Zorne reizten, und sich absichtlich von ihnen beissen liessen, ohne den geringsten Nachtheil davon gewahr worden zu seyn? Sicher sind also alle Geschichten von gefährlichen Spinnenverletzungen fabelhaft, oder beruhen auf zufälligen Nebenumständen, die die Spinnen ohne Grund in einen so üblen Verdacht gebracht haben!

Es ist zwar nicht zu läugnen, daß angebohrner Ekel und Abscheu, vorzüglich beym weiblichen Geschlechte, und von Jugend auf genährtes und durch den Anblick eines an sich häßlichen Insekts bekräftigtes Vorurtheil, viel zu den Übertreibungen der Alten von der Schädlichkeit und Gefahr des Spinnengifts beygetragen haben mögen; allein die von *Kleemann* entdeckten Giftöffnungen an den Fängern der gemeinsten und für völlig unschädlich gehaltenen Haus- und Winkelspinnen, und der vorzüglich von *Rösel* für ganz unschuldig erklärten Kreutzspinnen, lassen wohl nicht zweifeln, daß sie ähnliche Bestimmung, wie die Giftöffnungen an den Fängern der grossen ausländischen und offenbar schädlichen und giftigen Spinnen, haben müssen, wenn auch *Harvey's* Versuch mit einer an jenen Fängern geriebenen und in die Haut gestochenen Nadel, wirklich so zweydeutig wäre, als *Göze* wähnt, welches aber nach den Erfahrungen der Ärzte der Fall nicht ist: Denn nie erhebt sich auf einen leichten Nadelstich an der gestochenen Stelle plötzlich eine kleine Beule, welche sich gleich entzündet, roth und heiss wird, wie es auf *Harvey's* Versuch geschehen ist. Übrigens läßt auch die eigenthümliche Beschaffenheit des Gifts, die Art und Grösse der Spinnen, die Beschaffenheit der verletzten Stelle, die Konstitution des Subjekts, das Klima, die Witterung etc. ohne Schwierigkeit die Einwendungen der Gegner beseitigen.

Es giebt Gifte, welche mehr Wirkung haben, wenn sie durch die Haut beygebracht, als wenn sie innerlich genommen werden. Dies ist z. B. der Fall beym Viperngifte und kann es eben so wohl beym Gifte der Spinnen und Skorpionen seyn; denn auch von dem unschädlichen Genuß der letzteren findet man im XV. Theil der Abh. d. kais. Akad. der Naturf. S. 32. ein Beyspiel. Der Speichel, der alle inneren Theile des menschlichen Körpers überziehende Schleim, verhindern die Einwirkung eines minder corrosiven Giftes und die verdauenden Säfte stüm-

pfen es vollends ab und machen es völlig unkräftig, ehe es ins Blut gelangt. Schwielige und solche Stellen der Fetthaut, wo die Gefässe nicht blofs liegen und wo also der Giftsaft, welcher unmittelbar ins Blut kommen muß, wenn er seine Wirkung leisten soll, eben so wohl abgestumpft wird, müssen ähnliche Erscheinungen liefern. Hierzu kommt noch die grössere oder geringere Reizbarkeit der Subjekte, welche es erklärbar macht, warum Personen von dem Weine, in welchen Spinnen gefallen oder eingeweicht waren, vergiftet worden sind, da im Gegentheil die bekannten Spinnenfresser diese Insekten sehr gut vertragen konnten.

Auch auf die Grösse des Insekts selbst, scheint sehr viel anzukommen. Eine kleine Spinne welche überaus feine Fänger hat und den Giftsaft in überaus kleiner Quantität bey sich führt, wird vielleicht so wenig schaden, als eine Stubenfliege. Was würde aber letztere nicht vollbringen können, wenn sie hundert mal grösser wäre, und was muß nicht erst ein Insekt in gleichem Verhältnisse der Grösse ausrichten können, welches so grosse und spitzige Maxillen, wie die grösseren Spinnenarten, und eben so grosse Giftbehältnisse hat? Nicht weniger wichtig ist bey Spinnenverletzungen das Klima. Dieses macht, daß die Spinnen der meisten europäischen Länder äusserst selten schwere Zufälle hervorbringen, wie *Amoureux* sogar von den Spinnen des mittägigen Frankreichs erzählt, deren Biß nur bisweilen eine unterlaufene Geschwulst mit kleinen, eine scharfe Feuchtigkeit enthaltenden Pusteln bewirkt. Anders verhält es sich aber mit den grossen Spinnen des warmen Italiens und der ausser europäischen heissen Länder, mit der *Spithamea*, der *Avicularia*, der schwarzen Spinne von Madagaskar, auf deren Biß man sogleich ohnmächtig wird, mit den brasilianischen Spinnen, der *Tunga*, den *Loup* und *Nhamduguasu*, den grossen Feldspinnen aller heissen Klimate überhaupt, welche nach *Fermins* Versicherung alle tödtlich verletzen können.

Was das heisse Klima der übrigen Welttheile thut, bewirkt oft unter einem gemässigten Himmelsstrich eine ungewöhnlich warme Witterung. So zeigten die öffentlichen Blätter Italiens 1789 an, daß eine Spinne grosse Verheerungen in der Gegend von *Volterra* in Toskana anrichtete, welche die Schnitter auf dem Felde verletzte, heftige Schmerzen und convulsivische Bewegungen in allen Gliedern veranlasste, und eben so meldete *Lemanon* daß gewöhnlich unschädliche Spinnen, bey der im Monath Junius 1782 ausserordentlich gewesenem Hitze und Dürre in der Provence, durch ihren Biß schwere Krankheiten hervorbrachten, die mit denjenigen, welche der Tarantelbiß zu veranlassen pflegt, viele Ähnlichkeit hatten. Übrigens verdienen die Beyspiele, welche *Berner*, *Crüger*, *Florentinus*,

Fourcroy, Lister, Mercurialis, Preus, Reise, Schulze, Sennert und viele andere Schriftsteller von den üblen, ja tödtlichen Folgen des Gifts unserer gemeinen Spinnen erzehlen, eben sowohl Glauben, als die ihrer Gegner. Ich begnüge mich nur einige Beyspiele dieser Art anzuführen. Ein Arzt, der zugleich Wundarzt und gründlicher Insektenkenner war, erzählte unserem berühmten Entomologen, Herrn *Herbst*, er sey einst von einer kleinen Spinne, die er beym Ankleiden der blossen Haut nahe brachte, so heftig gebissen worden, daß er, in der Meinung, es sey irgend ein anderes Insekt, dieselbe durch einen Schlag zertrümmerte, aber doch noch zu seiner Verwunderung für eine Spinne erkannte. Die Wunde verursachte ihm eine dicke, sehr schmerzhaftige Beule, mit deren Heilung er lange Zeit zubrachte. Eben so liest man über die Giftigkeit der *Kreuzspinne* im *Reichsanzeiger* eine unbezweifelte Erfahrung. „Ich hatte, heisst es in demselben, einst ein Männchen aus der Gattung der Kreutzspinnen von vorzüglicher Grösse, mehrere Tage hinter einander, durch vieles Hin- und Herschleppen in andere Gespinnste, gereizt, ihr Gift, wenn sie dessen hätte (denn ich war damals sehr vom Gegentheile überzeugt) auf mich auszuspritzen. Endlich aber riß ihr jedoch plötzlich die Geduld und sie bespritzte mir mit einem ganz weissen milchartigen Saft die ganze linke Hand in so reichlichem Masse, daß ich, nachdem ich die Hand ziemlich nachlässig an meinen Kleidern abgewischt hatte, für gut befand, mich zurückzuziehen. Die Hand war, mir unbewußt, fast zweymal so stark angeschwollen, als in ihrem natürlichen Zustande. Ich hatte jedoch ganz und gar keinen Schmerz empfunden, bis mich endlich, nach Verlauf einer halben Viertelstunde, jemand auf die äusserst starke Geschwulst aufmerksam machte. Sie vergieng jedoch, so viel mir noch erinnerlich ist, von sich selbst und ohne allen Schmerz wieder. — Die Erfahrung selbst ist ganz sicher.“

Eine nicht minder glaubwürdige Beobachtung wurde dem ehemaligen Professor *Spielmann* in Strasburg von *Corvinus* mitgetheilt. Es kroch nemlich eine schwarze Spinne über den Unterleib und die Brust eines Soldaten und sogleich erhob sich auf dem ganzen Weg, den sie genommen hatte, das Oberhäutchen in eine Blase und der Soldat bekam Hitze und Beklemmung der Brust. Aus der aufgeschnittenen Blase floss eine überaus scharfe Lymphe, welche die Haut, worüber sie abfloss, so angriff, daß sie in Eiterung gieng und kaum in zwey Wochen geheilt werden konnte. Ferner führt *Tourner* ein Beyspiel an, daß die Spinnen einen schädlichen Geruch verbreiten, wenn sie verbrannt werden, und daß starke Geschwulst und Entzündung mit andern üblen Zufällen entstehen, wenn man

man eine Spinne an der Flamme zerplatzen läßt, und ihr Saft ins Gesicht spritzt. *Boyle* aber versichert, daß ein Mensch, dem eine Spinne ein kleines Tröpfchen einer gewissen Feuchtigkeit ins Auge fallen lassen, ohne Empfindung einiger Schmerzen, auf der Stelle blind geworden sey. Selbst im Munde äusserte, gegen die bekannten unschädlichen Versuche der Spinnenfresser, nach *Crügers* Erfahrung eine Spinne ihre Giftigkeit, und es schwoll einem Knaben von vier Jahren die bald mit Blasen bedeckte Zunge auf, dem sein jüngerer Bruder eine Spinne in den Mund gesteckt hatte.

Auch von der Tödtlichkeit des Spinnengifts kommen bey den Schriftstellern Beyspiele vor. So erzehlt *Reisel*, daß ein starker Mann ein Kätzeln am Halse spürte und, als er an denselben griff, eine dahin gefallene Spinne zwischen die Finger bekam. Er empfand hierauf bald Brennen und Stechen, achtete aber beydes nicht, bis den dritten Tag eine Entzündung am Halse erfolgte. Diese wurde den vierten schon von Entzündung der Brust mit Ohnmacht begleitet, worauf der Kranke am sechsten Tage verschied. Eben so gedenkt *Burel* verschiedener Fälle von Spinnenstichen, die in wenig Stunden, unter kalten Schweissen und Ohnmachten, den Tod brachten. An der Stelle des Stichs fand man immer einen schwarzen, brandigen Fleck, der einige Ähnlichkeit mit einem Carbunkel hatte.

Noch glaube ich unter dieser Rubrik von den Spinnen überhaupt, einige Notizen von einigen weniger bekannten, und noch nicht systematisch bestimmten Arten schädlicher Spinnen beyfügen zu müssen. „Zu St. Jago, sagt *Byron*, in der Erzählung seiner Unglücksfälle auf der patagonischen Küste, giebt es eine grosse Spinne, deren Stich so giftig ist, daß ich nie einen so abscheulichen Anblick gehabt habe, als den ihre Wunden verursachen. Ja ihr Stich ist, ohne zeitig dagegen veranstaltete Hülfe, unfehlbar tödtlich. Ich wurde einst im Schlafe von einer in die Wange gebissen, welche sogleich davon so schwarz wie Dinte wurde. Doch heilte man mich mittelst eines gewissen blauen Steins, welcher vermuthlich der in Ostindien sogenannte Schlangenstein war, der eine Composition ist. Er blieb eine Zeitlang fest am Gesichte hangen und da er herabfiel, wurde er in Milch gelegt, bis das von ihm eingesogene Gift wieder herausgezogen war, da er denn abermals angelegt wurde, bis der Schmerz nachgelassen hatte. Bald darauf war ich völlig wieder wohl.“

In der neuen Erdbeschreibung von ganz Amerika, übersetzt von *Schlözer*, liest man folgendes: „Unter die giftigen Insekten von Nord- und Süd-Carolina und Georgien gehören die Spinnen. Es giebt davon mehrere Arten, aber die merk-

merkwürdigste ist die *Bergspinne*, die selten anderswo, als in den Wäldern nahe bey den Bergen angetroffen wird. Bey denen, die so unglücklich sind, von ihnen gestochen zu werden, äussern sich verschiedene Übel, je nachdem die Spinne ist, die ihnen ihr Gift mitgetheilt hat. Einige bekommen Herzensangst, andere Engbrüstigkeit, andere Zittern der Glieder, kalten Schweiß und Erbrechen; noch andere lachen, singen und bekommen Zufälle, die sich mit dem Tode endigen.“

In der allgemeinen Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande sagt der Verfasser, nachdem er von einigen giftigen Thieren geredet hat, von der Spinne *Democulo*: „Man stellt sich nicht ohne Schrecken eine grosse Spinne in Ceylan vor, welche *Democulo* genannt wird, lang, schwarz, rauh, fleckicht, durchsichtig und glänzend ist, welche einen Leib, so dick, als eine Faust und Füsse nach Verhältniß hat. Sie verbirgt sich gemeiniglich in den hohlen Bäumen und andern Löchern. Nichts ist giftiger, als dieses Ungeziefer. Ihr Biß ist zwar nicht tödlich, allein ihr Gift hat die besondere Eigenschaft, den Menschen verwirrt zu machen und ihn der Vernunft zu berauben. Das Vieh wird oft von diesen Ungeheuern gebissen und fällt um, ohne daß man ihm Hülfe leisten kann, Die Menschen aber finden beym Gebrauch gewisser Kräuter und Rinden Hülfe, wenn sie Gelegenheit haben, sie geschwind anzuwenden.“

Eine ähnliche Menschen und Thiere durch ihren Biß unsinnig machende Spinne ist die *Kurakaviensische* (Ar. *Curacaviensis* oder *Müllers Tollmacher*), die nicht viel grösser als eine mittelmässige Hausspinne, braun von Farbe, und an jeder Seite mit einem pomeranzenfarbigen Fleck bezeichnet ist, und auf der Insel Curakao, wo sie *Oranje* genannt wird, unter den Wurzeln und Kräutern sich aufhält.

Als Gegenmittel wider den Spinnenbiß überhaupt, empfiehlt *Göze*, ein Blatt wilden Salbey gleich nach dem Biß aufzulegen, *Sennert* aber, Feigensaft auf der Wunde auszudrücken. Andere empfehlen Wegerichblätter in schwachem Weinessig zu kochen und damit die schmerzhafteste Stelle zu reiben. *Fermin* hält das Auflegen des Theriaks für hinreichend, schwere Zufälle zu verhüten, glaubt aber, daß überhaupt hier das nemliche Verfahren, wie beym Skorpionstiche statt finde.

72. Die Nestspinne. Tab. VII. Fig. 12 — 14.

Aranea nidulans atra nitida, abdomine hirto nigro. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2955. n. 73. — Habitat in insulis, Americae meridionali obversis, sub terra nidum cylindricum spithamaeum, superne operculatum, tenacissimum struens, morsu febrem excitans, sudorifero sanandum, thorace lunula magna in medio impressa, abdomine ovato, pedibus aequalibus.

Browne, P. The civil and natural History of Jamaica, London 1756. Fol. p. 420. Tab. 44. F. 3.

Tarantula fusca major subhirsuta, sub terram nidulans,
The black Tarantula.
Fabricii Mant. ins. I. p. 343. n. 5.

Auf den Inseln des mittägigen Amerikas, vorzüglich aber auf Jamaika, ist eine Spinne einheimisch, welche von der Eigenschaft, in dem lockeren felsigten Boden sich ein besonderes Nest zu weben, ihren Namen erhalten hat. Dieses Nest (Fig. 14.), welches ich hier etwas verkleinert vorgestellt habe, hat eine cylindrische Form, wohl eine Spanne in der Länge und auf anderthalb Zoll im Durchmesser. Das eine Ende desselben ist abgerundet und verwebt, das andere mit einer doppelten Klappe versehen, welche so gut eingerichtet und so fest verbunden ist, daß sie durch die natürliche Elasticität ihrer Bänder sogleich wieder in ihre vorige Lage gebracht wird, wenn man sie auch mit Gewalt zu öffnen sucht. Die Spinne (Fig. 12. 13.), welche dieses Nest bewohnt, ist anderthalb Zoll lang, von glänzend schwarzbrauner Farbe. Sie hat zwey ziemlich lange und stark nach unten gekrümmte Maxillen, auf dem vorne breiten und dicken Brustschilde sechs Augen in zwey Reihen hintereinander, und zwey Augen in der dritten und hintersten Reihe. Der Hinterleib ist groß, bauchicht und eyrund, jedoch oben mehr gewölbt und unten mehr flach, und hat an seinem hinteren und unteren Theile (Fig. 13.) drey ziemlich grosse Spinnwarzen. Übrigens sind die zehn Füße dieser Spinne beynahe alle von gleicher Länge und haaricht, wie ihr ganzer Körper.

Ihr Biß veranlaßt einen, mehrere Stunden anhaltenden Schmerz, und erregt bisweilen Fieber und Raserey. Es werden aber diese Zufälle gemeiniglich dadurch gehoben, daß man den Gebissenen in einen mässigen Schweiß zu bringen sucht, welches die Neger, die den Verletzungen dieser Spinnen am meisten ausgesetzt sind, gewöhnlich mit etwas warmen Punsch von Rum zu bewirken wissen. Sie kommen hierauf bald in einen Schlaf und sind alsdann in wenig Stunden wieder hergestellt.

73. Die tatarische Spinne.

Aranea tatarica, hirta, atra, thorace albo marginato, rotundato, abdominis dorso seriebus duabus punctorum albicantium, pedibus e rufescente-nigris. Mayer, D. F. A. A. Versuch zur nähern Bestimmung einiger schädlichen, weniger bekannten Insekten, in Voigts Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. Band IX.

St. II. S. 75. 81. — Habitat in Tartaria valde frequens.

Lepechin's Tagebuch einer Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, Altenburg 1774. Th. I. S. 200 und 257. *Tarantel*.

Unter dem Namen *Tarantel* beschreibt *Lepechin* eine Spinne, deren grosse Verschiedenheit von der eigentlichen Tarantel Herrn *Meyer* bewog, sie wenigstens durch den Beynamen die *tatarische Tarantel* zu unterscheiden und als eine eigne Art in dem System gleich hinter der *Aranea clavipes*, aufzustellen. Sie hält sich in der salzreichen Gegend um *Usolie* in eignen Höhlen unter der Erde auf, vor welchen sie ihr Netz ausspannet, und sich von den Insekten nährt, welche in dasselbe gerathen. Ihr Körper ist nach *Lepechin's* Schilderung, ganz mit Milchhaaren bewachsen, wodurch sie ein abscheuliches Ansehen erhält. Der Kopf hat die Figur einer halben Pyramide, deren schmälere Seite die Mitte und deren Grund die Stirne vorstellt. Von da an bedeckt die Brust oben ein rundlicher Schild, der an den Rändern weißlich, in der Mitte aber mit schwarzen Haaren besetzt ist. Oben auf dem Kopfe sind acht Augen, von welchen die vier kleinsten den untersten Platz vor den Kinnladen einnehmen. Über denselben aber sitzen zwey grosse und über diesen noch zwey von mittlerer Grösse. Ausser diesen sollen auf den Kinnladen selbst, an den Seiten, grosse rothe Augen hervorleuchten. Beyde Maxillen sind milchhaarig, schwärzlich, an den Enden mit kleinen spitzigen und steifen Häkchen bewaffnet. Die Fühlspitzen bestehen aus vier rothbräunlichen Gliedern, wovon das letzte eine stumpfe Spitze hat und schwarz ist. Auf dem Rücken sind zwischen der schwarzen Grundfarbe, zwey Reihen weißlicher Punkte sichtbar. Die untere Fläche der Spinne ist auch schwarz und rauh. Die ersten Schenkel sind von unten her rothbraun. Das andere Fußglied ist kurz und auf allen Seiten schwarz; das dritte rothbräunlich mit einem schwarzen Bande am Ende; das vierte und fünfte schwarzgraulich, und von diesen spaltet sich das letzte wie eine Klaue. Der After ist mit sechs Schwanzbüschelchen von verschiedener Länge besetzt.

Wenn dieser Spinne alle Mittel zur Flucht benommen sind, so hält sie sich unbeweglich still, bläst sich auf und sprüzt aus ihrem Rücken einen weissen Saft

zwey

zwey Arschinen weit, wie aus einer Sprütze. „Ich kann nicht zuverlässig sagen, schreibt *Lepechin*, ob dieser Saft giftig sey; denn es wollte niemand von uns einen gefährlichen Versuch machen. Doch versicherten uns die im Wogutischen Weghause wachhabenden Kosaken, daß eine kleinreussische Weibsperson die Wirkung dieses Safts erfahren habe. Sie grub eine solche Spinne in ihrem Garten aus, und wurde, als sie dieselbe mit einem Stecken umkehrte, mit gedachtem Saft besprützt, wovon sich ihre Hand in kurzer Zeit entzündete und mit unerträglichem Schmerze aufschwell. Wahrscheinlich wären, ohne schnelle Hülffleistung, schlimme Folgen für sie daraus erwachsen.“

Für das beste Gegenmittel wider diese Spinnen, werden sie selbst gehalten. Man wirft sie lebendig ins Baumöl und hebt sie darinnen zum Gebrauch auf, alsdann schmiert man blos die Wunde oder die besprüzte Stelle damit, und so erfolgt die Heilung. Die größten Feinde dieser Spinnen sollen die schwarzen Schaafse seyn, welche sie aus der Erde scharren und überaus gerne fressen. Die Kalmücken, welche sich so sehr vor diesen Spinnen fürchten, daß sie sich niemals da lagern, wo sie sich aufzuhalten pflegen; sondern auch noch zu ermüdet, mit ihrem Vieh weiter ziehen, halten, deswegen ihre schwarzen Schaafse vorzüglich in Ehren.

74 Die Tarantel. Tab. IX. Fig. 1.

Aranea Tarantula abdominis dorso maculis trigonis nigris; pedibus nigro maculatis. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 2956. n. 34. — Habitat in Europa australi, potissimum Apulia, in Barbaria, in Tauria Russiaeque australis desertis, in Astracania ad montes Sibiriae altaicos usque, in Persia et reliquo Oriente, in solo praecipue argillaceo in antris, cinerascens, oculis 2 prioribus majoribus rubris, thorace in areas nigris diviso in centrum concurrentes, abdomine supra fasciis maxillisque nigras.

- Aeliani* de natura animalium, Lib. I. C. 8.
Albinus, B. Diss. de Tarantismo Francof. ad Od. 1691. 4.
Albin, E. natural. hist. of the Spiders, p. 64. Tab. 38.
Altes Hamburgisches Magaz. I. 68. XIII. 4. XIV. 39. 433. 436.
Amoreux Notice des Ins. venim. p. 67 et 217. Tab. I. F. 5.
Baglivii, G. Opera omnia Antwerpiae 1715. Dissertatio VI. de Anatomie, Morsu et Effectibus Tarantulae.
Bartholinus, Th. de Tarantula, Histor. Anatom. Cent. VI. Hist. 35. p. 258.

- Beobachtungen* über die Tarantel, und ihren vorgeblich tödtlichen Stich, S. ökonomische Hefte Band I. Heft 1. Leipz. 1795. S. 119.
Bezac, J. Rideaux, P. Magnol, A. etc. Quaestiones propositae. Monspel. 1732. 4. vbi qu. 1. p. 30. Resp. Gourraigne, an Musica morsus Tarantulae unicum remedium?
Blancardi Collectanea, Cent. V. 1680.
Blumenbachs Handb. d. Naturg. S. 391. n. 7. Tarantula.
Boccone intorno il Regno Velenoso della Corsica, ó sia Tarantula, it. la Tarantula della Puglia, in Museo de Fisica obs. 16 et 17. p. 92 et obt. 20. p. 116. Bon-

Bonafini Observ. circa viventia etc. seu Micrographia curiosa. Romae 1691.

Borch (Comte de) memoire, im Journal d'Histoire naturelle No. X. 1787. p. 57.

Bradley, R. a Philosophical account of the works of Nature, Lond. 1721. Tab. XXIV. F. 10.

Brunus de Tarantulis, 1602.

Büschings, A. F. eigene Gedanken und gesammelte Nachrichten von der Tarantel, Berlin 1772. 8. Ebendesselben Schreiben von denen, die von den Taranteln gebissen seyn sollen, Hamburg. Mag. B. XIV. S. 433.

Calceolariii Museum. Veronae 1622. Fol. p. 666. de Tarantula.

Camerarius, J. R. Tarantularum venenum musica mulcetur. Syll. Memorabil. Cent. IV. P. 4. p. 194.

Cirillio, D. de ictu Tarantulae ex Philos. Trans. Vol. LX. p. 233.

Cid, Er. X. Tarantismo observado en Espana conque se prueba et de la Pulla dudado de algunos y tradado de otros de fabuloso: y memorias para escribir la historia del insecto bamado Tarantula; efectos de su veneno en el cuerpo humano y curacion por la musica non el modo de obrar de esta y su aplicacion como remedio à varias enfermedades. Madrid, 1787. 8.

Collini, C. sur le Tarantisme v. Act. Acad. Theod. Palat. T. V. P. physica.

Cornelio, Th. Persons supposed to be stung by Tarantulas. Philos. Trans. n. 83. p. 4066. Badd. I. p. 361.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 469. la Tarantule (hält Wirkung und Kur des Tarantelstichs für Fabel.)

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 72.

Erzählungen, neue gesellschaftliche, B. III. S. 307. Der Tarantelbiss eine Betrügerey.

Extrait du Journal d'Italie, contenant l'histoire de la Tarantule et la raison des effects, que produit son venin. Journ. des Scav. To. VI. p. 434.

Fabricii Mant. ins. I. p. 346. n. 47. Spec. Ins. I. p. 545. n. 45. Syst. Ent. p. 438. n. 34.

Fortis Reise in Dalmatien, II. S. 40.

Geschichte, allgemeine, der neuesten Entdeckungen von verschiedenen Gelehrten im Russischen Reich und Persien, Bern 8. 1777. Th. I. S. 368. Tarantel.

Gmelins Geschichte der Gifte, Th. I. S. 301. streicht die Tarantel aus der Klasse der giftigen Thiere ganz weg.

Grube, H. de ictu Tarantulae et vi musices in ejus curatione, conjecturae physico-medicae Francof. 1699. 8.

Hafenreffer, S. Tractatus de morbis cutis, Ulmae 1660. 12.

Herbsts, J. F. Natursyst. der ungefl. Ins. Heft S. I. 20 und 47.

Histoire de l'Academie royale des Sciences année 1702. p. 16.

Hübner, V. Diss. de Tarantismo, Argent. 1674. 4. Journal des Sav. T. VI. p. 434. Extrait du Journal d'Italie, contenant l'histoire de la Tarantule et la raison des effects, que produit son venin.

Justi neue Wahrheiten, B. II. S. 210 und 275. J. D. T. Erläuterungen über die Heilung des Tarantelbisses durch die Musik und Büschings Schreiben über diese Abhandlung.

Kähler, M. Anmerkungen über die Tanzkrankheit, die man Tarantismus nennt, S. B. XX. der Schwed. Abh. S. 30.

Keyslers, J. G. neueste Reisen, Hannov. 1751. 4. Th. II. S. 760. Taranteln.

Kirchmaieri, G. C. Diss. de Aranea inprimis vero Tarantula, Witt. 1660.

Krünitz ökonomische Encyklop. Th. II. S. 372. Laurentii Dissertatio de Tarantula.

Laxmann, nov. comm. Petrop. 14. p. 602. Aranea singoriensis.

Lister, inquiry concern. Tarantula's etc. Philos. Trans. Vol. VI. no. 77. p. 3002.

Listers Naturgesch. der Spinnen v. Göze, S. 266. Die russische Tarantel, S. 285. Die dalmatische Tarantelspinne.

Madeira, E. de nova philosophia de qualitatibus occultis, acc. inaudita philosophia de Tarantula, Ulysiponi. 1650. 4.

Mead, R. Tractatus de venenis, Lugd. Bat. 1750. 8. (bezweifelt die Schädlichkeit d. Tarantelbisses.)

Misson Voyage d'Italie 8. à Utr. 1722. Term. III. p. 368. Tarantula.

Müller, J. Diss. de Tarantula, Resp. Braun. Witt. 1676. 4.

Müller's Linn. N. S. d. Ins. B. II. S. 1082. Die Tarantel.

Müllers, D. A. L. Suppl. und Registerband, S. 343. T. 50.

Mylius Uebersetzung eines Briefs v. einem Italiäner über den Biss der Tarantel, aus den Gentlem. Magaz. 1753. im Hamb. Mag. Band XIII. S. 1.

Nardii Noct. Genial. noct. 4. p. 301. de effectibus nonnullis morsus Tarantulae.

Neue Anmerkungen aus allen Theilen der Naturlehre, Th. I. S. 457.

Olearii, A. Gottorffische Kunst-Kammer. Schlesw. 1674. 4. Tab. XII. F. 4.

Okomat. Hist. nat. P. VII. p. 442. Tarantelspinne.

Pallas neue nordische Beyträge, B. V. S. 320. Nachrichten von Cherson, B. XI. S. 345. Taranteln in der Krimm. Desselben Reisen durch Rußland. Auszug Frankf. und Leipz. 1776. I. Anh. S. 24. n. 79. Aran. Tarantula.

Panarolus de araneis, Tarantula dictis, in Jatrolegism. Pentec. V. p. 172.

Philosoph. Transact. no. 83. p. 4066. (Widerlegung der Wirkung und Kuren des Tarantelstichs.)

Plateri, F. Diss. de Tarantismo, Basil. 1669. 4.

Quatremere-Disjonval's Araneologie, S. 108.

Redi de generatione insector. p. 177.

Reinharti, J. Theranthropismus fictus. 1673. 4.

Retrato de la Tarantula Macho y Gembra, de los ovarios y nido, qua fabrican; su historia natural y efectos de su veneno y la relacion del Tarantado del Hospital general. Madrid. 1787.

Rolfinc, G. Diss. Decas quaestionum medicarum, Jenae 1640. quaest. 10, quae sit causa saltationis a tarantulis morsorum.

Sauvages Nosologia meth. T. IV. p. 350. *Tarantismus*; il Carnevaletto delle donne Baglivi; Oestrodi bal-lare; le Tarantisme, le Janon.

Scaliger, Tarantula etc. de subtilit. exorcit. 180. p. 610.

Scarfi de Tarantula ejusq. ictu, P. I. V. 1. p. 276 et 379.

Schoengast, Chr. Andr. Diss. de Enkurek Persarum morsuq. tarantulae, Resp. Petermann. Lips. 1668. 4.

Schotti Magia universalis, P. II. L. V.

Schwarz, J. B. M. Diss. inaug. med. de Tarantismo et Chorea Viti. 8. Vienn. 1766. c. Fig.

Senguerdii, J. Tract. phys. de Tarantula, Lugd. Bat. 1668. 12. ejusd. Diss. de Tarantula 16. 1767. c. Fig.

Senguerdii (Wolferdi) Disquisitio de Tarantula, Lugd. Bat. 1688. 12. c. Tab.

Serao Lezione prima della Tarantula, Haller. Biblioth. chir. II. p. 330.

Sturm in den philosophischen Transactionen, n. 83.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 248 et 254. Tab. XXX. Fig. 1.

Systematisches Lehrbuch über die drey Reiche der Natur, Nürnberg. 8. 1777. Th. I. S. 387. *Tarantel*.

Tudecius, S. A. de Tarantismo, Eph. Nat. Cur. ann. IX. obs. 116.

Turnball de Tarantulæ ictu, in Essays and obs. by the Soc. in Edinburgh. Vol. III. p. 100. et London Chronicle 1771.

Unzers, J. A. Arzt, Th. II. S. 473. 640. III. S. 466. 526.

Urbans Gentlem. Mag. Vol. XXIII. p. 433 et Vol. XXIV. p. 29. de Morsu Tarantulæ.

Valentini Mus. Mus. Tom. I. p. 514.

Valetta, L. Opusculum de Phalangio Apulio s. Tarantula, Neapoli 1706. 12.

Volkmanns Reise durch Italien, B. III. S. 197.

Voyages to the Madeira and Leeward Caribbean Islands, Lond. 1792. 8.

Wiel, (Stalpart van der) de Tarantulæ veneno observat. Cent. I. obs. 100. p. 438. c. Fig.

Ausser den Skorpionen hat sich wohl kein Insekt durch Jahrhunderte in einem so bedeutenden Rufe erhalten, und in Rücksicht seines nachtheiligen Einflusses auf Gesundheit und Leben, mehrere Federn in Bewegung gesetzt und mehrere Streitigkeiten veranlaßt, als die allgemein bekannte und allgemein gefürchtete *Tarantel*. Nur Schade! daß man über die Berichtigung ihrer gegründeten oder ungegründeten Schädlichkeit, die Bemühungen aus der Acht gelassen hat, ihre Naturgeschichte selbst mehr aufzuklären. Den Namen gaben ihr die Alten von *Tarentum*, dieser ältesten Stadt in Groß-Griechenland am Ionischen Meere, oder der gegenwärtigen Stadt *Tarento* im Königreiche Neapel, nicht als ob sie daselbst häufiger vorgekommen wäre und noch vorkäme, oder giftiger wäre, als in den übrigen Gegenden Apuliens; sondern wahrscheinlich deswegen, weil in einer zur Zeit der alten Griechen und Römer so grossen und bevölkerten Stadt, weit mehr Beyspiele von den Folgen des Tarantelbisses, als in den kleinern angränzenden Ortschaften vorkommen mußten, wodurch sie also verleitet wurden zu glauben, daß die Bösartigkeit des Tarantelbisses sich vorzüglich auf diese Stadt beschränke.

Die

Die Grösse der Tarantel ist nach den verschiedenen Arten sehr verschieden, und steigt von einem bis zu anderthalb, ja zwey Zoll. Die in den südlichen Gegenden des russischen Reichs befindlichen, erreichen, nach *Pallas*, sogar die Grösse der amerikanischen Kolibrifresserin (Tab. IX. Fig. 2.). Gewöhnlich aber ist das Männchen kleiner und magerer, als das Weibchen, auch unterscheidet sich letzteres von ersterem durch seine weichere Haut. Eben so verschieden wie die Grösse, ist auch die Farbe dieser Insekten. Einige sind flohfarb oder braunroth, andere aschgrau, an der oberen fläche des Körpers und den Füßen schwarz gefleckt, an der unteren Fläche aber ganz schwarz; noch andere (Tab. IX. Fig. 1.) sind gelblich-grau und unten schwarzgefleckt, kurz, es sind alle davon vorhandenen Zeichnungen verschieden. Sie haben vier kleine und vier grosse Augen. Erstere stehen über den Fresswerkzeugen in einer Querlinie neben einander, letztere in zwey Paaren über den kleinen Augen gegen den Rücken zu hinter einander. Ihre ziemlich starken Maxillen sind nach unten zu schwarz, ihre Palpen ziemlich lang und gegliedert, ihr Brustschild so lang als der Hinterleib, mit einem doppelten Buckel und sternförmig auslaufenden Furchen versehen, ihr Hinterleib selbst vollkommen eyrund mit verschiedenen Querstrichen und anderen Punkten und Flecken geziert, und die Füße dick, grau, unterhalb schwarz gefleckt und gestreift. Die Eyer des zu Anfang des Junius befruchteten Weibchens haben die Grösse der Hirsenkörner und kommen in zwanzig bis dreysig Tagen an der Sonne zur Reife. Die ausgekrochenen und erwachsenen Taranteln leben wahrscheinlich von allerley Insekten und fressen in Ermangelung derselben, einander selbst auf, so daß vor mehreren in ein Glas zusammengesperreten, zuletzt nur noch eine übrig bleibt.

Ausser Apulien, dem Königreiche Neapel, Sicilien, Sardinien und Corsika, kommen die Taranteln auch in Romanien, Toskana, in der Lombardie, ja selbst in Frankreich an der Küste des mittelländischen Meeres, in der untern Provence und in den südlichen Gegenden des russischen Reichs' mehr oder minder häufig vor. Sie wohnen daselbst in der Erde auf den Feldern und an dünnen leimichten Ufern, halten sich den Winter hindurch in der Erde verborgen, und kommen erst zu Anfang des Sommers wieder zum Vorschein.

In Hinsicht auf den gefährlichen Biß dieses Insekts und die durch denselben veranlaßten sonderbaren Zufälle, haben sich neuere Naturforscher und vorzüglich *Büsching* geschmeichelt, den ganzen Streit dadurch beygelegt zu haben, daß sie alle Erzählungen von Tarantelgift und Tarantismus für Märchen erklär-

ten.

ten. Allein, die neuerlich angestellten Versuche, womit sie vorzüglich ihre Behauptung zu unterstützen suchten, sind, wie ich unten zeigen werde, noch immer nicht hinreichend, so viele andere, von nicht minder glaubwürdigen Schriftstellern angeführte Fälle zu entkräften. Überhaupt scheint man bey der ganzen Erörterung des Streits nicht die Extreme vermieden und der übertriebenen Vergrösserung zu viel Scepticismus entgegengesetzt zu haben. Die älteren Naturforscher und Ärzte verliessen sich meistens auf Traditionen und fremde Erzählungen, ohne ein Bestreben zu äussern, die verschiedenen Erscheinungen, welche als Folgen des Tarantelbisses angesehen worden sind, in ihrem ganzen Zusammenhange, mit genauer Prüfung aller obwaltenden Umstände, einzusehen. Daher kam es, daß sie eine Krankheit, welche fälschlich mit dem Namen *Tarantismus* belegt worden ist, als Folge des Tarantelbisses ansahen und mit den Zufällen desselben verwechselten. *Ferdinand Epiphanes*, ein Arzt in der *Terra di Otranto* im Königreiche Neapel, suchte aber schon im Jahre 1621 dem herrschenden Vorurtheile entgegenzuwirken, indem er versicherte, daß er in einer zwanzigjährigen Praxis niemanden an den Folgen des Tarantelbisses habe sterben gesehen, daß aber der Tarantismus selbst keine auf Verstellung beruhende, sondern eine wahre Krankheit sey. Auch *Serao* und neuere Ärzte erklärten den Tarantismus für eine endemische Krankheit Apuliens und eine besondere Art von Schwermuth oder Melancholie, die von der Verdickung der Säfte abhänge, welche wieder als Folge der von der Hitze des Klimas und der Jahrszeit begünstigten Trägheit und Faulheit der Einwohner betrachtet werden müsse. Sie behaupteten zugleich, daß sie alleine durchs Tanzen, eine starke, die Stockungen hebende und die Ausdünstung befördernde Bewegung, gehoben werden könnte, wozu solche träge Menschen nur die Musik einzuladen vermögend seye.

Kähler schildert, als Selbstbeobachter, den ganzen Verlauf dieser Krankheit ohngefähr auf folgende Art: „Ich hatte Gelegenheit bey meinem Aufenthalte in Apulien 1756 die wunderbare Eigenschaft der Taranteln zu untersuchen, nach welcher sie durch ihren Biß den Tarantismus, oder die sogenannte Tanzkrankheit verursachen sollen. Mit dieser Krankheit verhält es sich aber folgendergestalt: Sie fängt sich damit an, daß ein Mensch stiller als gewöhnlich wird, viel nachdenkt, den Appetit verliert, Müdigkeit und Abgeschlagenheit in allen Gliedern empfindet. Es gesellt sich hierzu ein grosses Drücken in der Herzgrube, die Unruhe vermehrt sich und artet in eine grosse Beängstigung aus. Hierdurch verliert der Kranke die gesunde Farbe und wird im Gesichte gelblich, weiterhin aber
völlig

völlig melancholisch und scheu vor allen Dingen. Seine Zähne werden locker, der Urin wird blafs und geht häufig ab, und der Puls geht langsam und stark. In diesem Zustande bleibt der Kranke oft zwey bis drey Jahre, ohne zu rasen oder etwas Thörichtes zu verlangen. Nur gegen den Junius verschlimmert sich sein Befinden durch stärkeres und öfteres Drücken um das Herz und unter der Brust. Man geräth dann leicht auf den Gedanken dafs er von der Tarantel gebissen worden sey, deren veranlafste Zufälle durch die Musik gehoben werden müssen, läfst daher Musikanten kommen, meistens mit einer Violine oder Cither, welche einen besondern und dazu gewöhnlichen Ton zu spielen anfangen, worauf dann der Kranke den Takt mit einem hohen und jämmerlichen Geschrey anfängt, im Gesichte roth wird und so in völligen Tanz kommt. Je älter und schwerer die Krankheit ist, desto länger tanzt er, welches oft zwey Stunden nach einander beträgt. Er kann sich unmöglich zwingen aufzuhören, bis der Anfall völlig vorüber ist. Fehlt der Musikant in einem Tone oder Striche auf dem Instrumente, so schreyt der Tanzende jämmerlich und sieht wie ein Mensch aus, der die grösste Pein leidet. Nach dem Paroxysmus fällt er in einen starken Schweiß. Man muß ihn nun, wenn der erste Anfall vorüber ist, immer nach drey Tagen eine Zeit lang forttanzen lassen und hierzu die besondere Musik beybehalten, weil er durchaus nach keiner andern tanzt. Hört er aber diese Musik ehe noch die drey Tage verlaufen sind, so kann er sich nicht enthalten zu tanzen. Ist die Tanzperiode vorbey, so hat er nicht das geringste krankhafte Gefühl mehr, sondern ist die ganze übrige Zeit des Jahres bis an den Tag gesund, wo er im vorigen Jahre zu tanzen anfieng. Dann aber tritt seine Krankheit in höherem Grade wieder ein und er muß von neuem die Tanzkur brauchen. Zur Zeit der Genesung entsteht gerne eine Geschwulst oder eine Beule an irgend einem Gelenke. Auf diese legt man gewöhnlich Blätter von der Eselsgurke, welche die Beule zur Reife bringt und heilt.

Was aber die wahren Zufälle vom Bisse der italiänischen Tarantel selbst betrifft; so empfinden die Gebissenen, nach *Baglivi*s Erzählung, keinen stärkeren Schmerz, als wenn Jemand von einer Biene oder Ameise gestochen worden ist. An der verletzten Stelle entsteht aber bald ein blau und gelb unterlaufener Fleck mit heftigem Schmerz, und Geschwulst, bisweilen auch mit Unempfindlichkeit des Theils und verschiedenen Zufällen, nach Verschiedenheit der Farbe und Grösse des Insekts, der erhöhten Schärfe des Gifts, der Hitze der Jahrszeit, der Temperamentsanlage und Constitution des Kranken. Wenige Stunden nach dem Biss wird

wird er nemlich mit Beängstigung, Traurigkeit, beschwerlichem Athemholen, Magenschmerz, Übelkeit, Durst befallen. *Bagliv* bringt nun, als Anhänger der alten Meinung, die Krankheit des Tarantismus, mit den Zufällen des Tarantelbisses in Verbindung und läßt, nachdem die Zufälle der ersten Tage vorüber sind, endlich eine eigne Melancholie erfolgen, die ganz mit *Kählers* Schilderung des Tarantismus übereinstimmt, und so lange anhält, bis durch Musik und Tanz das Gift aus dem Blute und von den Nerven entfernt worden ist. Tanzen die Gebissenen nicht sogleich, wenn Müdigkeit den jährlichen Anfall verkündiget, so fallen sie oft plötzlich halb todt zur Erde und bleiben so liegen, bis die Citharödi kommen und die gewöhnliche Musik machen, wodurch sie allmählich wieder zu sich kommen und endlich anfangen zu tanzen und dabey allerley Gauckeleyen und unsinniges Zeug vorzunehmen, welches sie so lange fortsetzen bis ein starker Schweiß ausbricht, der das Gift zerstreuet und durch die gewöhnlichen schweißtreibenden Mittel nicht soll hervorgebracht werden können. Auch in Rücksicht der Zufälle jener Melancholie selbst, setzt er noch verschiedenes hinzu, welches *Kähler* nicht bemerkt hat, und vielleicht zu den Übertreibungen gehört. Viele suchten nemlich die Gräber und einsame Orte auf, stürzten sich wohl als Verzeifelte in Brunnen; Weibspersonen von bekannter Schamhaftigkeit und Sittsamkeit machten allerley unschickliche Geberden und entblößten sich. Viele wälzten sich wie Schweine im Koth; andere wollten immer geschlagen seyn, noch andere liefen unaufhörlich umher und würden durch verschiedene Farben besonders gereizt. Nur der Tod der Tarantel selbst, welche den Kranken gebissen habe und durch eine gewisse magnetische Kraft mit ihm immer in Verbindung stehe, könne ihn von den jährlichen Anfällen und der Krankheit gründlich befreyen, daher auch das Sprichwort entstanden sey: *morta la bestia, morto il veneno*. Die Tanzsucht, als das hervorstechendste Symptom der Krankheit leitet er übrigens aus der Specificität des Tarantelgifts her, von welchem sie eine eben so unzertrennliche Folge sey, als die Hydrophobie von dem resorbirten Geifer des tollen Hundes ist.

Mit den vom *Bagliv* angegebenen ersten Folgen des Tarantelbisses, kommen vollkommen die von *Sauvages* bemerkten Zufälle überein, welche sich aus neueren mit den Taranteln in Rom angestellten Versuchen ergaben. Es folgte nemlich auf den Biß Schmerz mit einer mißfärbigen Geschwulst, welche nach einigen Tagen mit einer schwärzlichten Borke bedeckt ward. Hierzu kamen Neigung zum Schlaf; Beängstigung und Beklemmung der Brust und hierauf Schmerzen

in allen Gliedern, niemals aber eine Neigung oder Begierde zum Tanzen. Auch wurden die Zufälle durch die gewöhnlichen innerlichen schweißtreibenden Mittel gehoben.

Borchs Versuch mit einem gedungenen Menschen in Neapel gab zwar nicht gleiches Resultat, spricht aber doch die Tarantel nicht von einer gewissen Giftigkeit frey. Der Biß derselben in die Finger dieses Menschen bestand bloß in einem Kneipen mit ihren Maxillen, man sah aber dabey einen gelblichen Saft aus ihrem Munde fließen, welchem alleine nur man die Wirkung des Bisses zuschreiben konnte; denn die Hand, und besonders die Finger, schwellen bald darnach auf und der Gebissene empfand ein grosses Jucken. Aber anstatt dagegen eine Hilfeleistung anzunehmen, trank er bloß eine Bouteille Wein. Ausser dem, was sich aus diesen und ähnlichen Versuchen und Beobachtungen ergibt, ist noch so viel richtig, daß die Taranteln in Italien den Schnittern zur Erndezeit vorzüglich nachtheilig zu werden pflegen.

Ganz widersprechend fielen dagegen zum Theil die Versuche der das andere Extrem liebenden Gegner aus. Doktor *Claritio* erbot sich dem Vertheidiger des Tarantelgifts Dr. *Sanginetti* den entscheidendsten Beweis in Gegenwart vieler Hundert Zuschauer zu geben. Er ließ sich wirklich in der heissesten Jahreszeit von den Taranteln beißen, und es erfolgte kein schlimmer Zufall. Gleiches Resultat liefert der ungenannte Verfasser des Aufsatzes über die Tarantel in den ökonomischen Heften. „Als ich zu Neapel war, schreibt er, gab ich meinem Wirth zu verstehen, daß ich wohl Lust hätte, die Wirkungen, welche der Stich von der Tarantel hervorbringen soll, näher zu beobachten. Der gefällige Mann brachte in einiger Zeit einen Menschen zu mir, der gleich sobald er mich sah, seine Hand ausstreckte und sagte: wo sind die Taranteln? ich will mich von ihnen stechen lassen. Ich fragte ihn nun, ob er die Folgen solcher Stiche nicht fürchte. Nein, versetzte dieser; denn ich habe ein Gegenmittel, das mich sichert. Ich wünschte dies zu sehen und da zeigte er mir eine Flasche Wein, die er mitgebracht hatte. Ich ließ nun meine Taranteln heraus. Kaum hatte aber eine von ihnen gesehen, daß der Herausforderer seinen Finger nach ihr ausstreckte, als sie vor Wuth sich aufblies, auf den Finger zusprang und ihren Feind biß, indem sie ihre beyden Arme, die am Ende mit Zangen versehen sind, zusammenzog. In der That bemerkte ich Nachmittag, denn ich behielt den Mann den ganzen Tag über in meiner Behausung, daß seine Hand ganz geschwollen war, und er sagte auch daß der Finger ihn sehr juckte. An der Stelle, die gestochen oder vielmehr

gezwickt worden war, sah man durchs Mikroskop zwey Risse, welche durch das gewaltsame Zusammenzwicken des Insekts verursacht worden waren. Nach einigen Tagen war die Wunde des Menschen völlig geheilt, ohne daß er nöthig gehabt hatte, seine Zuflucht zum Tanz zu nehmen. Er sagte nur, *das Jucken wäre so gewaltig stark gewesen, daß er es nicht ausgehalten haben würde, wenn der Wein nicht seine Sinnen benebelt hätte.*“

Serao, Leibmedikus des Königs von Neapel, machte, um ein Jahrhunderte herrschendes Vorurtheil zu besiegen, noch mehrere Versuche, die natürlich für ihn entschieden und die ihm Stoff zu einer interessanten Abhandlung gaben. Er bemühte sich darinnen die betrügerische Kunst der Possenmacher zu enthüllen, welche durch die teuschende Nachahmung der Zufälle des Tarantismus, vorzüglich das Mitleiden der Reisenden hintergehen, und zu beweisen, daß die größte Angst, die heftigsten Convulsionen, blos Folgen der Einbildung und der Todesfurcht seyn könnten, daß Menschen von kranker Einbildungskraft eben solche Zufälle auf die Vorstellung von einer Tarantel gebissen worden zu seyn, erhalten könnten. Überhaupt suchte er in dieser Schrift die ganze Herrschaft der Einbildungskraft über den Körper ans Licht zu stellen und darzuthun, daß sie um so mehr zu fürchten sey, da sie befiehlt, wenn sie zu gehorchen scheint. *Quatremere-Disjonval*, dieser vertraute Freund der Spinnen, die ihm in seinem Gefängnisse die meiste Unterhaltung verschafften, hilft ebenfalls alle Sagen vom Tarantelgift in Vorurtheil auflösen. Alle Spinnen, und mithin auch die Taranteln, sind in seinen Augen ganz schuldlose Geschöpfe.

Auf obige und ähnliche Erfahrungen und Behauptungen gestützt, betrachteten nun die meisten Naturforscher und Ärzte, die ganze Sache aus keinem andern Gesichtspunkte, als daß alles, was jemals vom Tarantelbiss geschrieben und gesagt worden sey, Betrug oder Folge der überspannten Einbildungskraft, der Nervenschwäche, der Hypochondrie und Hysterie gewesen sey, und daß hierzu besonders die lebhaftere Einbildungskraft, das melancholische Temperament, und die leidenschaftliche Liebe zur Musik der Apulier beygetragen habe. *Bagliv* selbst spricht für die Macht der Einbildungskraft in vielen Fällen und läugnet den Antheil nicht, welchen andere Krankheiten, vorzüglich die Melancholie, daran nehmen können, wozu das weibliche Geschlecht in jenen Gegenden besonders geneigt sey, so daß es sich oft für gestochen hielte, ohngeachtet es sich nicht zu besinnen wisse, von einer Tarantel gebissen worden zu seyn. Aber zu weit hat sich *Büsching* durch diese und ähnliche Geständnisse und obige Erzählungen verleiten lassen,

sen, wenn er nun jeden verketzert, der noch an die Schädlichkeit des Tarantelbisses zu glauben sich erkühnt, und der verdienstvolle und bescheidene *Herbst* scheint selbst hierbey mehr aus Schonung, als aus Überzeugung die Beschuldigungen der Taranteln auf die Solpugen übertragen zu haben. Das was er hierüber sagt, ist zu interessant, als daß ich es nicht hier wörtlich mittheilen sollte. „Wenn man, schreibt er, die Erzählungen von den apulischen Taranteln ohne Vorurtheil liest und darüber nachdenkt, so ist es der unpartheyischen Wahrheitsliebe viel gemässer und billiger, daß man annimmt, es gäbe wirklich im südlichen Italien eine *kleine Art von Solpugen*, welche aber, grade weil sie zu unbedeutend scheint, übersehen und dagegen irgend eine grosse Spinne in Anspruch genommen wird, sie müsse die Vergifterin seyn, als daß man mit *Büsching* alles, was man von dem Gift der Taranteln sagt, schlechtweg für Einbildung oder Betrug erklärt. Die Einwohner von Tarent und den umliegenden Gegenden haben eine Tradition von giftigen Insekten, welche mitten im Sommer zuweilen Menschen verletzen, so daß üble Nervenzufälle darauf erfolgen. Diese mündliche Überlieferung besagt es, es sey eine Spinne, welche tanze und schwarz mit weissen Strichen sey. Dieses hat man nach und nach dahin gedreht, daß man das Tanzen, welches *Aristoteles* als Kennzeichen des Giftkankers angiebt, für das Symptom oder gar für die Kur eines von einer Tanzspinne Verwundeten hält, und daß man recht grosse Spinnen aufsucht, welche schwarz und weiß sind, um sie für Taranteln auszugeben, in der Meinung eine recht grosse Spinne könne ja viel besser verwunden, als ein ganz kleiner Kanker. Daß mehrentheils Frauenzimmer und Bettler von den Bissen der sogenannten Taranteln getroffen werden, das ist kein so bündiger Beweis, wie *Büsching* es glaubt, dafür, daß alles Einbildung und Betrügerey sey. Frauenzimmer und Bettler sind weniger bekleidet, als Männer und reiche Leute. Die blossen Arme thun hier wohl das wenigste. Die Geschlechtstheile, welche, nach jetzigen Sitten, bey den Mannspersonen durch die Beinkleider geschützt werden, sind bey den Weibern den Anlauf dieser Insekten ausgesetzt.“ Doch! ich will es versuchen, noch einige Zweifel und Gründe, sowohl gegen die Übertreibungen, als gegen die gänzliche Abläugnung der nachtheiligen Folgen des Tarantelbisses hier beyzufügen.

Was die ältere Behauptung betrifft, daß der Tarantismus Folge des Tarantelbisses sey, so streitet dagegen die Geschichte, indem man vor dem funfzehnten Jahrhundert bey keinem Schriftsteller einige Erwähnung von dem Tarantismus findet, ohngeachtet die Taranteln in jenen Gegenden überall bekannt waren. Es

scheint also, daß dieser eine neue Krankheit sey, zu deren Entstehung ausser der veränderten Lebensart und mancherley andern Umständen, auch die Lage und Beschaffenheit des, als die schmutzigste und unreinlichste Stadt im ganzen Königreiche Neapel, bekannten Tarents beygetragen haben können. Dieses macht noch wahrscheinlicher das auffallende Mißverhältniß zwischen den Mannspersonen und Weibspersonen, welche am Tarantismus leiden, da man oft keine einzige Mannsperson unter tausend Tanzenden findet, die Weibspersonen aber in jener Gegend beständig zu Hause bleiben und durch ihre sitzende Lebensart, zur Erzeugung eines dicken, schweren Bluts, zu Stockungen und Verstopfungen in den Eingeweiden des Unterleibes und den hiervon gewöhnlich abhängenden hysterischen und krampfhaften Beschwerden, dem Veitstanz und der Melancholie, Gelegenheit geben. Noch mehr beweisen die Kinder, die Fremden und Reisenden, von welchen man kein Beyspiel weiß, daß sie vom Tarantismus befallen worden wären, die Gewisheit, daß dieser keine mit dem Tarantelbiss in Verbindung stehende Krankheit seyn kann, weil selbst aus *Herbsts* Gründen nicht einleuchtet, warum alle diese vom Solpugenbiss verschont bleiben, da die Kleidung der Kinder und der reisenden Frauenzimmer diesen Insekten eben sowohl den Zugang zu den unteren Theilen des Körpers erlaubt. Ferner wissen selbst die am Tarantismus leidenden und ihn als Folge des Tarantelbisses ansehenden Weibspersonen nie anzugeben, ob, wo und wenn sie gebissen worden sind; sondern ihre ganze Aussage gründet sich immer nur auf Muthmassung. Auch ist nicht einzusehen, warum die Kranken bloß zu einer gewissen Zeit des Jahres und nicht so lange forttanzen, als noch Tarantelgift im Körper rückständig ist, da sich dieses doch unmöglich im menschlichen Körper wieder erzeugen, und erst nach Jahresfrist wieder in dem Grade anhäufen kann, welcher vermögend ist, so heftige Nervenreizungen hervorzubringen. Endlich ist das Hauptsympton selbst im Widerspruche mit der erregenden Ursache. Das Tarantelgift soll einen beständigen Trieb zum Tanzen veranlassen und gleichwohl tanzen die am Tarantismus leidenden nie von sich selbst, sondern immer erst, nachdem sie durch die Musik hierzu erweckt worden sind. Hingegen ist es hypochondrischen und melancholischen Personen eigen, durch Musik zu einer ungewöhnlichen Munterkeit und zum Tanz erweckt zu werden. Dieses Mittel erheitert den Geist, setzt den Körper in Bewegung und befördert die Ausdünstung; kein Wunder! wenn davon in den meisten Fällen gute Wirkung verspürt wurde, und wenn man daher immer die Musik als Heilmittel des Tarantismus brauchte, ja sogar bewogen würde, sie dann anzuwenden, wenn die

die auf den Tarantelbiss zu erfolgen pflegende Schläfrigkeit und übrigen Zufälle, mit denjenigen des anfangenden Tarantismus selbst verwechselt worden sind. Die Eigenheiten der Geberden und des Tanzes, welche von den convulsivischen Bewegungen der Kranken abhiengen, machten es wahrscheinlich nothwendig die besondern Compositionen von Melodien und Gesängen zur Tanzkur zu erfinden, die man bey *Blancard*, *Hafenreffer* und *Schott* angegeben findet.

Ich komme nun noch auf einige Gründe gegen die gänzliche Abläugnung aller üblen Zufälle des Tarantelbisses. Erstlich fragt es sich: ob bey den neuerlich mit den Taranteln angestellten Versuchen, nicht das unschädliche Insekt mit dem schädlichen verwechselt worden ist? Denn nur ersteres, nicht aber letzteres konnte die gehörigen Resultate liefern. *Bagliv* sagt ausdrücklich, daß nur die apulischen und nicht einmal die auf den Anhöhen, sondern nur die in den warmen Gründen und Thälern Apuliens sich aufhaltenden Taranteln, und zwar nur in der heissesten Jahreszeit die von ihm geschilderten Zufälle hervorzubringen im Stande, alle übrige Arten aber unschädlich seyn, und der ungenannte Verfasser der Beobachtungen in den ökonomischen Heften stimmt hiermit vollkommen überein. „Es hat sich zugetragen, schreibt er, daß ich auf meinen Reisen in Italien und südlichem Frankreich, wo schlechte Wirthshäuser und Herbergen gar gemein sind, zuweilen in der Lagerstätte Taranteln gefunden habe, die sich ins Bettlacken verkrochen hatten, weil sie die Wärme sehr lieben; allein sie thaten mir nichts, und die Leute des Orts und der übrigen Gegend sagten alle, man wisse von keinem Beyspiel, daß dies Thier jemanden etwas zu Leide gethan habe. *Nur allein die in Apulien hält man für giftig und viele sind der Meinung, daß diese Art, wenn sie unter dem heissen Erdgürtel vorhanden wäre, durch ihren Biss tödtlich werden würde.*“ Offenbar hat man also darinnen gefehlt, daß man die Versuche nicht an Ort und Stelle; sondern in Neapel, in Rom etc. angestellt und vielleicht nicht einmal immer die Jahreszeit dabey in Betrachtung gezogen hat. Hierzu kommt, daß selbst das wahre, gefährliche Insekt, wenn auch mit demselben in den Feldern Apuliens, bey der drückendsten Sonnenhitze Versuche gemacht werden, durchaus nicht immer dasselbe Resultat liefern kann, weil es darauf ankommt, ob es den, zu einer bedeutenden Verwundung erforderlichen Giftvorrath noch bey sich führt, oder, ihn schon durch vorhergegangene Bisse verschwendet hat; denn alsdann muß es eben so unschädlich seyn, wie der bey erneuerten Stichen vom Gifte erschöpfte Skorpion. Überhaupt aber fragt es sich noch: ob diejenigen Männer, welche jene entscheidend seyn sollenden Versuche mit den Taranteln angestellt,

atellt, oder ohne eigne Versuche darüber abgesprochen haben, wirklich als competente und unpartheyische Richter anerkannt werden können? Vom Dr. *Claritio* erfährt man nicht, ob er, ehe er sich von den Taranteln beissen liefs, nicht ein Präservativ genommen, oder wenigstens Wein getrunken hat, dessen Gebrauch vor oder nach dem Bisse der Taranteln, keinesweges für unbedeutend und nutzlos angesehen werden darf, da der Wein von jeher gegen die Aufnahme der Krankheitsstoffe mit offenbarem Nutzen, als ein treffliches Verwahrungsmittel angewendet worden ist. Die Versuche *Borchs* und des ungenannten Verfassers des Aufsatzes in den ökonomischen Heften, werden daher durch den Gebrauch des Weins ganz zweydeutig. Der Gebissene des letzteren selbst versicherte, er würde das Jucken, welches der Tarantelbiss veranlafste, nicht ausgehalten haben, wenn er sich nicht berauscht hätte. Da nun aber die bisher angestellten Versuche selbst noch diesen und ähnlichen Zweifeln unterworfen sind; so verräth es wenigstens Voreiligkeit, im Vertrauen auf dieselben im nördlichen Teutschlande eine Sache für thöricht und lächerlich erklären zu wollen, die durchaus mehrjährige, an Ort und Stelle selbst gemachte und gesammelte Erfahrungen voraussetzt.

In Rücksicht *Herbsts* besonderen Meinung, welcher lieber Solpugen annimmt, um nichts auf die Taranteln kommen zu lassen, scheint mir doch, daß von der *Aranea Avicularia*, deren Giftigkeit anerkannt und durch den Bau ihrer Gebißwerkzeuge so gut, als die Giftigkeit der Solpugen erwiesen worden ist, eben sowohl ein analogischer Schluß auf kleinere Spinnen statt finde, als *Herbst* von den grösseren Solpugen auf die kleineren macht, wenn auch die Wuth, mit welcher sich die gereizte italiänische Tarantel zur Gegenwehr setzet, nicht schon zu erkennen gäbe, daß sie nicht unvermögend sey, ihren Gegner auf eine empfindliche Art zu empfangen, und die Giftigkeit der ausserhalb Italien vorkommenden Taranteln nicht durch die glaubwürdigsten Zeugnisse der russischen Naturforscher ausser Zweifel gesetzt worden wäre, und auf die Giftigkeit des ganzen Tarantelgeschlechts zu schliessen berechtigte. In der Krimm wurden nach *Pallas's* Erzählung fast bey jedem Regimente des Nachts zwey bis sechs Personen von den Taranteln beschädiget, welche sich den Nachtfeuern näherten und in die Zelter liefen, wo Licht brannte. Die Gebissenen schrien beständig für Schmerzen, wurden unsinnig, sprachlos, lachten wider Willen, quälten sich jämmerlich, und hatten grosse Hitze. Der gebissene Theil schwoll auf, wurde roth, blau, schwarz und solche Patienten starben in zwey bis drey Tagen. Doch hatten nur wenige dieses Loos, und die meisten wurden gerettet und in vier bis acht Tagen ge-

gesund, wenn man ihnen gleich Theriak gab, und diesen auch äusserlich auflegte.

Auch die dalmatische Tarantel, welche die Einwohner der Grafschaft Tran Pauk nennen, haaricht und gefleckt, wie die apulische Tarantel, nur in der Farbe verschieden ist, ist nach Lister sehr wild und bösartig. Die Bauern, die in der heissen Jahreszeit im Felde arbeiten müssen, werden oft von derselben gebissen. Ihre Kur besteht aber darinnen, daß sie den Kranken auf ein schlaffes, oben an Haken befestigtes Seil setzen und fünf bis sechs Stunden schwingen — ein Mittel, welches viel Ähnlichkeit mit der italiänischen Behandlungsart der von den Taranteln Gebissenen hat.

Noch gedenkt die Verfasserin der *Voyages to the Madeira* einer gefährlichen Tarantel. „Man findet, schreibt sie, auf Antigua an felsigten Orten und unter alten Ruinen eine Art von Tarantel, deren Biß Convulsionen und Strangurie verursacht, und zu Zeiten tödtlich seyn soll. Doch hat die Musik auf die Gebissenen keine besondere Wirkung.“ Diese und ähnliche Erzählungen rechtfertigen sicher mehr die ältere, als die neuere Meinung über die Schädlichkeit des Tarantelbisses, und lassen um so weniger einsehen, warum man gerade die in einer nicht minder warmen Gegend sich aufhaltenden apulischen Taranteln für ganz schuldlos erklären will, da nach dem, was von der Schädlichkeit der Spinnen überhaupt gesagt worden ist, ungleich kleinere Spinnen, als die Taranteln sind, schädlich werden können.

75. Die amerikanische Vogelspinne. Tab. IX. Fig. 2—9.

Aranea Avicularia thorace orbiculato convexo: centro transversim excavato. Linn.

Syst. nat. T. I. P. V. p. 2957. n. 32. Amoen. acad. I. p. 323. — Habitat in

America, aviculis, insectis insidians, trochilos exhaustiens.

Albin natural Hist. of the Spiders, Tab. XXXIV, XXXV. Fig. 173 et 174.

Amoreux Notice des Ins. p. 214.

Backers Beyträge zum nützlichen Gebrauch des Mikroskopi, Th. II. Augsb. 1754. 8. Kap. XX. S. 531.

Bankrofts Naturgeschichte von Guiana, aus dem Engl. Frankf. u. Leipz. 8. 1769. S. 148. Vogel- oder Kolibrispinne.

Berlinische Mannigfaltigkeiten, B IV. S. 515. Nhamdu, der Kolibrifresser, B. V. S. 66. Naturgeschichte der Brasilianischen Winkelspinne.

Bibliothèque universelle et historique de l'année 1687 Tom. IV. aus dieser in Berl. Samml. B. VIII. S. 467.

Blanckard van de Rupsen, Wormen, Maden etc. Tab. XVII. Fig. A. in der deutsch. Ausgabe: Schauplatz der Raupen, Würmer und Maden, Leipz. 1690. S. 99. Tab. XVII.

Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 391. n. 5. *Aranea Avicularia*, die Buschspinne.

Bomare Dict. Tom. VII. p. 370.

Clusii, C. Curae posteriores, Antverp. 1611. Folio, p. 47.

Cur-

Cuvier Tableau élémentaire, p. 469. *L'araignée des oiseaux*.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 72 und 122. Tab. XXXVIII. F. 8 — 10. *Araignée des oiseaux, die Vogelspinne*.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 346. n. 48. Spec. ins. II. p. 545. n. 46. Syst. Ent. p. 438. n. 35.

Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 273. *Araneus maximus*, Holländ. *Spinnen - Koppen*.

Jonstonii Hist. nat. de Insect. Lib. II. p. 140.

Kleemanns Beyträge zu Rösels Insectenbelust. Th. I. S. 85. Tab. XI und XII. *Die grosse schädliche, braune, zottigte Westindische Winkelspinne*.

Knorr, G. W. Deliciae Naturae selectae II. p. 20. Tab. F. Fig. 1. 2.

Laet, J. de, Novus Orbis, T. 570.

Leskes Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 489. n. 3.

Lessers Theol. d. Insekten, S. 65. *Nhamduguacu*.

Marcgravii, G. Hist. rer. nat. Brasil. Lib. VII. Cap. III. p. 248. *Nhamdu Guacu, der Brasilianer*.

Martini Naturlexik. II. p. 240.

Mead, R. Amechanical account of Poisons in Several essays, p. 88.

Merian, M. S. Dissert. de generat. et metamorph. ins. Surinamens. Hagae 1736. p. 18. Tab. XVIII.

Meyer's, D. F. A. A. Versuch zur näheren Bestimmung einiger schädlichen Insekten, in Voigts

Magaz. für das Neueste aus der Phys. und Naturgesch. B. IX. St. II. S. 83. *Amerikanische Vogelspinne*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1080. n. 31. *Der Kolibrifresser*.

Museum Lud. Ulricianum, p. 428.

Neuer Schaupt. der Nat. II. S. 191.

Neues Hamburg. Magaz. St. 84.

Olearii Gottorfische Kunstkammer, 4. 1666. p. 29. Tab. XVII. F. 2. *Ar. Avicularia*.

Onomat. Hist. Nat. P. I. p. 668. *Die Vogelspinne*.

Pisonis, G. de Indiae utriusq. re naturali et medica Lib. XIV. p. 284 und ejusd. de Medicina Brasiliensi Lib. IV. p. 44.

Quatremere-Disjonval Araneologie. S. 107. *Die surinamische Vogelspinne oder Buschspinne*.

Reise eines franz. Officiers nach den Inseln Frankr. und Bourbon, dem Vorgeb. d. G. H. Altenb. 1774. 8. S. 100. *Die grosse fürchterliche Spinne*.

Schwammerdamm's Bibel der Nat. S. 20.

Sebae locupl. rer. nat. Thes. descript. Tom. I. p. 109. Tab. LXIX. F. 2. 3. Tom. II. Tab. XXXXI. C.

Sulzers Geschichte der Insekten, S. 248. Tab. XXXV. Fig. 15. *Die Kolibrifresserin*.

Unzers, J. A. Sammlung kleiner physikalischer Schriften, S. 263.

Wormii, O. Museum, Tab. 244.

Diese Riesin unter den Spinnen, wovon gegenwärtige Abbildung (Tab. IX. Fig. 2.) nur eine von mittlerer Grösse vorstellt, ist nach *Fermin* meistens einer Faust groß, nicht selten aber hat sie mit ausgestreckten Füßen den Umfang der größten Handfläche, nach *Mead* aber eine Grösse, welche diejenige der größten europäischen Spinnen, wohl funfzig mal übertrifft. Ihre ganze Oberfläche ist rauhaaricht, bis auf das Brustschild, welches mit kürzeren und weniger borstigen Haaren bewachsen ist, im Alter aber soll sie mit einem sammetartigen Schimmel bedeckt seyn. In Rücksicht der Farbe, welche nach jeder jährlich erfolgenden Häutung dunkler wird, findet man zweyerley Abänderungen, eine grosse schwarzbraune oder dunkelolivfarbe mit rost- oder zimmtfarbigen Fussenden, und eine kleinere, deren ganzer Körper letztere Farbe hat. Unten, um die Maxillen (Fig. 4.) haben jedoch beyde Varietäten fuchsrothe Haare. Der Brustschild (Fig. 2.) ist grösser als der Hinterleib, vorne etwas schmaler, hinten breiter und eckigter, obenher aber flach und in der Mitte mit einer nabelförmigen Vertiefung versehen, aus welcher gegen den Rand des Brustschilds so viele Furchen auslaufen, als die Spinne Füße hat. Zwey dieser Furchen umfassen am Vordertheile des Brustschilds eine kleine, länglichte, in die Quere liegende, am Vorderrande zweymal

mal am Hinterrande und an den zwey Seitenrändern einmal ausgeschweifte Erhabenheit, die von Haaren entblößt und unter dem Mikroskope betrachtet (Fig. 3.) röthlicht- dunkelbraun, höckericht und mit verschiedenen Warzen besetzt erscheint. Auf dieser Erhabenheit sind die acht rothgelben blinkenden Augen vertheilt. Zwey davon, welche in gelbe Ringe gefassten Edelsteinen gleichen, sind vollkommen rund, weit grösser, als die andern und liegen in der Mitte neben einander. Von den sechs übrigen, welche alle oval sind, stehen die zwey grösseren in den zwey stumpfen Vorderecken, die vier kleineren aber mehr gegen die zwey Hinterecken dieses Augenhügels gekehrt.

Die zwey am Vorderrande des Brustschilds neben einander liegenden, unterwärts gekrümmten Maxillen (Fig. 2. b.) übertreffen im kleinen das fürchterliche Gebiß eines Löwen und setzen die Schädlichkeit und Gefährlichkeit dieser Insekten, auch ohne weitere Erfahrungen, ausser Zweifel. Jede Maxille besteht aus einem braunen, breiten und hartschalichten Hintertheile, welcher unten mit einer Reihe von acht kleinen Zähnen (Fig. 6. b.) und mit fuchsrothen Haaren, oben aber mit braunen Borsten besetzt ist, und aus einem gebogenen langen Zahn, oder einer Klaue (a.), welche überaus spitzig, hart und glänzend schwarz ist. An der Spitze und dem scharfen vordern Rand dieser Klaue, welche das Insekt ausser der Gebrauchszeit einschlägt (Fig. 5.), entdeckt man schon mit blosen Augen eine Vertiefung, welche unter dem Mikroskope (Fig. 7. a.), wie eine länglichtrunde und schmale Spalte erscheint. Diese ist das eigentliche Giftloch dieses gefährlichen Insekts, durch welches dasselbe seinen schädlichen Saft in die mit den Spitzen dieser Maxillen geschlagenen Wunden fliessen läßt. In dem Wahne, daß eine besondere Heilkraft in denselben stecken mögte, hat man ehemals diese Maxillen in Gold eingefasst und sich derselben als Zahnstocher zur Verhütung der Caries in den Zähnen und der Zahnschmerzen bedient. An die Maxillen schliessen sich zu beyden Seiten die ziemlich langen, aus fünf Gliedern bestehenden Fänger oder Palpen (Fig. 2. a. a. und Fig. 4. a. a.) an, deren Vorderglied stark behaart ist. Beym Männchen sieht man am untern Rande (Fig. 8. a.) dieser Palpen eine kleine glänzende Kugel mit einem sehr dünnen und spitzigen hakenförmigen Anhang. Wahrscheinlich ist dieser Theil das männliche Geschlechts- glied; vielleicht dient er auch noch besonders zum Festhalten der Beute und zu ihrer Annäherung an die Maxillen. Ausser den Fresswerkzeugen sind noch am Brustschilde befestiget, die acht langen, dicken und haarichten Füße, deren vorderes und hinteres Paar länger als die zwey mittleren Paare ist und oft mehr
als

als vier Zoll in der Länge zu haben pflegt. Jeder Fuß besteht aus vier Gliedern, wovon das dritte des ersten Paares eine rauhe, knotige Hervorragung (Fig. 2. c. c.) hat, alle aber mit breiten, oben erhabenen, unten platten Fußblättern und zwey kastanienbraunen Klauen (Fig. 9.) versehen sind. Den runden, oben gewölbten Hinterleib vergleichen einige, der Grösse nach, mit einem Tauben- andere mit einem Hünereye, welche Verschiedenheit nothwendig von der verschiedenen Grösse des ganzen Insekts selbst abhängt. Hinten ist er mit zwey schwanzähnlichen, haarichten, und zweygliedrichten Anhängen versehen (Fig. 4. d.), welche bey dem Männchen länger als bey dem Weibchen sind, von *Seba* für die Geschlechtstheile gehalten werden, wohl aber nichts anderes als die Spinnwarzen sind, da noch zwey ähnliche kleinere unter denselben liegen. *Piso* meldet, daß sie sich mit verkehrten Leibern begatten. Doch gehört dieses noch zu dem unberichtigten Theil der Naturgeschichte dieser Spinnenart.

Ihre Nahrung besteht in allerley Insekten. Vorzüglich verfolgen sie die surinamischen Waldameisen und Kakerlaken. Sogar wagen sie sich an kleine Vögel, besonders an die Kolibris, die sie in ihren Nestern überfallen, tödten und ihre Eyer aussaugen. Von letzterer Eigenschaft hat man ihnen auch den Namen *Vogelspinnen* oder *Kolibrifresserinnen* gegeben.

Ihr Vaterland ist Südamerika, vorzüglich Surinam und die Insel Mevis, wo sie sich in den Löchern alter Mauern, hauptsächlich aber auf Bäumen, nach *Fermin* auch auf den Pflanzungen zwischen den Wurzeln, die zur Nahrung der Sklaven dienen, als Patatten, Ignamen oder Tejan, und auf der Krone der Ananas aufhalten. Sie spannen keine grossen Gewebe aus, sondern spinnen sich geräumige, eyförmige Nester, oft zwischen den Baumblättern, oft blos an die Baumäste, mit welchen diese Nester, die ihnen zur Wohnung und Aufbewahrung ihrer Eyer dienen, so fest zusammen hängen, daß sie nur mit Mühe losgerissen werden können. Wollen sie sich von einem hohen Baume herablassen; so ziehen sie einen dicken Faden, an welchem sie langsam herabsteigen.

Man hat die Schädlichkeit der amerikanischen Vogelspinne dadurch zweifelhaft zu machen gesucht, daß man, wie *Blanckard*, *Mead* und *Markgrav* versichern, sich ihrer Maxillen zu Zahnstochern bediente, welche doch eigentlich die Giftlöcher dieser Insekten enthalten. Da aber diese Maxillen nur die Giftleiter, nicht die Behältnisse des Giftes sind, der erst auf gegebene Veranlassung durch dieselben ausfließt, da ferner das Gift solcher Insekten nach ihrem Tode nicht mehr wirksam zu seyn pflegt, indem es seinen animalischen Geist verloren hat; so sind

sind diese Maxillen bloß als ausgetrocknete Hülßen und die ihrer inneren Fläche vielleicht noch anklebenden, unbedeutenden Gifttheilchen um so mehr als gänzlich unschädlich anzusehen, da sie, wenn sie auch durch den Speichel erweicht würden, doch nicht durch das zusammengezogene Giftloch mehr dringen können, und die übrige hornartige Oberfläche der Maxillen, kein Durchschwitzen des aufgelösten Gifts verstattet. *Amoureux*, *Blumenbach*, *Degeer* u. a. m. halten im Gegentheil den Biß dieser Spinne nicht nur für schädlich, sondern auch für sehr gefährlich, und *Merianin* schreibt, daß sie mit ihren spitzigen Zähnen, gefährlich beissen und verwunden könne, wenn sie zu gleicher Zeit eine gewisse Feuchtigkeit in die Wunde spritze. Nach *Fermin* ist ihr Biß sogar tödtlich, wenn nicht auf der Stelle die besten Heilmittel dagegen angewendet werden. Der von ihr Verwundete fällt sogleich in Ohnmacht, auf welche ein tiefer Schlummer folgt, und der gebissene Theil wird grün, gelb und schwarz und fängt an stark zu schwellen. Auch *Piso* versichert, das Übel nehme öfters so sehr überhand, daß es unheilbar werde, und schreibt ausserdem noch den Haaren dieser Spinne eine brennende Kraft zu, wenn sie auf die bloße Haut des Menschen fielen, welches wegen ihrer borstigen Beschaffenheit eben so wohl, wie bey den haarichten Raupen, der Fall seyn muß.

76. Das Jaikische Sechsauge. Tab. IX. Fig. 10.

Aranea Senoculata, thorace subgloboso, abdomine fasciis flavis nigrisque vario. *Lepechins* (Iwan) Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. 4. Altenburg 1771. Th. I. S. 316. Tab. XVI. Fig. 1. — Habitat in Russia australe.

Berlinische Sammlungen, B. VIII. S. 510. Fig. 5.

Listers Naturgesch. der Spinnen v. Göze, S. 264. n. 135. *Das Jaikische Sechsauge*.

Diese Spinne ist acht bis neun Linien lang, hat nur sechs Augen, zwey gelbe, schwarzpunktirte Palpen, ein graugelbliches Brustschild, einen ziemlich langen Hinterleib, welcher wechselsweise mit gelben und schwarzen Binden bezeichnet ist, gelb und schwarz geringelte Füße, von welchen das vordere Paar schwarze, die zwey hintern Paare rostfärbige Schenkel haben.

Sie ist in der Jaikischen Steppe zu Hause, macht ihr Gewebe horizontal auf den Gewächsen, und wird wegen ihrer Giftigkeit von den Kalmücken so sehr, als die Taranteln gefürchtet,

77. Der Jaikische Vierpunkt. Tab. XIII. Fig. 19.

Aranea quadripunctata, thorace depresso, abdomine excavato, globoso, lobato, punctis in dorso nigris. Lepechins Tagebuch Th. I. S. 316. Tab. XVI. F. 2. —

Habitat in Russia australe.

Berlinische Sammlungen, B. VIII. S. 510. Fig. 6.
Listers Naturgesch. d. Spinnen v. Göze, S. 265.
n. 136. *Aranea quadripunctata*, der Jaikische Vierpunkt.

Pallas Spicil. Zool. p. 46. Tab. III. Fig. 14. 15.

Aranea lobata, nach dessen eignen Uebersetzung, S. 71. Tab. III. F. 14. 15. Die Winkelspinne mit wulstigem Hinterleibe.

Petiverii Gazophyl. Tab. XII. Fig. 11. *Araneoides Capensis*.

Grösser als die vorhergehende Spinne ist der Jaikische Vierpunkt, welcher ebenfalls nur sechs schwarze Augen in einer Reihe auf der Stirne führet. Seine ziemlich langen Palpen sind wie der ganze Körper silberfarb, der länglichtrunde Brustschild mit zwey schwarzen Streifen bezeichnet, der ovale, breite und dicke Hinterleib mit sechs Einkerbungen versehen, wodurch er ein lappichtes Aussehen erhält. Auf dem Vordertheile des Hinterleibes sieht man vier schwarze Punkte, wovon diese Spinne ihren Namen erhalten hat, auf dem Hintertheile aber vier Reihen kleiner Pünktchen. Ihre am Brustschilde befestigten acht Füsse sind ziemlich lang, schwarz und gelb bandirt. Ohngeachtet Pallas's *Aranea lobata* für die nemliche Spinne gehalten wird, so weicht seine Beschreibung doch zu sehr von gegenwärtiger ab, um nicht auf die Vermuthung zu kommen, daß sie eine ganz andere Art sey.

Sie bewohnt ebenfalls die jaikische Steppe, macht ein vertikalhängendes Gewebe, eilt auf die in dasselbe gerathene Beute mit der größten Hefstigkeit zu, und gehört unter die wegen ihrer Giftigkeit gefürchteten Spinnen jener Gegend.

78. Die spindelförmige Spinne. Tab. IX. Fig. 11.

Aranea fusiformis, corpore conico, thorace nullo. — Habitat in Insulis philippinis.

Albin natural Hist. of the Spiders, p. 55. Tab. XXXVI. Fig. 180.

Camelli, G. J. de Araneis et Scarabaeis Philippensibus observata, in philos. Trans. Vol. XXVII.

p. 310. n. 331. *Araneus mortiferus Smaragdino-aureus*. (Banagan, die Spindel).

Listers Naturgesch. der Spinnen v. Göze, S. 232. n. 11. Tab. V. F. 10. Die spindelförmige Spinne.

Unter ihren übrigen Schwestern zeichnet sich gegenwärtige, an sich kleine Spinne, durch ihre sonderbare Gestalt aus. Ihr ganzer Körper besteht nemlich aus vier Ringen, welche von vorn nach hinten allmählich schmähler werden, und am

am Ende eine konische Spitze bilden, wodurch er ganz die Gestalt eines Kreisel's erhält. Da er kein besonderes Brustschild hat, so sind die acht Füße an die drey vorderen Ringe artikulirt. Am vordern Theile, oder an der Basis des Kreisel's, sieht man zwey ziemlich lange Palpen. Die Farbe des ganzen Insekts ist grün mit Gold vermischt.

Es hält sich gerne auf dem Flieder und in dem abgefallenen und zusammengeballten Laub desselben auf. Sein Biß ist so giftig, daß, wenn er nicht auf der Stelle ausgebrannt, oder das Dekokt von Dana gebraucht wird, Menschen und Vieh davon sterben.

Skorpionen überhaupt.

- Aeliani Hist. animal. LVI. Cap. XX.
 Aldrovandi de animal. Insectis, Lib. V. Cap. XI. remedia ad venenum Scorpionis.
 Amoureux Notice des Ins. réput. venim. p. 41.
 Atwoods Geschichte der Insel Dominica, S. 61.
 Baglivi Dissertatio de Anatome, Morsu, Effectibus Tarantulae Antwerp. 1715. p. 618.
 Beckmanns Anfangsgründe d. Naturgesch. S. 118.
 Bell, J. Voyage depuis Petersburg dans diverses contrées de l'Asie, Paris 1766.
 Bibliothèque universelle et historique de l'année 1687. Tom. VI. p. 237.
 Bierling, C. Scorpio coctus innoxie devoratus. Eph. N. C. Dec. I. ann. 2. Obs. 205. p. 306.
 Blumenbachs Handb. d. Naturg. S. 392.
 Boccone, P. Museo de Fisica etc. Venezia 1697. 4. p. 120. de Scorpione Barbariae.
 Börners Samml. I. S. 537.
 Byrons, J. Reisen, Leipz. 1769. S. 126.
 Camerarius, J. R. Scorpium Aymon etc. veneni Scorp. malignit. ictus ratio in Syll. Memorabil. Cent. XVII. Part. 34 etc. p. 1393.
 Courten, G. de vulnere a Scorpium inflicto, Phil. Trans. n. 335.
 Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 127.
 Dioscoridis de Materia medic. Lib. II. C. 130.
 Eberhards Thiergeschichte, S. 225.
 Eberts Naturlehre für die Jugend, III. S. 139.
 Fabricii Spec. Ins. I. p. 550. Syst. Ent. p. 399.
 Fournier, Observations et expériences sur le charbon malin, à Dijon 1769.
 Friccius, M. Viperas, Scorpiones sola vulneratione laedere etc. in Paradoxis Med. parad. 7. p. 171.
 Fueßlys neues Magazin der Entomol. I. S. 62. schweiz. Ins. S. 61.
 Galenus de locis affectis, Lib. VI. Cap. V.
 Gesner, C. Historia Insector. libellus, qui est de Scorpione, Francof. 1621. Fol.
 Gmelins Geschichte der Gifte, Th. I. S. 298.
 Göze, Geschichte schädlicher Insekten, S. 178.
 Helbigius, J. O. de Scorpionibus non venenatis, Eph. N. C. Dec. I. ann. 9 et 10. p. 453. Obs. 194.
 Herbsts Natursyst. der ungeflügelten Ins. Heft I. S. 49. Heft IV.
 Jacobaeus, Ol. de Scorpione observationes, Act. Hafn. Vol. V. p. 265.
 Jonston Hist. natural. de Insectis, p. 130.
 Instit. Bononiens. T. I. p. 103. de Scorpionum aculeis Comment.
 Journal de Phys. Tom. XXXV. Amoureux: Description methodique d'une espece de Scorpion roux commun à Sauvignargues en Languedoc.
 Klein, J. Th. in den Versuchen und Abhandl. d. naturforsch. Gesellsch. in Danzig. Th. II. Danzig 1754. S. 207.
 Lanzonus, J. de ictu Scorpionis, in Eph. N. C. Dec. III. ann. 1. obs. 20. p. 39.
 Leeuwenhoek de Scorpione indico, in arcanis naturae Ep. 118. Continuat. Epist. Arcan. Nat. Ep. 123. p. 167. Fig. 2 et 3.
 Leonis (Johannis Africani) totius Africae descriptio, Lib. IX.
 Leskes Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 489.
 Lucatelli Arcanorum Theatrum.
 Mallet de la Brossiere l'Histoire des Observations faites à Tunis sur deux personnes piquées par le scorpion, dans le Vol. II. de la Société Roy. de Médecine, ann. 1777. 1778. p. 315.
 Maupertuis (P. L. M. de) expériences sur les Scorpions, Mém. de l'Acad. de Paris 1731. p. 317. c. f.
 Müller's Linn. Nat. S. d. Ins. B. II. S. 1088.
 Muralto, Scorpium, in Eph. N. C. Dec. II. ann. 1. obs. 66. p. 166.

- Neuer Schauplatz d. Nat.* VIII. S. 53.
 Oldendorp Gesch. der Mission, Th. I. S. 129.
Onomat. Hist. nat. P. VII. p. 67.
 Fattersons Reise in das Land der Hottentotten, Berl. 1790. S. 342.
 Plinii Hist. nat. Lib. XI. Cap. XXV.
 Pocockes, R. Beschreibung von Kleinasien, Th. III. Buch II. Hauptstück 5. S. 87. §. 77.
 Redi, F. Opusculor. pars prior s. Exper. circa Generat. Ins. Amstel. 1686. p. 66. 84. c. Fig. Scorp. Funetani.
 Rhodius, J. Scorpil partus, vis venefica, antidotum. Observ. Cent. III. obs. 90. p. 170.
 Rösels Insektenbelustigung, Th. III. S. 362.
 Russels Beschreibung v. Aleppo, Götting. 1798. Th. II. S. 119.
 Schaw, Th. Reise durch die Barbarey und das Morgenland, Th. I. S. 282.
 Schwammerdamms Bibel der Natur, S. 41. Tab. III.
 Scopoli Entom. carn. p. 404.
 Seba, A. locupletiss. rer. nat. thesauri accurat. descript. T. I. p. 111.
 Sulzers Gesch. d. Insekten, S. 255.
 Thaddaeus Dunus de Scorpionis veneno, Miscell. Cap. IX. p. 124.
 Turpin histoire de Royaume de Siam, Tom. I. p. 342.
 Unzers, J. A. medicinisches Handbuch, Leipz. 1789. S. 642.
 Valentini, M. B. Museum Museorum, Francof. ad Moen. 1704. Vol. II. Cap. 38. Amphitheatr. Zoootomic. Francof. 1742. Fol. Pars II. p. 192. descriptio anatomica Scorpil.
 Vallisneri in Eph. N. C. Ent. III. Obs. 31. p. 58.
 Vandellii, D. Dissertationes tres de Aponii thermis, de nonnullis insectis terrestribus etc. Patoae 1758. 8. s. Tab. (agit quoq. de Scorpione.)
 Wedel, G. W. ex Ocyomo non nasci Scorpiones, Eph. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 79. p. 115.

Auch dieses Insekt hat sich schon in den ältesten Zeiten durch seine Giftigkeit bekannt gemacht. Die alten Griechen nannten es *σκόρπιος*, die alten Römer *Scorpius* und *Scorpio* und diese Benennung behielten die Teutschen, Franzosen und Engländer bey, welche es *Scorpion*, so wie die Holländer und die Spanier, es *Scorpioen* und *Escorpion* zu nennen pflegen. Seine Grösse, welche schon nach dem Grade seines sehr langsam mit dem Alter fortrückenden Wachsthum und dem Geschlechte sehr verschieden ist, indem die Weibchen immer die Männchen an Länge und Dicke übertreffen, ist es noch mehr in Rücksicht des Vaterlandes. Am kleinsten unter allen sind nemlich die europäischen; etwas grösser die amerikanischen, noch grösser die afrikanischen und am allergrössten die asiatischen Skorpione. Überhaupt aber pflegt ihre Grösse vom Kopf- bis zum Schwanzende von einem bis zu acht Zoll zu steigen. Eben so verschieden ist auch die Abweichung ihrer Farbe. Ganz jung, wenn sie so eben den Leib der Mutter verlassen haben, sind sie weifs, dann aber verändern sie allmählich, nach Verschiedenheit der Art, ihre Farbe, die bald schwarz, bald gelb, bald braunroth, bald dunkelbraun, bald grün und schwarz gefleckt etc. ist. Da sie aber, wie die Krebse, ihre alten Überzüge oder Bälge, welche man bey *Klein* abgebildet findet, jährlich ablegen, oder sich häuten; so wird auch ihre Farbe jährlich dunkler.

Wie bey den Spinnen ist auch bey den Skorpionen Kopf und Brustschild in einem Stücke vereinigt und ersterer nur der Vordertheil des letzteren. Überhaupt aber ist der Brustschild konvex, vorne schmaler, als hinten und hornartig.

Oben

Oben und beynahe in der Mitte desselben stehen an den Seiten einer kleinen Erhöhung zwey grosse, blitzende, hemisphärische Augen (Tab. X. Fig. 2. *a. a.*), an der rechten und linken Seite des Vorderrands aber, bald zwey, bald drey kleinere (*b. b.*), nach Verschiedenheit der Arten, neben einander. Die vor letzteren Augen gleich unter der Stirne eingelenkten Fresswerkzeuge bestehen aus zwey grossen scheerenförmigen Palpen, zwey Mandibulen oder Fresszangen, zwey Maxillen und einer doppelten Lippe.

Die Palpen (Tab. X. F. 1. *d. d.* u. F. 8. *c. c.*), welche viel länger, als die Füsse sind, bestehen aus fünf Gliedern, wovon das erste und kürzeste unmittelbar am Brustschilde, zwischen den Mandibulen und Lippen, dicht am Maule eingelenkt, und wie die drey nachfolgenden mit mehr oder weniger scharfen, in Linien aneinander gereihten Körnern besäet ist, das letzte, breiteste und längste aber vollkommen der Scheere eines gemeinen Flusskrebsses gleich sieht, und einen obern, unbeweglichen und einen untern, beweglichen Finger hat, deren scharfe Innenränder mit grösseren und kleineren Zähnen besetzt sind. Alle diese Palpenglieder hängen unter einander mittelst hellgelber Häute zusammen. Ausserdem, daß die Palpen die Stelle der Fühlhörner vertreten, indem die Skorpionen damit die Körper betasten, dienen sie ihnen noch besonders zum Fangen und Festhalten der Beute und selbst zur Unterstützung der Füsse im Fortrücken beym Laufen.

Die Mandibulen, oder Fresszangen (Tab. X. Fig. 1. *c.* Fig. 2. *c. c.* Fig. 3. *a. a.*) sind vor und zwischen den Palpen eingelenkt, hornartig und bestehen aus zwey Gliedern, wovon das vordere ebenfalls scheerenförmig und aus zwey an der Innenseite gezähnten und mit Haaren bewachsenen Fingern zusammengesetzt ist, deren äusserer, wie bey den grossen Scheeren, nur eine Bewegung zuläßt. Gleich unter den Mandibulen liegen die zwey hornartigen, breiten, mit ihren Spitzen hakenförmig gegen einander gekrümmten Maxillen, welche von der Unterseite betrachtet, gleich ausserhalb, hinter der Lippe hervorblicken (Tab. XV. Fig. 11. *a. a.*) von oben aber erst nach weggenommenen Mandibulen sichtbar werden, wo sie (Fig. 12. *a. a.*) dann dicht auf den Lippen (*b. b.*) liegen. Die Mandibulen und Maxillen nehmen zwischen sich, an ihrer Grundfläche das Maul (Fig. 12. *c.*) auf, welches von der Unterseite wieder von den zwey dreyeckigten, am äussern Rand etwas bogigten, am innern mehr geradelinichten, hornartigen Lippen (Fig. 12. *b. b.*) bedeckt wird. Wenn der Skorpion frisst, oder vielmehr saugt, welches sehr langsam geschieht; so sind seine scheerenförmigen Palpen in einer Art wankender Bewegung, welche gleichzeitig mit der Bewegung des Herzens oder mit der Respiration zu seyn scheint.

Der

Der mit dem Brustschilde in einem Stücke fortlaufende Hinterleib ist länglichtrund, oben und unten convex und, von der Rückenseite, aus sieben hornartigen Ringen zusammengesetzt, zwischen welchen bey trächtigen Weibchen und solchen Skorpionen, die sich sehr angefressen haben, ein häutiges Wesen sichtbar wird. An der weicheren Bauchseite (Tab. X. Fig. 6.) sieht man hingegen nur fünf Ringe, wovon jeder zu beyden Seiten einen braunen hornartigen Fleck hat, welcher ein Luftloch enthält, so daß also auf jeder Seite des Hinterleibes vier Luftlöcher zu stehen pflegen. Ausserdem ist noch eine Öffnung (Fig. 6. u. 7. a.) gleich am Anfange des Hinterleibes zwischen den hintersten Füßen sichtbar, welche mit einer am Innenrande runzlichten Wulst umgeben ist. Einige Naturforscher hielten diese Öffnung für den After, den aber *Herbst* mehr bey der Einlenkung des letzten Schwanzglieds sucht und dagegen mit andern Naturforschern dafürhält, daß sie zu den Geschlechtstheilen dieses Insekts gehöre. Sowohl jene Öffnung, als die umgebende Wulst (Tab. XV. Fig. 11. k.) werden zum Theil von einem dreyeckigen häutigen Läppchen (g.) bedeckt, mittelst welchem die zwey Kämme (i. i.) an dem Hinterrande des Brustchilds befestiget sind, und welches sich zugleich mit bewegt, wenn sich die Kämme bewegen. Noch immer ist man in Rücksicht des wahren Nutzen dieser Kamm- oder flossenartigen Theile ungewiß. *Amoreux* und andere, welche bemerkten, daß sie sich wie die Füße bewegten, waren der Meinung, daß sie auch eine ähnliche Bestimmung hätten, und dem Skorpione zum anklammern, oder dazu dienten, daß er sich wie auf einer Spindel herum-drehen könnte, während seine Füße seitwärts und rückwärts Bewegungen machten: Denn der Skorpion pflegt bald furchtsam rückwärts, bald verwegen vorwärts zu gehen. *Fuefsly* hielt sie hingegen für eine Art Nahrungswerkzeuge, aus welchem die, oft noch zwölf Tage nach der Geburt, am Körper der Mutter verweilenden Jungen, ihre Nahrung zögen. Da aber auch das Männchen mit solchen Kämmen versehen ist, so ist wohl *Herbsts* Meinung die wahrscheinlichste, daß sie nemlich, gleich den ebenfalls an der Brust sitzenden Afterfüßen der Krebse, zum gegenseitigen Anklammern bey der Begattung bestimmt sind. Die an denselben befindlichen Finger oder Zähne, haben den grossen *Linné* verleitet, sie als Unterscheidungsmerkmale der Arten anzunehmen. Allein, da sich die Anzahl derselben bey einer und derselben Art nie gleich bleibt, so werden die Kammzähne wohl immer ein sehr trügliches Merkmal bleiben. Der Hinterleib des Skorpions verlängert sich in einen viel längeren, härteren und hornartigeren Schwanz (Tab. X. Fig. 1. c. f.), welcher aus sechs, mit mehreren gekörnten Längskanten versehenen

Gliedern besteht, und mit Haaren hin und wieder besetzt ist. Die drey ersten Glieder sind fast von einerley Grösse und Bildung, das vierte etwas länger, das fünfte das längste, das sechste und letzte aber ganz an Bildung verschieden. Es stellt nemlich nach *Maupertuis* eine kleine Phiole mit einem harten, spitzigen Halse vor, an welchem *Leeuwenhöck* nicht weit von der Spitze eine kleine länglichte Öffnung (Fig. 5. c.) auf jeder Seite entdeckt hat. Der Skorpion mag sitzen oder kriechen, so trägt er immer seinen Schwanz über dem Rücken nach vorne gekrümmt, zum Stiche bereit. Unten am Brustschilde sind die acht hornartigen Flüsse eingelenkt, deren Länge vom ersten bis zum letzten Paare proportionirt zunimmt. Ihre ersten und stärksten Glieder (Tab. XV. Fig. e. c. d. d. e. e. f. f.) bedecken beynahe die ganze untere Fläche des Brustschilds, die drey darauf folgenden sind fast eben so dick, doch länger, die drey letzten aber machen das Fußblatt aus, dessen Endglied mit zwey krummen Krallen versehen ist. Alle diese Glieder sind in den Gelenken durch weisse Häute mit einander verbunden.

Die gewöhnliche Nahrung der Skorpione sind Asseln, Spinnen, Heuschrecken und andere Insekten, die sie mit den Scheeren ihrer Palpen fangen, dann den Mandibulen und Maxillen überliefern und mit den Lippen aussaugen. Ist ihnen die Beute aber durch ihre Grösse überlegen, so strecken sie den Schwanzstachel über den Kopf und tödten sie zuerst durch den Stich. Fehlt es ihnen an der gewöhnlichen Nahrung, oder sie befinden sich gedrängt beysammen, so zehren sie einander selbst auf und sind so grausam, selbst ihre Jungen zu fressen. — Ein abermaliger Beweis von der Sorgfalt der weisen Natur für die Erhaltung der Menschen und Thiere, welche bey der grossen Fruchtbarkeit dieser Insekten nothwendig leiden müßte.

Die Begattung der Skorpione hatte noch niemand das Glück zu beobachten. *Fuefslys* Wahrnehmung war wahrscheinlich nur die Vorbereitung dazu. Vermuthlich geschieht sie mit aneinanderhängenden Unterleibsflächen mittelst der Kämme, durch eine Öffnung innerhalb der erhabenen Wulst. Nach der Beobachtung des *Aristoteles*, die durch *Redis* und *Maupertuis* Erfahrungen bestätigt worden sind, bringt aber das Skorpionweibchen lebendige Jungen zur Welt. Diese entwickeln sich wahrscheinlich erst aus Eyern im Mutterleibe, wo sie nach *Schaw* in der Grösse der Gerstenkörner durch eine sie überziehende durchsichtige Schleimhaut aneinander gekettet beysammen liegen. Ihre Anzahl ist sehr verschieden und steigt von zwanzig bis fünf und sechzig. Diese neugebornen Skorpione kriechen ziemlich geschwind auf dem Leibe ihrer Mutter herum, und verlassen sie gemei-

meiniglich erst nach zwölf Tagen, wo sie die erste Häutung überstanden haben, und ihre abgezehrte Mutter zu sterben beginnt.

Auch diese Insekten bewohnen nur die warmen und heissen Länder der alten und neuen Welt, und werden immer grösser, je wärmer das Klima ist. Man findet sie in Tirol, der mittäglichen Schweiz, in Italien, in südlichem Frankreich, und Spanien, auf der Küste von Guinea, am Vorgebürge der guten Hofnung, auf der Insel Java, wo sie mit unter von ungeheurer Grösse vorkommen, die kleineren Arten aber so häufig seyn sollen, daß man keine Küste, keinen Spiegel, keine Schilderey von der Stelle rücken kann, ohne Skorpione anzutreffen und ihrem Stich ausgesetzt zu seyn. Gemeiniglich halten sie sich am Tage im alten Holze, unter Steinen, in den Löchern alter Mauern, in Abtritten und überhaupt in finstern Winkeln auf, und gehen erst bey Nacht auf ihren Raub aus. Sie laufen dann schnell herum mit geöffneten Scheeren, mit in die Höhe gerichtetem Schwanz und Hinterleibe, wodurch sie ein furchtbares Ansehen erhalten. Nicht selten verirren sie sich auch in die Betten und Kleidungsstücke, und der sie unvorsätzlich Beleidigende wird dann unverdienter Weise gestochen.

Lange war man ungewiß, wie man sich die gefährlichen Zufälle erklären sollte, die auf die an sich leichte Verwundung durch den Skorpionstachel zu erfolgen pflegen. Man vermuthete blos, daß die Flasche des Stachels ein Giftbehältniß seyn müsse, bis mit der Entdeckung jener Öffnungen an der Spitze desselben, alle Schwierigkeiten wegfielen. Schon vorher bemerkte man bisweilen an der Spitze des Stachels ein Tröpfchen weisser Feuchtigkeit, vorzüglich dann, wenn man den Skorpion zum Zorn gereizt hatte, nunmehr aber sah man sehr deutlich links und rechts aus jenen Öffnungen diese Feuchtigkeit hervordringen, wenn man an der Flasche des Stachels stark drückte. Ohngeachtet dieser unlängbaren Thatsache ist doch *Herbst* der Meinung, daß der Stich der Skorpione für Menschen beynahe ganz unschädlich sey, und blos zu ihrer Vertheidigung diene, daß sie aber vom Hunger angetrieben, denjenigen bissen, der sie durch einen besonderen Geruch herbeylocke. Er scheint also die Schädlichkeit der Skorpione, welche er an anderen Stellen wieder anerkennt, blos auf ihren Biß schieben zu wollen, und hierzu durch die Ähnlichkeit ihrer Gebißwerkzeuge mit denjenigen der Solpugen bewogen worden zu seyn. Da aber letztere ungleich grösser, als die Gebißwerkzeuge der Skorpione sind, diese weit versteckter und zurückgezogener liegen, als daß so häufig vorkommende Verletzungen von ihnen zu erwarten seyn sollten, überdiß der den Solpugeniß wenig nachgebende Schaden des Skorpions, mit der

der Grösse seiner Gebißwerkzeuge in keinem Verhältnisse steht; so mögte wohl die sich auf Erfahrungen gründende ältere Meinung von der Gefährlichkeit des Skorpionstachels, wenigstens noch so lange ihre Richtigkeit behalten, bis neuere, blos in Beziehung auf die allerdings gefährlich scheinenden Gebißwerkzeuge der Skorpionen, angestellte Beobachtungen und Versuche, hierüber vielleicht bestimmter entscheiden und die älteren, von *Redi* und *Maupertuis* gemachten, entkräften mögen. Ersterer liefs im November eine junge Taube, ein junges Huhn und einen jungen Hund von einem aus Tunis erhaltenen Skorpion stechen, bemerkte jedoch darauf nicht die geringste schlimme Wirkung. Als aber eben dieser Skorpion, der überhaupt acht Monathe keine Nahrung bekommen, und drey Monathe in einer Erstarrung oder in einer Art von Winterschlaf zugebracht hatte, im Februar wieder zu sich kam, und, ohne alle Nahrung, allmählich seine vorige Stärke wieder erhielt; so liefs *Redi* nochmals zwey Tauben nach einander von ihm stechen, welche bald darauf unter den gewöhnlichen Zufällen einer giftigen Wunde starben. Bey der dritten Taube hingegen war der Stich des nemlichen Skorpions ohne Wirkung, wahrscheinlich deswegen, weil sein Stachel vom Giftsafte erschöpft war; denn den folgenden Morgen liefs *Redi* dieselbe noch einmal von ihm stechen und nun war der Stich ebenfalls tödlich. Ein Armer, dem er die getödteten Tauben gab, verzehrte sie ohne Nachtheil. Ähnliches Resultat ergab sich aus *Maupertuis* mit languedockischen Skorpionen angestellten Versuchen, zum Beweis, daß ihr Stich zwar nicht immer tödlich, aber doch immer sehr gefährlich sey.

Die Zufälle, wodurch sich die Gefahr und Giftigkeit des Skorpionstichs bey Menschen zu erkennen giebt, sind folgende: An der Stelle des Stichs sieht man anfänglich eine rothe Spur, die sich allmählich vergrössert, und gegen die Mitte schwärzlich wird. Zugleich empfindet der Kranke einen Schmerz und eine Hitze in der Wunde als ob er sich verbrannt hätte. Der leidende Theil entzündet sich, schwillt auf und es kommen nicht selten Blasen an demselben zum Vorschein. Ist die Verletzung an den obern Theilen des Körpers, so entsteht Geschwulst unter den Achseln, bisweilen auch an der Zunge, wodurch das Reden beschwerlich wird, ist sie aber an den untern Theilen, so schwellen Unterleib und Geschlechtstheile, und es entsteht bey dem männlichen Geschlechte Satyriasis. Einige Personen bekommen Fieberbewegungen, Frost und Erstarren der Glieder, andere Schmerzen durch den ganzen Körper, Zittern, um die Ränder der Wunde und auf der ganzen Oberfläche blaue Flecken mit heftigen Jucken. Der Schrecken bey empfindlichen und reizbaren Personen kann alle diese Zufälle verschlimmern, und so ge-

schiebt es oft, daß der Gestochene unter Brennen, Schlucken, Convulsionen und kalten Schweissen, ohne schleunige Hülfe, seinen Geist aufgibt.

Die Stärke und Gefahr der Zufälle richtet sich, ausser der eigenen Constitution des Gestochenen, seiner besonderen Reizbarkeit, üblen Beschaffenheit der Säfte, seinen Krankheitsanlagen, und der Beschaffenheit der verletzten Stelle selbst; auch nach verschiedenen anderen Umständen, die von dem Zustande abhängen, worinnen sich der Skorpion befindet. Es scheint hierbey nicht gleichgültig zu seyn, ob er frey oder gefangen ist, ob er zufällig, oder zu seiner Vertheidigung genöthiget, seinen Stachel braucht; ob er noch jung, oder schon ausgewachsen, ob er der Abkömmling einer kleinen, oder einer grossen, viel Gift in einem grossen Giftbehältnisse verwahrenden Art ist; welche Nahrung er vorher genossen hat; ob er gesättiget oder von Hunger und Durst gequält sticht, ob der Begattungstrieb noch nicht bey ihm eingetreten, oder ob er eben brünstig ist; ob die Witterung kalt oder warm und vorzüglich, wie das Klima beschaffen ist. In letzterer Hinsicht hat man von den friaulschen, steiermärkschen, schweizerischen, ungarischen, bannatischen, und französischen Skorpionen, welche zugleich die kleineren unter den europäischen Arten zu seyn pflegen, selten traurige und vielleicht nie tödliche Folgen gesehen. Auch haben die Skorpione der wärmeren Klimate Spaniens und Italiens kein absolut tödliches Gift. Nur von den apulischen versichert *Bagliv* daß sie eben so giftig, wie die apulischen Taranteln wären, eben die Zufälle hervorbrächten, und eben sowohl die Tanzkur erforderten. Er gedenkt zugleich eines Falls von innerlicher Vergiftung durch einen solchen Skorpion. Ein Bauernjunge habe nemlich eine Melone genossen, aus deren oberem, ausgehöhlten Theile er vorher einen Skorpion entfernt hatte, sey hierauf von einer schmerzhaften Kolik mit Fieber und anderen Zufällen befallen worden, deren Heftigkeit er endlich den dritten Tag unterlag. Die Skorpione auf Minorka sind nur bey heisser Witterung giftig. Die californischen, welche so häufig sind, daß sie oft mit unter den Speisen auf den Tisch gebracht werden, verursachen durch ihren Stich nur eine kleine Geschwulst und ein Paar Stunden Schmerz. Auf der Insel Dominika, wo sie sich vorzüglich in den Wäldern und in alten Häusern in grosser Menge aufhalten, veranlaßt ihr Stich zwar anfänglich einen kaum auszuhaltenden Schmerz, doch ist dieser von keinen weiteren Folgen begleitet. In Surinam bewirkt ihr Stich heftige Schmerzen mit Fieber. Man hat aber keine Gefahr zu besorgen, wenn man gleich venetianischen Theriak auf die Wunde legt. Auf den caraibischen Inseln und auf Isle de France veranlassen die an sich sehr kleinen Skorpione durch

ihren

ihren Stich einen viertelstündigen brennenden Schmerz, und höchstens ein kleines Fieber. Dagegen sind die Brasilianischen überaus groß und giftig. Weit gefährlicher sind nach *Schaw*, *Redi* und andern Naturforschern und Reisebeschreibern die afrikanischen Skorpione. In Tunis soll nach *Pagnius* Angabe, welchen *Redi* citirt, kein Jahr vergehen, wo nicht eine beträchtliche Menge Menschen an den heftigsten Zufällen des Skorpionstichs sterben, und *Leo Afrikanus* meldet, daß die Bewohner der Gegend von Pescara von der Menge und Giftigkeit der Skorpionen genöthigt wären, jene Gegend im Sommer zu verlassen und erst zu Anfang des Novembers zurückzukehren, wo diese Insekten ihre giftige Eigenschaft zu verlieren pflegen. *Patterson* vergleicht den Stich der afrikanischen schwarzen oder Felsskorpione, mit dem giftigsten Biß irgend einer Schlange. Ein Landmann ohnweit der Kapstadt wurde von einem solchen Skorpion in den Fuß gestochen und starb wenige Stunden nachher. Auch die auf Madagaskar einheimischen bewirken durch ihren Stich augenblicklich Ohnmacht. Mehr als die Bewohner aller übrigen Welttheile sind jedoch die Völker Asiens von Skorpionen geplagt. In Aleppo kriechen sie in den Sommernächten auf den Strassen und Treppen herum, und halten sich selbst oft unter den Matrazen auf, die auf den Terrassen ausgebreitet werden. Ihr Stich veranlaßt jedoch nur selten eine beträchtliche schmerzhaftige Geschwulst mit Erbrechen und Ohnmachten. In Persien aber, besonders zu Cascini sind sie so groß, schwarz und giftig, daß ihr Stich in wenig Stunden tödtet. Eben dieses ist der Fall auf der Insel Java und in Siam. *Turpin* erzehlt, daß die grossen schwarzen Skorpione daselbst den grossen Flußkrebse in der Grösse gleichkommen, und daß ihr Anblick Schauer und Entsetzen erregt. Zu Madras fand ein Kapitain einen solchen Skorpion auf dem Boden seines Schiffes. Man tödtete ihn, breitete ihn aus und fand ihn anderthalb Fuß breit und die Knoten auf den Schwanzgliedern so groß, wie Westenknöpfe. Der Stich eines solchen Ungeheuers tödtet gleich auf der Stelle.

Das gewöhnliche Heilmittel gegen den Skorpionstich ist in allen Welttheilen das Öl. Aberglaube ist es wohl, wenn man dieses Öl erst vorher mit Skorpion digerirt und es nun, unter dem Namen *Skorpionöl*, für wirksamer hält. In Italien braucht man sogar die Vorsicht dieses Öl überall in geheimen Gemächern vorrätzig zu halten, weil sich die Skorpione in dieselben gerne einschleichen, und die daselbst ihren Abtritt nemenden Personen verletzen. In schweren Fällen ist es nöthig, die innerliche und äusserliche Kur zu verbinden, Skarifikationen, Zugmittel, schweistreibende Mittel und vorzüglich das flüchtige Alkali anzuwenden, welches nach *Amoreux* fähig ist, das Gift der böartigen Skorpione zu entkräften.

79. Der deutsche Skorpion. Tab. XI. Fig. 2. 3.

Scorpio germanicus fuscus, articulus caudae ultimus pedesque lividi. Frons truncatus lateribus rotundatus. Tuberculum oculorum ante medium globosum postice carinatum. Oculi nigri, laterales duo minores. Tergo linea canaliculata. Corpus depressum glabrum; Caudae articuli compressi tergo canaliculati marginibus granulatis. Chelae depressae glabrae marginibus elevatis serratis obscurioribus. Corpus pone medium introrsum dente unico. Manus depressa, glabra marginibus elevatis usque ad apicem digitorum; digiti introrsum repando dentali. Pectines septem dentati. Herbsts Naturgesch. der ungeflügelten Ins. Heft IV. p. 71. n. 13. Tab. III. Fig. 2. —
Habitat in Germania australi.

Degeers Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII.
S. 133. n. 2. Tab. XL. Fig. 11 — 13. *Scorpio flavi-*
sandis, *Scorpion à queue jaune*, der Gelbschwanz.

Schaefferi Element. entomol. Tab. CXIII. Fig.
1 — 3.
Schwammerdamms Bib. der Natur Tab. III. F. 2.

Unser vaterländischer, vorzüglich in Tyrol einheimischer Skorpion, hat von der Stirne bis zum Schwanzende höchstens eine Länge von vierzehn bis fünfzehn Linien, einen dunkelbraunen Körper, eben solche Palpen aber einen mehr ins Gelbe fallenden Schwanz und dergleichen Füße. Der Brustschild ist am Vordertheile gerade abgeschnitten und etwas gekörnt, an den Seiten vor den vier Nebenaugen abgerundet, in der Mitte mit einem kleinen Hügelchen versehen, dessen beyde Seiten das dritte und grössere Paar Augen besetzen. Vor der Stirne stehen die zwey grossen Palpen, welche am Innenrande des letzten Armgliedes einen starken Zahn und glatte, plattgedruckte Hände mit punktirten Kanten haben. Der Hinterleib ist etwas gewölbt, und hat längs dem Rücken zwey Reihen kleiner brauner Hohlpunkte, an jedem Kamm des Unterleibes aber nach *Herbst* sieben, nach *Degeer* neun Zähne. Die Glieder des Schwanzes sind von den Seiten gedrückt auf dem Rücken rinnenförmig ausgehöhlt. Das Stachelglied (Fig. 3.) ist sehr bauchicht, der Stachel selbst (*a.*) nur kurz, stark gebogen und braun. Die Füße sind ziemlich breit, platt, und mit einzelnen Haaren besetzt.

Ausser einem leichten Schmerz mit einer bald vergehenden entzündlichen Geschwulst, ist dieser Skorpion wohl schwerlich fähig, einen Zufall von einiger Bedeutung durch seinen Stich hervorzubringen.

80. Der italiänische Skorpion. Tab. X. Fig. 1. 3. 4. 6. 7.

Scorpio europaeus pectinibus octodecimdentatis, manibus angulatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2962. n. 5. — Habitat in Europa magis australi, ad Helvetiae germaniaeque fines meridionales vsque etiam in Persia boreali, pectinum dentibus aliquando 7 — 10, cauda sub aculeo mucronata, viviparus.

- | | |
|--|---|
| <p>Aldrovandi de animalibus ins. p. 577.
 Amoreux Notice des Ins. p. 43. Tab. I. Fig. 1.
 Blumenbach's Handb. d. N. G. S. 392. n. 2.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 467. <i>le Scorpion d'Europe</i>.
 Degeer's Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 332. Tab. XL. F. 1. <i>Scorpio Maurus</i>.
 Fabricii Mant. Ins. I. p. 348. n. 5. Syst. Ent. p. 399. n. 5. Spec. ins. II. p. 551. n. 5.
 Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 272.
 Fuefsly's alt. Mag. d. Entom. B. II. S. 71. <i>Der schweizerische Skorpion</i>.
 Galeni Opera T. II. Lib. de Cibis boni et mali succi.
 Gmelins Reisen Th. III. S. 483.</p> | <p>Leske, Naturgesch. Th. I. S. 490. n. 2. Tab. IX. Fig. 22. a. b.
 Leeuwenhoek Opera III. 159. 167.
 Maupertuis in Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris ann. 1731. p. 223. Tab. XVI. F. 3.
 Mousfetti Theatr. Ins. p. 204.
 Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1093. n. 5. Tab. XXXIII. F. 3. <i>Der Europäer</i>.
 Museum Lud. Ulricianum, p. 429.
 Raji Historia Insector. p. 9.
 Rösels Insectenbelust. Th. III. S. 377. Tab. LXVI. <i>Der italiänische Skorpion</i>.
 Scopoli Entomol. Cam. n. 1122.
 Sulzers Kennzeichen, Tab. XXIII. F. 150.</p> |
|--|---|

Unter dem Namen *Scorpio europaeus* findet man bey verschiedenen Schriftstellern ganz verschiedene Arten beschrieben und abgebildet. Linné hat nach Müllers Vermuthung, einen amerikanischen Skorpion mit gegenwärtiger Art verwechselt, da seine Beschreibung zu wenig damit übereinstimmt. Eben so weichen der *Scorpio rufus* oder *coccinatus* und der *Scorpio europaeus* des Maupertuis und Amoreux, die sich in der Gegend Sauvignargues in der Diöces Nismes aufhalten, und Degeers *Octonoculus fuscus*, welcher nach seiner Meinung der Linnäische *Europaeus* seyn soll, ganz von dem Röselschen ab. Hingegen kommt Degeers Abbildung des *Scorpio Maurus* ganz mit Rösels Abbildung überein. Wegen dieser Verschiedenheit der Meinungen und Beschreibungen, habe ich mich hier hauptsächlich an Rösels Abbildung und Beschreibung des italiänischen Skorpions gehalten, da er überdies der gefährlichste unter den europäischen Skorpionen ist.

Er ist von der Stirne des Brustschilds bis zum Schwanzende beynahe drey Zoll, der schweizerische Skorpion aber, der nach Fuefsly gleicher- obwohl nicht so grosser Art ist, selten zwey Zoll lang. Seine, vom Alter abhängende Farbe, ist oft schwarzbraun, oft ins Rothe fallend (Tab. X. Fig. 1. 6.), vorzüglich ist der dicke Leib des Weibchens schön roth, die Palpen und der Schwanz rothbraun, das Brustschild dunkelviolet, und die Füsse ockergelb. Die Mandibulen oder Fresszangen (Fig. 1. c.) sind, durchs Mikroskop betrachtet (Fig. 3. a. a.), an dem inneren Rand ihrer Finger mit sehr scharfen Zähnen von ungleicher Grösse be-

setzt und am unbeweglichen Finger mit steifen Haaren bewachsen. Zwischen den Fresszangen ragen die Lippen (Fig. 3. b. und Fig. 4.) hervor, welche eine gabelförmige Gestalt haben, und welche der Skorpion hervorstrecken und zurückziehen kann. Diese Lippen sind etwas gewunden, ganz flach, durchsichtig, hellgelb, und an der Wurzel mit einer rothbraunen Ader versehen. Die Untersuchung der Maxillen hat *Rösel* aus der Acht gelassen, der sich nun zur Betrachtung der oben schon geschilderten zwanzigzähnihten Kämme (Fig. 7.) wendet. Die Häute zwischen den Ringen des Hinterleibes sind ockergelb, die vier ersten Schwanzglieder beynahe von einer Grösse, das fünfte ziemlich lang, vorne bauchicht und hinten dünne, der Schwanzknoten mit einem stark gekrümmten Stachel versehen, die Füsse und die ganze untere Fläche des Körpers (Fig. 6.) ockergelb.

Das Wachsthum dieser Skorpione geht überaus langsam von statten, und sie bedürfen zur Vollendung desselben wenigstens zwey bis drey Jahre. Wenn sie sich häuten, sehen sie weiß aus, erhalten aber bald wieder ihre dunkle Farbe. Sie können lang ohne Nahrung aushalten, und bedürfen wenig zur Sättigung. Quält sie aber der Hunger, so strecken sie die Arme der Palpen aus und öffnen ihre Scheeren. Nähert sich diesen nun irgend ein Insekt, so ergreifen sie es schnell, bringen es zu den Fresszangen und verzehren es ganz, wenn es nicht hartschaligt ist. Gewöhnlich verbergen sie sich, als lichtscheue Geschöpfe, den Tag über und liegen dann unbeweglich, indem sie die Palpen an den Seiten des Körpers und gegen den Kopf anziehen, den Schwanz über den Rücken gekrümmt an der Seite des Leibes und den Stachel an den Schwanz anschliessen. Man hält sie in dieser Lage für todt, bis sie durch etwas rege gemacht, sich auf einmal ausbreiten, ihre Scheeren ausstrecken und öffnen, ihren Hinterleib und Schwanz in die Höhe heben, und mit einer Geschwindigkeit davon laufen. Sonderbar ist es, wie *Amoreux* gedenkt, daß diese, und wahrscheinlich auch andere Skorpionen, bloß durch die Berührung mit einigen Tropfen Wasser, ohne ersäuft zu werden, sterben. Wahrscheinlich ist daher die Meinung gekommen, welche schon *Galen* geäußert hat, daß der menschliche Speichel für den Skorpion tödtlich sey.

Ausser Italien wird diese Art Skorpion auch in den angrenzenden schweizerischen Provinzen und im mittäglichen Frankreich angetroffen. *Fermin* versichert sogar, sie in Surinam gefunden zu haben. Sie liebt kühle, nicht allzufeuchte Orte, und man trifft sie unter den Steinen, zwischen der Baumrinde, in den Winkeln und Ausschnitten der Fenster und Thüren, zwischen den Fensterläden, un-

ter den Betten längs der Mauern, in Gärten unter den Blumenscherben, in altem Mauerwerke und unter der Schutt an.

Ihr Stich ist in der Schweiz nicht gefährlich, und soll nicht mehr Schmerz und Geschwulst, als der Wespenstich hervorbringen, auch nie als in der größten Hitze zu besorgen seyn. Nach *Amoureux* ist er nach Verschiedenheit der Jahreszeit mehr oder weniger giftig, obgleich sehr selten, selbst in heisseren Gegenden als das mittägliche Frankreich ist, tödtlich. Die Vorsicht, welche die Skorpionenhändler brauchen, die diese Insekten in die Apotheken liefern und, nach *Rösels* Versicherung, übrigens sehr dreist und keck mit ihnen umgehen, beweist, daß ihr Stich auch ausser ihrem Vaterlande zu fürchten sey. Sie fassen sie nemlich so mit dem Daumen und Zeigefinger vorne beym Kopfe an, daß der Daume allezeit auf die Rückenfläche des Skorpions kommt, und also der Skorpion, wenn er stechen will, den Nagel des Daumens treffen muß. Werden sie dennoch gestochen, so verlassen sie sich auf die Hülfe des Skorpionöls, welches sie immer bey sich führen.

81. Der afrikanische Skorpion. Tab. X. Fig. 8 und 9.

Scorpio afer pectinibus tredecim dentatis, manibus subcordatis pilosis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2961. n. 3. — Habitat in India et Persia.

- | | |
|---|--|
| <p>Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S. 392. n. 1.
 Cuvier Tableau Élémentaire p. 467. <i>le Scorpion d'Afrique, der Indianer.</i>
 Degeers Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 133. n. 3. <i>Scorpion des Indes, der Indianer.</i>
 Fabricii Mant. ins. I. p. 348. n. 3. Spec. Ins. I. p. 550. n. 3. Syst. Ent. p. 309. n. 3.
 Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 270. <i>Scorpio nigricans, der schwarze Skorpion.</i>
 Herbsts Natursyst. der ungeflügel. Ins. Heft IV. S. 38. Tab. I. <i>Scorpio afer.</i>
 Leskes Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 490. n. 1.</p> | <p>Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1091. n. 3. Tab. XXXIII. F. 1. <i>Der Afrikaner.</i>
 Museum Lud. Ulrician. 429.
 Neue Berlin. Mannigfaltigkeiten, Jahrg. III. S. 343. <i>Pitiverii gazophylacium</i> Tab. XIII. Fig. 2.
 Rösels Insektenbelust. Th. III. S. 370. Tab. LXV. <i>Der orientalische Skorpion.</i>
 Schwammerdamms Bibel der Nat. S. 42. Tab. III. F. 3. Insektengeschichte Tab. VI.
 Sebae Thesaurus I. Tab. LXX. Fig. 4.
 Vallisneri, A. de foramine aculei in Scorpione Afric. Eph. N. C. Cent. III et IV. obs. 31. p. 58. et in Operibus Tom. II. p. 60.</p> |
|---|--|

Nicht weniger verschieden, wie bey den andern Skorpionarten, ist die Länge des afrikanischen oder indischen Skorpions, von welchem Exemplare von fünf, sechs bis acht Zoll in den Insektenkabinetten vorkommen. Auch die Farbe scheint mehreren Abweichungen, wahrscheinlich nach Verschiedenheit des Wohnorts, unterworfen zu seyn. Manche sind oben kastanienbraun, unten bräunlichgelb, an

den Seiten und Gelenken weiß, am Stachelgliede des Schwanzes korallenroth; manche mattbraun, wieder andere schwarzbraun, mit schmutzig weissen Verbindungshäuten zwischen den Gelenken, noch andere an dem Brustschilde, den Palpen und dem Schwanze schwarz und auf dem Rücken des Hinterleibes röthlich, an den Füßen und Unterleibe aber eckergelb. Das Weibchen ist immer dunkler an Farbe, auch grösser dicker und runder, als das Männchen.

Der vorne schmale, hinten breite Brustschild hat an der Stirne einen tiefen Ausschnitt, von welchem aus sich durch die Mitte desselben eine Furche zieht, die sich vor und hinter dem Augenhügel theilt (Fig. 9.). Übrigens ist die Oberfläche des Brustschilds mit grösseren und kleineren Körnern besäet, und am Hintertheile durch einige faltige Vertiefungen uneben. Auf jenem Augenhügel in der Mitte des Brustschilds stehen die zwey grossen, schwarzen, mit einem braungelben Ring umzogenen (Fig. 8. b. u. Fig. 9.), am vorderen Rande, über und hinter den Mandibulen aber, auf jeder Seite noch drey andere, kleinere Augen. Die viergliedrichten, sehr gekörnten Palpen haben eine herzförmige Hand mit einwärts gekrümmten Fingern (Fig. 8. c. c.), die einander ihre Spitzen hakenförmig zukehren, die Mandibulen, (a.) eine dicke, mehr cylindrische Form, und einen bald dunkelbraunen, bald röthlichgelben Anstrich. Sieben Ringe, die von vorne nach hinten immer länger werden und durch eine gelbe Haut unter einander verbunden sind, machen die Rückenfläche des Hinterleibes aus, der überhaupt oben mehr flach, als konvex, aber mit dem Hintertheile des Brustschilds beynahe von gleicher Breite ist. Unten am Hinterleibe bemerkt man nur fünf Ringe, wovon die vorderen rothgelb, der hinterste braunroth, alle flach und glänzend glatt sind. Die am Vordertheile der Hinterleibsfläche sitzenden Kämme sind gelbroth und haben vierzehn Zähne, die sechs Schwanzglieder mehrere scharfe, gekörnte Ränder. Das letzte Schwanzglied ist sehr bauchicht und hat einen hornartigen, schwarzen, stark einwärts gebogenen Stachel. An den Füßen ist keine besondere Abweichung zu bemerken, als daß sie von den Seiten ziemlich platt gedrückt und am Fußblatte mit stark gekrümmten Klauen versehen sind.

Nicht nur Afrika und die Küste von Guinea, sondern auch Bengalen, Ceylon und Brasilien, wo sie nach *Sebas* Abbildung von ausserordentlicher Grösse gefunden werden, sind das Vaterland dieses Skorpions.

Sein Stich ist, nach den Zeugnissen der meisten Reisebeschreiber, allermeist von tödtlichen Folgen begleitet, ohngeachtet *Fermin*, welcher zweymal gestochen wurde, ihn für minder gefährlich hält, als man gewöhnlich glaubt, wenn man nur

sogleich die gehörigen Mittel dagegen anwendet. Er empfiehlt zu dem Ende den venetianischen Theriak, als das sicherste Mittel wider dieses Gift, Fingers dick auf die Wunde zu legen und mit einer Leinwand zu umbinden, und versichert dadurch in weniger als einer Stunde, ohne Entzündung und andere Zufälle, geheilt worden zu seyn.

82. Der amerikanische Skorpion. Tab. X. Fig. 10. und Tab. XII Fig. 1.

Scorpio americanus pectinibus quatuordecim dentatis, manibus subciliatis, digitis filiformibus. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2962. n. 4. Habitat in America meridionali, in California edulis.

Bankrofts Naturgesch. von Guiana S. 150.
Cuvier Tableau élémentaire p. 467. *le Scorpion d'Amérique.*

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 135. Tab. XLI. Fig. 9. 10. *Scorpio maculatus, Scorpion tacheté, der gefleckte Skorpion.*

Fabricii Mant. ins. I. p. 348. n. 4. Spec. Ins. I. p. 550. n. 4. Syst. ant. II. p. 399. n. 4.

Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 270.

Herbst's Natursyst. d. ungeflügelten Ins. Heft IV. S. 60. n. 8. Tab. VI. F. 3. *Scorpio americanus.*

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1091. p. 4. Tab. XXXIII. F. 2. *Der Amerikaner.*

Neue Berlin. Mannigfaltigkeiten, III. S. 341.

Rösel's Insektenbelust. Th. III. S. 382. Tab. LXVI. Fig. 5. *Der Surinamische Skorpion.*

Sutzers Gesch. d. Ins. S. 257. Tab. XXX. F. 7. *Der Amerikaner.*

Systematisches Lehrb. über die drey Reiche der Natur I. S. 389. Tab. XX. F. 2.

Alle Theile des gegenwärtigen Skorpions (Tab. X. Fig. 10.) sind sehr zart und mager, daher sein ganzes Aussehen dürr und unvollkommen ist. Der männliche Körper ist acht, der weibliche neun Linien, der männliche Schwanz achtzehn, der weibliche nur zehn Linien lang. Bisweilen soll aber die ganze Länge vom Kopf- bis zum Schwanzende drey Zoll betragen. Seine Farbe ist grau und bey nahe alle Theile sind mit dunklen Querstrichen und Flecken besprengt. Der Brustschild ist vorne eckicht, hinten stark ausgeschnitten und in der Mitte der Länge nach mit einer Furche durchzogen, die selbst den in der Mitte befindlichen Augenhügel theilt. Die auf diesem stehenden zwey Augen liegen daher weiter, als gewöhnlich auseinander, die sechs übrigen aber zu beyden Seiten am Vorderrande des Brustschlds. Die Palpen sind schmal, länglicht, mit Haaren besetzt und haben kurze Hände, und lange, fadenförmige, einwärtsgebogene Finger. Jeder Ring des langen, cylindrischen Hinterleibes hat in seiner Mitte eine abgebrochene, stark erhabene Linie, die nicht gar den Vorderrand des nachfolgenden Rings erreicht und an jeder Seite eine bogigte, breite Einfassung. Die Kämme haben nach

Linne vierzehn, nach *Degeer* und *Müller* achtzehn Zähne, die schmalen, langen, mit Haaren besetzten Glieder des Schwanzes, prismatische Seiten mit fein gekörnten Randlinien, das letzte lang gezogene Schwanzglied (*b.*) aber, ausser seiner langen und krummen Stachelspitze, noch eine ihr gegenüberstehende kürzere.

Ohngeachtet *Sulzer* seinen amerikanischen, achtzehnzähligen Skorpion (Tab. XI. Fig. 1.) mit den oben beschriebenen Röslichen in Vergleichung sezet, so weicht er doch nach Farbe, Bildung und Grösse zu sehr von demselben ab, als daß er zu derselben Art gehören sollte. Er hat eine schwarze, ins blaurothe fallende Farbe, zwar ebenfalls schlanke Palpen, deren vorletztes Glied aber eine hervorragende Spitze bildet. Überdies sind seine Füße, so wie die Schwanzknoten, ungleich dicker, das letzte Schwanzglied und der den Giftstachel gegenüberstehende kleine Stachel, weit kürzer. Mehr Ähnlichkeit hat er mit dem von *Degeer* beschriebenen und abgebildeten *Scorpio testaceus*, oder braungelben Skorpion.

Die Weibchen des oben beschriebenen amerikanischen Skorpions tragen ihre Jungen auf dem Rücken. Das Vaterland des Röslichen ist Pensilvanien, wo er sich in faulem Holze und an feuchten Örtern aufhält, der Sulzerische Skorpion aber wohnt in Surinam.

Von besonderen, beyde Skorpione vor andern auszeichnenden, giftigen Eigenschaften, finde ich nichts bey den Schriftstellern.

83. Der punktirte Skorpion. Tab. XI. Fig. 4 — 6.

Scorpio punctatus, octonoculus, pectinibus sedecim dentatis, manibus elongatis, digitis filiformibus, cauda corporis longitudine, aculeo basi mucronato. *Degeers* Abh. z. Gesch.

d. Ins. v. Göze B. VII. S. 134. Tab. XLI. Fig. 1 — 4. *Scorpion ponctue*, der punktirte Skorpion. — Habitat in America.

Amoreux Notice des Ins. p. 43. Tab. I. Fig. 2.
Scorpio rufus s. *Scorpio occitanus*, der gelbrothe, oder
languedockische Skorpion.

Schwammerdamms Bibel der Nat. Tab. III.
F. 1.

Nach *Amoreux* ist dieser Skorpion ausser Amerika auch in Languedock zu Hause und mißt von der Stirne des Brustschilds bis zum Schwanzende achtzehn Linien. Er hat acht Augen, lange Palpenglieder ohne Winkel und Haken, länglichte Palpenscheeren (Fig. 5.) mit fadenförmigen, an der Innenseite gezähnten Fingern (*b. b.*). Sein Hinterleib ist weit dicker und breiter, als der Brustschild, und führt sechzehn Zähne an beyden Kämmen. Der Schwanz, so lang wie der Körper.

per, hat abgerundete Glieder und die leicht gefurchte Giftblase (Fig. 6.), dem Stachel (*a.*) gegen über, einen gezähnten Anhang (*b.*). Die ganze Rückenfläche des Körpers und Schwanzes ist punktirt. Er ist wahrscheinlich weniger gefährlich in Languedock, als in Amerika.

84. Der südländische Skorpion. Tab. XI. Fig. 7. 8.

Scorpio australis pectinum triginta duobus dentibus, manibus laevibus. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2962. n. 6. — Habitat in Africa.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 136. Tab. XLI. Fig. 5 — 8. *Scorpion Austral, der Südländer.*

Fabricii Mant. Ins. I. p. 348. n. 7. Spec. Ins. I. p. 551. n. 6. Syst. Ent. p. 400. n. 6.

Herbsts Natursystem der ungeflügelten Ins. Heft IV. S. 48. n. 4. Tab. IV. F. 1. *Scorpio australis.*

Müllers Linneisches Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1092. n. 6. *Der Südländer.*

Vierzehn bis ein und zwanzig Linien beträgt gewöhnlich die Länge des Körpers und zwey bis dritthalb Zoll die Länge des Schwanzes dieser Skorpionart, doch ist das Männchen immer kleiner, als das Weibchen. Die Farbe des Körpers ist dunkel, die der Extremitäten mehr lichtbraun. Der mit feinen Körnchen besäete Brustschild ist vorne abgestutzt, und mehr gegen den Vordertheil zu mit dem gewöhnlichen Augenhügelchen besetzt. Auf demselben sieht man zwey schwarze, ziemlich grosse, an jedem Vorder- und Seitenrand aber, dicht neben einander, drey kleine Augen. Grosse, gelbe Mandibulen, und länglichte, mit aufgeblasenen Scheerenhänden und fadenförmigen Scheerenfingern versehene Palpen, stehen vor der Stirne. Die Rückenfläche des Hinterleibes decken sieben gekörnte und an den Seitenrändern etwas aufwärts gebogene Ringe, an der schmutzig graugelben Bauchfläche aber zeichnen sich die Kämme durch ihre besondere Bildung und die Zahl der Kammzähne aus. An Statt sich letztere bey andern Skorpionarten nicht über zwanzig belauft, steigt sie hier von acht und zwanzig bis zu sechs und dreysig. Die Kämme an deren Lamellen sie sitzen, haben am Grundtheile eine kleine Kugel (Tab. XI. Fig. 8. *a.*), und am andern Ende zwey deutlich unterschiedene Glieder (*b. c.*), über der Wurzel jedes Zahns aber ein rundes Korn, welches mit den übrigen eine regelmässige Reihe bildet. Ungewöhnlich lang und dick ist, im Verhältniß des übrigen Körpers, der aus lauter eckigten, stark gekörnten Gliedern zusammengesetzte, und an dem unten bauchichten Endgliede noch mit einem

einem Nebentachel versehene Schwanz. Die Füße sind von denjenigen der übrigen Arten nicht verschieden.

Ausser Afrika ist dieser Skorpion auch in Amerika zu Hause und gehört unter die gefährlichsten Arten seines Geschlechts.

Krebse und Krabben überhaupt.

Altes Hamburg. Magaz. II. S. 476.

Baster, J. *Opuscula subseciva*, Tom. II. p. 12.

Beckmanns Anfangsgründe d. Naturgesch. S. 118.

Blumenbachs Handb. d. Naturgesch. S. 393.

n. 83.

Börners Sammlungen aus der Naturgesch. Th. I. S. 538.

Catesby nat. Hist. of Carolina II. p. 32. Tab. XXXII.

Degeers Abb. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 142

Eberhards Thiergeschichte, S. 225.

Eberts Naturlehre für die Jugend, III. S. 140.

Fabricii Spec. Ins. I. p. 496. Syst. Ent. p. 400.

Fermins Reise durch Surinam, Th. II. S. 256.

Fuefsllys Verz. schweiz. Ins. S. 61.

Geoffroy Hist. des Ins. T. II. p. 661.

Herbsts, J. F. W. Versuch einer Naturgesch. der Krabben und Grebe, Zürich 1782. 4.

Leske's Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 490.

Müllers Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 1096.

Mülleri Faun. Fr. p. 95. Zool. Dan. Pr. p. 195.

Onomat. Hist. nat. Pars II. p. 497.

Rösels Insektenbelustigung, Th. III. S. 305.

Scopoli Entom. carn. p. 405.

Sloane Hist. of Jamaica II. p. 269.

Sulzers abgekürzte Gesch. d. Insekten, S. 259.

Unzers Arzt. Th. III. S. 351.

Versuche und Abhandl. der naturf. Gesells. in Danzig, Th. II. S. 209.

Krebse (*Macrouri*) sind diejenigen Insekten, welche ein grosses, mehr oder weniger konvexes und cylindrisches, mit dem Kopfe ein zusammenhängendes Stück ausmachendes Brustschild, zwey auf langen beweglichen Stielen weit hervorragende und weit auseinander stehende Augen, zwey lange borstenartige Fühlhörner, zwey gegliederte Arme mit Scheeren, acht Füße, und einen langen gekrümmten Schwanz mit konvexen Ringen haben, dessen Ende mit blätterförmigen Schwimfflossen besetzt ist. Sie sind von verschiedener Grösse, die von der von wenigen Zollen, bis zu der von zwey bis drey Schuhen steigt, und oft sechs bis zwölf Pfund schwer.

Die Krabben, Taschenkrebse oder Seespinnen (*Brachyuri*) weichen von den Krebsen dadurch ab, daß sie mehr breit, als lang sind, einen weit kürzeren Schwanz haben, welchen sie so unter dem Bauch zurückschlagen können, daß sie ungeschwänzt zu seyn scheinen, und ein taschenförmiges Aussehen erhalten. Auch ihre Grösse ist, nach Verschiedenheit der Arten sehr verschieden. Sie sind oft über einen Schuh breit und wiegen nicht selten zehn und mehr Pfunde. Der Mangel der Schwimfflossen und des Schwimmschwanzes setzt sie ausser Stand zu schwimmen, daher sie nur auf den Boden des Meeres oder auf dem Sand am Ufer vor und rückwärts, und zwar öfters sehr geschwind, herumkriechen.

Sowohl die Krabben als die Krebse legen jährlich im Sommer ihre alte Schaafe ab und vertauschen sie mit einer neuen. Sie sind während dieser Veränderung krank, verlieren die Eßlust und werden mager. Wenn sie in ihren Streiten unter einander, oder durch irgend einen Zufall Fühlhörner, Scheeren, Füße verlieren; so werden diese Theile durch ihre überaus starke Reproductionskraft nach einiger Zeit wieder ersetzt, und daher kommt es, daß man oft Krebse mit einer kleinen und einer grossen Scheere etc. findet.

Beide Geschlechter sind mit doppelten, an der Bauchfläche befindlichen Zeugungstheilen versehen und begatten sich Bauch an Bauch, wobey das Weibchen auf dem Rücken zu liegen pflegt. Nach der Begattung legen sie eine Menge Eyer, die sie unter dem Schwanz, an Fäden befestiget, so lange tragen, bis die Jungen auskriechen. Überaus groß ist oft die Zahl jener Eyer. *Baster* fand unter dem Schwanz eines Hummers zwölftausend, und ausserdem noch eine Menge in dessen Leibe.

Ihre Nahrung sind allerley Wasserinsekten, auch Frösche, Fische und vorzüglich alles Aas. In Ermangelung dieser gewöhnlichen Speise, fressen sie sich unter einander selbst auf. Ohngeachtet ihres abschreckenden Aussehens hat sich der Mensch nicht gescheuet, sie zu einen seiner Lieblingsgerichte zu machen.

Flüsse, Seen und Meere sind der Aufenthalt dieser Insekten, welche jedoch auch ausser dem Wasser eine geraume Zeit fortleben können, vorzüglich gilt dieses von den Landkrabben, die auch im Sande, in Höhlen und Löchern wohnen.

Es ist den meisten Krebsen und Krabben eigen, daß sie mit ihren Scheeren empfindlich und bisweilen bis aufs Blut kneipen, und viele der grösseren Krabbenarten haben eine so ausserordentliche Stärke in diesen Scheeren, daß sie oft mit einem Hiebe den Fischern einige Zehen abschneiden, ja sich eher die Scheeren zerbrechen und abschlagen lassen, als sie die mit denselben festgehaltene Beute wieder losgeben. Manche Landkrabben haben auch noch eine besondere Eigenschaft, wodurch sie dem Menschen beschwerlich fallen und ihn nicht selten beschädigen. Auf den antillischen Inseln, zu Bahama und Surinam, kommt nach *Catesby* eine Art derselben, die sogenannte *Erdkrabbe* (*Cancer ruricola* Linn.), so häufig vor, daß sie bisweilen das ganze Land bedeckt. Nähert man sich diesen Krabben mit einem Stocke, so rücken sie mit drohenden Geberden und mit in die Höhe gerichteten Scheeren zum Angriffe an. Im Frühjahre kommen sie aus ihren Löchern im sandigen Erdreiche der gebirgigten Inseln hervor, um dem Meere zuzueilen, und an demselben ihre Eyer abzusetzen. Sie nemen dann, weil
sie

sie ihren Zug in gerader Linie fortzusetzen pflegen, über alles was ihnen vorkommt, und selbst über Häuser und Berge ihren Weg, kommen auf diese Art durch die Pallisaden und Fenster in die Häuser, machen darinnen mehr Lärm, als die Ratten und beunruhigen die Menschen in den Betten. Diese Eigenheiten, verbunden mit der Stärke ihrer Scheeren und ihrem oft furchtbaren Ansehen, mögen zu den Erdichtungen Gelegenheit gegeben haben, die bey *Berti*, *Albertus* und *Olaus Magnus*, auch bey *Gesner* von Krebsen monströser Grösse vorkommen, welche die Menschen anzufallen und aufzufressen pflegten.

Einige Krabbenarten, die sich von giftigen Pflanzen nähren, können den Menschen, der sie genießt, selbst vergiften. Vorzüglich sollen auf dem Genuß der eben gedachten Erdkrabben welche nach *Sloane*, die Blätter und Früchte des Mancinellabaums fressen, schon viele Menschen gestorben seyn.

85. Die Sandkrabbe. Tab. XIV. Fig. 1.

Cancer vocans, thorace unidentato, chela altera majori, oculis elongatis. Linn. S. N.

T. 1. P. V. p. 2969. n. 14. Amoen. acad. VI. p. 414. n. 96. — Habitat in Jamaica, sub saxis latitans, digitos occurrentes cum dolore prehensens.

Blumenbachs Handb. d. Naturg. S. 394. Die Sandkrabbe, Engl. the Sanderab.

Catesby nat. Hist. of Carolina Vol. II. Tab. XXV. *Cancer arenarius*.

Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 163. n. 4. Tab. XXVI. F. 12. *Crabs appellant, der Rufer*.

Fabricii Mant. ins. I. p. 318. n. 25. Spec. Ins. I. p. 409. n. 14. Syst. Ent. p. 401. n. 7.

Gronoviani Zoophilacii p. 965.

Herbsts Vers. einer Naturgesch. d. Krebs, etc. I. S. 84. n. 5. Tab. I. F. 12.

Marcgravii Hist. rer. nat. Brasil. p. 184. *Marocoani*.

Müller's Linn. Nat. S. d. Ins. B. II. S. 1103. n. 14. Tab. XXXIV. F. 2 3. *Der Winker*.

Onomatolog. Hist. nat. P. II. p. 522. *Der Rufer*.

Petiveri Gazophylacii Nat. et Art. decades. Tab. LXXVIII. Fig. 5.

Pisonis de Medicina Brasiliensi libri, p. 77. T. 78.

Rumphii, G. E. Amboinsche Rariteitkamer. Amsterd. 1705. gr. Fol. p. 14. *Cattom Pangel*.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 264. Tab. XXXI. F. 1. *Der Platte, Cancer planatus*.

Gegenwärtige Krabbe kommt von sehr verschiedener Grösse vor. Bey einigen ist der vorne breite und eckichte, hinten schmale und stumpfe Rückenschild nur eilf, bey andern vierzehn Linien breit. Zu beyden Seiten einer bogenförmigen Hervorragung am Vorderrande desselben, ragen die zwey Augen auf langen, dünnen Stielen, aus zwey länglichten Höhlen weit hervor. Der siebengliedrichte Schwanz ist kaum zwey Linien breit und fünf Linien lang. Das Auffallendste an dieser Krabbe ist aber die grosse Verschiedenheit beyder Scheeren unter einander in Rücksicht ihrer Grösse und Stärke. Die eine, welches bald die rechte, bald die

die linke ist, erreicht kaum die Grösse eines der acht Füsse, die andere hingegen ist überaus groß und dick, öfters vierzehn Linien lang und mithin länger, als der ganze Körper. Die Finger dieser Scheeren sind an den inneren Rändern scharf gezähnt, und der längere Innenfinger hat eine gekrümmte Spitze. Eine sonderbare Gewohnheit dieser Krabbe, immer ihre grosse Scheere über dem Kopfe rückwärts zu bewegen, als ob sie jemanden winken wollte, hat ihr den Namen *Winker*, oder *Rufer* verschafft.

Sie hält sich in den sandigen Ufern des amerikanischen Ozeans auf, und läuft auf denselben so schnell herum, daß man sie kaum erhaschen kann. Gewinnt sie Zeit, der Verfolgung zu entgehen, so gräbt sie sich im Sand ein, ausserdem aber zwickt sie mit ihrer grossen Scheere demjenigen sehr empfindlich in die Finger, welcher nach ihr greift.

86. Die Giftkrabbe. Tab. XIV. Fig. 2.

Cancer Dromia, hirsutus, thorace utrinque dentato, pedibus posterioribus unguibus geminis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2972. n. 24. Amoen. acad. VI. p. 413. n. 96. —

Habitat in Indiae profundo, niger, manuum digitis albis laevibus; an venenatus?

Fabricii Mant. Ins. I. p. 320. n. 42. Spec. Ins. I. p. 501. n. 27. Syst. Ent. p. 405. n. 26.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1107. n. 24. Die Giftkrabbe, der Reuter.

Rumphii Amboin. Rariteitkamer. p. 19. Tab. XI. N. 1. *Cancer lanosus*, Maleits, *Cattam Bisa* oder *Cancer venenatus*.

Sebae Thesaurus III. Tab. XVIII. F. 1. 3.

Ein ihre Schädlichkeit hinreichend zu erkennen gebendes Aussehen hat die *Giftkrabbe*. Sie ist über eine Faust groß, rauhhhaarig, schwarzgrau, und erhält durch eine zwischen den zwey grossen Augen hervorragende nasenförmige Spitze des Rückenschilds, durch die darunter liegende Queröffnung des Mundes und den unter dieser Öffnung hervorstehenden, kinnförmigen Winkel, welchen das oben gewölbte, auf den Seiten zackichte Rückenschild nach vorne bildet, viel Ähnlichkeit von einem abgezehrten menschlichen Gesichte. Die zwey weissen, glatten Scheerenfinger sind scharf, wie eine Säge gezähnt, die vier Vorderfüsse länger, als die Scheeren, und am Ende mit einer einfachen, die vier weit kürzeren Hinterfüsse aber mit einer doppelten Klaue versehen.

Ihr Aufenthalt sind die Tiefen der indischen Meere, aus welchen sie zum Glücke nie an den Strand kommt, denn der Genuß ihrer schwarzschleimichten Fleischsubstanz veranlaßt Schwindel und Betäubung, und hat die Wirkung eines narkotischen Gifts.

87. Der gemeine Taschenkrebs. Tab. XIV. Fig. 3.

Cancer Pagurus, thorace utrinque obtuse novemplicato, manibus apice atris. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2973. n. 27. Faun. Suec. I. n. 1. 41. II. n. 2028. It. W. goth. 173. Mus. Ad. Fr. I. p. 85. — Habitat in Oceano europaeo, indico, edulis.

Aldrovandi de Animalibus exsanguibus, p. 186.
Bellonii, P. l'Histoire naturelle des étrangères
Poissons marins, Paris 1551. 4. p. 368.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S. 394.
C. Pagurus, der Taschenkrebs, die Tasche, Engl. the
Purger.

Bradley, R. A. philosophical account of the works
of nature, London 1721. 4. Tab. III. F. 4.

Brit. Zool. IV. Tab. III. F. 7.

Fabricii Mant. ins. I. p. 321. n. 46. Spec. ins. I.
p. 501. n. 29. Syst. Ent. p. 405. n. 28.

Gesner, C. de Piscibus et Aquatilibus, p. 155.

Gronoviani Zoophilacii, p. 967.

Herbsts Naturgesch. d. Krebse, V. S. 165. n.
71. Tab. IX. F. 59.

Jonston Histor. de exsanguibus aquaticis, Tab.
V. F. 2 und 12.

Klein in den Versuch. und Abh. der naturforsch.
Gesellschaft in Danzig, Th. II. S. 187. Tab. II. III. IV.
Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1108.
n. 27.

Onomatologia Hist. nat. P. II. p. 498. Meerspinne,
Seespinne.

Rumph amboinsche Rariteitskammer p. 18. Tab. XI.
No. 4. *Cancer aeneus*, *Cattam Tambaga*, Koper Krabbe.

Rondeletii, G. Libri de piscibus marinis. Lugd.
Gallor. 1554. Fol. p. 560.

Scopoli Ent. carn. 1125.

Sulzers Geschichte der Ins. S. 259.

Dieses ist der eigentliche *Pagurus* der Alten, die gemeinste und esbarste Art Taschenkrebse, welche in Holland *Zeekrab*, in Schweden *Krabba* und *Kalltaska*, in Italien *Granoiporro* genannt wird. Sie ist gemeiniglich vom Kopf bis zum Schwanzende über sechs Zoll lang und von einer Seite des Rückenschildes zur andern über fünf Zoll breit. Seltener soll sie noch einmal so groß vorkommen und wohl zehn Pfunde am Gewichte haben. Ihre Farbe fällt oft mehr ins Braune, oft ins Kupferrothe. Oben auf dem Rücken hat sie gemeiniglich drey rothe Flecke, wovon der mittelste viereckicht ist, übrigen aber ist sie schuppenartig schattirt. Der Rückenschild ist in der Mitte schön gewölbt, an beyden Seiten gezackt, und hat an der Stirne zwey weit aus einander stehende, in die Quere laufende Augenhöhlen. Die Scheeren sind lang und stark, ihre Finger schwarz und scharf gezähnt, die acht kürzeren Füße mit einfachen, langen, wenig gekrümmten Klauen und der siebengliedrige eingeschlagene Schwanz mit einem spitzigen Endgliede versehen.

Es ist gefährlich, sich den Scheeren einer solchen Krabbe zu nähern. Schon oft haben sie Fischern Finger oder Zehen heruntergezwickelt.

88. Die Teufelskrabbe. Tab. XIV. Fig. 4.

Cancer Maja thorace aculeato, manibus ventricosus spinosis, digitis penicillato - hirsutis.

Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2979. n. 41. Faun. Suec. 2031. It. Scan. 327. —

Habitat in Oceano norwegico, pedibus sex.

Aldrovandi de animalibus exsanguibus, p. 184.
Fabricii Mant. ins. I. p. 326. n. 81. Spec. Ins.
I. p. 505. n. 50. Syst. Ent. p. 408. n. 45.

Gesner, de Piscibus et Aquatilibus p. 152. *Maja*
femina.

Gronoviani *Zoophilacii* p. 973.

Jonstoni Hist. nat. de exsanguibus aquaticis, T.
V. F. 5. *Cancer maja*, *Meerspinne*, Tab. VI. F. 2. *Cancer*
majas.

Matthioli, P. A. Commentarii in libros VI. Dioscoridis de Materia Medica, p. 229. *Maja*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1096.
und S. 1113. n. 41.

Onomatol. Hist. nat. P. II. p. 502. *Der Altvater*.

Scopoli Entom. carn. 1126.

Sebae Thesaurus III. Tab. XVIII. Fig. 10. et Tab.
XXII. F. 1.

Das Weibchen dieser Krabbenart nannten die alten *Maja*, die adriatischen Fischer nennen sie *Grancevoli*, die norwegischen *Troldgrabbe*, und wahrscheinlich hat ihre auszeichnende Grösse, ihr den Namen *Altvater* verschafft. Wirklich gehört sie unter die größten ihres Geschlechts, indem sie oft mehr als zehn Pfund wiegt. Sie hat einen dornichten Rückenschild, vorne an den Augen vier hervorstehende Spitzen, einen schmalen, in gegenwärtiger Abbildung an den Bauch angeschlossen erscheinenden Schwanz, acht Füße, die oft einer halben Elle lang sind, und daher wahrscheinlich zu der Benennung *Seespinne* Veranlassung gegeben haben, endlich noch zwey überaus lange und sehr starke Scheeren. Ihre Oberfläche ist klebrig, ihre Farbe schwärzlich und roth gefleckt, in getrockneten Exemplaren oft ganz roth, soll sich aber bey bevorstehendem Regenwetter verändern und diese, von einer verborgenen Zauberkraft abzuhängen scheinende Verwechslung der Farbe, die Ursache gewesen seyn, warum man ihr auch den Namen *Teufelskrabbe* beygelegt hat.

Sie ist im grossen Weltmeere und in den norwegischen Gewässern sehr gemein, und besitzt eine so grosse Kraft in ihren Scheeren, daß sie, wie Rumph versichert, eine kaum mit einem Steine aufzuschlagende Cocosnuß, mit leichter Mühe zerdrückt. In grosser Anzahl am Ufer versammelt, ist sie im Stande, einen Menschen mit ihren Scheeren in Lebensgefahr zu setzen.

89. Die Seeheuschrecke. Tab. XIV. Fig. 5.

Cancer Homarus thorace antrorsum aculeato, fronte bicorni, manibus adactylis. Linn.
S. N. T. I. P. V. p. 2988. n. 75. — Habitat in mari asiatico, americano, guttis
albis varius, antennis anticis aculeatis, aculeis apice rutilis, pedum
digitis pilosis.

- | | |
|--|--|
| <p><i>Brit. Zool.</i> IV. Tab. XI. Fig. 22.
Fabricii Mant. Ins. I. p. 331. n. 3. Spec. ins.
I. p. 510. n. 3.
Gronoviani <i>Zoophilacii</i> p. 981.
Marcgravii Hist. rer. nat. Brasil. p. 245. T. 246.
Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1129.</p> | <p>und 1130. n. 78. Tab. XXXV. F. 1. <i>Die Seeheuschrecke.</i>
<i>Museum</i> Lud. Ulrician. 457.
Petiveri Amb. Tab. VI. F. 1.
Rumph amb. Rariteitkani, p. 2. <i>Locusta Marina</i>,
<i>Zeekreeft</i>, <i>Vdang Laut</i>.
Sebae Thesaurus III. Tab. XXI. F. 5.</p> |
|--|--|

Die Alten kannten diesen Krebs, welcher eigentlich eine Squille, oder ein Krebs ohne Scheeren ist, unter den Namen *Locusta marina*, wozu seine sonderbare Gestalt Gelegenheit gegeben haben mag. Er erreicht die Grösse der grössten Hummer und ist oft über zwey Schuhe lang. Am Vordertheile seines Körpers bemerkt man sehr deutlich, wie der Kopf- und Rückenschild durch eine Linie unterschieden sind. Beyde kommen übrigens so wie der am Ende mit Flossen versehene Schwanz, der Bildung nach ziemlich mit dem gemeinen Fluszkrebse überein, nur sind Kopf- und Rückenschild ganz mit Stacheln besetzt, deren Spitzen nach vorne gerichtet sind. An der Stirne, dicht hinter den grossen, stark hervorragenden Augen, stehen zwey ziemlich lange, vorwärts gekehrte und oben convexe Hörner (Fig. 5. b.), und gleich hinter denselben zwey ungleich kleinere (c.). Unter den Augen aber kommen mit dicken, starken, langstachlichten Wurzeln, noch zwey überaus grosse Hörner (a. a.) hervor, welche diesen Krebs vor allen anderen auszeichnen. Sie sind noch einmal so lang, als sein ganzer Körper, beynahe ganz mit immer feiner werdenden Stacheln besäet, haben eine spiralförmige Biegung nach innen, und laufen an den gekrümmten Enden in ziemlich feine Spitzen aus. Zwischen diesen grossen Hörnern befinden sich noch zwey lange, gerade, dünne, vor der Mitte gabelförmig gespaltene Bartspitzen (d. d.), deren innere Zinke länger und dünner, als die äussere ist. Die zehn langen und schmalen Füsse endigen sich alle mit klauenförmigen, stark behaarten Gliedern, und weichen mithin, durch den gänzlichen Mangel der Scheeren, von andern Krebsarten ab. Die hochblaue Farbe des ganzen Körpers, fällt an der Stirne und an den grossen Hörnern mehr ins Rothe, und ist auf dem Rückenschilde und Schwanze mit weissen verloschenen Flecken marmorirt, an den Füßen aber weissgestreift. Wird der Krebs gekocht, so wird er ganz roth, und giebt ein schmackhaftes Gerichte.

Die

Die Seeheuschrecken sind Bewohner der asiatischen und amerikanischen Meere. Werden sie verfolgt, so schlagen sie mit dem Schwanze im Sande und laufen rückwärts, schnellen aber bald wieder vorwärts und stossen ihre Verfolger mit ihren Hörnern. Fischer werden oft von ihnen verwundet.

90. Der Schwanenkrebs. Tab. XIV. Fig. 6.

Cancer Mantis, manibus adactylis compressis falcatis serrato - dentatis. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2990. n. 76. Faun. Suec. 2035. Mus. Ad. Fr. I. p. 86. — Habitat in mari asiatico, indico, mediterraneo, Italis esculentus, antennis posterioribus trifidis.

Aldrovandi de animalibus exsanguibus, p. 156.
Squilla Mantis.

Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S. 396. *C. Mantis*.

Degeers Abb. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 194 n. 5. Tab. XXXIV. F. 1. *Squilla Mante, die Mantis-squilla*

Fabricii Mant. ins. I. p. 333. n. 1. Spec. Ins. I. p. 514. n. 1. *Squilla Mantis*. I. Syst. Ent. p. 417. n. 16. *Astacus M.*

Gronov. *Zooph.* n. 984. *Astacus thorace etc.*

Marcgravii Hist. rer. nat. Bras. p. 187. F. 1. *Tamaru-guacu*.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1131. n. 76. Tab. XXXV. F. 2. — *Der Schwanenkrebs*.

Onomatol. Hist. nat. P. II. p. 518. Der Wahrsagekrebs, der Kuepper.

Rumph. amb. Rariteitk. p. 4. Tab. III. Fig. E. *Locusta s. Squilla arenaria terrestris, Knyper, Locky.*

Rondeletii de pisc. marinis. p. 551.

Scopoli Entomol. Carn. n. 1135.

Sebae Thesaurus III. Tab. XX. F. 2. 3.

Sulzers Gesch. d. Ins. S. 265. Tab. XXXII. F. 2.

Das Gespenst.

Valentini India vet. et nov. III. p. 348. n. 2. F. 2. p. 416. n. 218. F. 218. p. 509. n. 526. F. 526.

Wegen der Ähnlichkeit, welche dieser Krebs mit der Fangheuschrecke (*Mantis*) hat, gab man ihm letztere Benennung. Die Holländer heissen ihn *Zwaantjeskreeft*. Der mit dem Kopfe ein zusammenhängendes Stück bildende Brustschild desselben, ist vorne schmal und stachlicht, an den Seiten ausgeschweift, hinten breit, bauchicht, und oben durch verschiedene Leisten uneben. An den, auf beweglichen Stielen sitzenden Augen, befinden sich zwey länglichtrunde, an den Rändern behaarte Schwimmblätter (Fig. 6. d. d.) oder Floßfedern, an deren Grundtheile von der Innenseite zwey kurze Fühlhörner (c. c.) hervorkommen. Vor und zwischen diesen stehen aber wieder zwey ungleich längere (b. b.) auf einer irregulären Hervorragung. Die Scheeren (a. a.) haben eine von der gewöhnlichen Form der Krebscheeren abweichende Bildung und bestehen aus einem breiten, etwas geschweiften, flachen und eckigten Grundtheile, der an der Brust seine Einlenkung hat, aus einem längeren, am Innenrande gefalzten Mittelgliede und aus einem mit letzteren unter einem spitzigen Winkel zusammenhängenden, an der Innenseite mit lauter langen Zähnen besetzten Endgliede, welches diese Zähne ausser der Gebrauchszeit in jene Falz einschlägt. Hinter diesen Scheerenfüßen folgen

gen die am Hintertheile des Brustschilds eingelenkten sechs Schwimm- oder Vorderfüsse (*e. e. e.*), deren letztes Glied platt, am Grundtheile breit und rund, am Ende schmal, und mit einem sichelförmigen, einwärtsgekrümmten Haken versehen ist. Weit dünner sind die sechs am Schwanze eingelenkten Hinterfüsse (*g. g. g.*), welche dreygliedricht, gerade, länger als die Vorderfüsse und an den Endgliedern, behaart sind. Der vordere Theil des nach hinten immer breiter werdenden Schwanzes selbst, ist achtgliedricht und, durch die erhabenen Längslinien seiner convexen Oberfläche, in lauter Vierecke getheilt; der Hintertheil aber mit langen Flossen und dazwischen liegenden spitzigen Stacheln versehen. Die ganze Oberfläche des Körpers deckt eine durchsichtige, pergamentartige, weisse und ins Röthlichte spielende Schale.

Man findet diesen bisweilen über einen Schuh langen Krebs, sowohl im asiatischen, als mittelländischen Meere, auch an dem Ausflusse grosser Flüsse im sandigen Ufer, wo er sich oft drey Schuh tief eingräbt und die Erde wie ein Maulwurf aufwirft. Zur Zeit der Ebbe kommt er hervor, sucht seine Nahrung und schleppt die gemachte Beute mit in seine Sandhöhlen. Er besitzt eine ungewöhnliche Stärke in seinen Scheerenfüssen und ist im Stande, die ihm in Wege kommenden Steine wegzuwerfen. Den Menschen pflegt er damit gewöhnlich zu verletzen und ausserdem mit seinen spitzigen Schwanzstacheln zu stechen. Die Fischer können ihn daher nicht anders als dadurch erhalten, daß sie sich der Netze bedienen, oder Schlingen vor seine Sandlöcher setzen.

91. Der Sandkrebs. Tab. XIV. Fig. 7.

Cancer Chiragricus, manibus adactylis subulatis basi nodosis rußs. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2990. n. 168. — Habitat in Oceano australi, manibus acutissimis vulnerans, statura C. Mantis, at triplo minor, antennis posterioribus trifidis, thorace plano, laevi, bisulcato: Marginis anterioris lamina mobili, tridentata; pedibus 14.

Fabricii Mant. ins. I. p. 334. n. 4. Spec. ins. I. p. 515. n. 3.	S. 1133. n. 77. <i>Cancer Scyllaris</i>, der Sandkrebs. Rumph Amb. Rariteitk. p. 5. Tab. III. Fig. F. Müllers Linn. Natursyst. der Insekten, B. II. <i>Squilla arenaria marina</i>.
---	--

Der Gestalt nach kommt gegenwärtiger Krebs mit dem vorhergehenden ziemlich überein, nur ist er um den dritten Theil kleiner, am hintern Rande des Brustschilds gerändelt und hinter den Füßen noch mit ein Paar Spitzen versehen. Die Scheerenfüsse haben an ihrem Innenrande ebenfalls scharfe Zähne, womit er empfind-

pfündlich verwunden kann, der zehnringichte Hinterleib aber ist glatt, ohne Furchen und erhabene Längslinien. Die Farbe ist dunkelgrün, weiß und blau gefleckt, und roth an den Enden der Füße. Er gehört unter die Bewohner des ostindischen Meeres.

Skolopendern überhaupt.

Amoreux Notice des Ins. p. 142 et 277.
Blumenbach's Handb. d. Naturges. 398. n. 86.
Scopolendra, *Assel*.
Degeer's Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 200.

Forskælii Descriptio Animal. p. 87. n. 31.
Müllers Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 1155.
Onomatologia Hist. nat. P. VII. p. 47.
Sulzers Gesch. d. Ins. S. 270. *Asselwurm*.

Hundert- oder Tausendfüsse (*Cent-pieds*, *Mille-pieds*) ist der allgemein bekannte Name dieser Insekten, welche von der Länge eines Zolls bis zur Länge einer Elle gefunden werden. Ihr Kopf ist rund, hornartig, plattgedrückt, ganz vorne mit kleinen hemisphärischen, den Spinnenaugen ähnlichen Augen, mit zwey vielgliedrichten, borstenartigen, gegen das Ende allmählich abnehmenden Fühlhörnern (Tab. XI. Fig. 10. a. a.), unter dem Kopfe mit zwey scheerenförmigen, scharfen und spitzigen Fresszangen (b. b), und zwischen diesen Fresszangen und den Fühlhörnern, noch mit zwey konischen, beweglichen Fühlspitzen versehen. Gleichbreit mit dem Kopfe ist der lange, schmale, harthäutige Körper, welcher oben etwas convex, unten ganz platt, und wegen der vielen Ringe, aus welchen er besteht, nach allen Richtungen schlangenförmige Bewegungen zu machen geschickt ist. Sein Ende machen zwey, oft gerade und gegliederte, oft krumme und zangenförmige Anhänge, welche manche für den Schwanz halten, und diese Insekten daher auch *Gabel- oder Doppelschwänze* nennen, andere aber noch zu den Füßen rechnen, deren Anzahl sich überhaupt nach der Anzahl der Ringe richtet, indem an jeder Seite eines Rings immer ein Fuß eingelenkt ist. Diese Füße bestehen aus mehreren Gliedern, deren letztes einen spitzigen Nagel, oder eine Klaue bildet. Überaus groß ist die Bewegfertigkeit, welche diese Insekten mit diesen immer auswärts gekehrten, und in bewundernswürdiger Ordnung nach einander fortrückenden Füßen äussern.

Mit der Fortpflanzungsart der Skolopendern ist man noch unbekannt, ihre stufenweise Entwicklung geschieht aber bloß durch die wiederholte Häutung, welche jedesmal mit der Anzahl der Ringe, auch die Anzahl der Füße vervielfältiget. Sie leben vom Raube anderer Insekten und Würmer, die ihr giftiger Biß augenblicklich tödtet. Da sie weder Luft, noch Wärme vertragen können, so halten sie sich mei-

meistens unter Steinen, in der Erde, in faulen Holze und an andern feuchten Orten auf.

Die Skolopendern gehören unter die bekannten giftigen Insekten der Vorzeit. Nur waren die Alten zweifelhaft, ob die Gefährlichkeit ihrer Verletzung mehr in ihrem Gebisse, oder in ihrer Schwanzzange zu suchen sey? Es ist wohl nicht zu läugnen, daß sie mit ihren Schwanzstacheln mehr oder weniger empfindlich stechen können, ihre Fresszangen aber sind unstreitig das gefährlich verletzende Werkzeug. Kleinere Arten veranlassen dadurch eine unbedeutende Geschwulst, grössere, wie die indianischen aber, grosse, schmerzhaftige Geschwülste mit anderen bedenklichen Zufällen. Gelangen sie an die Haut des Menschen, so klammern sie sich so fest an dieselbe an, daß sie, nach *Forskäls* Versicherung, oft nicht anders, als durch die Annäherung eines glühenden Eisens, davon zu entfernen sind. Ihre Gewohnheit, sich gerne in die Falten, in die Ärmel und Taschen der Kleider einzuschleichen, macht sie um so gefährlicher, weil man hierdurch ohne Vorsatz und unverdienter Weise von ihnen gebissen werden kann.

92. Die gegabelte Skolopender. Tab. XI. Fig. 9. 10.

Scolopendra forficata pedibus utrinque quindecim. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 3016. n. 3. Faun. Suec. n. 2064. — Habitat in Europa, America.

Aldrovandi de animalibus insectis. p. 635.
 Amoureux Notice p. 144.
 Berlinische Sammlungen IV. p. 304.
 Cuvier Tableau élémentaire, p. 466. *la Scolopendre brune*.
 Degeers Abh. 2. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 202. n. 1. Tab. XXXV. Fig. 12 — 16. *Scolopendre Fourchue*, die Zangenskolopender.
 Fabricii Mant. ins. I. p. 341. n. 3. Spec. Ins. I. p. 532. n. 3. Syst. Ent. p. 429. n. 3.
 Frischs Ins. Teutschl. XI. Pl. 2. Tab. VII.
 Fries's Verz. schweiz. Ins. n. 1221.
 Geoffroy Hist. des Ins. Vol. II. p. 674. n. 1. Tab. XXII. F. 3. *la Scolopendre à trente pattes*.

Leskes Naturgesch. I. S. 494. n. 1.
 Moufetti Theatr. Ins. p. 199.
 Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1157. n. 3. Tab. XXXVI. F. 7. *Die Scheerenassel*.
 Mülleri Faun. Fr. n. 855. Zool. Dan. Pr. n. 2419. *Neue Berlin*. Mannigfaltigk. III. S. 341.
 Onomat. Hist. nat. VII. p. 50. *Die Skolopender mit dem Scheerenschwanz*.
 Raji Historia Insector. p. 45.
 Schaefferi Elem. Ent. Tab. III. Fig. 1. Icon. Ins. Ratisb. Tab. XLVI. F. 12.
 Schröters Abhandl. I. S. 352. Tab. III. F. 2.
 Scopoli Ent. carn. 1146.
 Sulzers Kennzeichen der Ins. Tab. XXIV. F. 155.

Die gemeinste unter allen Skolopendern ist die *gegabelte*, deren Körper, Fühlhörner und letztes Fußpaar kastanienbraun, oder rostfärbig, die übrigen Füße aber gelb sind. Ihre ganze Länge beträgt ungefähr einen Zoll, ihre Breite andert-halb Linien. Die Fühlhörner (Tab. XI. F. 10 a. a.) bestehen aus fünf und zwanzig, gegen die Spitze immer kleiner werdenden Gliedern; die scheerenförmigen Fress-

zan-

zangen (*b. b.*) von welchen sie auch den Namen *Scheerenassel* erhalten hat; aus zwey breiten Grundtheilen (*c. c.*), und den klauenförmigen Fresszangen selbst, welche jenen Grundtheilen eingelenkt sind. Von den funfzehn paar Füßen, deren Gelenke mit kleinen Härchen und kurzen Stacheln besetzt sind, sind die zwey vorletzten schon länger, als die übrigen, das allerletzte aber nicht nur das längste, sondern auch das dickste, ganz nach hinten ausgestreckt, und vorzüglich bestimmt, dem Insekte, welches so geschwind vorwärts kriecht, daß es nur mit Mühe zu fangen ist, das Rückwärtskriechen zu erleichtern.

Ausser Europa ist die gegabelte Skolopender auch in Nordamerika zu Hause. Sie liebt gerne feuchte Orte, lebt daher in Gärten unter Steinen, in verdorbenen Früchten, unter der Rinde alter Baumstämme, unter Blumentöpfen, abgefallenen Blättern u. s. w.

Wird sie gereizt, so öffnet sie ihre Fresszangen weit und setzt sich damit auf eine empfindliche Art zur Gegenwehr. Wirklich scheint ihr Biß giftig zu seyn, da Fliegen und andere Insekten augenblicklich davon sterben.

93. Die beissende Skolopender. Tab. XI. Fig. 11. 12.

Scolopendra morsitans, pedibus utrinque viginti, oculis octo. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 3016. n. 5. Amoenit. acad. I. p. 325. 506. Museum Adolphi Fr. I. p. 89. — Habitat in America australi et India, corporis segmentis 22. antennarum articulis 20.

Amoureux Notice des Ins. p. 143.
Bankrofts Naturgesch. von Guiana S. 151.
Blumenbachs Handbuch der Naturgesch. S. 399. n. 1.
Bradley, R. Philosophical account of the works of Nature Tab. XXV. F. 4.
Catesby nat. Hist. of Carolina III. p. 2. Tab. II.
Cuvier Tableau élémentaire p. 466. *la Scolopendre d'Amérique*.
Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. v. Göze, B. VII. S. 204. n. 1. Tab. XLIII. F. 1—15. *Scolopendre mordante, der Beisser*.
Fabricii Mant. Ins. I. p. 341. n. 5. Spec. Ins. I. p. 532. n. 5. Syst. Ent. p. 429. n. 5.
Fermins Reise durch Surinam Th. II. S. 297.
Frischs Ins. Teutschl. II. Tab. II. F. 5.
Gronov. Zoophilacii, n. 1002.
Leeuwenhoeck Qpp. I. Contin. epist. p. 10. c. F. III. 173.

Leskes Anfangsgr. d. Naturgesch. I. S. 495. n. 2.
Marcgravii Hist. rer. nat. Brasil. p. 253. *Jac-purua*.
Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1158. *Die indianische Assel*.
Müllers, O. F. Wurmarten des süßen und salzigen Wassers, S. 186. *Die indianische Skolopender*.
Olearii Gottorffische Kunstkammer, Tab. XII. Fig. 3.
Oronotol. Hist. nat. P. VII. p. 52. *Die indianische Skolopender*.
Pallas neue nord. Beytr. B. V. S. 320.
Petiveri gazophylacii Tab. XIII. F. 3.
Schröters, J. S. Abhandlungen über verschied. Gegenst. d. Naturgesch. Th. I Tab. III. F. 2.
Sebae Thesaurus I. Tab. LXXXI. F. 3. 4. II. Tab. XXV. F. 3. 4.
Sulzers Gesch. d. Ins. S. 272. Tab. XXX. F. 14. *Der indianische Asschwurm*.

Rothgelb, welches bey manchen Exemplaren blaß, bey andern dunkler ist, und mehr ins Braune fällt, ist die Farbe des gegenwärtigen Insekts, dessen Länge

zwischen fünf und zwölf Zoll, und dessen Breite zwischen einem halben und ganzen Zoll wechselt. Am Vordertheile des länglichrunden Kopfs ist es mit zwey Fühlhörnern versehen, wovon jedes zwey und zwanzig Glieder hat, und hinter denselben hat es auf jeder Seite vier kleine, schwarze, in einem Vierecke stehende Augen. Die Fresszangen sitzen auf einer, beynahe dreyeckigten Hornplatte (Fig. 12. f. f.) am Untertheile des Kopfs, und sind aus einem dicken Grundtheile (d. d.), und aus einem scharfen und spitzigen, klauenförmigen, von innen nach aussen beweglichen Ende (a. b.) zusammengesetzt. *Leeuwenhöck* hat dicht an der Spitze des letzteren das Giftloch entdeckt, welches in einer länglichten, rinnenförmigen, bis ans Ende reichenden Öffnung bestehet, und aus dieser Öffnung bey lebendigen Skolopendern einen Saft kommen gesehen. Gleich über den Fresszangen sind die zwey viergliedrichten, am Ende ebenfalls klauenförmigen Bartspitzen (c. c.) befindlich, zwischen welchen wieder zwey, den Backenzähnen gleichende, jedoch weiche Theile (e. e.) von unbekannter Bestimmung hervorragen. Der glatte unbehaarte Leib ist nach Verschiedenheit seiner Länge, bald aus zwanzig, bald aus zwey und zwanzig und mehr Ringen zusammengesetzt. In Surinam und Neuspanien sollen sogar Skolopendern dieser Art vorkommen, welche wohl dreysig Ringe haben. Nach der Anzahl der Ringe richtet sich auch die Anzahl der Füße, wovon jeder aus fünf Gliedern und einem schwarzen Endnagel besteht, und die hinteren Paare länger, als die vorderen sind. Das letzte Paar (Fig. 11. c. c.) ist nicht nur länger, als alle übrige; sondern auch durch seine Stärke, seine zangenförmige Biegung, und die hornartigen Stacheln, welche es an der Innenseite des ersten Glieds hat, von denselben verschieden.

Amoreux versichert, daß er die beissende Skolopender oft unter Steinen und Bretern im südlichen Frankreich angetroffen habe. Eben so kommt sie auch in Spanien, und nach *Pallas* in Cherson vor. Sehr gemein ist sie auf den antillischen Inseln, wo sie *Malfaisante* genannt wird. Auch Brasilien, das Vorgebirge der guten Hoffnung, und Ostindien sind mit derselben so reichlich versehen, daß sie den Einwohnern nicht selten in ihren Häusern lästig und gefährlich wird.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß dieses Insekt bey dem Bisse einen giftigen Saft aus jenen Ritzen der Fresszangen in die gemachte Wunde fliessen läßt, weil ausserdem aus der bloßen klauenförmigen Bildung der Fresszangen, weder die Heftigkeit noch die Dauer des Schmerzes zu erklären wäre. Ein Wundarzt bekam nach *Pallas's* Erzählung auf dem Biß dieser Skolopender eine starke entzündliche

Geschwulst, welche einige Wochen dauerte und *Fermin* versichert, daß die Heftigkeit des Schmerzes ein vier und zwanzig Stunden anhaltendes Fieber nach sich gezogen habe. Andere Reisende melden, daß der Biß dieser Skolopender noch schmerzhafter, als der Skorpionstich, dennoch aber nicht tödtlich sey. *Gronov* und andere brachten auch die beyden Hinterfüsse in den Verdacht einer besondern Giftigkeit, welches jedoch nicht wahrscheinlich ist, ohngeachtet diese Insekten vielleicht fähig sind, damit ziemlich empfindlich zu kneipen.

Zur Verhütung der üblen Folgen des Bisses empfiehlt *Fermin* sogleich guten venetianischen Theriak auf die gebissene Stelle zu legen.

94. Der größte Tausendfuß.

Julus maximus pedibus utrinque 134. Linn. Syst. Nat. T. I. P. V. p. 3020. n. 9. —
Habitat in America.

Berlinische Sammlungen B. VIII. S. 470. *Palmwürm*.
Bibliothèque universelle et historique de l'année 1687.
Tom. VI.
Fabricii Mant. Ins. I. p. 340. n. 12. Spec. Ins. I.
p. 531. n. 12. Syst. Ent. p. 428. n. 11.
Lister H. 1699. T. V.

Marcgravii Hist. rer. nat. Brasil. p. 255. *Vermis terrestres*.
Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 1165.
n. 8. *Der Amerikaner*.
Onomatolog. Hist. nat. P. IV. p. 570. *Der größte Tausendfuß*.

Die beträchtliche Länge dieses Insekts steigt von einem bis zu anderthalb Fuß, und seine Dicke von dreyviertel bis zu einem Zoll. Eben so verschieden ist die Zahl der Ringe und der Füße, von welchen immer vier auf einen Ring kommen, so daß es also Vielfüße dieser Art von sechzig Ringen und ein hundert und zwanzig Paar Füßen, von sieben und sechzig Ringen und Einhundert und vier und dreysig Paar Füßen, und von siebenzig Ringen und Einhundert und vierzig Paar Füßen giebt, die wie Schweinsborsten unter dem Leibe stehen. Der ganze Körper ist mit schwärzlichen harten Schuppen bedeckt, die wie Dachziegeln über einander liegen. Am Kopfe sowohl, als am Schwanzende, sind sie mit einer Spitze versehen, womit sie sich in die Häuser einbohren, die Menschen verletzen, und die ihnen beygebrachten Wunden so sehr vergiften, daß sie vier und zwanzig Stunden entsetzliche Schmerzen ausstehen müssen. Diese Vielfüße sind auf der Insel Mevis sehr gemein und unter dem Namen *Palmwürmer* bekannt.

Dritter Abschnitt.

Zufällig schädliche Insekten, welche als ganz ungewöhnliche Erscheinungen innerhalb des menschlichen Körpers vorgekommen sind.

Auch die inneren Theile des menschlichen Körpers sind nicht verschont geblieben von den mancherley Nachstellungen und zufälligen Besuchen der Insekten. Unter der Haut und im Fleische, in allen Höhlen, und beynahe in allen Eingeweiden, hat man in seltenen Fällen Larven, Puppen und vollkommene Insekten entdekt. Die hierüber bey den älteren Schriftstellern häufig vorkommenden Beobachtungen und Erfahrungen, sind von vielen Neuern um so mehr für Erdichtungen, Teuschungen und Betrügereyen gehalten worden, da sie grossentheils in dem Zeitalter des Aberglaubens, der Hexerey und Behexungen gemacht worden sind. Neuere, von helldenkenenden Ärzten und Naturforschern herrührende Beobachtungen, drücken aber jenen älteren wieder das Siegel der Glaubwürdigkeit auf, und bestätigen unumstößlich die alte Wahrheit, daß sich Insekten sogar in die verborgensten Theile unseres Körpers einschleichen und überaus schmerzhaft, ja tödtliche Zufälle hervorbringen können. Zwar macht die grosse Reizbarkeit der verschiedenen Öffnungen und Höhlen unsrer Oberfläche auskleidenden Haut, das Eindringen vollkommener, sich leicht durch den Reiz ihrer mit Häkchen versehenen Füße verrathender Insekten nur im Zustande der starken Berauschung, des tiefen Schlags, der Ohnmacht und der Bewusstlosigkeit überhaupt gedenkbar; ihre Eyer können sie hingegen sehr wohl in den Winkeln der geschlossenen Augen, des geschlossenen Mundes, im äusseren Gehörgange, in den Nasenlöchern, an der Mündung der Harnröhre, zwischen den grossen Schamlippen und am After absetzen, und in diesen Eyern noch öfter durch Speisen und Getränke in den Körper gebracht werden. Auch beweisen dieses die weit häufiger vorgekommenen Fälle von Larven und Puppen, als von vollkommenen Insekten, welche in dem menschlichen Körper angetroffen worden, oder aus demselben abgegangen sind. Erstere können sich aber aus den in den Mündungen jener Höhlen abgesetzten Eyern in der ihnen angemessenen feuchten Wärme, bald entwickeln, ohne zu reizen, tiefer eindringen und sich sodann in Puppen verwandeln. Ja es wird aus gewissen Beyspielen mehr als wahrscheinlich, daß Insekten so gar die Puppenhülle im menschlichen Körper verlassen und ihre Nachkommenschaft in demselben fortgepflanzt haben. Was aber die verschluckten Eyer noch besonders betrifft; so geben die
ganz

ganz entfernt und abgesondert von den äusseren Zugängen entdeckten Maden, Puppen und vollkommenen Insekten zu erkennen, daß diese Eyer die ersten Wege den Magen und Darmkanal, unentwickelt passiren, und sich erst in den zweyten Wegen, im Blut- und Lymphsysteme, entwickeln können.

Da die im menschlichen Körper vorgekommenen verwandelten und unverwandelten Insekten, sehr oft von den, der Entomologie und Helminthologie unkundigen Beobachtern unter dem allgemeinen Namen *Würmer* begriffen und damit verwechselt worden sind, zum Theil auch bey den besten naturhistorischen Kenntnissen nicht systematisch bestimmt werden konnten: so war es unmöglich, das hieher gehörige immer ganz genau von demjenigen zu trennen, was eigentlich in den zweyten oder helminthologischen Theil dieses Werks gehört, und die hier vorkommenden Insekten selbst in einer systematischen Ordnung aufzustellen; sondern blos zulässig sie nach den Theilen, in welchen sie gefunden worden sind, durchzugehen, und aus dem zahlreichen Haufen der Beobachtungen, hier nur diejenigen auszuheben, bey welchen es weniger zweifelhaft war, ob nicht Larven mit Würmern verwechselt worden sind?

Insektenlarven und vollkommene Insekten unter der Haut und in den fleischichten Theilen des menschlichen Körpers.

Diodore de Sicile, Histoire universelle traduite en françois par l'Abbé Terrasson, Amsterd. 1738. T. I. L. III. C. XV. p. 295.

Graham von Würmern unter der Haut in Duncan's Medical Commentaries Vol. II. und aus diesem in Richters chir. Bibl. B. X. S. 543.

Göze Geschichte schäd. Insekten S. 42.

Marcellus Donatus L. I. Hist. med. mirab. C. V. p. 59. de Acridophagis Libiae populo.

Sauvages Nosologia methodica T. V. p. 200. n. 2. Malis verminosa, p. 202. n. 4. Malis Acridophagorum und p. 285.

Ein merkwürdiges Beyspiel von Fliegenlarven, welche die ganze Oberfläche des Körpers durchwühlten hatten, erzehlt Sauvages nach Salzmann unter *Malis verminosa*: „Im Jahre 1718 wurde im strasburgischen Krankenhause ein Jüngling aufgenommen, bey welchem kleinere und grössere Würmchen in einem grossen Theile des Körpers unter der Haut Gänge machten und beynahe den ganzen Körper aufzehrten. Das Fett des linken Auges war davon ganz vernichtet, in der Leistengegend, in der Kniekehle waren ganze Stücken Fleisch ausgefressen — ein schrecklicher, beklagenswürdiger Anblick! In den innern Theilen des geöffneten Leichnams war aber kein Wurm anzutreffen, zum Beweis, daß sie von aussen in die Fleischsubstanz gelangt waren.“ Eben so gedenkt Graham eines Kranken, bey wel-

welchem' sich Insektenlarven durch die Haut frassen, und der, so oft dieses geschah, vorher jederzeit heftige Schmerzen litt, *Diodorus Siculus* aber, und nach ihm *Marcellus Donatus* und andere ältere und neuere Schriftsteller, liefern die merkwürdige Geschichte einer Libischen Nation, welche den Insektentod oder an einer Aufzehrung aller muskulösen und weichen Theile des Körpers durch Insekten starb. Ersterer drückte sich hierüber ungefehr so aus: „Die Akridophagen oder Heuschreckenfresser, ein äthiopisches Volk, welches weit kleiner als andere Menschen, überaus mager, schwarz und sehr behend ist, nemen durch ihr ganzes Leben keine andere Nahrung, als eine ausserordentlich grosse Art Heuschrecken zu sich, welche ihnen der Westwind im Frühlinge aus der Wüste in ungeheurer Menge zuführet. Sie sammeln diese Heuschrecken in Haufen und salzen sie ein, um sich bis zum neuen Heuschreckenfange im nächsten Jahre in Vorrath zu setzen. Ihre Lebensdauer erstreckt sich hierbey nicht über vierzig Jahre und das Ende derselben ist überaus jammervoll; denn sobald ihr frühes Ende herannahet, so entstehen in ihrem Körper geflügelte Läuse von verschiedener Gestalt und häßlichem Ansehen. Dieses Übel nimmt seinen Anfang im Unterleibe und in der Brust, erstreckt sich aber bald über den ganzen Körper. Der Kranke fühlt anfänglich ein Jucken, welches ihn zum Kratzen nöthiget. Wann nun die sich im Inneren des Körpers erzeugenden Läuse nach aussen wollen, so treiben sie ein verdorbenes Blut heraus, welches heftige Schmerzen in der Haut macht. Der Kranke selbst sucht ihnen mit seinen Nägeln Luft zu verschaffen, und erhebt dabey ein klägliches Geschrey. Endlich kommen die Läuse aus den Wunden, die er sich durch das Kratzen gemacht hat, wie aus einem Siebe in unvertilgbarer Menge hervor.“

So unbegreiflich die Entwicklung dieser geflügelten Insekten im lebenden Menschen zu seyn scheint, so läßt sie doch eine nicht unwahrscheinliche Erklärung zu. Wie alle Insekten waren nemlich auch jene Zugheuschrecken den Verfolgungen anderer Schmarutzerinsekten ausgesetzt, welche vielleicht noch mehr in den eingesalzenen, als in den lebendigen Heuschrecken ihre Eyer absetzen. Die Kleinheit dieser verschluckten Eyer liefs es sehr wohl zu, daß sie selbst in das Schlagadersystem und somit in alle weiche, muskulöse, häutigte und drüsigte Theile des menschlichen Körpers gelangen, daselbst ihre Reife erhalten und, nachdem sie schon als Maden sich durch die Muskelsubstanz ihren Weg gegen die Oberfläche gebahnt hatten, endlich als vollkommene Insekten auf demselben zum Vorschein kommen konnten. Weniger glaublich ist es, daß ein eignes Insekt, wozu sich wohl am wenigsten die fliegende Pferdelaus (*Hippobosca equina*), wel-

welche Göze annimmt, wegen ihrer eigenen Fortpflanzungsart qualificiren dürfte, von der eigenen Ausdünstung der Heuschreckenfresser angelockt, den Körper von aussen nach innen angegriffen habe.

Unwahrscheinlich und unbegreiflich ist dagegen *Sauvage's* Mittheilung der Erzählung seines Freundes *Leuefre*, welcher versicherte, daß bey einem Kranken in den Jahren 1728 und 1729 täglich eine Menge, ihm zugleich in Abbildungen mitgetheilte Läuse, Flöhe, Ohrenhöhlen, kleine Spinnen und Käfer, aus Augen, Ohren, After, Harnröhre und Aderlaßwunde hervorgekommen wären, wogegen man verschiedene Mittel und endlich die Merkurialkur versucht hätte. Während des hierauf erfolgten, und vierzehn Tage angehaltenen Speichelflusses, wäre der Kranke frey von Insekten gewesen, nachher aber wieder damit befallen worden und endlich bey beständiger Schlaflosigkeit ausgemagert und umgekommen.

Skolopendern und Maden in den Stirnhöhlen.

Abhandlungen der Kaiserl. Akad. d. Naturf. Th. II. S. 215.

Clerici Hist. lat. lumbric. p. 295.

Hildanus, Fabr. Cent. I. obs. 8.

Hist. de l'Acad. de Paris 1708. p. 42 et 1733. p. 34.

Holdefreund, J. R. S. von einer langwierigen Tollheit, die nach Abgang vieler aus den Stirnhö-

len durch die Nase gefallener Würmer glücklich gehoben ward. S. dessen Erzählungen merkwürdiger Krankengeschichten. Braunsch. und Wolfenbüttel 1775. S. 1.

Richters chir. Biblioth. B. II. S. 28. von einem besonderen Geschwür und einem Wurm in der Stirnhöhle, aus Hill's Cases in Surgery.

In den *Histoires de l'Académie de Paris* wird einer Frau gedacht, welche vier Jahre lang an den heftigsten Kopfschmerzen gelitten hatte, und endlich mit dem Abgang einer hundert und zwölfköpfigen Skolopender, wahrscheinlich der *Electrica Linnaei*, davon befreiet wurde. Eben dieses erfolgte bey einem Manne nach dreyjährigem Kopfschmerzen. Ähnlich ist auch der bey *Hill* vorkommende Fall. Eine Weibsperson hatte nemlich heftige Zahnschmerzen, zu gleicher Zeit eine Geschwulst im Gesichte, einen Schmerz in der Stirne und innerlich in der Nase, der sie zuweilen durch seine Heftigkeit des Bewusstseyns beraubte. Überdies zeigte sich ein kleiner schwarzer Fleck am linken Nasenflügel, der oft sehr juckte und feucht wurde. Sie ließ diesen Fleck öffnen und brauchte eine Merkurialkur. Die Wunde heilte und die Kranke befand sich eine zeitlang sehr wohl. Einst fühlte sie etwas Fremdes in der Nase. Sie griff darnach und zog einen drey Zoll langen Wurm heraus, der mit sehr vielen Füßen versehen, wahrscheinlich also eine Skolepender war.

Fabricius Hildanus erzehlt, daß der Sohn seines Vettern lange Zeit vom Kopfschmerzen geplagt ward, wozu sich ein kleines Fieber und Niesen gesellte. Hierdurch zerriß ein Absceß in der Gegend des Siebbeins, und ergofs eine äusserst stinkende Gauche, mit welcher zugleich ein Wurm, wahrscheinlich eine Skolopender, oder eine Insektenlarve, hervorkroch. Viele Ähnlichkeit mit diesem Fall hat *Holdefreunds* Beobachtung. Eine Bauersfrau von sieben und dreyßig Jahren raßte nemlich ein ganzes Vierteljahr aufs heftigste und klagte in den guten Zwischenräumen über einen bohrenden Schmerz in dem Stirnbeine. Dabey floß ihr öfters ein stinkendes helles Wasser aus der Nase. Auf den Gebrauch eines Schnupftobacks kamen mit dem Ausfluß eines faulriechenden, mit Blutstriemen vermischten Wassers neunzehn kleine, noch lebende, hellrothe, wie die Käsemaden gestaltete Würmer zum Vorschein. Bey dem fortgesetzten Gebrauch dieses Mittels wurde die Frau wieder vollkommen gesund. Mehrere Beyspiele und Nachweisungen von Insektenlarven, die in den Stirnhöhlen und in verschiedenen Theilen des Gehirns selbst angetroffen worden sind, findet man bey *Clerikus* und in den *Abhandlungen der kaiserlichen Akademie der Naturforscher*.

Milben und Fliegenlarven in den Augen.

Clerici *Histor. lat. lumbric.* p. 273. *Sirones intra oculos*, p. 311. *Vermes oculorum*.

Das in langwierigen Ophthalmien aller Art abfließende, die Augenlieder wund machende, und oft übelriechende Serum, und der sie zusammen klebende scharfe Eiter, locken nicht selten Milben und Fliegen herbey, welche in demselben ihre Eyer absetzen und sich einnisten. Triefäugige Mütterchen liefern hierzu genug Beyspiele.

Insektenlarven in den Kinnbackenhöhlen.

Cemmere. litter. Noric. Vol IX. p. 164. n. 3. *Casus de vermibus ex sinu maxillari per nasum elapsis.*

Heysham, J. An Account of a painful Affection

of the Antrum Maxillare, from which three Insects were discharged. *Vid. Medical Communications.* Vol. I. Lond. 1784. n. XXX. p. 430.

Eine sechzigjährige Frau litt über acht Jahre an einem heftigen Schmerz in der rechten Seite des Gesichts und Kopfs, der gewöhnlich Paroxysmenweise kam, ausserdem aber bey jeder Bewegung der Kinnbacke rege und öfters so heftig wurde, daß die Kranke über laut schrie. Man durchbohrte endlich nach vielen vergebens

gebens angewandten Mitteln, die Kinnbackenhöhle, und es zeigten sich drey Würmer, von der Dicke eines Gänsekiels und der Länge eines Zolls wahrscheinlich nach der undeutlichen Abbildung Larven von dem Östrusgeschlechte, die man auszog. Hierauf erfolgte, nach *Heyshams* Versicherung, zwar Erleichterung, aber sie war von kurzer Dauer und, ohngeachtet man Öl einspritzte, so kamen doch keine Würmer mehr zum Vorschein.

Der im *Commercio litterario* vorkommende Fall betrifft eine Frau von acht und dreissig Jahren, deren linker Backen in der Gegend der Kinnbackenhöhle bis ans Auge etwas angeschwollen war, nachdem sie vorher über heftigen Kopfschmerz geklagt hatte. Sobald dieser aufhörte, floss eine wässrichte Feuchtigkeit aus der Nase, mit welcher bisweilen Würmer vermischt waren. Auf den Gebrauch bitterer Einspritzungen kamen in der Folge mehr als dreissig, Zoll lange, Fleischmaden ähnliche Würmer mit schwarzen Köpfen hervor, worauf alle Zufälle verschwanden.

Insektenlarven in der Nase.

Brury, J. St. de Vermibus nasalibus, Budae 1782.
Commerc. litter. Nor. Vol. X. p. 131. Tab. I. F. 6.
 Cruce (Vincent, Alsarius a) de verme admirando
 per nares egresso *Comment. Ravennae*, 1610. 4.
 Razow von Würmern aus der Nase, *Vandermon-*
de Samml. B. IX. S. 353.
 Salzmann, J. Diss. de verme naribus excusso,
Resp. Honold, Argent. 1721. c. Tab. aen.

Slabber, M. de excretionem vermis ex dextro na-
 rium orificio; in *Comment. Soc. Harlemens. T. X.*
P. 2. p. 466.

Wohlfart, J. A. *Observ. de vermibus per nares*
excretis. Hal. 1768. c. Tab. aen. (enthält die Be-
 schreibung und Abbildung der Maden und ihrer Mut-
 terfliegen, welche einem alten Manne aus der Nase
 abgegangen sind.)

Der merkwürdigste von den in den angeführten Schriften vorkommenden Fällen, ist wohl der im *Commercio litterario* enthaltene, in so ferne er offenbar beweist, daß Insekteneyer in der Nase ihre Reife erhalten, die ausgekrochenen Larven in derselben ihr Wachsthum vollenden, und wenn sie nicht gestört werden, sich wohl auch verpuppen und als vollkommene Insekten zum Vorschein kommen können. Eine Hebamme, meldet der Erzähler *Quelmalz*, bekam Kopfschmerzen, welche bald bis zum Unsinnigwerden überhand namen. Nach einigen Tagen entstand eine Geschwulst, welche die Nase und den größten Theil des Gesichts einnahm. Alle zertheilende Mittel waren vergebens angewandt worden, und die Geschwulst gieng in Eiterung. Sie wurde sobald sie reif zu seyn schien, durch eine Incision geöffnet, worauf Eiter mit länglichten, in Knäueln vereinigten Stückchen zum Vorschein kam. Der durch sie gehemmte Ausfluß des Eiters, machte an
 ihre

ihre nähere Untersuchung aufmerksam, und bey dieser ergab sich, daß diese Stückchen eilf Linjen lange und drey Linien breite; weiche, etwas platigedrückte aschgraue, mit kleinen Fühlhörnern versehene, den Fliegenmaden ähnliche Würmer waren, von welchen in wenig Tagen wenigstens hundert abgiengen. Die Kranke wurde hierauf ungemein erleichtert, und das Geschwür in kurzen zur Heilung gebracht.

Insektenlarven in den Ohren.

Acrels, O. chirurgische Krankengeschichte im königlichen Lazarethe zu Stockholm angemerkt. S. *Richters* chir. Bibl. B. II. St. 2. S. 3. Desselben chirurgische Vorfälle, S. *Richters* chir. Bibl. B. IV. S. 458.

Farion im Vandermonde Journal de Med. Mens. Aug. 1758. p. 138.

Filleau im Journal de Medecine T. LXXVI. S. *Richt.* chir. Bibl. B. XI. S. 459.

Leschevin von den Krankheiten des Gehörs, in *Richters* chir. Bibl. B. IV. S. 735.

Lieutaud de vermibus ex aure et tumore ma-

gno V. Journal de Medecine T. VIII. p. 145. et T. XVII. p. 550.

Maget im Journal de Med. Chir. et Pharm. T. LXVI. S. *Richt.* chir. Bibl. B. XI. S. 71.

Rayger, B. von Würmern in den Ohren, in den Abh. d. kais. Akad. d. Naturf. Th. IV. S. 111.

Remanini, S. V. unwahrscheinl. Geschichte einer lebendigen Fliege, die man aus dem Gehörgange herausgezogen haben will, nachdem sie 15 Jahre darinnen gelebet, im Orteschi Giornale di Medicina Vol. XII.

Rösels Insektenbelustigung, Th. II. S. 40.

Leschevin schreibt, „von aussen können allerhand fremde Körper in den Gehörgang fallen. Sind es Insekteneyer, so werden sie zuweilen daselbst ausgebrütet, und zeugen Würmer.“ Dieser Satz gründet sich auf eine Menge Erfahrungen, wovon ich hier nur einige anführen will. Nach *Acrel* bekam eine Weibsperson, die seit einiger Zeit ein schweres Gehör hatte, zuweilen, ohne irgend eine in die Augen fallende Ursache, Convulsionen. Sie beklagte sich in der Folge über Schmerzen in den Ohren, wobey jederzeit die Convulsionen heftiger wurden. Man steckte ein wenig mit Öl und Laudanum befeuchtete Charpie ins Ohr, und fand, als man sie wieder auszog, einige länglichte Würmer an derselben hängen, worauf sich die oben bemeldeten Zufälle verloren. An einem andern Orte empfiehlt er, als ein sehr oft bewährt gefundenes Mittel gegen diese Gäste, das Dekokt von wildem Rosmarin (*Ledum palustre*) ins Ohr zu sprüzen und mit Charpie einzulegen.

Wie nöthig es, nicht blos zur Unterhaltung der Ruhe, sondern auch zur Verhütung jedes Absatzes von Insekteneyern in der wärmeren Jahrszeit sey, schlafende Kinder durch ein über sie ausgespanntes Flortuch etc. vor Fliegen und andern Insekten zu sichern, beweist *Maget* durch folgenden Fall: Ein dreywöchentliches Kind gab durch sein Geschrey und öfteres Greifen nach dem Ohre zu erkennen-

kennen, daß es daselbst heftige Schmerzen empfinde. Nach acht Tagen fieng das Ohr an zu fließen und die Schmerzen verschwanden. Nach vierzehn Tagen kamen sie wieder und endigten sich abermals mit einem Ausflusse aus dem Ohre womit allmählich zwey und dreysig Würmer ausgeleert wurden, die den Fleischmaden glichen. Von dieser Zeit an verlohren sich Schmerzen und Ausfluß, und das Kind befand sich nachher immer wohl.

Eben so belehrend in dieser Hinsicht ist das Beyspiel, welches *Filléau* anführt. Ein Knabe, der eine Zeitlang auf einem Misthaufen geschlafen hatte, klagte über Schmerzen im Ohre. Bey der Untersuchung fanden sich Würmer darinnen, welche man herausnam und somit den Kranken von seinen Schmerzen befreyte. Ohne Zweifel waren diese Würmer die Larven der Aas- oder Fleischfliege, die ihre Verwandlung in dem Miste zu machen pflegt.

Noch überzeugender sind aber die Fälle, welche *Farion* und *Rösel* erzählen. Ein Knabe, meldet ersterer, aus dessen Ohre schon seit einem Monathe Eiter floß, wurde auf einmal von heftigen, mit convulsivischen Bewegungen begleiteten Schmerzen befallen. Als diese etwas nachliessen, zog man drey Würmer heraus, die man in einem Papiere verwahrte, um zu sehen, ob sie nicht einer Verwandlung fähig wären. Fünf Tage nachher hatten sie sich wirklich in Puppen verwandelt, aus welchen endlich Fliegen hervorkamen, welche die im faulen Fleische befindlichen an Grösse übertrafen. Und *Rösel* führt folgende Stelle aus D. *Kirstens* Brief an: „die funfzehn Würmer, welche ich aus dem Ohre eines Bauernjungen von dreyzehn Jahren, der unerhörte Schmerzen einige Wochen erlitten, sowohl durch Hülfe einiger Arzneyen, als auch durch Hülfe einer kleinen Zange herausgezogen, waren den Maden, woraus die Schmeisfliegen hervorkommen, die Sie im zweyten Theil Ihrer Insektenbelustigung abgebildet haben, an Farbe und Grösse vollkommen gleich.“

Insektenlarven im Munde.

Doläi, J. von Würmern im Speichel in den Abhandl. d. kaiserl. Akad. d. Naturf. Th. IX. S. 191.

Isibordus, vom Speichel mit Würmern, eben- daselbst B. XIV. S. 327.

Der stinkende Speichel skorbutischer Menschen ist unstreitig eines der ersten Anlockungsmittel der Fliegen, ihre Eyer in den Winkeln des Mundes oder im Munde selbst abzusetzen, um den auskriechenden Larven gleich die angemessenste Nahrung zu verschaffen. *Doläi* bestätigt dieses durch das Beyspiel einer solchen

Person, die in seiner Gegenwart einen stinkenden und mit Würmern angefüllten Speichel auswarf, und *Isibordus* durch das Beyspiel einer skorbutischen Nonne, die wegen ihres stinkenden Athems vieles fruchtlos gebraucht hatte, und in deren Speichel man endlich kleine weisse, den Käsemaden ähnliche Würmer entdeckte.

Insektenlarven in der Luftröhre und in den Lungen.

Alsaharavius in Capite de Tussi.
 Bianchini, lettere Medico Pratiche all indole delle febbri maligne p. 339.
 Consbruch von Würmern aus der Lunge in Hufelands Journal der practischen Heilkunde, B. IV. St. 3. S. 599.
 Lieutaud Hist. anat. med. Vol. II. obs. 572 et 720.

Miscell. Cur. Dec. XI. An. IV. obs. 63.
 Morgagni Ep. XIX. art. 41. et Ep. XXI. art. 44.
 Percival Ess. medical philosophand experimental. Vol. II.
 Sentulianus et Valisnerius in Galer. di Minerva T. VII. P. I. obs. 7.
 Schenkii Obs. med. L. II. de pulm. p. 249.
 Zoar Alhomer. Lib. I. Tract. II. Cap. 3.

Die Entstehung der Insektenlarven in den Lungen setzt voraus, daß die Eyer tief im Rachen bey völlig offenem Munde abgesetzt worden sind. Da aber diese Theile viel zu reizbar sind, als daß sie, selbst im tiefsten Schläfe, das zum Eyerlegen nöthige Verweilen eines Insekts verstatten sollten; so sind die unter dem Auswurfe Lungensüchtiger gefundenen Maden, wohl nur als zufällige, erst ausser den Lungen hinzugekommene Gäste anzusehen. Auch mehren die bey den Schriftstellern vorkommenden Beyspiele, wovon ich nur das von *Consbruch* anführe, diesen Verdacht. „Im Militärlazareth zu Bielefeld starb im December 1796 ein Schwindsüchtiger, dessen Auswurf, nach der Versicherung des Regimentschirurgus und der Compagniewundärzte, immer von zahllosen Maden wimmelte, vorzüglich wenn er neben dem warmen Ofen auswarf.“ In der Nachbarschaft des Ofens halten sich aber immer am meisten die Fliegen auf, und die in der Wärme vermehrte faulichte Beschaffenheit des Eiters zieht sie um so mehr herbey, in demselben ihre Eyer abzusetzen.

Insektenlarven, Asseln und Skolopendern in dem Magen.

Klärlich, Beschreibung einer convulsivischen Krankheit, welche von einem kriechenden Insekto im Magen entstanden; in den deutschen Schriften der königl. Soc. zu Göttingen B. I. n. 14. c. Fig.

Lälii, J. L. von Kellerwürmern, die durch Er-

brechen abgegangen; in den Abh. der kaiserl. Akad. d. Naturf. Th. XI. S. 139.

Lister. (Martin) in den Philosoph. Transactionen, B. X. S. 394. n. 417.

Sauvages Nosolog. Meth. T. V. p. 199.

Wall, J. in den Phil. Transact. Vol. L. P. II. p. 842.

In Rücksicht der durch Brechen, Stuhlgang und Urin ausgeleerten Insektenlarven und vollkommenen Insekten, ist wohl nicht zu läugnen, daß sich bey vielen

Ien Beobachtungen, welche vorzüglich in den Abhandlungen der kaiserl. Akad. d. Naturforscher vorkommen, manche Trugschlüsse eingemischt und manche Insekten etc. erst in die Gefässe, worinnen die Abgänge aufbewahret worden sind, gekommen seyn mögen. Andere Beobachtungen aber sind von zu glaubwürdigen Männern und unter zu überzeugenden Umständen gemacht worden, als daß sie in Zweifel gezogen werden könnten. Hieher gehört der merkwürdige Fall, den *Lister* von einem neunjährigen Kinde, welches zolllange und einer Entenfeder dicke Raupen, mit schwarzen Köpfen, braunen Ringen und vierzehn Beinen ausbrach, und *Wall* von einem Mädchen erzehlt, die lange Zeit mit einem nagenden Schmerz im Magen beschwert war, endlich aber auf tausend Stück Asseln oder Kellersesel (*Oniscus Asellus*) wegbrach, und hierdurch von ihrem Übel befreyet wurde. Sehr übereinstimmend ist hiermit Lälis Erzählung von einem Mädchen von funfzehn Jahren, welche bey grossem Durst aus einem Brunnen getrunken hatte, und nach gegebenem Brechsafte, mehr als sechzig Kellerwürmer über sich ausleerte. Das kriechende Insekt, welches *Klarich* abgebildet hat, und durch seinem Reiz im Magen Convulsionen veranlasste, war eine gegabelte Skolopender (*Scolopendra forficata*). Was aber die im Magen vorkommenden Insektenlarven betrifft; so äussert *Sauvages* hierüber folgende Meinung: „Die Pferdebremse (*Oestrus nasalis*) schlüpft oft in die Nasenlöcher der Schaaf, Ziegen etc. und setzt in ihren Stirnhöhlen ihre Eyer ab. Etwas Ähnliches scheint auch bey dem Menschen Statt zu finden und zu der Zeit, als die Pest in Alesia 1720 wüthete, öfters hundert Menschen begegnet zu seyn; denn alle, welche Brechmittel zur Vorbauung namen, brachen eine grosse Menge Larven oder Maden von der Grösse der Gerstenkörner weg.“ Es ist aber eben sowohl möglich, daß Insekteneyer mit Speisen und Getränken verschluckt werden können, wie ich schon oben gedacht habe, und wie wir noch ferner sehen werden.

Insektenlarven, Puppen und vollkommene Insekten im Darmkanale.

Akrel, J. G. Historia vermium, larvarum nec non insectorum, variorum generum, per biennium intra corpus humanum hospitantium, una cum variis experimentis ea expellendi; in Nov. Act. Regiae Societ. Scient. Upsaliensis, Vol. VI. 1799.

Bastiani, A. Beschreibung und Abbildung eines Thiers das nebst vielen Spulwürmern abgetrieben worden, in Atti dell' Acad. di Siena To. VI. (Blumen-

bach med. Bibl. B. I. S. 86. hat zwischen diesem Thiere und der Meerbremse *Oestro* Gesn. viele Aehnlichkeit bemerkt.)

Bönneken in den Fränk. Samml. B. IV. S. 62.

Calderwood in den Medical Commentaries, S. Richt. chir. Bibl. B. IX. S. 434.

Rosen (Nils) Bemerkungen von Ins. im menschl. Körper. in den Abh. d. Schwed. Ak. B. XIV. S. 56.

Spar.

Sparmann, A. Fliegenmaden (von der *Musca me-*
teorica) von einem Menschen abgetrieben in den Abb.
 d. Schwed. Ak. B. XXXX. S. 61.
 Wahlbom, J. G. Bemerk. v. Fliegenmaden im

menschlichen Körper in der Abb. d. Schwed. Akad.
 B. XIV. S. 56.

White in den Memoirs of the medical Society of
 London, S. Richt. chir. Bibl. B. X. S. 383.

Lezterer Autor erzehlt die Geschichte eines Mannes, der von mancherley Beschwerden, womit er seit geraumer Zeit behaftet war, vorzüglich von Schmerz und Spannung in der Lebergegend, öfterer Leibesverstopfung, öfterem Trieb zum Harnen, vornemlich aber von einer beständigen sehr lästigen Kälte der untern Gliedmassen befreuet wurde, nachdem eine Menge Puppen von der gewöhnlichen Fliege durch den Stuhlgang abgegangen waren. *Wahlbom* hingegen meldet, daß von einer mageren Jungfer mit eingefallenen Augen, welche öfters über Mattigkeit, Mangel des Appetits, zuweilen über Übligkeit, geringen Husten, Schmerz oder Drücken in der linken Seite klagte, welches sich besonders während des Arzneygebrauchs mit einer Erstarrung des ganzen dicken Beins vermehrte, auf den Gebrauch von Pulvern aus *Tart. vitriol.* und *Vitriol Mart.* eine Menge kleiner, kaum einen Querfinger langer und einer Taubenfeder dicker, am stumpfen Ende etwas behaarter, zwölfringigter Maden abgiengen. Eine von diesen Maden wurde aufbewahret und verwandelte sich in eine braune Puppe, aus welcher nach drey Wochen eine Fliege auskroch, die *Musca nigra* Linn. *Fn. Su.* 1266, welche noch einmal so groß, als unsre gewöhnliche Hausfliege war.

Von dem sel. Präsidenten *Schöppf* erhielt ich, nach einer Unterredung über diese Materie, folgendes mitgetheilt. „Eine durch den After abgegangene Larve sah ich zu Neu York. Eine Frau daselbst, litte seit mehreren Wochen unsägliche Schmerzen im Leibe, wodurch sogar fieberhafte Bewegungen entstanden. Endlich erfolgte Erleichterung nach dem Abgang eines larvenähnlichen Wurms. Der Körper desselben war neun Linien lang, am Vordertheile dick und plump, nach hinten zu verschmälert, abgetheilt in zwölf bis funfzehn ringförmige Einschnitte, deren vorderster, oder das Kopfbende, breiter, glätter, oben und unten etwas platter war, als die übrigen. Die Farbe des weichen, oben mit einigen kleinen schwarzen Borsten besetzten Körpers war weiß. Der Mund hatte zwö gleiche hornigte, abgestumpfte Kinnladen, und in jedem Winkel derselben noch einen kleinen hornigten kegelförmigen Zahn. Es war am 19. December 1781 als ich dieses Thier sah und damals schon fünf Wochen, nachdem es die Kranke verlassen hatte, aber doch noch lebend und voll Bewegung, ohngeachtet es in einem kalten Zimmer aufbewahret war. Welches Insekts Larve oder Puppe es mochte gewesen seyn, blieb uns verborgen. In seiner gegenwärtigen Grösse und Beschaffenheit konnte

es gewiß nicht verschluckt worden seyn, sondern als Ey, oder doch noch sehr klein, mußte es seinen Weg in den Magen gefunden haben, dessen Verdauungskräften es widerstand, so daß es in den Darmkanal gelangen konnte, in welchem es wuchs und welchen es schmerzhaft reizte und kneipte.“

Als Beyspiel von vollkommenen Insekten, welche sich im Darmkanal aufhielten, führe ich hier *Bönnekens* Beobachtung von drey Knaben, welchen durch den Gebrauch von Merkurialpillen, lebendige Käfer abgetrieben worden sind, und das an, was *Calderwood* von einem vierjährigen Knaben erzählt, dem eine ungeheure Menge Würmer durch den Hintern abgieng, die kleinen Heuschrecken glichen. Er hatte eine Zeit lang vorher allerhand Zufälle, welche Wurmbeschwerden glichen, und verfiel zuletzt in eine Schlagsucht, während welcher ihm jene Insekten verliessen. Die Eltern erzählten, daß er vor einiger Zeit im Garten junge Kohlblätter gegessen und seit dem jene Beschwerden empfunden habe.

Noch besonders merkwürdig in dieser Rücksicht ist *Roseus* Beobachtung. Ein vornehmes Frauenzimmer klagte nach überstandenen Friesel über Kopfweg, Schmerzen in den Armen, öftere Härte und Anschwellen des Unterleibes, Mangel der Eßlust. Sie war dabey mager, hatte matte Augen und eine grauliche Gesichtsfarbe. Auf ein gegebenes Laxiertränkchen von Sennesblättern bekam sie heftige Schmerzen im Unterleibe, worauf mit den erfolgten Stuhlgängen drey Schalen abgiengen, welche *Rosen* vom Dr. *Wahlbom* in Gegenwart des Licentiaten *Kählers* und *Sundii* untersuchen, und öffnen ließ. In einer Öffnung zwischen zweyen dieser Schalen befand sich ein Stückchen einer Raupe, welche der Kohlraupe glich. Die erste Schale selbst enthielt 1) Frischs grösseren schwarzen Mistkäfer (S. dessen Ins. Th. IV. S. 13. Tab. 6. oder den *Scarabaeus capite thoraceque nigro, glabro, elytris griseis, pedibus pallidis Linn. in Fn. Su. 353.*), wovon nur noch Kopf, Brust und die eine Flügeldecke übrig waren; 2) Kopf, Brust, Flügeldecke, Füße und Hinterleib vom *Curculio ater, proboscide thoracis longitudine Fn. Su. 451.* Alle diese Theile waren mehr als einmal und von verschiedener Grösse vorhanden, und man war im Stande aus den grösseren einen vollkommenen Käfer zusammenzusetzen; 3) Vier unsrer gemeinen Spinen, alle ganz, nur daß der Bauch etwas ausgetrocknet und eingeschrumpft war; 4) eine Käferlarve; 5) zwey Nachtvogelraupen und ausserdem eine Menge anderer kleiner Stücke, Köpfe, Brüste, Flügeldecken. Die Schale selbst, welche dieses alles enthielt, glich einem Raupengespinnste. Die zweyte und dritte Schale waren von gleicher Beschaffenheit und enthielten ähnliche Dinge. *Rosen* zieht hieraus den Schluß; daß wir wohl mit Kohl oder anderen grünen Sachen

Sachen, die wir zum Salate brauchen, Eyer von verschiedenen Insekten verschlucken, und daß diese oft, ungeachtet der peristaltischen Bewegung des Magens und Darmkanals und der Gegenwart der verdauenden Säfte, ihre Verwandlungen machen, wachsen und Krankheiten hervorbringen können, die wir mit den gewöhnlichen Mitteln zu heben, öfters vergebens bemühet sind, da Insektenlarven, Puppen und vollkommene Insekten, wohl nie oder selten den Mitteln weichen, welche die Intestinalwürmer vertreiben.

Bisweilen bewohnen dergleichen fremde Gäste den Magen und Darmkanal zugleich. Eine in dieser Rücksicht überaus merkwürdige Krankengeschichte liefert *Akrel* von einer dreysig jährigen Jungfrau, welche zwey Jahre lang von oben und unten eine, alle Vorstellung übertreffende Menge von Larven, Insekten und Würmern von sich gab. Unter den abgegangenen Insekten befanden sich alleine nur zwey Hundert und drey und sechzig Raubkäfer (*Staphylini*), wohl funfzig verschiedene Larvenarten, ein lebendiger Laufkäfer (*Carabus*), Hundert und zwanzig After- und Spulwürmer (*Ascaris vermicularis et lumbricoides*) und mehrere Bandwurmstücke. Nach vielen vergeblich angestellten Versuchen bewirkte Leinöl mit Terpentinöl verbunden, die eigentliche Kur.

Insekten in den Harnwegen.

Turberville in den philosophischen Transaktionen B. XIV. S. 839. n. 167.

Im Urine einer mit der fallenden Sucht behafteten Edelfrau sah *Turberville* eine grosse Menge kurzer Insekten, die viele Beine hatten und den Schaben gleichen. Er gab zwey bis drey Laxiermittel, worauf man immer noch acht, zehn und mehr solcher Insekten in dem Urine gewahr wurde, welche alle sehr munter und lebhaft waren. Dabey dauerten die epileptischen Anfälle täglich fort. Endlich liefs er eine halbe Unze von dem mit Niesewurz bereiteten Meerzwiebel-safte (*Oxymel helleboratum*) in Wurmkrautwasser nemen, und hierauf wurde sie völlig von ihrer Krankheit befreyet.

Insekten in den Brüsten säugender Personen.

Baldingers neues Magaz. B. V. St. 5. S. 459. enthält eine Beobachtung aus dem zu Anfange des verflossenen Jahrhunderts in Venedig erschienenen *Gran Giornale*

nale di Europa, von einem Wurme oder Insekte, welches ein Mann, als er den Überfluß von Milch aus seines Weibes Brust sog, mit aus dieser herauszog, und welcher vier Fingerbreiten lang und so dick war, wie ein Seidenwurm, zwey Reihen von Füßen, einen grauen Balg mit aneinander gereiheten Schuppen und zwey dem Schwanze eines Skorpions ähnliche Hörner am Kopfe hatte. Es machte viel heftige Bewegungen, kroch und lebte noch vier und zwanzig Stunden.

Insektenlarven und vollkommene Insekten in den inneren weiblichen Geburtstheilen.

Cockson in den Medical and philosophical Commentaries by a Society of Physicians in Edinburgh, Vol. III, S. Richt. chir. Bibl. B. IV. S. 425.

Paullini, C.F. von Kellerwürmern, die mit der Wöchnerinreinigung abgegangen; in den Abh. d. kais. Akad. d. Nf. Th. XV. S. 458.

Eine sieben und zwanzig jährige Frau bekam jedesmal einige Tage vor ihrer monatlichen Reinigung, Schmerzen in den Lenden und einen Ausfluß einer grünen, sehr stinkenden Feuchtigkeit, welcher gewöhnlich so lange dauerte, bis das Geblüte sich einstellte. Diesesmal, als sie Herrn *Cockson* um Rath fragte, giengen mit dieser Materie eine grosse Menge lebendige Maden ab, die viel Ähnlichkeit mit Kohlraupen hatten. Durch Einspritzungen von Kamillen- und Wermuth - Dekokt mit Baumöl, welche drey Wochen lang täglich zweymal gemacht wurden, ward sie von dieser sonderbaren Beschwerde so vollkommen befreyet, daß sie nachher nie wieder einen Anfall davon spürte. Eben so versichert *Paullini*, eine Frau gekannt zu haben, welche mit dem Nachfluß, der richtig nach der Geburt folgte, fast hundert lebendige Kellerwürmer von sich gab, wovon sie aber niemals so viel sie sich zu erinnern wuste, einiges Leibreissen verspüret hatte.

Ich übergehe hier, um nicht weitläufig zu werden, eine Menge ähnlicher Beyspiele von ungewöhnlichen Bewohnern innerer Theile des menschlichen Körpers aus dem Insektenreiche, und verweise in dieser Rücksicht noch auf folgende Schriften:

Clerici Histor. lator. lumbricorum.
Lignac (Mathurin de) Diss. sur la generat. des Ins. dans le Corps. Mem. de Trevoux 1718. p. 171.

Ruysch, de abditis hominum brutorumve peregrinis vermibus, aliisque animalibus aut eorum partibus, observationes.

Dritte Abtheilung.

Geschichte derjenigen Insekten, welche im menschlichen Leichname Nahrung suchen, und sich in demselben fortpflanzen.

Der schon im Leben den mancherley Verfolgungen der Insekten ausgesetzte menschliche Körper, ist es noch mehr nach dem Tode. Mit diesem ist er den chemischen Gesetzen der Zerlegung aller verwesenden Substanzen in ihre Grundstoffe unterworfen, und äussert durch die langsame Verdunstung der flüssigen und riechbaren Stoffe, und durch die hierbey statt findende Verpestung der athembaren atmosphärischen Luft, einen nachtheiligen Einfluß auf die belebte animalische Natur. Eine Menge Insekten ist daher angewiesen, in den faulenden thierischen Theilen selbst noch Nahrung zu suchen, und hiermit die langsame Auflösung und Zerstäubung derselben entweder ganz überflüssig zu machen, oder doch zu befördern. Es gehören hieher verschiedene Dermesten! oder Kleinkäfer, das ganze Geschlecht der Silphen oder Aaskäfer, viele Staphylinen oder Raubkäfer, die meisten Fliegenarten etc., wovon ich, um den Zweck der Kürze nicht aus den Augen zu verlieren, nur einige der merkwürdigsten ausheben werde.

Alle diese, die Zerstörung des menschlichen Körpers nach dem Tode befördernden Insektenarten, können füglich nach dem besonderen Nahrungstriebe, den sie in dieser Rücksicht äussern, in zwey Klassen getheilt werden. Einige derselben werden nemlich mehr vom thierischen Riechstoff und den verdunstenden flüssigen Theilen im ersten Grade der Fäulniß herbeygelockt, andere aber finden sich erst im lezten Grade derselben ein, wo mit Entweichung des faulen Gases, des thierischen Leims, und Wassers, die, der Zerstäubung der feuerbeständigen Erd- und Salztheile vorhergehende Austrocknung der thierischen Substanzen statt findet. In erstere Klasse gehören vorzüglich die *Musca Caesar, cadaverina, vomitoria* und *carnaria*, in leztere Klasse der *Dermestes lardarius* und *Julus terrestris*.

Erster Abschnitt.

Insekten, welche dem menschlichen Leichnam im ersten Grade der Fäulniss aufsuchen.

Blankardi Theatrum vermium Cap. I. p. 2. n. 2.
Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. II. Th. I. S. 54.

Gözen's Untersuchung der sogenannten Leichenwürmer, im Naturforscher Stück XI. S. 96.

Lange war man der Meinung, daß die menschlichen Leichname in und ausser den Särgen von einer besonderen Art von Würmern verzehrt würden. Vor *Redi* liess man diese Würmer aus den verwesenden Leichnamen selbst entstehen, in der Folge aber nam man an, daß die menschlichen Intestinalwürmer die Bestimmung hätten, die Hülle des Menschen nach seiner Entseelung zu vernichten. Da aber, wie aus der Geschichte der Intestinalwürmer im helminthologischen Theile dieses Werkchens erhellen wird, der Tod dieser Würmer, als angewiesener Bewohner des menschlichen Körpers, nothwendig mit dem Tode des Menschen selbst erfolgt, und eine Erzeugung aus nichts, nicht statt findet; so bleibt nichts übrig, als daß den sogenannten Leichenwürmern ihre Rangordnung entweder unter den ausserhalb dem menschlichen Körper bekannten Wurmarten oder unter den Insektenlarven angewiesen werden muß. Die bekannten Erdwürmer (*lumbrici terrestres*) entsprechen dieser Absicht gar nicht, und ausser denselben hat man nie eine besondere Wurmart entdeckt, die durch ihren Aufenthalt in der Nachbarschaft menschlicher Leichname, auf eine ähnliche Bestimmung hätte leiten können. Es bleibt daher nichts übrig, als bey den Erscheinungen von Würmern im verwesenden menschlichen Körper im Insektenreiche Auskunft zu suchen: Und wirklich giebt diese das Geschlecht der Fliegen in seiner zahllosen Nachkommenschaft. Freylich kann letztere so wenig, wie die Larven irgend einer anderen Insektenart, oder irgend ein Wurm, wegen Mangel der Luft tief in der Erde leben, und die Fliegen selbst nicht in dieselbe eindringen, wie schon *Blankard* bewiesen hat, welcher in den Fleischstücken, die er vergraben und mit Erde wohl bedeckt hatte, auch nach mehreren Wochen keine Spur von Würmern oder Maden fand, da hingegen andere Fleischstücken, zu welchen die Fliegen kommen konnten, in der größten Menge Maden enthielten. Wenn aber die Leichname unter freyem Himmel liegen bleiben, oder nur leicht mit Erde bedeckt, oder in den gemauerten mit Zuglöchern versehenen Gewölben der Kirchen und Kirchhöfe beygesetzt werden: so ist es in der wärmeren Jahrszeit, wo die Leichen gewöhnlich schon in völliger Gährung sind, wenn sie beerdiget werden, der gewöhnliche Fall, daß man sie in kurzer

Zeit von Würmern verzehrt und völlig skeletirt findet. Denn der hölzerne Sarg mag noch so gut verwahret seyn, so sprengt ihn doch die durch die Gährung der Leiche entbundene Luft und er bekommt, wenigstens in seinen Fugen Risse. Verschiedene, mit überaus feinen Geruchsorganen versehene Fliegenarten, die den cadaverösen Geruch schon in beträchtlicher Entfernung wittern, eilen nun zum Sarge herbey, schlüpfen durch dessen Risse zum faulenden Leichname, theils um für sich selbst Nahrung herauszusaugen, theils um ihre zahllosen Eyer auf und in demselben abzusetzen. Letztere liefern nun in kurzer Zeit die eckelhafte Erscheinung der alle fleischichte Theile durchwühlenden Fliegenmaden, welche das Fleisch nicht nur aussaugen, sondern auch in die kleinsten Stückchen zerreißen und so verzehren. Die Luft erhält zugleich durch die von diesen Fliegenmaden gebildeten Löcher und Höhlen, eine Menge Zugänge in die innere Muskelsubstanz, wodurch nothwendig die Gährung vermehrt und die Verwesung beschleunigt wird. Man kann dieses in den heissen Sommertagen täglich wahrnehmen, wo nichts schneller, als das einmal von den Maden ergriffene und durchlöchernte Fleisch wegfault.

Göze führt über das Eindringen der Fliegen in die Särge unläugbare Erfahrungen an und zieht daraus den Schluß: Wer seinen Körper nicht von Würmern verzehren lassen will, der verlägne die Ehre in Gräften beygesezt zu werden. Er lasse sich sechs Schuh tief in die Erde einsenken, seinen Sarg gut mit Erde beschütten, und dann wird er gewiß ohne Würmer das werden, was er werden soll — Staub und Erde.

1. Die gemeine Goldfliege. Tab. III. Fig. 17.

Musca Caesar viridi-nitens, pedibus nigris. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2838. n. 64. Faun. Suec. 1828. — Habitat in Europae cadaveribus.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 608. *la Mouche verte*.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VI. S. 30. n. 6.

Mouche dorée commune, die gemeine Goldfliege.

Fabricii Mant. ins. II. p. 343. n. 12. Spec. Ins. II. p. 437. n. 10. Syst. Ent. p. 775. n. 8.

Fabricii, O. Faun. Groenl. n. 168.

Fuefssly's Verz. schweiz. Ins. S. 55. n. 1097.

Geoffroy Hist. des Ins. II. p. 522. n. 53. *la Mouche dorée commune*.

Goedarti Hist. Ins. T. I. Tab. LIV.

Merian in Europ. Ins. I. Tab. XXXIX.

Moufetti Theatr. Ins. T. 49.

Mülleri Faun. Fr. n. 727. Zool. Dan. Pr. n. 2098.

Müllers Linn. Natursyst. d. Ins. B. II. S. 966. n. 64. *Der Kaiser*.

Raji Historia Ins. p. 272. n. 1.

Reaumur Mem. des Ins. T. IV. p. 165. Tab. XII. F. 1. 2. 5. 6. 8. 9.

Schaefferi Icon. Ins. Tab. LIV. F. 3.

Schrank, F. de P. Enumerat. Ins. Austr. p. 455. n. 924.

Scopoli Ent. Carn. 873.

Etwas grösser, als unsre Stubenfliege ist die *gemeine Goldfliege*, die wegen der Schönheit ihrer Farbe auch den Namen *Kaiserfliege* erhalten hat. Ihr Kopf ist braun, Brustschild und Hinterleib aber sind glänzend goldgrün, wie die spanische Fliege, und ihre Füsse schwarzbraun. Sie ist überall in Europa, auch in Pensylvanien zu Hause. Ihre Larve lebt vom faulen Fleische und wohnt in Kadavern.

2. Die Aasfliege.

Musca cadaverina nitens, thorace caeruleo, abdomine viridi. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2839. n. 65. Faun. Suec. 1829. — Habitat in Europae cadaveribus.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VI. n. 7. S. 30.
Petite Mouche dorée, die kleine Goldfliege.

Fabricii Mant. ins. II. p. 343. n. 14. Spec. ins. II. p. 438. n. 12. Syst. Ent. p. 775. n. 9.

Fuefsly's Schweiz. Ins. S. 55. n. 1098.

Goedarti Hist. Ins. I. Tab. LIX. Listeri Goed. F. 123.

Geoffroy Hist. Ins. II. p. 524. n. 57. *la Mouche dorée à corcelet bleu et ventre vert.*

Kranz, Gesch. v. Grönl. Th. I. S. 105.

Meyers Naturgesch. d. gift. Ins. S. 3.

Mülleri Faun. Fr. n. 728. Zool. Dan. Pr. n. 2099.

Müllers Linn. Naturs. d. Ins. B. II. S. 967. n. 65.
Die Aasfliege.

Onomat. Hist. nat. Th. V. S. 358.

Theils wegen der Farbe, theils wegen des Goldglanzes ist diese Fliege leicht mit der vorhergehenden zu verwechseln; nur ist sie ungleich kleiner. Sie hat einen glänzenden blauen Brustschild, einen glänzend grünen Hinterleib und schwarze Füsse. Ihre Larven findet man zu Ende des Mayes in faulem Fleische und eben daselbst schon vor Ende des Junius ihre Puppen. Man hat Beyspiele, daß von zufällig verschluckten Aasfliegen Üblichkeiten und Durchfälle entstanden sind, welches ohnfehlbar von den scharfen und faulenden Stoffen herrührt, womit dieses Insekt angefüllt ist.

3. Die Brechfliege. Tab. III. Fig. 18—23.

Musca vomitoria thorace nigro, abdomine caeruleo nitente, fronte fulva. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2839. n. 67. Faun. Suec. 1831. — Habitat in Europae et Americae cadaveribus, tribus cadaver equi aequae cito consumentibus, ac leo; in cremore quoque lactis.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 381. n. 1.
Die Schmeißfliege.

Cuvier Tableau élément. p. 608. *la Mouche à viande.*

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VI. S. 29. n. 4.

Mouche bleue de la viande, die blaue Fleischfliege.
Schwed. *Spyflugor.*

Fabricii Mant. ins. T. II. n. 19. p. 343. Spec. Ins. T. II. p. 439. n. 17. Syst. Ent. p. 776. n. 13.

Fabricii, O. Faun. Grönl. n. 167.

Fuefs-

- Fuefslly's schweiz. Ins. S. 55. n. 1111. neues
Magaz. B. II. S. 98.
Geoffroy Hist. Ins. T. II. n. 59. p. 524. *La Mou-
che bleu de la Viande*.
Goedarti Hist. Ins. I. Tab. LIII. List. Goed. n.
122. F. 122.
Kobs Naturgesch. der Forlphaläne S. 54. Tab. II.
F. 5. *Brechmücke*.
Leem von den Lappen S. 166.
Lyonet Not. sur. Lesser. Tab. I. F. 27.
Merian in Europ. Ins. Tab. 49.
Mülleri Faun. Fr. n. 730. Zool. Dan. Pr.
n. 2101.
- Müllers Linn. Nat. S. d. Ins. B. II. S. 967. n.
67. *Brechfliege*.
Onomatolog. Hist. nat. P. V. p. 367. *Die Speysfliege*.
Panzer, Faun. Insect. Germ. Heft X. *Brechfliege*.
Raji Hist. Ins. p. 271. *Musca carnivora*.
Reaumur Mem. T. IV. Mem. 5. Tab. VIII. F. 1.
Tab. XIX. F. 8. Tab. XXIV. F. 13. 14. 15.
Rösels Insektenbel. Th. II. Samml. d. Mück. und
Schnacken S. 37. Tab. IX und X. *Schmeis- Aqs- oder
Fleischmücke*.
Schaefferi Icon. Ins. Tab. LIV. F. 9.
Schrank Ins. austr. n. 926.
Scopoli Ent. Carn. n. 868. *Musca carnaria*.

Unter die grösseren Fliegenarten gehört die *Brechfliege* (Tab. III. Fig. 22. 23.), deren Körper bisweilen über einen halben Zoll lang und über dritthalb Linien breit ist. Zwey rothbraune netzförmige Augen, welche die schmale ockergelbe Stirne trennt, nemen den grössten Theil des Kopfs ein, dessen Vorderende mit einem ähnlichen Saugrüssel, wie bey der Stubenfliege, versehen ist. Der kurze und breite Brustschild ist hechtgrau, wie der Kopf mit Haaren besetzt, und mit schwarzen Längsstreifen gezieret. Den ersten Ring des Hinterleibes (Fig. 22.) decken oben drey schuppenartige Blättchen, die übrigen Ringe aber führen schwarze Querbinden und die Mitte des Rückens einen hellblauen dreyeckigten Fleck auf dunkel- aschgrauem Boden. Die Flügel sind mit schwarzen Adern durchzogen und spielen mit Regenbogenfarben. An ihrer Einlenkung befinden sich die zwey Schallbläschen oder Schüppchen mit ihren Schlägeln oder Balansirstangen, durch welche diese Fliegen ein starkes Gesumme im Fluge machen, und dadurch überaus lästig werden, wenn sie im Sommer bey offenen Fenstern in die Zimmer kommen. Übrigens haben sie sechs schwärzlichte Füsse.

Zu ihrer völligen Verwandlung bedürfen sie nicht mehr, als drey Wochen. Das sich blos durch die Dicke des Hinterleibes auszeichnende Weibchen legt bald nach der Begattung seine schmalen, länglichten, gelblichweissen Eyer in mehreren Schichten neben einander (Fig. 18.) und schon eine Stunde nachher kriechen die jungen Maden (Fig. 19.) aus diesen Eyern, nach neun Tagen aber sind sie vollkommen ausgewachsen (Fig. 20.). Ihr spitziges, bewegliches Kopfende ist mit zwey Häkchen versehen, womit sie das Fleisch zerstückeln und abnagen. Nach hinten wird ihr, aus zwölf Ringen bestehender Körper immer breiter, und am Ende erscheint er wie abgestutzt, ist aber dennoch mit vier Erhabenheiten besetzt, welche die Made bald enger zusammenzieht, bald aber wieder weiter aus einander treibt. Durch die weissgelbliche, pergamentartige Haut, schimmert der röthlich- braune

braune Nahrungskanal. Ehe sich die Made verwandelt, verkriecht sie sich unter die Erde. Sie macht sich dann aus ihrer eignen Haut eine eyrunde Verwandlungshülse (Fig. 21.), deren weiche und gelbe Schale bald hart und braunroth wird. Diese Hülse oder Puppe bleibt nur neun bis zehn Tage liegen, und dann kriecht die junge Fliege aus. Nach Rösels Berechnung macht ein solches Fliegenpaar vom Frühlinge bis im Herbste wenigstens drey Generationen und liefert in einem Jahre 444480 Nachkommen.

Ausser Europa, ist auch Amerika, und vorzüglich Pensilvanien, das Vaterland dieser Brechfliegen, welche ihren Namen entweder von dem, Ekel und Brechen erregenden Anblick ihrer Madencolonien in den verschiedenen Eßwaaren, oder von der Wirkung erhalten haben, welche sie verschluckt, in dem Magen veranlassen können. Sie halten sich gerne zum Speise- und Milchbehälter, in Fleisch- und Schlachthäusern, um übelriechende Geschwüre und alte Schäden, um faulende thierische Substanzen und um Cadaver auf, und belegen das faule Fleisch schicht- und klumpenweise mit ihren Eyern. Die auskommenden Maden verzehren dann dasselbe und befördern schnell seine faulichte Auflösung.

4. Die Fleischfliege. Tab. III. Fig. 24—29.

Musca carnaria nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitidulo tessellato. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 2840. n. 68. Faun. Suec. 1382. Amoen. acad. III. p. 344. — Habitat in Europae, Americae cadaveribus.

- | | |
|---|---|
| Aldrovandi de Animal. Ins. p. 348. Tab. II. F. 16. | Jonstonii Hist. Ins. T. VIII. O. 2. F. 16. |
| Altes Hamb. Magaz. XVII. S. 392. | Kobs Naturgesch. d. Foriphaläne. S. 53. Tab. I. |
| Beckmanns phys. Bibl. VIII. S. 18. | F. 16. <i>Fleischmücke.</i> |
| Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 381. n. 2. | Martini Naturlex. I. S. 56. |
| Cuvier Tableau élémentaire p. 609. <i>la Mouche vivipare.</i> | Müllers Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 967. |
| Degeers Abh. z. G. d. Ins. B. VI. S. 31. n. 8. Tab. III. F. 5 — 18. <i>Grande Mouche vivipare, die grosse lebendig gebährende Fliege.</i> | n. 68. <i>Die Schmeißfliege.</i> |
| Fabricii Mant. ins. II. p. 342. n. 5. Spec. ins. II. p. 436. n. 4. Syst. Ent. p. 773. n. 4. | Mülleri Faun. Fr. n. 731. Zool. Dan. Pr. n. 2102. |
| Frischs Besch. v. Ins. Th. VIII. S. 21. Tab. XIV. F. 1. <i>Schmeißfliege mit grau und schwarzwürfflichen Hinterleibe.</i> | Neue Mannigfaltigk. Jahrg. II. S. 641. |
| Fuëssly's Schweiz. Ins. S. 55. n. 1101. <i>Fleischfliege.</i> | Neuer Schaupt. d. Nat. I. S. 44. |
| Geoffroy Hist. Ins. II. p. 527. n. 65. <i>la grande Mouche à extrémité du ventre rougeâtre.</i> | Olauffs Reise durch Island I. S. 322. |
| Hebenstreit, J. E. Programma de vermibus anatomicor. administris. p. XIII. | Onomatol. Hist. nat. V. S. 354. <i>Die Schmeiß- Aas- oder Fleischmücke.</i> |
| | Raji Hist. Ins. p. 270. n. 1. <i>Musca carnaria vulgaris, the common Flesh-Fly.</i> |
| | Réaumur Mem. des Ins. IV. Tab. XXIX. F. 4 — 6. |
| | Schaefferi Leon. Ins. Tab. XXXX. F. 1. 2. |
| | Scopoli Ent. carn. 869. <i>Musca subvariegata.</i> |
| | Sulzers Gesch. d. Ins. S. XXVIII. <i>Schmeißfliege, Vignette S. 204.</i> |
| | Stellers Reise S. 197. |

Eben.

Eben so groß und nicht selten noch grösser, als die vorhergehende Fliegenart ist die gegenwärtige (Tab. III. Fig. 28. und 29.), welche schwarze Fühlhörner hat, auf dem schwarzen Bruststücke mit drey blassen Längsstreifen, auf dem glänzenden Hinterleibe mit würfelartigen Flecken bezeichnet ist, und deren, mit verschiedenen Farben spielende Flügel mehr ins Gelbe fallen. Die befruchtete Fliegenmutter hat das Eigene, daß die Larven oder Maden schon in ihrem Leibe die Eyer verlassen, und daß sie also gleich Maden oder lebendige Junge zur Welt bringt, die schon nach fünf bis sechs Tagen ihre vollkommene Grösse (Fig. 24.) erreichen, und dann den Larven der Brechfliege ziemlich ähnlich sind. Sie haben nemlich einen zugespitzten, beweglichen Kopf (Fig. 25. a.), an welchem sich zwey Fleischwarzen (Fig. 26. a. a.) mit kleinen Knötchen, und unter denselben zwey hornartige, schwarze, ziemlich lange Häkchen (b. b.) befinden. Letztere kann die Larve nicht nur in den Kopf, sondern bis in die ersten Ringe zurückziehen. Sobald sie aber kriecht, streckt sie dieselben hervor, klammert sich damit an und schiebt sich so fort. Auch bedient sie sich derselben zur Benagung der Fleischfasern. Hinter dem Kopfe wird man durchs Mikroskop zwey Lufröhrenmündungen (Fig. 25. c. c.) gewahr, die in einer stärkeren Vergrößerung (Fig. 26. d.) als kleine konkave, hornartige Lamellen mit gezähnelten Rändern und einem runden Luftloche in der Tiefe, erscheinen. Ihre Fortsetzungen sind die in der ganzen Länge des Körpers durch die Haut schimmernden, mit vielen Nebenästen versehenen Lufröhren selbst (Tab. III. Fig. 25. c. d. c. d.), die sich in der Aushöhlung des querabgeschnittenen, mit Fleischwärzchen besetzten, letzten Rings (b.) des dicken Hinterleibes endigen. Nur sieben bis acht Tage dauert die Lebensperiode der Larve, welche nun träge wird, ihre Nahrung verläßt und sich an einem entfernten Orte in eine zwölfringichte, kastanienbraune Nymphe (Fig. 27.) verwandelt. Achtzehn Tage nachher kriecht die junge Fliege aus, die gleich nach Entfaltung ihrer Flügel davon fliegt und Fleisch aufsucht, dem sie aber nicht durchs Verzehren, weil sie blos saugen kann, sondern durch die Maden schadet, die sie in dasselbe, vorzüglich aber an die faule Knochenhaut in mehreren Klümpchen absetzt, und deren Anzahl sich in der Gebärmutter einer einzigen solchen Fliege, nach *Reaumur's* Versicherung, auf zwanzig Tausend belief. „Man rechne nur, schreibt *Göze*, daß sechs solche Fliegen an eine Leiche kommen; so wird sie schon in einer halben Stunde von einer ganzen Armee, von Hundert und zwanzig Tausend Würmern verzehrt.“ In Beziehung auf Anatomie, würde man sich, nach *Hebenstreit*, von diesen Gehülfen viel versprechen können; denn sie sind äusserst gefressig und

und entblößen sehr schnell die Gefässe, sind aber auch bald gesättigt, ruhen dann und lassen das Werk unvollendet. Auch rühren sie trockene Theile nicht an, sondern werden blos von feuchten faulenden, vorzüglich aber vom Fette ergötzt.

Europa sowohl, als Amerika sind das Vaterland dieser Fleischfliegen. Sie sind daselbst überall im Frühjahr und den ganzen Sommer hindurch vorhanden, und ziehen sich gerne in die Zimmer.

Zweyter Abschnitt.

Insekten, welche den menschlichen Leichnam im zweyten Grade der Fäulniss aufsuchen.

Dermestes lardarius niger, elytris antierius cinereis. Linn. S. N. T. I. P. IV. p. 1592. n. 1. Amoen. ac. III. p. 344. Faun. Suec. 408. — Habitat in Europa.

Berlinische Sammlungen B. VII. S. 387. *Speckkäfer*.
Blauckard Schouwburg van de Rupsen etc. T. XI. Fig. K. L. M.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 314. n. 1. *Speckkäfer*.

Cuvier Tableau élémentaire p. 530. *le Dermeste de Lard*.

Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. II. Th. I. S. 55.

Fabricii Mant. Ins. I. p. 34. n. 1. Spec. Ins. I. p. 63. n. 1. Syst. Ent. p. 55. n. 1.

Frischs Beschreib. v. allerl. Ins. Teutschl. Th. V. S. 25. Tab. IX. *Der kleine Speckkäfer*.

Fuefsly's altes Mag. d. Entomol. B. II. S. 128.

Geoffroy Hist. des Ins. T. I. p. 100. n. 5.

Göedarti, J. Hist. des Ins. T. II. Tab. XXXXI.

Hebenstreit, J. E. Programm. de vermibus anatomicor. administris Lips. 1741. c. Tab. aen. p. V.

Meriannin Europ. Ins. T. II. Tab. XXXIII.

Müllers Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. I. S. 100. Tab. III. F. 1. *Speckkäferchen*.

Naturforscher Stück III. S. 58 und 63. *Der kleine schwarze Speckkäfer*.

Onomatol. Hist. Nat. B. III. S. 603. *Der kleine Speckkäfer*.

Raji Hist. Ins. p. 107. n. 4.

Ruysch, F. Curae renovatae, s. Thesaur. anatomicus, Amst. 1728. 4.

Schaefferi Elem. Ent. T. VII. F. 1. 2. Icon. Ins. Tab. 42. F. 3.

Scopoli Entomol. Carn. 34.

Ich führe hier ebenfalls von der Menge hieher gehöriger Insekten nur zwey der merkwürdigsten, nemlich den *Speckkäfer* und den *Erdvielfufs* an.

Das Speckkäferweibchen, welches sich durch seine grössere Dicke und seinen langsameren Gang von dem Männchen unterscheidet, legt unzählig viele Eyer, die mit einem fasichten, wollichten Wesen umgeben sind. Aus diesen Eyern werden in sehr kurzer Zeit Larven, die nach dem Zeitpunkt ihrer Entwicklung von verschiedener Grösse (Tab. I. Fig. 1. a. b.) angetroffen werden. Sie sind überhaupt vorne stumpf, wie abgeschnitten, nach hinten mehr spitzig, am Ende gabelförmig gespalten, in mehrere Ringe getheilt und längs der Bauchfläche mit einer schmalen,

len, herabhängenden Haut versehen. Ihre behaarte Oberfläche ist eisengrau, dazwischen aber mit blässerem Ringen bandirt. Zu ihrem Wachsthum scheinen sie über ein Jahr nöthig zu haben, und mehrere Generationen in einem Jahre zu machen. Denn man findet sie den ganzen Sommer hindurch bis im Spätherbste bald klein, bald ausgewachsen. Im Verlaufe ihres Wachstums legen sie überhaupt viermal ihre Haut ab, welche sodann steif, wie aufgeblasen, am Vordertheile oben auf dem Rücken so weit aufgesprungen, als zum Auskriechen nöthig ist, und von röthlichbrauner Farbe gefunden wird. Endlich werden die größten dieser Larven selbst steif und vollenden zu Anfang des Frühjahres ihre Verwandlung in Nymphen mit der vierten Häutung. Diese Nymphen (Fig. 2.) weichen von der gewöhnlichen Puppengestalt nicht ab, sind braun, haaricht und, wie die Larven, am Ende mit zwey kleinen Spitzen versehen. Schon nach acht Tagen findet man sie vorne gespalten und der ausgekrochene Speckkäfer beginnt nun sein herumschweifendes Leben. Er ist im ausgewachsenen Zustande (Fig. 3.) ehngefähr vier Linien lang, hat einen sehr kleinen Kopf mit eben so kleinen Fühlhörnern, ein ungezähneltes, scheerenförmiges Gebiß, ein rundes schmales und kurzes, schwarzgraues Brustschild, lange, gleichbreite, hinten abgerundete Flügeldecken, deren Vordertheil schmutzig weiß und schwarz punktirt, der Hintertheil aber schwarzgrau ist, und sechs kurze Füße.

Er ist überall in Europa zu Hause, und das Weibchen setzt seine Eyer in ausgetrocknete thierische Substanzen ab, in welchen die aus den Fliegeneyern hervorkommenden Maden zu verhungern pflegen, weil sie sich durch die harte, trockne Oberfläche nicht durcharbeiten können, die auskommenden Speckkäferlarven aber, wegen ihres schärferen Gebisses, so wie das vollkommene Insekt selbst, die angemessenste Nahrung finden. Sie sind daher den Sammlungen ausgetrockneter Thiere und anatomischer Präparate überaus nachtheilig und im Stande, trockne Muskeln, Bänder, Eingeweide etc. ganz zu verzehren, und nichts, als die Knochen übrig zu lassen. Geschickter als die Hand des besten Zergliederer äussert sich oft ihre Gefressigkeit an angiologischen Präparaten, wo sie nichts, als die mit Wachsmasse ausgesprützten Gefässe übrig lassen. Man will sogar behaupten, daß die ehemals berühmten Einspritzungen des *Ruisch* diesen Larven, welche er seine Gehülfen zu nennen pflegte, ihre Entstehung verdanken. Das künstliche ihrer Präparate, welches man einem gewissen Kunsttriebe zuzuschreiben geneigt war, ist aber blos Folge der Nothwendigkeit, dasjenige zu schonen, dessen Häute und Substanz für sie unbezwinglich sind.

2. Der Erdvielfufs. Tab. XI. Fig. 13. 14

Julus terrestris pedibus utrinque centum. Linn. S. N. T. I. P. V. p. 3018. n. 3.
Faun. Suec. 2066. — Habitat in Europae nemoribus.

- | | |
|--|---|
| <p>Aldrovandi de animal. insect. I. p. 336. n. 4.
Amoureux Notice des Ins. p. 147. et 278.
Beckmanns Bibl. III. 49.
Blumenbachs Handb. S. 399.
Bonnet Corps organ. I. Art. 207. Desselben und
anderer Naturf. Abh. S. 337.
Cuvier Tableau élém. p. 465. <i>le jule terrestre</i>.
Degeers Abh. z. Gesch. d. Ins. B. VII. S. 207.
n. 2. Tab. XXXVI. Fig. 9—22. <i>Julé à bandes</i>, der
gestreifte Vielfufs.
Fabricii Mant. ins. I. p. 340. n. 4. Spec. Ins. I.
p. 529. n. 4. Syst. Ent. p. 427. n. 3.
Frisch's Ins. in Teutschl. XI. S. 21. Tab. VIII.
F. 3.
Fuessly's Verz. schweiz. Ins. n. 1223.
Geoffroy Hist. des Ins. II. p. 679. n. 1. <i>Julé à
deux cent pattes</i>.
Gözens Untersuchung der sogenannten Leichen-
würmer im Naturforsch. St. XI. S. 96.
Gronoviani Zoophilacii n. 1007.
Jonstonii Hist. nat. Tab. XXIII.</p> | <p>Listeri Goedartus F. 141.
Mem. des Scav. étrang. III. p. 61. Tab. I.
Mouffetti Theatr. Ins. 30.
Müllers Linn. Nat. Syst. d. Ins. B. II. S. 1163.
n. 3. Tab. XXXVI. Fig. 8 <i>Der Erdvielfufs</i>.
Müller von den Würmern des süss. u. salz. Wass.
S. 179. <i>Der Pfahhourm</i>, desselben Faun. Fr. n. 857.
Zool. Dan. Pr. n. 2421.
Nieuwetyt rechter Gebrauch der Weltbetrach-
tung zur Erkenntniß der Macht, Weisheit und Güte
Gottes, Jena 1747. S. 373. §. 40. Tab. XII. F. 1.
Onomatol. Hist. nat. P. IV. p. 571. <i>Der Erdtausend-
fufs</i>, P. VII. p. 54. <i>Scolopendra terrestris minor</i>.
Raji Hist. Ins. p. 46. n. 4. <i>Julus quartus glaber</i>.
Schaefferi Elem. Ent. Tab. LXXIII. Icon. Ins.
Tab. LXXXVIII. F. 8.
Schröters Abh. I. S. 367. Tab. III. F. 7.
Scopoli Entomol. Carn. 1152.
Sulzers Kennzeichen der Ins. Tab. XXIV. F. 156.
Gesch. d. Ins. S. 274. Tab. XXX. F. 15. d. <i>Der Erd-
vielfufs</i>.</p> |
|--|---|

In ganz Europa sehr gemein und bekannt ist der *Erdvielfufs*, welcher oft über zwey Zoll lang und über zwey Linien breit gefunden wird. Er gleicht in Rücksicht seines langen, ganz walzenförmigen Körpers, seiner glatten, spröden Haut, welche in Ermangelung der äusseren Feuchtigkeit leicht zerreißt, einer kleinen Schlange. Sein sphärischer Kopf (Fig. 14.) ist an jeder Seite mit einem grossen, länglichtrunden, netzförmigen Auge, vor demselben mit zwey sechsgliedrichten, anderthalb Linien langen Fühlhörnern (*a. a.*), die das Insekt im Kriechen beständig bewegt und gegen den Boden gerichtet hält, um die ihm in Wege kommenden Gegenstände zu betasten, und an dem untern, abgestumpften Theil, mit zwey Zähnen (*b. b.*) versehen, die sich zwischen zwey Lippen befinden. Der Körper besteht nach *Degeer* aus 104 Ringen, wovon der erste der längste ist und gleichsam den Brustschild ausmacht, die 102 folgenden schmaler sind, und der letzte, mit dem ersten beynahe gleich, in eine stumpfe Spitze ausläuft. Da aber die Zahl der Ringe vom Wachsthum abhängt; so ist hierinnen nichts beständiges zu suchen. Eben dieses gilt von den Füßen, wovon oft zweyhundert, oft mehr, oft weniger vorhanden sind, weil sie sich ganz nach der Anzahl der Ringe richten. Immer stehen nemlich zu beyden Seiten einer Längslinie, die sich mitten unter

dem Körper hinzieht, an jedem Ringe vier Füße, mit Ausnahme des ersten und der drey letzten, welche keine Füße haben. Alle diese Füße gleichen weissen Härchen, sind etwann eine Linie lang, sechsgliedricht, und so behend, daß das Auge ihre Bewegung kaum verfolgen kann. Die Grundfarbe des ganzen Körpers ist schwarzbraun, fällt jedoch bisweilen ins röthliche. Der Kopf am Vordertheile, der dritte bis zum achten Ring, und ein längs der Mitte des Rückens zwischen zwey fahlbraunen Längsstreifen fortlaufender Streif, sind rothgelb.

Die Erdviefüße legen, wie andere Julen, viele kleine, runde weißgrauliche Eyer, aus welchen nach einigen Tagen die kleinen weissen Julen hervorkommen. Diese haben nur sechs Füße, erhalten aber immer mehrere, so wie sich die Zahl ihrer Ringe vermehrt oder entwickelt. Werden sie berührt, so rollen sie sich spiralförmig zusammen und bleiben so, als ob sie todt wären, geraume Zeit unbeweglich liegen. Faßt man sie mit der Hand; so lassen sie einen starken unangenehmen Geruch von ihrer fettigen Ausdünstung zurück, welche mit der Ameisensäure verwandt zu seyn scheint. Eben dieses erfolgt, wenn sie zertreten werden.

Sie fliehen die Sonne und trockne Luft und halten sich unter feuchten Steinen, welche lange auf einer Stelle gelegen sind, unter faulen Blättern, in feuchter Holzerde, in faulen hölzernen Röhren und Särgen, unter den vermoderten Resten und Knochen der Leichname auf. *Nieuwetyt* erzehlt, daß sie in grosser Menge in dem Hüftbeine eines begrabenen Menschen gefunden worden sind.

Erklärung der Kupfertafeln des ersten Bandes.

Tabula I.

- Fig. 1. Die Larve des Speckkäfers (*Dermestes lardarius*) *a.* in unvollkommenem *b.* in ausgewachsenem Zustande.
- 2. Eine Speckkäfernymphe.
- 3. Der Speckkäfer selbst.
- 4. Der Inquisitor (*Cerambix Inquisitor*.)
- 5. Der beissende Bockkäfer (*Cerambix mordax*.)
- 6. Der graue Holzbock (*Cerambix cinereus*.)
- 7. Der schwarzbraune Warzenkäfer (*Cantharis fusca*.)
- 8. Der Kopf des schwarzbraunen Warzenkäfers, *a. a.* die Fühlhörner, *c. d.* die Fresszangen, *b. b.* die Bartspitzen.
- 9. Der grosse Ohrwurm (*Forficula auricularia*.)
- 10. Die vergrösserte Zange dieses Ohrwurms; *a. a.* der letzte Ring des Hinterleibes; *b. b.* die beweglichen Arme der Zange.
- 11. Die amerikanische Schabe (*Blatta americana*.)
- 12. Das Warzenfressermännchen (*Gryllus verrucivorus*). *a.* Die langen Dornspitzen der Hinterfüsse, *b.* die zur Begattung dienenden Haltzangen am Schwanzende.
- 13. Das Warzenfresserweibchen, *a.* die grossen Dornspitzen der Hinterfüsse, *b.* das Legrohr oder die Begattungsscheide.
- 14. Der vergrösserte Kopf des Warzenfressers, *a.* die Stirnplatte, *b. b.* der untere Theil der abgeschnittenen Fühlhörner mit seinen Wurzeln, *c. c.* die Augen, *d.* ein länglichtrunder Fleck unter den Fühlhörnern am Vorderkopfe, *e.* die Wurzel der Oberlippe, *f.* der vordere und runde Theil der Oberlippe, *g. g.* die Unterlippe, *h. h.* die zwey grossen, *i. i.* die zwey kleinen Bart- oder Fressspitzen.
- 15. Die geöffneten Fresszangen dieses Warzenfressers, *a.* die Wurzel der Oberlippe, *b.* der runde Vordertheil der Oberlippe, *c. c.* die Gebisszangen.
- 16. Ein Bettwanzenest.
- 17. Ein vergrössertes Bettwanzeney.
- 18. Eine junge Bettwanze (*Cimex lectularius*.)
- 19. Die junge Bettwanze von der Bauchseite durchs Mikroskop vergrössert, *a.* das Zangengebiss, *b.* der Saugstachel, *c. c.* die Augen, *d. d.* die Fühlhörner, *e. e. e. e.* die sechs Füsse.
- 20. Die ausgewachsene Bettwanze.
- 21. Die stark vergrösserte ausgewachsene Bettwanze, *a. a.* der durchschimmernde Nahrungskanal, *b.* das hervorstehende Läppchen des ersten Leibrings, *c.* die Mündung des Afters.
- 22. Der Saugstachel der Bettwanze in natürlicher Grösse.
- 23. Derselbe vergrössert.

Fig.

- Fig. 24. Die stark vergrösserten zwey letzten Ringe des weiblichen Hinterleibes mit den durchschimmernden flaschenförmigen weiblichen Geschlechtstheilen.
 — 25. Die drey vergrösserten letzten Ringe des Hinterleibes der männlichen Bettwanze, nebst dem hervorragenden männlichen Begattungsgliede.

Tabula II.

- Fig. 1. Die Ringelwanze (*Cimex annulatus*).
 — 2. Der gelbe Raupentödter (*Ichneumon luteus*).
 — 3. Der stark vergrösserte weibliche Stachel dieses Raupentödters, *a.* die Lanzette, *b.* der Ursprung dieser Lanzette, *c. c.* die Scheiden oder Seitenstücke derselben, *d. d.* zwey länglichte Wärzchen am letzten Ringe des Hinterleibes, *e.* ein vergrössertes Luftloch an der Seite dieses Rings.
 — 4. Die Sandwölberin (*Sphex sabulosa*).
 — 5. Das Ende des Hinterleibes dieser Sandwölberin mit dem Stachel, *a.* der letzte Ring des Hinterleibes, *b.* der Stachel, *c.* die Spalte, welche sich öffnet, wenn der Stachel hervortritt.
 — 6. Die einzelnen Theile dieses Stachels stark vergrössert, *a.* der Stachel selbst, *b. b.* die zwey Halbscheiden desselben, *c. d. e. f.* der Bewegungsmuskel des Stachels und der Stachelscheide.
 — 7. Das Hornissenweibchen (*Vespa Crabro*).
 — 8. Das Hornissenmännchen.
 — 9. Das verkleinerte Nest der gemeinen Wespe (*Vespa vulgaris*), *a. b.* der an den Gesimsen der Dächer befestigte breitere Theil desselben, *c. c.* die Absätze der Lüschrpapierartigen Blätter, welche die äussere Schale desselben bilden, *d.* das Flugloch.
 — 10. Das von seiner äusseren Schale entblößte Nest dieser Wespenart, *a. a.* die obere Scheibe, *b. b.* die untere Scheibe, *c.* ein Band, welches die obere Scheibe am obern Theil der äussern Schale befestigt, *d.* ein Band, welches die untere mit der obern Zellscheibe verbindet, *e. e.* die Grundfläche der mit ihren Öffnungen nach unten gekehrten Zellen, *f. f. f.* die verspinnenen Öffnungen derjenigen Zellen, worinnen Puppen enthalten sind.
 — 11. Die ausgewachsene Larve der gemeinen Wespe.
 — 12. Die Puppe dieser Wespe.
 — 13. Die weibliche oder Mutterwespe selbst.
 — 14. Die männliche Wespe im Fluge.
 — 15. Die geschlechtlose oder Arbeitswespe.
 — 16. Das hängende Nest der Wandwespe (*Vespa parietum*), nebst der auf denselben herumkriechenden Wespe *a.* selbst.
 — 17. Dieses mit den Zellenöffnungen nach oben gekehrte Nest, *a.* eine Zelle, welche eine Larve enthält, *b. b.* Puppen enthaltende Zellen.
 — 18. Ein Wandwespeney.
 — 19. Eine ausgewachsene Wandwespenlarve.
 — 20. Eine Wandwespenpuppe.
 — 21. Die Arbeitsbiene (*Apis mellifica*).
 — 22. Die Drohne oder männliche Biene.
 — 23. Die Königin oder Bienenmutter.

Fig. 24. Der Bienenstachel in natürlicher Grösse.

— 25. Derselbe vergrößert.

— 26. Der aufgeschlossene, stark vergrößerte Bienenstachel, *a. a.* seine Scheiden, *b.* die Spitze des eigentlichen Stachels, *c.* das Giftbläschen, *d. d. d. d.* die Muskeln, welche den Giftsaft in den hohlen Stachel treiben, *e. e.* die Wiederhaken des Stachels.

Tabula III.

Fig. 1. Die schwarze Biene (*Apis nigra*).

— 2. Der weibliche Schwanzring, *a. b.* die geöffneten hornartigen Theile desselben, *c.* der in der Scheide befindliche Stachel.

— 3. Dieser Stachel entwickelt und stark vergrößert, *a.* der Stachel selbst, *b. b.* ein runder muskulöser Theil, um welchen sich der Stachel krümmt, *c. c.* die zwei Halbscheiden des Stachels.

— 4. Zwei Eyer der rothen Ameise (*Formica rubra*).

— 5. Die Larve dieser Ameise in natürlicher Grösse.

— 6. Dieselbe vergrößert, *a.* ihr mit zwei Haken versehener Kopf.

— 7. Eine vergrößerte Nymphe oder Puppe der Arbeitsameise, *a.* der Kopf, *b.* die Zähne, *c.* die Fühlhörner, *d.* die Füße, *e.* der Hinterleib.

— 8. Eine vergrößerte Nymphe der geflügelten Ameise, *a.* die Fühlhörner, *b.* die Flügelscheiden, *c. c. c.* die Füße, *d.* der Hinterleib.

— 9. Die Arbeitsameise in natürlicher Grösse.

— 10. Dieselbe vergrößert, *a. a.* die Fühlhörner, *b. b.* zwei Zähne, *c.* der Brustschild.

— 11. Die vergrößerte Schwanzspitze der Arbeitsameise, *a.* der verborgene Stachel.

— 12. Dieser Stachel stark vergrößert, *a. a. a. a.* die ihn in Bewegung setzenden Muskeln.

— 13. Die stark vergrößerte, rothe, männliche Ameise.

— 14. Das Ameisenweibchen in natürlicher Grösse.

— 15. Die Zugameise (*Formica cephalotes*).

— 16. Ihr stark vergrößerter Kopf, *a. a.* die Fühlhörner, *b.* das Zangengebiss.

— 17. Die gemeine Goldfliege (*Musca Caesar*).

— 18. Die Eyerlagen der Brechfliege (*Musca vomitoria*).

— 19. Die erst ausgekrochenen Maden dieser Fliege.

— 20. Diese Maden in ihrer vollkommenen Grösse.

— 21. Die Brechfliegenpuppe.

— 22. Die Brechfliege im Fluge.

— 23. Dieselbe kriechend.

— 24. Eine ausgewachsene Made der Fleischfliege (*Musca carnaria*).

— 25. Diese Made vergrößert, *a.* das Kopfende, *b.* die Vertiefung des letzten Rings, *c. c.* die vorderen Luftröhrenmündungen, *d. d.* die hinteren Luftröhrenmündungen.

— 26. Das stark vergrößerte Kopfende dieser Made, *a. a.* zwei zitzenförmige Fleischwärtchen, *b. b.* zwei schwarze hakenförmige Zähne, *c. c.* der erste Leibring, *d.* eine Luftröhrenmündung.

— 27. Die Puppe der Fleischfliege.

— 28. Die kriechende Fleischfliege.

— 29. Die fliegende Fleischfliege.

Fig.

- Fig. 30. Die an faulen Roggen klebenden Eyer der Stubenfliege (*Musca domestica*).
 — 31. Die ausgewachsene Made dieser Fliege.
 — 32. Die Stubenfliegenpuppe.
 — 33. Die Stubenfliege selbst.

Tabula IV.

- Fig. 1. Die Gewitterfliege (*Musca meteorica*).
 — 1*. Diese Fliege vergrößert.
 — 2. Murray's in dem arabischen Aussatze gefundene Made in natürlicher Grösse.
 — 3. Dieselbe vergrößert, von der Seite und auf dem Rücken liegend, *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende, *c. d. e.* ein Luftröhrenast, *f. f. f.* die scharfen Hervorragungen zwischen den Ringen an der Bauchfläche, welche die Stelle der Füße vertreten, *g.* eine Hervorragung am stumpfen Ende der Made.
 — 4. Eben diese Made von der Rückenseite, *a.* das Kopfende mit seinen Häkchen, *b.* das stumpfe Schwanzende, *c. c.* die hervorragenden Mündungen der Luftröhrenäste, *d. d.* die Luftröhren selbst, *e. e.* ihre Endmündungen.
 — 5. Die vergrößerte Larve der Quarkfliege (*Musca putris*), oder die Käsemade in der Krümmung, wie sie sich gewöhnlich zum Springen anschickt, *a.* das Kopfende mit seinen Häkchen, *c. c.* die Mündungen der Luftgefässe, *d. d.* die Hauptstämme der Luftröhren.
 — 6. Die Puppe der Quarkfliege, *a.* in natürlicher Grösse, *b.* vergrößert.
 — 7. Die Quarkfliege selbst in natürlicher Grösse, *a.* kriechend, *b.* fliegend.
 — 8. Dieselbe Fliege stark vergrößert.
 — 9. Die Regengbreme (*Tabanus pluvialis*).
 — 10. Die blinzäugichte Breme (*Tabanus caecutiens*).
 — 11. Die blauäugichte Breme (*Tabanus caesus*).
 — 12. Das Eyerhäufchen der Singmücke (*Culex pipiens*).
 — 13. Einige vergrößerte Eyer dieses Häufchens, *a. a.* wahrscheinlich männliche Eyer, *b.* wahrscheinlich ein weibliches Ey, *e.* der zurückgeschlagene Deckel der vom Insekte verlassenen Eyerhülse.
 — 14. Die ausgekrochenen jungen Larven der Singmücke in natürlicher Grösse unter der Fläche des Wassers.
 — 15. Eine ausgewachsene Larve in natürlicher Grösse und so vorgestellt, wie sie unter dem Wasser hängt.
 — 16. Eine solche Larve stark vergrößert, *a.* der Kopf, *b. b.* die Fressspitzen, *c.* der Brustchild, *d. d.* die Mündungen der anfangenden Luftröhren, *e.* die durch den Körper fortlaufenden Luftröhren, *f.* das mit blattförmigen Flossen versehene Ende des Hinterleibes mit den hervorkommenden Exkrementen, *g.* ein Anhang am Hinterleibe, durch welchen die Luftröhren ihren Ausgang nehmen.
 — 17. Die Nymphe der Singmücke unter der Wasserfläche in natürlicher Grösse.
 — 18. Dieselbe vergrößert.
 — 19. Die weibliche Singmücke selbst in natürlicher Grösse.
 — 20. Dieses Weibchen vergrößert.
 — 21. Die männliche Singmücke in natürlicher Grösse.
 — 22. Dieselbe vergrößert.

Fig. 23. Der Kopf der männlichen Singmücke in einer starken Vergrößerung, *a.* der Hals, *b. b.* die Augen, *c. c.* zwey Knöpfe, auf welchen die Fühlhörner *d. d.* ihren Ursprung nehmen, *e.* der Saugstachel, *f.* die Spitze dieses Stachels, *g.* der hervorgestreckte Wehrstachel, *h. h.* die Fressspitzen.

— 24. Der vordere Theil des Singmückenweibchens vergrößert und so vorgestellt, wie es seinen Saugstachel in die Haut senkt, *a. a.* die Balansirstäbchen, *b.* die sich zurückziehende Scheide des Saugstachels, *c.* der mit Blut angefüllte Saugstachel selbst, *d.* eine Stelle der Hand, welche diese Singmücke verletzt.

— 25. Die Larve der Flohmücke (*Culex pulicaris*).

— 26. Die Nymphe oder Puppe derselben.

— 27. Diese Mücke selbst in natürlicher Grösse.

Tabula V.

Fig. 1. Die braungrauliche Tanzfliege (*Empis livida*).

— 2. Der vergrößerte Kopf dieses Insekts, *a.* der Hals, *b.* das Auge, *c. c.* die beyden Fühlhörner, *d. d.* die zwey Bartspitzen, *e. f.* der obere Theil des geöffneten, schnabelförmigen Saugrüssels, *g.* das obere lanzettenförmige Mittelstück, *h.* das mittlere stachelförmige Mittelstück, *i.* das untere lanzettenförmige Mittelstück, *k. l.* der am Ende löffelförmige untere Theil dieses Saugrüssels.

— 3. Die Wadenstecherin (*Conops calceitrans*).

— 4. Der Vordertheil des Kopfs dieses Insekts nebst den Saugstachel, *a. b.* das kurze Wurzelglied, *c.* zwey gefiederte Bartspitzen, *b. d.* das lange Vorderglied des Saugstachels, *d.* die Fleischlippen dieses Vorderglieds.

— 5. Der geöffnete Saugstachel der Wadenstecherin, *a. b.* das oben mit einer Falz versehene Vorderglied desselben, *c. d.* der in dieser Falz verborgen liegende lanzettenförmige Theil.

— 6. Der eigentliche verletzende Stachel *c.*, welcher in jenem lanzettenförmigen Theil *a. b.* enthalten ist.

— 7. Die gelbe Raubfliege (*Asilus flavus*).

— 8. Der Saugstachel dieser Raubfliege, *a.* die Scheide desselben, *b.* das Stilet oder der eigentliche Stachel.

— 9. Die fliegende Pferdelaus (*Hippobosca equina*).

— 10. Der vergrößerte Kopf derselben, *a. a.* die Augen *b. b.* zwey gelbe Knöpfchen, mit *c. c.* zwey besonders borstenartigen Haaren, *d. d.* die Rüsselscheide, *e.* der Rüsselstachel.

— 11. Der vergrößerte Rüssel dieser Pferdelaus, *a. a.* die Halbscheiden, *b.* der fadenförmige Rüssel selbst.

— 12. Die fliegende Vogellaus (*Hippobosca avicularia*).

— 13. Der vergrößerte Vordertheil des Kopfs, *a. a.* zwey behaarte Läppchen, *b. b.* die zwey Halbscheiden des Saugstachels *c.* der Saugstachel selbst.

— 14. Das vollkommene Insekt der Kriegertermite (*Termes bellicosus*).

— 15. Ein Kriegertermiten-König.

— 16. Eine Kriegertermiten-Königin, *a. b.* ihr geschwängelter Hinterleib.

— 17. Der vergrößerte Kopf des vollkommenen Insekts (Fig. 14.) von unten, *a. a.* die Fresszangen.

— 18. Derselbe Kopf von vorne.

Fig.

- Fig. 19. Ein Arbeiter der Kriegerterminen.
 — 20. Ein vergrößerter Arbeiter von unten, *a. a.* die Gebisszangen des Unterkiefers.
 — 21. Ein Soldat der Kriegerterminen.
 — 22. Das vollkommene Insekt der beissenden Termiten (*Termes mordax*).
 — 23. Ein Arbeiter der beissenden Termiten.
 — 24. Ein Soldat der beissenden Termiten.
 — 25. Das vollkommene Insekt der grimmigen Termiten (*Termes atrox*).
 — 26. Ein Arbeiter der grimmigen Termiten.
 — 27. Ein Soldat der grimmigen Termiten.
 — 28. *Smeathmanns* (*Termes destructor*).
 — 29. Das vollkommene Insekt der Baumtermiten (*Termes arborum*).
 — 30. Ein Arbeiter der Baumtermiten.
 — 31. Ein Soldat der Baumtermiten.
 — 32. Eine Baumtermiten - Königin oder ein trächtiges Baumtermitenweibchen.
 — 33. Der Floh des Hautjuckens der Greise (*Pulex pruriginis senilis*).
 — 34. Derselbe vergrößert.
 — 35. Eine vergrößerte Klaue dieses Flohs.

Tabula VI.

- Fig. 1. Die Eyer des gemeinen Flohs (*Pulex irritans*). in natürlicher Grösse.
 — 2. Ein solches Ey vergrößert.
 — 3. Die vergrößerte, im Eye liegende Flohmade.
 — 4. Verschiedene eben ausgekrochene Flohmaden in natürlicher Grösse.
 — 5. Drey ausgewachsene weisse Flohmaden.
 — 6. Zwey Flohmaden, welche sich voll Blut gesogen haben, *a.* das Männchen, *b.* das Weibchen.
 — 7. Eine durchs Mikroskop gezeichnete Flohmade, *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende.
 — 8. Eine ähnliche Made, die sich nicht vom Blute genährt hat, in einer ihr eigenen Biegung, wobey sie sich mit dem Kopfende *a.* und mit dem Schwanzende *b.* aufzustützen pflegt.
 — 9. Eine wieder weißgewordene, sich der Verpuppung nähernde Flohmade.
 — 10. Dieselbe Made in der gekrümmten Lage zur Verpuppung.
 — 11. Die männliche Flohpuppe.
 — 12. Die weibliche Flohpuppe.
 — 13. Die vergrößerte weibliche Flohpuppe, *a.* der abgestreifte Madenbalg.
 — 14. Eine vergrößerte männliche Flohpuppe, welche sich schon verfärbt hat.
 — 15. Der männliche Floh.
 — 16. Der weibliche Floh.
 — 17. Das vergrößerte Flohmännchen, *a.* der Saugstachel, *b.* die Geschlechtstheile.
 — 18. Das vergrößerte Flohweibchen, *a.* der Saugrüssel, *b.* die bewegliche Warze der weiblichen Geschlechtstheile, *c.* die warzenförmige Klappe, welche die Spalte der weiblichen Geschlechtstheile bedeckt.
 — 19. Der Kopf des Flohs mehr vergrößert, *a.* das bewegliche Läppchen hinter dem Auge, *b. b.* die Fühlhörner, *c.* der Saugrüssel, *d.* der Saugstachel.
 — 20. Zwey in der Begattung begriffene Flöhe, *a.* die männliche Haltzange, welche die weibliche Spalte fäßt.

Fig.

- Fig. 21. Die stark vergrößerten männlichen Geschlechtstheile, *a.* das männliche Glied, *b.* zwey kolbenähnliche Hervorragungen von unbekannten Nutzen, *c.* die zwey Blätter der Haltzange.
- 22. Das männliche Glied ausser seiner Verbindung mit der Haltzange und den kolbenähnlichen Hervorragungen, *a.* die hakenförmige Spitze desselben.
- 23. Die stark vergrößerten weiblichen Geschlechtstheile, *a.* ein Ey, welches aus der weiblichen Spalte hervorkommt, *b.* die bewegliche Warze, *c.* die die Spalte bedeckende Hervorragung oder Schamlippe.
- 24. Das vergrößerte Weibchen des Sandflohs (*Pulex penetrans*) *a.* der Saugrüssel, *b.* der Schwanzstachel.
- 25. Das vergrößerte Ey dieses Flohs.

Tabula VII.

- Fig. 1. Die Kopflaus (*Pediculus humanus capitis*) in natürlicher Grösse.
- 2. Die vergrößerte weibliche Kopflaus, *a. a.* die Augen, *b. b.* die Fühlhörner, *d.* der Saugstachel, *e. e. e.* die Füße, *f. f.* der durchschimmernde Nahrungskanal, *g.* das gespaltene Schwanzende des Weibchens.
- 3. Ein vergrößertes Lausey.
- 4. Die von der ausgekrochenen Laus zurückgelassene Hülse des Eyes mit ihrem Dekkel durchs Mikroskop gezeichnet.
- 5. Ein stark vergrößertes Luftröhrenästchen der Kopflaus.
- 6. Die stark vergrößerte Filzlaus (*Pediculus pubis*).
- 7. Die Reduvi milbe (*Acarus Reduvius*) in natürlicher Grösse.
- 8. Dieselbe vergrößert, *a.* der Saugrüssel, *b. b.* die Saugrüsselklappen.
- 9. Der vergrößerte Kopf der Reduvi milbe, *a.* der Saugrüssel, *c. b. c. b.* die Saugrüsselscheiden oder Klappen.
- 10. Die rothe amerikanische Waldmilbe (*Acarus americanus*).
- 11. Dieselbe, wenn sie sich voll Blut gesogen hat.
- 12. Eben diese Milbe vergrößert von oben, *a.* der Saugrüssel, *b. b.* zwey kleine Arme oder Scheiden des Saugrüssels.
- 13. Die vergrößerte amerikanische Waldmilbe von unten.
- 14. Die Hundsmilbe (*Acarus Ricinus*) in natürlicher Grösse.
- 15. Dieselbe vergrößert.
- 16. Der Kopf dieser Milbe in einer starken Vergrößerung *a.* der Saugrüssel, *b. b.* zwey löffel- oder kolbenförmige Arme, *c. c.* zwey Knöpfchen, welchen diese Arme eingelenkt sind.
- 17 und 18. Die vergrößerte Krätzmilbe (*Acarus Scabiei*) nach zwey verschiedenen Zeichnungen von oben.
- 19. Dieselbe von unten, *a.* der Kopf, *b. b. b. b.* die vier Vorderfüsse mit blasenförmigen Fußblättern, *c. c. c. c.* die vier Hinterfüsse.
- 20. Das Eyerhäufchen des Bücherskorpions (*Phalangium cancroides*) in natürlicher Grösse.
- 21. Dasselbe vergrößert.
- 22. Der Bücherskorpion selbst in natürlicher Grösse.
- 23. Derselbe vergrößert.

Tabula VIII.

- Fig. 1. Die Milbenspinne (*Phalangium acaroides*).
 — 2. Dieselbe vergrößert.
 — 3. Die vergrößerten Maulscheeren dieser Milbenspinne.
 — 4. Das *Phalangium* mit halbmondförmigem Brustschilde (*Phalangium lunatum*) wahrscheinlich das Männchen, nach *Pallas*, c. c. c. c. die fühlhornförmigen Füße oder *Herbsts* Cirren.
 — 5. Der Körper dieses *Phalangiums* von unten.
 — 6. Das Männchen der spinnenartigen Solpuge (*Solpuga arachnodes* von oben.
 — 7. Dasselbe von unten.
 — 8. Der vergrößerte Kopf nebst den Kinnladenscheeren und der Saugstachelippe dieser Solpuge.
 — 9. Eine vergrößerte Kinnladenscheere mit dem oberen kurzen und dem unteren beweglichen Finger von der Seite.
 — 10. Der Körper der weiblichen spinnenartigen Solpuge ohne Füße.
 — 11. Die Krebscheere (*Phalangium canceriforme*).
 — 12. Die Nestspinne (*Aranea nidulans*) von der Seite.
 — 13. Dieselbe Spinne von unten.
 — 14. Das etwas verkleinerte Nest dieser Spinne mit seiner doppelten Klappe.

Tabula IX.

- Fig. 1. Die Tarantel (*Aranea Tarantula*).
 — 2. Die amerikanische Vogelspinne (*Aranea Avicularia*) a. a. die Fänger oder Palpen, b. die zwey Maxillen, c. c. eine knotige Hervorragung am ersten Fußpaare.
 — 3. Der stark vergrößerte, mit zwey grossen und sechs kleinen Augen besetzte Augenhügel dieser Spinne.
 — 4. Der Körper dieser Spinne von unten, a. a. die Palpen oder Fänger, b. die zwey unten rothhaarichten Maxillen, c. c. c. c. die Einlenkungsglieder der Füße, d. zwey Anhänge des Hinterleibes.
 — 5. Eine im Ruhestand eingeschlagene Maxille der *Avicularia*, a. die Klaue, b. der mit Zähnen besetzte Hintertheil derselben.
 — 6. Diese Maxille geöffnet, a. die Klaue, b. die Zähne am Hintergliede derselben.
 — 7. Die stark vergrößerte Klaue einer Maxille, a. das länglichtrunde Giftloch an ihrer Spitze.
 — 8. Eine von der Seite vorgestellte Palpe, a. eine kleine glänzende Kugel mit einem Haken am Ende dieser Palpe.
 — 9. Die stark vergrößerten Klauen des Fußblatts.
 — 10. Das Jaikische Sechsauge (*Aranea Senoculata*).
 — 11. Die spindelförmige Spinne (*Aranea fusiformis*).

Tabula X.

- Fig. 1. Der italienische Skorpion (*Scorpio europaeus*), a. b. die Seitenaugen, c. die Mandibulen oder Fresszangen, d. d. die Palpen, e. f. der Schwanz.

Fig

- Fig. 2. Der vergrösserte Vordertheil des Kopf- und Brustschilds, *a. a.* die zwey grossen, *b. b.* die vier kleinen Augen, *c. c.* die Mandibulen.
- 3. Die stark vergrösserten Mandibulen, *a. a.* der bewegliche äussere und der unbewegliche innere Finger, *b.* die Lippen.
- 4. Diese Lippen stark vergrössert.
- 5. Das vergrösserte Schwanzende eines Skorpions, *a.* das vorlezte Glied, *b.* der Schwanzknoten, *c.* das Giftloch am Schwanzstachel.
- 6. Der italiänische Skorpion von unten, *a.* die Öffnung an der runden Erhabenheit über den Kämmen, nach *Rösel* die Mündung des Afters, nach *Herbst* die Mündung der Geschlechtstheile.
- 7. Die Kämme dieses Skorpions vergrössert, *a.* die runde Erhabenheit mit der Öffnung an der Wurzel derselben, *b. b.* die Kämme selbst.
- 8. Der afrikanische Skorpion (*Scorpio afer*) *a.* die Mandibulen, *b.* die zwey grossen Augen in der Mitte des Brustschilds, *c. c.* die zwey Palpen, *d.* der Schwanzknoten.
- 9. Diese zwey grossen Augen sammt dem Augenhügel vergrössert.
- 10. Der amerikanische Skorpion (*Scorpio americanus*) *a. a.* die zwey Palpen, *b.* der Schwanzknoten.

Tabula XI.

- Fig. 1. *Sulzers* amerikanischer Skorpion (*Scorpio americanus*).
- 2. Der teutsche Skorpion (*Scorpio germanicus*).
- 3. Das vergrösserte Stachelglied des Schwanzes mit dem Giftloche *a.*
- 4. Der punktirte Skorpion (*Scorpio punctatus*).
- 5. Eine vergrösserte Palpenscheere dieses Skorpions, *a.* die Hand, *b. b.* die gezähnten Finger.
- 6. Die vergrösserte Giftblase am Schwanzende dieses Skorpions, *a.* der Giftstachel, *b.* ein gezählter Anhang.
- 7. Der südländische Skorpion (*Scorpio australis*) *a.* die Mandibulen oder Fresszangen, *b. b.* die Palpen, *c.* die Giftblase oder der Schwanzknoten.
- 8. Ein vergrösserter achtzehnzähliger Kamm dieses Skorpions, *a.* das kugelförmige Gelenke am Grundtheile, *b. c.* zwey abgesonderte Glieder am Kammende.
- 9. Die gegabelte Skolopender (*Scolopendra forficata*),
- 10. Der vergrösserte Kopf dieser Skolopender von unten, *a. a.* die Fühlhörner, *b. b.* die scheerenförmigen Fresszangen, *c. c.* die Grundtheile dieser Fresszangen.
- 11. Die beissende Skolopender (*Scolopendra morsitans*) *a. a.* die Fühlhörner, *b.* die rechte Fresszange, *c. c.* das lezte gabelförmige Fusspaar.
- 12. Der stark vergrösserte Kopf dieser Skolopender von unten, *a.* der an den inneren Finger angeschlossene äussere Finger der linken Fresszange, *b.* der geöffnete äussere Finger der rechten Fresszange, *c. c.* die inneren Finger beyder Fresszangen, *d. d.* der Grundtheil der Fresszangen, *e. e.* zwey Backenzähne gleichende weiche Theile, *f. f.* die dreyeckige Hornplatte des Unterkopfs.
- 13. Der Erdvielfuss (*Julus terrestris*).
- 14. Der vergrösserte Kopf desselben *a. a.* die Fühlhörner, *b. b.* zwey Zähne.

Tabula XII.

- Fig. 1. Die Wolfsmilchraupe (*Larva Sphingis Euphorbiae*).
 — 2. Die grosse Kühn- oder Fichtenraupe (*Larva Phalaenae Bombycis Pini*).
 — 3. Die Klee- oder Quittenraupe (*Larva Phalaenae Bombicis Trifolii*).
 — 4. Die Eichenraupe (*Larva Phalaenae Bombycis Quercus*).
 — 5. Die Gabelschwanzraupe (*Larva Phal. Bombycis Vinulae*) *a. a.* die Scheiden des Gabelschwanzes, *b. b.* die hervorgetriebenen spiralförmigen, rosenrothen Fäden.
 — 6. Der Kopf dieser Raupe von vorne, *a.* die Spalte unter dem Kopfe, *b. b.* zwey dunkle Flecke auf dem ersten Ringe.
 — 7. Der vergrößerte, mit vier Hervorragungen *a. a. a. a.* versehene Theil, welchen diese Raupe aus der Spalte unter dem Kopfe hervorstreckt.
 — 8. Die Absonderungswerkzeuge des Giftsafs dieser Raupe, *a.* das Saftbehältniß, *b. b.* *b. b.* die Seidengefässe.
 — 9. Die vergrößerte Scheide des Gabelschwanzes, *a. b. a. b.* diese mit Haaren besetzte Scheide selbst, *c.* ein schwarzes hornartiges Stück mit zwey steifen Haaren, welches auf dem letzten Ringe liegt.
 — 10. Die Processionsraupe (*Larva Phalaenae Bombycis Processionae*).
 — 11. Die Pithyocampa (*Larva Phalaenae Bombycis Pithyocampae*).
 — 12. Die schwarze Bärenraupe *Larva Phalaenae Cajae*.
 — 13. Die graue Bürstenraupe (*Larva Phal. Bomb. Fascelinae*).
 — 14. Die grosse Holzraupe (*Larva Phal. Bomb. Cossi*) *a.* der Saft, welchen sie von sich spritzt.
 — 15. Die vergrößerten Absonderungsorgane dieses Safts, *a. b. a. b.* zwey Kanäle, welche den Saft in den Mund führen, *c. c.* die Saftbehältnisse, *d. d.* die zuführenden Gefässe.
 — 16. Die Sonderlingsraupe (*Larva Phal. Bomb. Antiquae*) *a. a.* die zwey langen Haarbüschel des ersten Rings, *b. b.* die weißgelben Haarbüschel des vierten Rings, *c. c.* die schwarzen Haarbüschel des fünften Rings, *d.* der dicke schwarze Haarbüschel am Schwanzende.
 — 17. Ein vergrößertes Ringwärtchen der Sonderlingsraupe mit seinem Haarbüschel, *a.* die Warze, *b.* die Nebenhaare der einzelnen Haare dieses Haarbüschels.
 — 18. Ein solches Wärtchenhaar mit seinen Nebenhaaren stark vergrößert.
 — 19. Ein stark vergrößertes gelbliches Haar der übrigen Oberfläche des Körpers mit seinen Nebenhaaren.

Tabula XIII.

- Fig. 1. Der Hirschschröter (*Lucanus Cervus*) *a.* die Saugrüssellippen, *b. b.* die Fühlhörner, *c. c.* die geweihartigen Maxillen.
 — 2. Die spanische Fliege (*Meloë vesicatorius*).
 — 3. Die Maulwurfsgrille (*Gryllo - talpa*) *a.* das daumenförmige Glied des Fußblatts, *b.* das zweyzackichte Glied, worinnen ersteres eingelenkt ist, *c.* das dritte vierzackichte Glied des Fußblatts.
 — 4. Der Wanzenskorpion (*Nepa cimicoides*).
 — 5. Der vergrößerte Kopf dieses Insekts nebst den Vorderfüßen von unten, *a.* die Saugstachelscheide, *b.* die rechte geöffnete Fangklaue, *c.* die linke eingeschlagene Fangklaue.

- Fig. 6. Die maskirte Wanze (*Cimex personatus*).
 — 7. Diese Wanze in ihrem Nymphenstande.
 — 8. Der vergrösserte Kopf und Saugstachel dieser Wanze.
 — 9. Die Eyer der Riesenwespe (*Sirex Gigas*). *a.* in natürlicher Grösse, *b.* vergrössert.
 — 10. Die Larve der Riesenwespe.
 — 11. Die Puppe derselben.
 — 12. Das vollkommene Insekt oder die Riesenwespe selbst, *a.* die spindelförmige Spitze des letzten Hinterleibrings, *b.* der weibliche Stachel.
 — 13. Dieser Stachel stark vergrössert, *a.* der Grundtheil, *b. b.* die eckigten Hervorragungen in der Mitte der Scheidenblätter, *c.* der mit Widerhäkchen versehene Stachel selbst.
 — 14. Die Leiblaus (*Pediculus humanus corporis*) stark vergrössert.
 — 15. Der vergrösserte Saugstachel der Kopflaus, *a.* der Stachel selbst, *b.* die Scheide des Stachels, *c.* die Gegend des Mundes, *d.* der Schlund, *e.* der Anhang der Speiseröhre.
 — 16. Der Stachel mit seiner Scheide noch mehr vergrössert, *a.* der etwas krummgebogene Stachel, *b.* einige Widerhaken am Vordertheile der Stachelscheide, *c.* die Fortsetzung dieser Scheide.
 — 17. Der stark vergrösserte Schwanzring der männlichen Kopflaus, *a.* der Begattungstachel, *b. b.* der breite Grundtheil dieses Stachels.

Tabula XIV.

- Fig. 1. Die Sandkrabbe (*Cancer vocans*) in natürlicher Grösse.
 — 2. Die Giftkrabbe (*Cancer Dromia*.) verkleinert.
 — 3. Der gemeine Taschenkreb (Cancer *Pagurus*) verkleinert.
 — 4. Die Teufelskrabbe (*Cancer Maja*) von unten und verkleinert.
 — 5. Die Seeheuschrecke (*Cancer Homarus*) verkleinert, *a. a.* die grossen, spiralförmigen Hörner, *b.* die zwey mittleren, *c.* die zwey kleinen Hörner, *d. d.* die zwey langen gabelförmigen Bartspitzen.
 — 6. Der Schwanenkreb (Cancer *Mantis*) verkleinert, *a. a.* die Scheeren, *b. b.* die zwey langen Fühlhörner, *c. c.* die zwey kurzen Fühlhörner *d. d.* die Schwimmblätter, *e. e. e.* die sechs Schwimm- oder Vorderfüsse, *f. f.* zwey unter den Scheeren hervorkommende kurze Füsse, *g. g. g.* die sechs Hinterfüsse, *h.* das stachelichte Schwanzende.
 — 7. Der Sandkreb (Cancer *Chiragicus*) *a. a.* die Schwimmblätter, *b.* die Scheere, *c.* die Schwimmfüsse.

Tabula XV.

- Fig. 1. Die tödtliche Solpuge (*Solpuga fatalis*) *a. a.* die Kinnladenscheeren, *b. b.* die zwey vorderen Fühlspitzen, oder, nach *Pallas*, das erste Paar Füsse, *c. c.* die zwey hinteren Fühlspitzen, oder das zweyte Paar Füsse, *d. d.* der Kopfschild.
 — 2. Der Vordertheil des Kopfs der tödtlichen Solpuge von unten, *a. a.* die Kinnladenscheeren, *b. b.* die unteren Kinnladen, *c.* die saugstachelförmige Lippe.
 — 3. Die afrikanische Solpuge (*Solpuga africana*).
 — 4. Das Phalangium mit halbmondförmigem Brustschilde (*Phalangium lunatum*), wahrscheinlich.

scheinlich das Weibchen, nach *Herbst*, *a.* das mit den zwey kleinen Augen besetzte Hügelchen, *b. b.* die zwey grossen Augen, *c. c.* die klauenförmigen Maxillen, *d. d.* die Palpen oder Fangarme, *e. e. e. e.* die fühlhornförmigen Füsse oder *Herbsts* Cirren, *f.* der Eyergang des Weibchens.

- Fig. 5. Eine vergrösserte Maxille nebst einem Theil der Palpe dieses Phalangiums von der Seite, *a.* das Einlenkungsglied der Maxille, *b.* das zweyte bauchigte, *c.* das dritte klauenförmige Glied, *d.* das Einlenkungsglied der Palpe, *e.* eine Verlängerung dieses Glieds, *f.* das zweyte, *g.* ein Theil des dritten Palpenglieds.
- 6. Das stark vergrösserte Ende einer Palpe desselben Phalangiums, *a. a.* zwey kurze hornartige Dorne, *b. b.* zwey längere Dorne, *c.* der cylindrische Theil des längsten Dorns, *d.* ein dornichter Auswuchs an diesem Theile, *e.* das klauenförmige Ende des längsten Dorns.
- 7. Die giftige Fliegenwanze (*Cimex venenatus*).
- 8. Das Weibchen der Kolumbatzer Mücke (*Culex Columbatzensis*) in natürlicher Grösse.
- 9. Diese Mücke vergrössert.
- 10. Der stark vergrösserte Kopf derselben.
- 11. Der Kopf- und Brustschild eines Skorpions von unten, *a. a.* die Maxillen, *b. b.* die Lippen, *c. c. d. d. e. e. f. f.* die Einlenkungsglieder der acht Füsse, *g.* ein häutiges Läppchen, an welchem die Kämme sitzen, *h.* eine leere glatte Stelle der Brust, *i. i.* die zwey Kämme selbst, *k.* eine fleischigte, in der Mitte mit einer Öffnung versehene Erhöhung unter dem häutigen Kammläppchen — wahrscheinlich die Öffnung der Geschlechtstheile.
- 12. Der Kopf- und Brustschild eines Skorpions von oben, an welchem, nach weggenommenen Fresszangen, folgende Theile sichtbar werden, *a. a.* die Maxillen, *b. b.* die Lippen, *c.* das zwischen der Basis der Maxillen befindliche Maul, *d. d. d.* die Höhlung der Brust, *e. e.* einige fast knochenartige Bogen, die dieser Höhlung Festigkeit und Wölbung geben.

Verbesserungen.

Seite	29	Zeile	18	kann, statt läßt.
—	35	—	1	hinterleibe, statt Hinterleibe.
—	40	—	19	<i>vermiculis</i> , statt <i>vermiculus</i> .
—	48	—	2	in ihr, statt inniger.
—	49	—	15	ist nach <i>bahnen</i> ausgelassen <i>sich</i> .
—	57	—	6	Wanzenkäfer, statt Warzenkäfer.
—	—	—	25	und den, statt unter den.
—	62	—	7	schwanzborsten, statt Schwanzborsten.
—	65	—	21	blutharnen, statt Blutharnen.
—	66	—	14	Niederschlagenheit, statt Niedergeschlagenheit.
—	—	—	24	errettet, statt gerettet.
—	67	—	9	als, statt das.
—	70	—	11	mit, statt in.
—	81	—	10	erhält, statt enthält.
—	137	—	34	mit, statt von.
—	159	—	11	<i>Meris</i> , statt <i>Mevis</i> .
—	162	—	34	in dem, statt in den.
—	165	—	9	für, statt vor.
—	190	—	22	equinoctionali, statt equinoctiali.
—	197	—	8	Laube, statt Laubs.
—	203	—	7	widernatürlichen, statt widerwärtigen.
—	204	—	17	den, statt dem.
—	212	—	29	wenn sie, statt wenn bey.
—	213	—	7	Busch, statt Tisch.
—	220	—	19	dem, statt den.
—	232	—	24	nigris, statt nigras.
—	—	—	25	nigras, statt nigris.
—	234	Zeile	des Texts	8 donischen, statt ionischen.
—	235	—	23	vor, statt von.
—	243	—	10	ersteres, nicht aber letzteres, statt letzteres, nicht aber ersteres.
—	289	—	7	<i>Filliau</i> , statt <i>Fillon</i> .

1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

ENTOMOLOGIE
und
HELMINTHOLOGIE
des
MENSCHLICHEN KÖRPERS,

oder

Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben
unter den Insekten und Würmern

von

D. JOHANN HEINRICH JÖRDENS

Königl. Preuss. Hofrathe, der Kurfürstl. Maynzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt und der
mineralogischen Societät zu Jena Ehrenmitgliede.



*Indus homo est, et eo vexato saepe dolore,
Concipit inde suas incolae delicias.*

ZWEYTER BAND.

Mit sieben colorirten Kupfertafeln.

Hof, bei Gottfried Adolph Grau. 1802.

Inhalt des zweyten Bandes.

	Seite
Erste Abtheilung. Geschichte derjenigen Würmer, welche zu den eigenthümlichen Bewohnern des menschlichen Körpers gehören	3
Erster Abschnitt. Eingeweidewürmer überhaupt.	4
Zweyter Abschnitt. Rundwürmer, <i>Ascarides</i>	17
1. Der Haarschwanz, <i>Trichocephalus hominis</i>	17
2. Der Afterwurm, <i>Ascaris vermicularis</i>	19
3. Der Spulwurm, <i>Ascaris lumbricoides</i>	22
4. Das Kronenmaul, <i>Ascaris stephanostoma</i>	29
5. Der Kegelwurm, <i>Ascaris conosoma</i>	30
6. Der Lymphgefäß-Hakenwurm, <i>Hamularia lymphatica</i>	31
Dritter Abschnitt. Bandwürmer, <i>Taeniae</i>	33
1. Der langgliedrichte Bandwurm, <i>Taenia solium</i>	40
2. Der kurzgliedrichte Bandwurm, <i>Taenia vulgaris</i>	47
3. Der breite Bandwurm, <i>Taenia lata</i>	49
Vierter Abschnitt. Blasenwürmer, <i>Hydatigenae</i>	52
1. Treutlers Eingeweide-Blasenwurm, <i>Taenia visceralis Treutleri</i>	56
2. Der Muskelblasenwurm, <i>Taenia muscularis seu Finna humana</i>	57
3. Der birnförmige Blasenwurm, <i>Taenia piriformis</i>	59
4. Der weißpunktirte Blasenwurm, <i>Taenia albopunctata</i>	61
5. Der Menschenvielkopf, <i>Polycephalus hominis</i>	62
Fünfter Abschnitt. Blattwürmer, <i>Ligulae</i>	64
1. Der Leberblattwurm, <i>Fasciola hepatica</i>	64
2. Der Fettblattwurm, <i>Hexathyridium Pinguicola</i>	66
3. Der Venenblattwurm, <i>Hexathyridium venarum</i>	67
Sechster Abschnitt. Infusionsthierchen, <i>Chaos infusorium</i>	69
1. Das Kreisthierchen des Zahnschmuzes, <i>Cercaria tenax</i>	73
2. Das Samenthierchen, <i>Chaos spermaticum</i>	77
Zweyte Abtheilung. Geschichte derjenigen Würmer, welche dem menschlichen Körper nur zufällig schädlich werden	82
Erster Abschnitt. Würmer, die sich zufällig an die äussern Theile des Menschen ansaugen	82
1. Der Rofsigel, <i>Hirudo sanguisuga</i>	87
2. Der medicinische Blutigel, <i>Hirudo medicinalis</i>	88
Zweyter Abschnitt. Würmer, welche gerne die Haut des menschlichen Körpers durchbohren und unter derselben ihren Aufenthalt suchen	91
1. Der Fadenwurm, <i>Gordius aquaticus</i>	92
2. Der Hautwurm, <i>Filaria medinensis</i>	94
3. Der Höllenwurm, <i>Furia infernalis</i>	103
	Drit-

	Seite
Dritter Abschnitt. Würmer, welche sich zufällig in den inneren Theilen des menschlichen Körpers eingefunden haben	112
Würmer im Auge	112
Würmer im Gesichte, im Gaumen und in der Zunge	113
Würmer im Herzen	114
Würmer in der Leber	114
Blutigel im Magen	114
Fadenwürmer im Magen	116
Schnecken im Magen und Darmkanale	116
Ein Polype im Magen	117
Würmer in den Harnwegen	118
Würmer in den Brüsten	120
Würmer in den innerlichen weiblichen Geburtstheilen	120
Anhang.	121
Eine unbestimmte, dem menschlichen Körper zufällig schädliche Insekten- und Wurmart	121
1. Das Condiruinsekt	121
2. Der Makakewurm	122
Erdichtete Würmer	122
1. Der menschliche Bindwurm	123
2. Der Veitswurm	125
3. Die Mitesser	126
Verschiedene Amphibien und andere Thiere, welche als ausserordentliche Erscheinungen in dem menschlichen Körper vorgekommen sind oder vorgekommen seyn sollen	129
1. Kröten im Magen, Darmkanale und in Abscessen	134
2. Frösche im Magen, Darmkanale, in den weiblichen Geburtstheilen und äusserlichen Geschwülsten	135
3. Eidexen im Magen und Darmkanale	137
4. Schlangen im Magen, Darmkanale und im Herzen	140
5. Einige andere Thiere, welche aus dem menschlichen Körper abgegangen seyn sollen	142
Erklärung der Kupfertafeln des zweyten Bandes	145

Helminthologie.

Handwritten text, likely a signature or name, appearing as a faint, mirrored impression across the center of the page.

Erste Abtheilung.

Geschichte derjenigen Würmer, welche zu den eigentlichen Bewohnern des menschlichen Körpers gehören.

Unserem an neuern Entdeckungen fruchtbaren Zeitalter gebühret der Ruhm, den seit Jahrhunderten, als ein Geschöpf von zweydeutiger Entstehung, übersehenen und verkannten Wurm einer blinden Verabscheuung entrissen und die Achtung und Bewunderung geschenkt zu haben, auf welche er, wie jedes der in Beziehung auf ihn fälschlich sogenannten vollkommenen Thiere, den gegründetsten Anspruch machen konnte. Eine Menge, seine thierische Ökonomie, seine Erhaltung und Fortpflanzung betreffende, überaus befremdende Eigenschaften, die sich der einmal auf seine Untersuchung geleiteten und bald unermüdet gewordenen Forschung fast täglich darboten, trugen dazu bey, ihn endlich ans Licht aus seiner Verborgenheit zu ziehen, in welcher er für Menschen und Thiere nicht selten Schaden verbreitet. Seine besondere Organisation macht ihn nemlich geschickt, Flüssigkeiten zu bewohnen und selbst da sein Fortkommen und eine lange Lebensdauer zu finden, wo Insekten schon in ihrem unvollkommenen Zustande, bald umkommen müssen; daher kommt es denn, daß die Klasse der Würmer ungleich zahlreicher, als die Klasse der Insekten, an eigenthümlichen Bewohnern des menschlichen Körpers ist. Es gehören zu letzteren ausser den Intestinalwürmern, auch die Saamen- und Infusionsthierchen. Beyde wollen wir zu erst kennen lernen, und sodann, wie im ersten Bande, zu den zufälligen Bewohnern und Feinden des menschlichen Körpers aus dieser Thierklasse übergehen.

Erster Abschnitt.

Eingeweidewürmer überhaupt.

- Abhandl. der Kaiserl. Akad. d. Nf.* Th. XV. Beyspiele von Blindheit, Stummheit, Mutterwuth, Raserey, Lähmung etc. die von Intestinalwürmern herrührten.
- Alberti, M. Diss. de morb. ex verm. (Resp. Weist.) Halae 1725.
- Andry, N. de la Generat. d. Vers dans le Corps de l'homme, Paris 1700. Ebendesselb. Eclaircissem. sur le Liv. de la Generat. d. Vers. Paris 1704.
- Aristoteles, Hist. animal. L. V. C. 9. et Meteorologic. L. IV. C. 6.
- Armstrong, G. von den Würmern bey Kindern, in den Samml. f. prakt. Aerzt. B. IV. S. 120.
- Beireis, G. C. Diss. de Febr. et variol. verminos. (Resp. Hinze) Helmst. 1780. 4.
- Beringer, J. L. C. Diss. de Lumbric. in Duplicat. omenti rept. (Resp. Walk.) Heidelberg. 1744. 4. c. Tab.
- Belov, I. F. Diss. d. Verm. intest. Ultraiect. 1691.
- Bernard, Beschreib. eines epid. Wurmfi. das 1796 in Kurland herrschte, in Hufl. Journ. B. IV. St. 4.
- Bianchini, J. F. Lett. med. prat. intorno all' indole delle febr. malign. collatoria de Vermi del C. H. Venez. 1750.
- Bloch's, M. E. Abh. v. der Erzeug. d. Eingeweidewürmer und den Mitteln wider dieselben, mit Kupf. 1782. 4. S. 37. Ebenderselbe in den Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. naturf. Freunde B. IV.
- Bosch (J. J. van den) Hist. Const. vermin. epidem. Amstel. 1769.
- Bosson, H. G. de Morb. ex verm. in pr. viis. L. B. 1777.
- Broughton, A. Diss. d. Verm. intest. Edinb. 1779. 8.
- Brylli, H. Opuscul. de Verm. in C. H. genit. Venet. 1540.
- Camerarius, E. Obs. de mira verm. foecund. Eph. N. C. Cent. VIII. Obs. 43. Ejusd. Helmintholog. intricata (Resp. Hummel) Tubing. 1724.
- Daquin de effectib. verminos. in Roux. Journ. d. Med. T. XXXIV. p. 151.
- Degeers Abh. z. Gesch. der Ins. B. III. S. 280, in den Henschrecken, Phryganäen und Raupen kommt der *Gordius insect. totus albus* vor.
- Doeveren, G. van, Diss. de Verm. intest. hum. L. B. 1753.
- Ferdinand. Epiphan. quid sint verm. in C. H. eorumq. different. in Theorem. Med. et Philos. T. XXII. p. 178.
- Fischer, J. G. de Vermib. in C. H. Stadae 1751.
- Goutier de Verm. intest. in Obs. sur l'hist. nat. Part. XV. p. 190. c. f.
- Godel de Verm. ventricul. perfor. in Roux Journ. d. Med. T. XXXX. p. 145.
- Göze, J. A. E. Versuch einer Naturgesch. d. Eingeweidewürm. thierischer Körper. mit 44 Kupf. Dessau 1782. 4. Ebendesselben Uebersetz. v. Bonnets Abh. aus der Insektol. und Anmerk. zu Müllers Naturf. St. 14.
- Happe, C. F. Diss. Verm. intest. hom. Hist. Lips. 1780.
- Harrer, H. de Ortu, progressu Verm. mira Phenom. in C. H. producentium, Heidelberg. 1766.
- Harries, G. Diss. de Verm. intest. Edinb. 1790.
- Hippocrates de infant. et pueror. morb. L. VI. C. 10.
- Hofmann, F. Supplem. ad Med. Syst. d. Inf. morb. C. X. d. Vermib. Ejusd. Diss. de animal. H. C. infest. hospit. oder von den Bauchwürmern (Resp. Drauth) Hal. 1734.
- Juncker, J. Diss. de Verm. Dysenter. et Haemorrhoid. mentientibus (Resp. Weinschanck) Hal. 1747.
- Klein, J. Th. Untersuch. untersch. Meinungen von dem Herkomm. und Fortpfl. der im menschl. Körper befindl. Würm. Hamb. Mag. B. XVIII. S. 19.
- Kratzenstein, C. G. v. der Erzeugung der Würm. im menschl. Körper, Halle 1743.
- Lemery, L. Trois lettres sur le Livre de M. Andry de la Gen. de V. Leide 1719.
- Lengsfeld Beschreib. der Bandwürmer und deren Heilmittel, Wien 1794. S. 5.
- Lille (de) de palpitat. cord. et de arter. puls. intermiss. p. 133.
- Linnaei Amoen. acad. V. II. p. 72.
- Luther, J. M. Diss. de Febr. Verm. (Resp. Rothermann) Erf. 1787.
- Malbois, I. Diss. de Intest. et Verm. in iis nidul. L. B. 1751.
- Mayer, Abh. von den Würm. d. Mensch. in den Abh. d. Privatgesellsch. in Böhmen, B. V. S. 77.
- Mercurialis de intern. pueror. morb. L. III. C. 2.
- Müllers, P. L. St. Linn. Naturs. der Würmer, Nürnberg. 1775.
- Müller, J. L. v. Erzeugung der Würm. im menschlichen Körper, Hamb. Mag. B. XX. S. 424. Desselben ununterbrochene Bemüh. bey den Intetinsalwürmern, Berlin. Schrift. B. I. S. 202.
- Naturforscher St. XII. S. 178. St. XIV. S. 129, 164, 191, 198. St. XXII. welches das Verzeichn. d. bisher entdeckten Eingeweidewürm. d. Thiere enthält.
- Pallas, neue nord. Beytr. Petersb. und Leipzig 1781. B. I. S. 39 und 58. Ejusd. Diss. de infest. viv. intra vivent. L. B. 1760. p. 59.

- Palmer, J. F. Diss. de Verm. intest. Edinb. 1766.
 Paula Schrank, Verz. der bish. hinlängl. bekannten Eingeweidewürmer. München 1788.
 Perrault Obs. touch. les Vers, qui s'engendrent dans les Intest. Journ. d. Scav. 1675. p. 154.
 Philites, S. Februm verminos. pathologia. Goett. 1785.
Phil. Transact. Vol. L. P. II. p. 518. Zufälle von Würmern.
 Posewitz, J. F. S. Epist. Lumbr. teret. Taen. Ascarid. non esse vermes corpori animant. connatos, sed in id potius inferri, Vitenb. 1788.
 Raven, A. Diss. d. Verm. intest. L. B. 1675.
 Retzius, A. J. Lectiones publicae d. Verm. intest. inprim. human. Stockholm, 1786.
 Riedel, C. Diss. de Verm. intest. Trai. Rh. 1705.
 Ritter in Hufelands Journal der prakt. Heilkunde, B. VII. St. 3. S. 92.
 Rosenstein Underrättelse om Barns, Sjukdomar och deras Botemedel; Stockh. 1771, liefert die Gesch. verschied. menschliche Eingeweidewürmer.
 Rougers de morb. quibusd. c. Verm. conjunct. in Roux. Journ. d. Med. T. XXX. p. 44.
 Rudolphi, C. A. Obs. circ. Verm. intest. Gryphisw. P. I. 1793. P. II. 1795. 4.
 Rungius, L. H. Diss. de Verm. Genes. in C. H. (Resp. Wohldt) Bremae 1719.
 Schenke, J. Th. Diss. de Verm. intest. (Resp. Ayrrer) Jen. 1670.
 Schroeder, H. E. A. de Verm. C. H. intest. Hall. 1787.
 Sigwart, G. F. Diss. de Verm. intest. (Resp. Weysser) Tubing. 1770.
 Sperling, P. G. Diss. de Verm. in prim. viis (Resp. Bothius) Witteb. 1700.
 Stalparti van der Wiel (C.) Observ. rar. med. Cent. II. Obs. 29.
 Straszguti, A. Diss. Hist. Verm. et Febr. Verm. Vienn. 1774.
 Sylvestre, Obs. motuum convuls. a Verm. in Roux. Jour. T. 34. p. 424.
 Theil, M. Diss. de Verm. Canal. intest. obsident. Erf. 1770.
 Treutler, F. A. Observat. pathologico - anatomicae Auctarium ad Helminthol. C. H. continentes. Lips. 1794. 4. c. Tab.
 Valeriolae Observ. Lib. 1.
 Vallisnieri, A. Considerazione et esperience intorno alle generazione de Vermi ordinari del Corpo umano. Padua 1707. Ejusd. Lettre critiq. à l'Auteur du Livre de la générat. d. Vers. Paris 1727.
 Vater, C. Diss. d. Verm. intest. Wittenb. 1687.
 Verbek, L. A. Diss. de Syncho putrida epidemica vermib. stipata, Prag. 1758. Sect. II.
 Verdries, J. M. Diss. de pultit. verminos. in pr. viis. (Resp. Renker) Giss. 1728.
 Vogels Handb. d. prakt. Arzneywiss. Th. II. §. 19.
 Volpini, G. della origine e nat. d. Verm. del Corp. umano, Parma 1721.
 Wagler, im Naturforsch. St. 14. S. 199.
 Wallich, S. E. de febr. verminos. Gissae.
 Wegelin, C. Diss. duas circa vermes observationes c. ear. epicrisi continent. Argentor. 1779, p. 2.
 Werner, P. C. F. vermium intest. brev. exposit. c. Contin. I. et II. edita et animadvers. atq. Tab. auct. a F. L. Fischer. Lips. 1783 — 85. 8. p. 14.
 Wolf, E. J. Diss. de verm. intest. Gissae 1763.
 Zamponi, G. A. de ortu verm. vulg. in C. H. Venez. 1752.

Unter Eingeweidewürmern begreift man diejenige ziemlich zahlreiche Klasse im Thierreiche, deren von der Natur angewiesener Wohnort die Eingeweide und inneren Theile des thierischen Körpers überhaupt sind. Man hat nemlich, wie aus Müllers Verzeichnisse besonders zu ersehen ist, nicht nur bey dem Menschen, sondern auch bey vielen vierfüssigen Thieren, Vögeln, Fischen, Amphibien, und nach Degeer sogar bey Insekten, ganz besondere, ausserhalb dem thierischen Körper nirgends anzutreffende Würmer entdeckt, welche vermuthen lassen, daß vielleicht keine Thierart ohne ähnliche Bewohner ist. Vorzüglich aber hat der Fleiß der neuern Naturforscher in Rücksicht dieser Bewohner die inneren Theile des menschlichen Körpers zum Gegenstand der mühsamsten Untersuchung gemacht und daher in denselben mehrere und verschiednere Geschöpfe dieser Art, als in andern Thieren gefunden, zugleich aber die Naturgeschichte der seit den Zeiten
des

des *Hippokrates*, *Aristoteles*, *Aldrovandi* und *Linne* schon bekannten Eingeweidewürmer berichtet, und von einer Menge irriger Begriffe gereinigt. In der That ist es zu bewundern, wie sich die Naturforscher so lange Zeit bloß mit denjenigen Geschöpfen beschäftigen konnten, welche sich ausserhalb dem menschlichen Körper befinden, ohne durch die mancherley schmerzhaften und schrecklichen Zufälle auf diejenigen aufmerksam gemacht worden zu seyn, welche in unseren Eingeweiden wühlen; denn erst in das letzte Viertel des achtzehnten Jahrhunderts fällt der Zeitpunkt, wo unsre besten Naturforscher durch den Herrn Etatsrath *Müller* auf die nähere Untersuchung dieser Geschöpfe aufmerksam gemacht worden sind. *Pallas*, *Göze*, *Bloch*, *Werner*, *Fischer*, *Treutler* fiengen sodann an, durch ihre angestellten, überaus mühsamen Beobachtungen, die Naturgeschichte dieser Thierklasse mit einer Menge neuer Entdeckungen zu bereichern und einen grossen Theil der Lücke auszufüllen, welche *Linné* übrig gelassen hatte. Sie vereinfachten die Eintheilung der Alten, welche drey Geschlechter unterschieden und das erste *ασκαρίδας* oder *parvos et graciles*, das zweyte *έλμινθες στρογγύλας*, oder *teretes*, das dritte *έλμινθες πλατείας*, oder *latos*, *cucurbitinos* nannten, und namen nur ein rundes und ein breites Wurmgeschlecht an. Das gemeinsame beyder Geschlechter gründeten sie auf die Merkmale eines weichen und gallertartigen Körpers; der, in Vergleichung anderer Thiere, ungleich einfacheren Werkzeuge, welche zur Verdauung, Absonderung, Bewegung der Säfte und zur Fortpflanzung des Geschlechts dienen; der, in Ermangelung der Seh- Geruch- und Gehörorgane, bey ihnen bloß auf den Geschmack- Gefühl- und Geschlechtssinn eingeschränkten sinnlichen Rührungen; und ihrer besondern Auszeichnung in Rücksicht der Fortpflanzung vor allen anderen Thieren. Noch besonders aber lösten sie das grosse Rätsel auf, wie diese Würmer in den menschlichen Körper gelangen, oder vielmehr wie sie aus einem Menschen in den andern übergehen.

Bekanntlich namen *Hippokrates*, *Aristoteles* und andere ältere Naturforscher bey der Entstehung der Würmer, wie bey der Entstehung der Insekten, die Fäulniß oder Gährung animalischer und vegetabilischer Substanzen, als die blind und zufällig schaffende Kraft an, ohne ihre Wißbegierde durch die ihnen bekannten Fortpflanzungsarten anderer Thiere reizen zu lassen, auch bey diesen kleinen Geschöpfen ähnlichen begreiflichen Ursachen ihres Ursprungs nachzuspühren. Nach dieser Meinung war der Unrath des Darmkanals selbst fähig, Würmer zu erzeugen, nach *Variola* aber konnten sie noch besonders aus zähem Schleim, Chylus und Nahrungsmitteln entstehen. Die *Epicureer* brauchten zur Erzeugung derselben nichts

als

als Bewegung der Materie und Wärme, *Mercurialis* und andere hingegen namen zu einer verborgenen himmlischen Kraft ihre Zuflucht, durch deren Beytritt die Würmer aus Schleim oder einer andern Feuchtigkeit gebildet wurden, mehrerer anderer lächerlicher Meinungen nicht zu gedenken. Neuere Naturforscher und unter diesen zuerst *Redi*, welche das Ungenugthuende dieser und ähnlicher Behauptungen wohl einsahen, namen zwar die Fortpflanzung der Würmer durch ihres Gleichen an, blieben aber eine geraume Zeit ungewiß, wie sie dieselbe, ohne mühsame und ekelhafte Beobachtungen und Versuche anzustellen, in den menschlichen Körper gelangen lassen sollten. Sie fielen daher auf nicht weniger sonderbare Behauptungen, indem sie die Eingeweidewürmer als Abarten der ausserhalb dem thierischen Körper vorhandenen Wurmarten ansahen und nun ihre Eyer in der Luft umherfliegen, und nach *Wagler*, wie andere Ansteckungsmaterien, in den Körper kommen, oder mit Speise und Trank verschlucken liessen. Letzterer Meinung waren vorzüglich *Leuwenhöck*, *Schwammerdam*, *Bonnet*, *van Döveren*, *Verbek* und *Linné*, welcher behauptete, daß die Spulwürmer von den Erdwürmern abstammten, deren Eyer wir mit den Pflanzen, Wurzeln und mit dem Fleisch der sich von diesen Würmern nährenden Thiere verzehrten, und daß die veränderte Gestalt dieser Würmer in unserem Körper, blos von dem veränderten Aufenthalte herühre. Die Afterwürmer aber hielt dieser grosse Naturforscher mit den Sumpfwürmern und denjenigen Insekten, welche die Wurzeln der Frühlingspflanzen angreifen, für einerley Art, und *Lengsfeld* blieb noch in unsern Tagen seiner Meinung.

Das Schwankende und Ungewisse dieser und ähnlicher Behauptungen, die Schwierigkeiten, welche ihnen von allen Seiten entgegenstuden, brachten endlich die Herren *Andry*, *Hartsöcker*, *Müller*, *Pallas*, *van Phelsum* und *Vallisnieri* auf die wahrscheinliche Vermuthung, daß die in den Eingeweiden der Menschen und Thiere vorkommenden Würmer ihnen angebohren, oder durch die Muttermilch mitgetheilt seyn müßten, und diese Vermuthung erhoben theils diese Männer, besonders aber *Bloch* und *Werner* durch ihre auf eine Menge Beobachtungen und Untersuchungen gegründeten Beweise, bald zur unbezweifelten Gewißheit. Diese Beweise sind:

- 1) Den Wurmkrankheiten sind gewöhnlich solche Kinder unterworfen, deren Mütter oder Ammen an Würmern leiden oder gelitten haben;
- 2) Die Würmer kommen bey dem weiblichen Geschlechte häufiger vor, als bey dem männlichen. Jenes ist aber zur erblichen Mittheilung durch die Ernährung des Kindes im Uterus und an der Brust am geschicktesten;

3) Die

- 3) Die Eingeweidewürmer sind ausserhalb dem thierischen Körper nirgends anzutreffen, und von allen bekannten Wurmartten ganz verschieden. Dieses hat *Müller* durch die genaue Beschreibung der im Wasser lebenden Würmer und die neue Untersuchung und Vergleichung der sich in den Leibern der Thiere aufhaltenden Wurmartten, ausser allen Zweifel gesetzt. Nie hat er ausser dem thierischen Körper Ascariden, Spuhlwürmer, Bandwürmer, oder Trichuriden etc. gefunden;
- 4) Hingegen sind sie nach *Hippokrates*, *Doläus*, *Vallisnieri* und *Pallas* Zeugnissen schon in Embrionen und nach *de Lille* in ganz neugebohrnen Kindern, die ausser dem Blute der Mutter keine Nahrung genossen hatten, vorgekommen;
- 5) Die Eingeweidewürmer schränken sich nicht blos auf den Darmkanal ein. Auch ausser demselben werden besondere Arten derselben im Zellgewebe der Muskeln, im Fette, in Gefässen, im Gehirne und den übrigen Eingeweiden der Brust- und Bauchhöhle und mithin in solchen Theilen des thierischen Körpers angetroffen, wohin sie durch keinen der bekannten Wege von aussen gelangen können;
- 6) Da wir ferner die wenigsten Speisen roh geniessen, so ist es nicht gedenkbar, daß der Wurmsaame oder die Wurmbrut bei den gewöhnlichen Zubereitungsarten der Speisen, nicht zu jeder ferneren Entwicklung durch das Feuer unbrauchbar gemacht werden sollte;
- 7) Wenn wir aber auch annemen, daß jene Wurmstoffe unversehrt mit den Nahrungsmitteln in den thierischen Körper gebracht werden können; so kann die bessere und reichlichere Nahrung, die sie in demselben finden, doch nur auf ihre Stärke und Grösse Einfluß haben, keinesweges aber eine Verschiedenheit in der Bildung der Theile und den hiervon abhängenden Verrichtungen bewirken;
- 8) Alle thierische Substanzen, selbst Häute, Knorpel und Knochen, werden, zwar nicht bey dem Menschen, aber doch bey vielen, ebenfalls mit Eingeweidewürmern versehenen Thieren, durch die verdauenden Kräfte und Säfte völlig aufgelöst und in einen Brey verwandelt. Dieses würde ebensowohl den Eingeweidewürmern, als thierischen Substanzen, begegnen müssen, wenn sie nicht im thierischen Körper gehörten und erblich in denselben gebracht würden. Ihr Bau und ihre thierische Ökonomie trotz aber der auflösenden Kraft der verdauenden Säfte so gut, wie dem Reiben der Muskelhäute des Magens und Darmkanals;

- 9) Selbst Wachsthum, Dickwerden und Fortpflanzung findet nur statt bey einer gewohnten und angemessenen Nahrung. Diese aber giebt, nach der bey allen anderen Thieren gemachten Erfahrung, einzig der Geburtsort;
- 10) Wären die Eingeweidewürmer ausserhalb dem thierischen Körper gebohren, so würden sie gewiß nicht sterben, sobald sie denselben verlassen. Die Veränderung ihres Wohnorts müste ihnen so gleichgültig seyn, wie die Veränderung ihrer Kost;
- 11) Kämen ferner die Eingeweidewürmer von aussen in die Thiere; so liefs sich nicht einsehen, warum Thiere, die einerley Vaterland haben und einerley Nahrung geniessen, nicht auch einerley Würmer haben sollten. Gleichwohl hat nicht nur jede Klasse, und beynahe jedes Geschlecht der Thiere; sondern es haben sogar mehrere Gattungen in einer und eben derselben Gegend, bey einer und eben derselben Nahrung, ihre eigenthümlichen, von den der übrigen Thierarten ganz verschiedenen Würmer;
- 12) Die Eingeweidewürmer geben auch schon nach ihrem Bau zu erkennen, daß sie bestimmt sind, in den Leibern anderer Thiere zu leben. Sie sind weder mit Augen, noch mit Fühlhörnern, noch mit Vertheidigungswerkzeugen etc. versehen, weil sie in ihren finsternen Wohnungen nichts mit dem Gesichtssinne zu unterscheiden, keiner Gefahr, keiner Verfolgung anderer Thiere zu entgehen haben etc.;
- 13) Der Schöpfer versah sie mit einer solchen Menge Eyer, als bey keinem der Bekannten Thiere angetroffen wird, weil es ihr Aufenthalt mit sich brachte, daß eine Menge mit dem Unrathe vermischt, ab- und zu Grunde gehen müssen, wobey ohne jenen reichen Vorrath, die Fortpflanzung des Geschlechts nicht hätte bestehen können. Eben so hat die Mehrheit der Weibchen beym Spulwurm eine besondere Beziehung auf die mit der Beschaffenheit des Wohnorts vereinbarte Fortpflanzung;
- 14) Kämen die Eingeweidewürmer nur zufälliger Weise von aussen in die Leiber der Thiere, und wären sie nicht in ihrem Bau verschieden nach Verschiedenheit der Thiere, welche sie bewohnen; so müßten sie sich von den einem in jedes beliebige andere fortpflanzen lassen. Dieses widerlegen aber *Blochs* verunglückte Versuche. Von den aus Hechten und Gänsen genommenen und von Enten und Hühnern lebendig verschluckten Bandwürmern, fand sich, ausser den, letzteren Thieren eigenen Wurmarten, auch nicht die mindeste Spur in dem Darmkanal der geöffneten Enten und Hühner. Eben so lehrten

Pallasens blos mit Fischen angestellte Versuche, daß die Bandwürmer und Bandwurmeyer aus verschiedenen Fischen, welche von einer anderen Gattung Fische verschluckt wurden, nicht bey letzteren blieben; sondern wieder von denselben abgiengen, weil sie bey ihnen ihre angemessene Nahrung und Herberge nicht fanden,

- 15) Endlich ist auch die Abwesenheit aller Zufälle, bey den meisten Thieren, und bey vielen Menschen, welche Würmer haben, ein Beweis, daß letztere angebohren seyn und in den thierischen Körper gehören müssen. In entgegengesetztem Fall müßten sie ohne Ausname bey jedem Menschen, bey jedem Thiere die Zufälle hervorbringen, welche Insekten, die durch Mund, Nase, Ohren, After in den Körper kriechen, oder Frösche, Kröten, Eidexen und Schlangen, die mit Speisen und Getränken in den Körper kommen, als nicht in denselben gehörende Thiere hervorzubringen pflegen.

Es ist also wohl keinem Zweifel mehr unterworfen, daß die Eingeweidewürmer Menschen und Thieren angebohren sind, nur fragt es sich noch, unter welcher Gestalt und wie sie eigentlich von einem Menschen in den andern übergehen?

Was die Gestalt betrifft, so ist es blos nöthig zu erweisen, daß die kleinen Körperchen, welche man in und ausser dem Leibe dieser Thiere gefunden und für Eyer gehalten hat, wirklich Eyer sind, und mithin *Pereboms* Meinung, daß die Spulwürmer lebendig gebähren, so gut ungegründet ist, als *Gözens* Behauptung, die Embryonen der Afterwürmer entdeckt zu haben, die (Tab. II. Fig. 3. 4.) doch schon dem Nichtkenner mehr Eyer- als Wurmgestalt verrathen. Jene sowohl in den Eingeweidewürmern selbst, als in dem sie umgebenden Schleim sichtbaren Körperchen gleichen nicht nur nach ihrer Gestalt den Eyern anderer Thiere, sondern enthalten auch wirklich Embryonen. Diese Embryonen werden z. B. in den Eyern der Spulwürmer dem bewaffneten Auge als kleine Schnerkel (Fig. 11.) sichtbar, und wurden von *Göze* und *Müller* auch in den Bandwurmeyern und in der Nachbarschaft derselben entdeckt. Ersterer versichert nemlich einen Embryo aus einem Bandwurmeye gedrückt, und letzterer, überaus kleine Bandwürmchen, an welchen ausser dem Kopfe nur vier Gliederchen zu sehen waren, unter den Eyern im Schleime des Darmkanals gefunden zu haben. Noch auffallender aber beweist des grossen und unermüdeten Naturforschers *Pallas* merkwürdiger Versuch, die Entstehung der Intestinalwürmer aus Eyern. Er brachte einige Bandwurmeyer in den Unterleib eines Hundes und fand, als er denselben nach einigen Wochen öffnete, zwischen den Krümmungen des Darmkanals einige linienlange Bandwürmchen.

chen. Ausser diesen Gründen für die Entwicklung der Eingeweidewürmer aus Eyern, findet *Werner* selbst in der verschiedenen Gestalt der Körperchen, welche für Eyer gehalten werden, und welche bey dem Haarschwanz viereckicht, bey dem Spulwurm rund und flockicht, bey dem breiten Bandwurm rund und bey dem gezähnten oval sind, einen Beweis, daß dieses organische Körperchen seyn und etwas enthalten müssen, was schon in seiner Entstehung der äusseren Hülle eine charakteristische Form geben kann, wie es der Fall bey den Eyern anderer Thiere ist. Sogar gibt der Schleim in welchem diese eyerähnlichen Körperchen gefunden werden, zu erkennen, daß sie wirklich Eyer sind. Er verhütet nicht nur, daß sie nicht so leicht mit den Exkrementen aus dem Darmkanal fortgetrieben werden können, indem er das schicklichste Mittel ist ihren rauhen und flockichten Oberflächen eine Menge Adhäsionspunkte zu verschaffen; sondern er erleichtert auch ungemein ihre Ernährung, indem sie aus demselben, wie die Flocken des menschlichen Eyes aus dem Uterus, den feinen ernährenden Stoff ziehen können, während die feuchte Wärme des Darmkanals ihre Entwicklung begünstigt. Auch dient dieser Schleim den ausgekrochenen jungen Würmchen zur angemessensten Herberge, wofür die Natur gewöhnlich bey eyerlegenden Thieren durch den Instinkt gesorgt hat, ihre Eyer dahin abzusetzen, wo die junge Brut gleich ihr Fortkommen und ihre Nahrung findet.

Wenn nach diesen Voraussetzungen die Eingeweidewürmer noch in der Hülle des Eyes aus einem Menschen in den andern übergehen; so ist kein anderer Weg dieser Fortpflanzung oder Mittheilung übrig, als der des allgemeinen Kreislaufs der Säfte. Und in der That ist sowohl die runde Form, als die Kleinheit jener Eyer diesem Weg vollkommen angemessen. Letztere übertrifft im unreifern Zustande der Eyer bey weitem die der kleinsten Blutkugeln und verstattet ihnen daher sehr wohl den Durchgang durch die feinsten Gefäße. Daß aber dieses nicht blose Muthmassung sey, beweisen die Beobachtungen vieler Ärzte und Naturforscher, nach welchen diejenigen Würmer; die sich blos im Darmkanale aufzuhalten pflegen, auch ausserhalb demselben, in anderen Theilen des Körpers angetroffen worden sind. So haben mehrere Ärzte den Afterwurm mit dem Urin abgehen gesehen. So hat *Stalpart van der Wiel* einen Spulwurm in der Nachgeburt gefunden, *Wegelin* die seltene Entdeckung eines zehn Zoll langen in der Substanz des Netzes gefundenen und von derselben nur durchs Messer zu trennenden Spulwurms, und *Beringer* schon vor ihm einen merkwürdigen Fall beschrieben, wo sechs Spulwürmer in der Duplikatur des Netzes gefunden worden sind, ohne daß man die geringste Verletzung weder im Darmkanale, noch in einem anderen Eingeweide hätte entdecken können. So hat

Ritter

Ritter erst neuerlich eine merkwürdige Beobachtung geliefert, nach welcher ein grosser, lebendiger Spulwurm aus einem Abscess an der linken Schamlefze eines dreissigjährigen Mädchens heraussprang. Diese und ähnliche Erscheinungen sind aber bloß dadurch zu erklären, daß die Wurmeyerchen, bey dem erschwerten oder gehinderten Durchgang des Bluts durch die feineren Gefässe gewisser Theile und Eingeweide, Zeit gewinnen können, mit ihrer flockichten Haut irgend einen festen Punkt zu fassen, sich daselbst anzusaugen und in der thierischen Wärme ausgebrütet zu werden. Wenn wir nun auf die Fortpflanzung der Eingeweidewürmer im Mutterleibe zurückgehen; so ist es sehr wohl möglich, daß die überaus kleinen, nur dem bewaffneten Auge sichtbaren Wurmeyer von den Milchgefässen in der flockigten Haut des Darmkanals der Mutter aufgenommen, durch dieselben in den allgemeinen Kreislauf des Bluts und durch die Nabelblutader in den Körper der Frucht gebracht werden, aus der Masse der Säfte dieser Frucht aber sodann, nach den Gesetzen der Verwandschaft, in die ihnen von der Natur angewiesenen Wohnplätze gelangen und daselbst von den aushauchenden Gefässen abgesetzt werden können.

Aber auch ausser dem Leibe der Mutter steht den Wurmeyern noch der Übergang in das Kind durch die Cirkulation offen. In der Saugezeit, wo bey vermehrtem Appetit und lebhafterem Dauungsvermögen säugender Personen, das Resorptionsgeschäfte im Darmkanale in stärkstem Gange ist, können nemlich jene Wurmeyer von den mehr als gewöhnlich erweiterten einsaugenden Milchgefässen, um desto leichter und in desto grösserer Menge aufgenommen werden und bey dem nun immer freyen Weg und beständigen Andrang der Säfte nach den Brüsten ungehindert in diese Brüste gelangen und in den Säugling übergehen. Es erhellet hieraus, wie nachtheilig auch in dieser Rücksicht das Ammenhalten werden kann, und daß es zu den wichtigsten Erfordernissen einer Amme gehört, niemals Würmer gehabt zu haben, weil diese ausserdem nothwendig in Familien gebracht werden müssen, welchen sie nie eigen waren. Auch ist es gedenkbar, daß die Wurmeyer, ausser der Milch, sich noch anderen, aus dem Blute abgeschiedenen Säften, z. B. dem Speichel beymischen und mit diesem bey dem ekelhaften und in mancher andern Rücksicht schädlichen Vorkauen der Speisen, in die Kinder übergehen können. Wenigstens ist dieses der Weg der Würmerfortpflanzung bey Eyer legenden Thieren, wo der Weg durch die Cirkulation wegfällt und bey welchen die Eingeweidewürmer bloß durch das Ätzen fortgepflanzt werden.

Wenn

Wenn aber auf diese Art die Mittheilung des Wurmstoffs bey ungeborenen und neugeborenen Kindern so leicht möglich ist; so scheint es den Gegnern des Valisnierischen Systems doch auffallend zu seyn, daß nicht alle Menschen an Würmern leiden. Allein, eben der Mangel der prädisponirenden und gelegentlichlichen Ursachen, welcher macht, daß nicht alle Menschen von den auf die Oberfläche ihres Körpers angewiesenen Insekten geplagt werden, ist auch der Grund, warum nicht bey allen diese inneren Bewohner anzutreffen sind. Es gehört hierzu durchaus eine besondere Anlage oder Receptivität. Bey Mangel des Schleims im Darmkanale können die Wurmeyer nicht leicht an der innern Darmhaut hängen bleiben, ernährt und ausgebrütet werden, hey gehöriger Wirksamkeit der Muskelkraft jenes Kanals, kein Absetzen der Eyer statt finden, weil das Auszuscheidende schnell fortgetrieben und diese Eyer mit dem Unrathe ausgeleeret werden. Daher kommt es, daß oft Kinder solcher Mütter an Würmern leiden, welche selbst nie Würmer hatten, weil bey den Kindern die nöthige Disposition zur Entwicklung der Wurmeyer vorhanden ist, welche bey den Müttern fehlte, die also blos für die Nachkommenschaft Wurmeyer in ihren Säften führten. Diese Disposition ist vielleicht nur wenigen Menschen angeboren, sondern wird bey den meisten erst durch die besondere Lebensart, durch den Genuß solcher Speisen und Getränke, welche den Darmkanal erschlaffen, Schleim erzeugen, oder die Anhäufung desselben begünstigen, durch die Veränderung des Wohnorts und des Klimas hervorgebracht. In letzterer Rücksicht begünstigen ein feuchter Boden, eine feuchte Wohnung, jede warme und feuchte Luft überhaupt, wie die sumpfichten Gegenden, die Entwicklung der Wurmeyer durch die Erschlaffung der festen Theile, und geben hierdurch Veranlassung zum Absetzen und Verweilen jener Eyer in den zu ihrer Ausbildung geschickten Lagerstätten. Daher sind Wurmkrankheiten in Batavia und anderen Orten endemisch, daher verbreiten sie sich unter gewissen Umständen sogar über ganze Gegenden und herrschen nach *van den Bosch, Vogel, Bernard etc.* epidemisch. Dieses ist besonders der Fall zur Zeit der Theuerung, wo durch den Genuß roher und schlechter Nahrungsmittel die Herberge der Wurmbrut in den Körper geschafft wird, oder wo eine ungewöhnlich herrschende feuchte und warme Luft durch die Erschlaffung der festen Theile zur Erzeugung des Klebers im Darmkanale Veranlassung giebt.

Weder die Wurmeyer, noch die Wurmbrut pflegen dem thierischen Körper lästig zu werden und ihre Gegenwart durch besondere Zufälle zu verrathen. Umgeben von ihrem Schleimneste, sind sie unfähig selbst auf die reizbarsten Nerven

ven zu wirken. Nur von der mit dem Wachstume des Wurms zunehmenden Lebhaftigkeit seiner Bewegung und von der Äusserung seiner thierischen Triebe, hängt der sich, wie ein Proteus, unter den mannigfaltigsten und sonderbarsten Gestalten äussernde Wurmreiz ab. Indem sich nemlich der ausgebildete Wurm durch die Krümmungen des Darmkanals fortwindet, indem er durch Nagen, Saugen, Bohren an der mit Nerven durchwebten Darmhaut sich zu befestigen, aus ihr seine Nahrung zu ziehen, durch sie, von allerley Widerwärtigkeiten gewisser Nahrungsmittel, der Arzneyen, der Fieberhitze etc. bestürmt, seinen Ausweg zu nehmen sucht; erregt er, durch die Mitleidenheit der Nerven in den entferntesten Theilen oft eine Menge der schreckhaftesten Zufälle, welche vielen andern Krankheiten gemein sind und daher bisweilen sehr schwer die Ursache ihrer Entstehung ergründen lassen. Dabey schadet er gewöhnlich nicht blos durch seine Saugorgane, sondern auch durch seine Exkremente und die vermehrte Schleimabsonderung im Darmkanale, welche wieder nicht selten die unerklärbarsten Zufälle hervorbringt, so dafs man aus der Zusammenstellung aller Wurmfälle, welche theils vom Reize des Wurms selbst, theils von der Anhäufung seiner Exkremente, theils von seinem Schleimneste abhängen, noch nicht im Stande ist, zuverlässige Merkmale von der unbezweifelten Gegenwart der Darmwürmer festzusetzen. Völlig ungewifs sind vollends bis jezt die Kennzeichen von dem Daseyn der sich ausserhalb dem Darmkanale, in anderen Theilen des Körpers aufhaltenden Würmer, welche allermeist zufällig in den Leichnamen entdeckt worden sind, und in den Fällen, wo man Gelegenheit hatte, die Leichenöffnung nach vorhergegangener Beobachtung und Behandlung des Kranken anzustellen, sich durch keine charakterisirenden Zufälle zu erkennen gaben. Sie bleiben daher nicht nur in dieser Rücksicht, sondern auch deswegen unbezwingbare Feinde der Kunst, weil wir nicht im Stande sind, auf sie in ihren entfernten und verborgenen Zellen und Höhlen zu wirken. Überhaupt aber widerspricht das Angebohrenseyn der Eingeweidewürmer jedem Versuch der Kunst, die Wurmeyer, aus dem menschlichen Körper zu entfernen, und somit die Würmer gänzlich auszurotten. Nur die Entwicklung der Wurmeyer und das Gedeihen der Wurmbut im Darmkanale kann sie verhüten und die Reinigung dieses Kanals von dem Wurmneste, den jungen und ausgebildeten Würmern bewirken. In ersterer Rücksicht beruhet alles darauf, der Wurmdisposition zu begegnen, die auf der Schwäche des Darmkanals beruht, welche wieder die widernatürliche Schleimerzeugung und Schleimanhäufung zur nothwendigen Folge hat. Alles, was die Spannung der thierischen Faser überhaupt, oder der Muskelhaut des

des Magens und Darmkanals besonders schwächt, wie der Genuß warmer Getränke, ölichter, fetter, schleimichter, zäher, rohsaftiger, den Darmkanal durch die enthaltene Menge von Luft ausdehnender, und durch diese Ausdehnung seiner Spannkraft beraubender Speisen, der Misbrauch der die Galle schwächenden und hiermit die Verdauung träger und unvollkommener machenden Säuren der auflösenden Arzneyen und Abführungsmittel, eine unthätige Lebensart u. s. w. müssen daher nothwendig vermieden werden, um jene Disposition nicht zu veranlassen, oder, wenn sie schon vorhanden ist, zu vermehren. In letztem Falle müssen zugleich kalte Bäder, Stahl, China, und andere stärkende Mittel angewendet werden.

Hat man es nicht mehr mit der Disposition, sondern mit den entwickelten Wurmeiern zu thun; so kommt es bey der Kur darauf an, 1) der aus der Heftigkeit der Wurmzufälle erwachsenden Gefahr zu begegnen, 2) das Schleimnest der Würmer zu zerstören, 3) die Würmer selbst zu tödten, 4) die getödteten Würmer aus dem Körper zu schaffen, und 5) eine neue Entwicklung der Wurmeier zu verhüten. Es ist bey der Erfüllung aller dieser Heilanzeigen nöthig, die Konstitution des Kranken und die Heftigkeit der Zufälle in Erwägung zu ziehen, schnell zu wirken, wo erstere stark und letztere schmerzhaft und Gefahr drohend sind; langsam zu Werk zu gehen, wo die von Nervenschwäche abhängende Reizbarkeit jedes heroische Verfahren verbietet. Im ersten Falle wird durch ein langsames Verfahren die erste Indikation allermeist verfehlt. Denn alle Wurmschleim auflösenden, Würmer tödtenden und abführenden Mittel, beunruhigen diese Thiere so sehr, daß durch die vermehrte Heftigkeit der Zufälle weit mehr Gefahr erwächst, als bey einer die Würmer schnell fortstürmenden Heilart. Im zweyten Fall könnte aber die schwächende und reizende Kraft der Mittel, sehr leicht den Nachtheil der Wurmzufälle überwiegen, und es ist daher nöthig, das langsame Verfahren in Verbindung besänftigender, schmerzstillender Mittel und einer überaus einfachen Diät zu wählen; denn letztere scheint, wenigstens bey den mit Würmern behafteten und sich gleichwohl dabey wohlfindenden Thieren zu beweisen, daß grosse Abwechslung im Genuße der Speisen und Getränke die Würmer so sehr wie die Wurmmittel beunruhigen könne.

Den Schleim lösen vorzüglich die Salze und alle mineralischen salinischen, Brunnen auf, die zum Theil die Würmer selbst zu tödten vermögen. Vorzüglich aber bewirken letzteres die Kälte, die bitteren, die durch ihren widerwärtigen Geschmack und ihre Schwere auf sie wirkenden Mittel. Die Kälte macht, daß
die

die nur laue Wärme gewohnten Darmwürmer erstarren und daher oft bloß durch frisches, besonders mineralisches Wasser getödtet und durch ein gleich darauf genommenes Abführungsmittel fortgeschafft werden können. Vor den bittern und widerwärtig schmeckenden Mitteln scheinen sich die Saugorgane der Würmer krampfhaft zu verschliessen, und vielleicht ist es möglich durch sie, besonders durch den stinkenden Asand, den Schwefel, die *Calx antimonii sulphurata* u. s. w., die ihren Geruch selbst durch die aushauchenden Gefäße noch verbreiten und den ganzen Körper zu parfümiren scheinen, selbst auf die Blasenwürmer zu wirken, welchen durch kein, sich bloß auf die ersten Wege in seiner Wirkung beschränkendes Mittel, beyzukommen ist. Durch Schwere und Rauigkeit nöthiget das granulirte, oder grob gefeilte englische oder malaische Zinn die Darmwürmer ihren Wohnort zu verlassen. Als Abführungsmittel verdienen aber das versüßte Quecksilber, die Wurzel der Jalappe, das Jalappen- und Skamoniumharz, die Aloe vor allen andern den Vorzug. Ohngeachtet der um die Naturgeschichte der Eingeweidewürmer so überaus verdiente *Bloch* letztere Mittel und das kalte Wasser für die einzigen hielt, von welchen wir mit Gewißheit sagen könnten, daß sie den Würmern nachtheilig wären, und glaubte, daß es kein spezifisches Wurmmittel gäbe; so läßt sich doch nicht läugnen, daß wir wirklich solche Mittel besitzen, die ganz allein gebraucht, ohne alle abführende Kraft, die Würmer abzutreiben im Stande sind. Ich könnte eine Menge Beyspiele anführen, wo z. B. auf den alleinigen Gebrauch des bekannten Wurmsaamens, und ohne daß dieser im geringsten eine laxirende Wirkung geäußert hätte, unzehlige Spulwürmer bey der gewöhnlichen Leibesöffnung abgegangen, auch einzeln, trocken aus dem After gekrochen und im Bette gefunden worden sind. Den Beschluß der Wurmkur müssen jederzeit solche Mittel machen, welche die Verdauungsorgane stärken und den verdauenden Säften grössere Wirksamkeit geben; weil ausserdem die Anlage zur neuen Entwicklung der Wurmeyer zurückbleibt.

Zweyter Abschnitt.

Rundwürmer, Ascarides.

In der besondern Beschreibung der Eingeweidewürmer glaubte ich die verschiedenen Geschlechter am schicklichsten nach den auffallendsten Verschiedenheiten ihrer äusseren Gestalt ordnen und unter den Rubriken der *Rundwürmer*, *Bandwürmer*, *Blasenwürmer* und *Blattwürmer* aufführen zu können. Unter Rundwürmern verstehe ich überhaupt, diejenigen, welche einen mehr oder weniger runden oder cylindrischen Körper haben und zehle unter dieselben den *Haarschwanz*, den *Afterwurm*, den *Spulwurm*, das *Kronenmaul*, den *Kegelwurm* und den *Lymphgefäß-Hakenwurm*.

1. Der Haarschwanz. Tab. I. Fig. 6—10.

Trichocephalus hominis, supra subcrenatus, subtus laevis, antierius subtilissime striatus.
Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. XIII. Tom. I. Pars VI. p. 3038. n. 1. Mantiss.
Plant. Vol. II. p. 543. Habitat in canale intestinali.

Blochs Abhandl. von d. Erzeug. d. Eingeweidew.
S. 32. Fig. 7—9. *Trichuris*, der Schwanzwurm.

Blumenbachs Handbuch d. Nat. Gesch. 5. Aufl.
S. 412. n. 1. Tab. I. Fig. 3. *Die Trichuride*.

Cuvier Tableau élément. p. 636. *les Trichures*.

Göze's Versuch einer Nat. Gesch. der Eingeweidewürmer S. 114. Tab. VI. Fig. 1—5. *der menschliche Haarkopf, die Trichuride, der Haarschwanz*.

Happ. Verm. intest. hom. Hist. p. 21.

Müller im Naturforscher St. XII. S. 182.

Onomat. Hist. nat. P. VII. p. 548.

Pallas in Nov. Commentar. Acad. Petrop. Vol. XIX. p. 449.

Reichard's medic. Wochenbl. Jahrg. 1. St. 13.
Bemerk. bey den *Ascarid. trichur*. Linn. daß das Haar-
ende das Kopfende sey und sie nicht zu den *Ascarid*-
den gehören.

Röderer in den Götting. gelehrten Anzeigen 1761
n. 25. *Theotisce, geschwänzte Würmer*. Ejusd. et Wag-
leri Tractatus de morbo mucoso. Götting. 1783. p. 62.
Tab. II. Fig. 4. *Trichuris*.

Treutleri Auctarium ad Helminthol. p. 31. *Tri-
chocephalus*.

Werneri Verm. intest. exposit. p. 84. Tab. VI.
Fig. 138—143. *Trichuris*.

Wrisbergii Observ. de animalculis infusor. Sa-
turae. Goett. 1765. p. 6. *Trichuris*.

Erst seit dem Jahre 1760 kennt man diese von *Wagler* in den Leichnamen französischer Soldaten entdeckte Askaridenart, welche überhaupt selten vorzukommen scheint, da *Werner*, nach vielfältigen Versuchen, nie so glücklich war, sie abzutreiben, und sie blos im unteren Theile des gewundenen Darms einer Wöchnerin antraf, nachdem er in vielen Leichnamen vergebens darnach gesucht hatte. Am meisten hat man sie ausserdem noch im Blinddarme solcher Personen entdeckt, die an einer grossen Anhäufung vom Schleim im Darmkanale litten, in welchem sie wegen ihrer Kleinheit überaus schwer aufzufinden waren.

Der an sich sehr dünne, weisse und durchsichtige, drey und drey viertel Zoll lange Wurm (Tab. I Fig. 6) besteht überhaupt aus einem dickeren, eine halbe Linie breiten und fünf viertel Zoll langen (*a. b.*), und aus einem dünnen, haarförmigen, dritthalb Zoll langen Theile (*b. c.*). Anfänglich waren die Naturforscher zweifelhaft, welcher von beyden das Kopf- oder das Schwanzende sey. Göze glaubte am Haarende etwas entdeckt zu haben, was für den Kopf hätte gehalten werden können. *Werner* hingegen, welcher Gelegenheit hatte, vollständigere Exemplare zu untersuchen, fand, daß das stumpfe Ende des dickeren Theils (Fig. 6. *a.*) mit einem, schon dem blossen Auge sichtbaren Häkchen versehen sey, welches unter dem Mikroskope (Fig. 7. 8. 9. *a. b.*) ganz die Gestalt eines Saugrüssels hat. Dieser Saugrüssel fängt sich fadenförmig an und endigt sich mit einem breiteren, stumpfen und rauhen Kölbchen (*b.*). Er ist nicht allezeit sichtbar, da ihn der Wurm bald wie aus einer besondern Scheide, hervorstreckt, bald wieder in das stumpfe Vorderende seines dicken Theils zurückzieht. Letzterer verliert sich allmählig in den überaus feinen, haarförmigen Schwanz, in welchem man durchs Mikroskop zarte Querstriche entdeckt, so wie man durch den dicken Theil die Eingeweide schimmern sieht. Sehr selten halten diese Würmer ihren Körper ausgestreckt, gemeiniglich sind sie spiralförmig gekrümmt, und, wenn ihrer viele vorhanden sind, in einen Knäuel verschlungen. *Pallas* glaubte, daß auf der Verschiedenheit ihrer Krümmungen der Geschlechtsunterschied beruhe, und erklärte die spiralförmig gewundenen für Männchen, die mehr ausgestreckten aber für Weibchen, an welchen er auch keinen Saugrüssel entdeckt zu haben versicherte. Allein die Krümmungen dieser Würmer scheinen nach *Werner* durchaus nichts bestimmtes zu haben, und die Saugrüssel an den für Weibchen gehaltenen Exemplaren durch Fäulniß verloren gegangen zu seyn.

Nach ihrem innern Baue haben die Haarschwänze einige Ähnlichkeit mit den Afterwürmern. Sie enthalten einen Nahrungskanal und ein anderes, wahrscheinlich zur Fortpflanzung dienendes Gefäß. Der Nahrungskanal (Fig. 8 und 9. *a. c.*) nimmt seinen Anfang vom stumpfen Ende des Saugrüssels (*b.*), läuft in der Mitte desselben fort, geht dann in den dicken Theil des Wurms über und endigt sich an der unteren, oder concaven Fläche dieses Theils in der Gegend, wo der Schwanz anfängt, mit einem schwarzen Punkt, oder dem After. Hinter dem Nahrungskanal, mehr gegen den Rücken, oder convexen Rand des Wurms, befindet sich ein gleich dicker geschlängelter Gang (Fig. 8. *d. e.* und Fig. 9. *f. f. f.*), der erst unter dem Saugrüssel entsteht, und nahe am After mit dem Nahrungskanale zusammen-

menzufließen scheint, sich aber in dieser Gegend (Fig. 10. d) in einer unbedeutenden Entfernung von demselben (a. b.) endiget, und ohnfehlbar der Eyerstock ist; denn durchs Mikroskop entdeckt man in demselben eine Menge kleiner, fast viereckiger, weisser Körperchen, welche wahrscheinlich nichts als Eyer sind. Übrigens ist weder von den besonderen Zufällen, welche dieser Wurm wahrscheinlich zu veranlassen im Stande ist, noch von den Mitteln, welche vorzüglich auf ihn wirken, etwas bekannt. Wegen des vielen, ihn umgebenden Schleims, läßt sich jedoch, wenn der Abgang solcher Würmer, und die fortdauernden Zufälle auf die Gegenwart mehrerer zu schliessen berechtigen, von dem Gebrauch der Salze und salinischen Brunnen sehr viel Nutzen erwarten.

2. Der Afterwurm. Tab. II. Fig. 1—5.

Ascaris vermicularis, cauda subulata, cute ad latera corporis subtilissime crenata. Linn.
S. N. T. I. P. VI. p. 3029. n. 1. Faun. Suec. *Ascaris pollicaris*. Amoen.
acad. p. 104. Habitat in intestino recto.

Acrets chirurgische Vorfälle in Richters chir. Bibl. B. IV. S. 470. Einer Frau giengen mit dem Urin eine grosse Menge Askariden ab.

Aldrovandi de animal. ins. L. VI. p. 652.

Almindelige Naturhistorie, T. VII. p. 150.

Becker Misc. Curios. Dec. I. An. 8. Obs. 74. (*Ascarides ex utero*).

Bianchini Hist. morb. Tab. III. F. 20. hepatis. T. I. p. 2. C. 7. p. 166.

Blochs Abh. v. d. Erz. der Eingeweidewürmer, S. 31. der *Afterwurm*.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 411. Tab I. F. 1. der *Mastwurm*, *Madenwurm*, *Springwurm*.

Bomare (de) Dictionaire des Animaux, Tom. I.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 252. Tab. III. F. 5—10. und Tab. IV. F. 5. *Vermis ascaris*.

Coulet, St. Dissert. d. Ascaridib. L. B. 1729.

Cuvier, Tableau élém. p. 636. *Pascaride vermiculaire*.

Döveren, Abhandl. v. d. Würmern, S. 57.

Faber, J. M. von Würmern, die aus der Mutterscheide hervorkommen im Th. XIX. der Abh. der k. Ak. der Nf. S. 401.

Fabricii, H. A. Diss. de Ascaridib. et lumbr. lat. Duisbürg. 1733.

Fabricii, O. Fauna Groenland. p. 248.

Fermíns Reise durch Surinam, Th. II. S. 317. *Kinderwurm*, *Därmschaben*.

Göze, Vers. einer N. G. d. E. W. S. 102. T. V. F. 1—3. der *Pfriemenschwanz*.

Happ. Verm. hom. int. p. 8.

Heberden, G. de Ascaridibus. Medical. Trans. Lond. Vol. I. p. 45.

Hill, Hist. anim. p. 14. *Ascaris capite minore*.

Hippocrates Epidem. Lib. II. Sect. I. et de Morb. mul. L. II. Tit. 66. *Ascarides in Genitalibus foeminis*.

Johnston Hist. anim. L. III. de insect. Tab. 24.

Kniphof, Diss. de Pedic. ing. §. XI. *Maden*.

Kratzensteins Abh. v. d. Erz. der Würm. im menschlichen Körper, Halle 1748. S. 29. F. 3.

Limbürg, Obs. de Ascarid. Philos. Trans. Vol. LVI. p. 126.

Ludovici, D. de Variis, Ascaridibus atque Sironib. Misc. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. p. 109. Obs. 39.

Moufetti Theatr. ins. p. 297.

Müller, O. F. Hist. Verm. terrestr. V. I. P. 2. p. 34 Cl. XIX. Spec. 165. *Ascaris cauda setacea*, Dan. *Bür-ne-orm*; *Smaa Spol-orme*. Angl. *Ascaridis*; *Bots. Germ.*

Kinder-Wurm; *Därmen-Schaben*.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. S. 53. n. 1. die *Aftermade*.

Onomat. H. N. P. I. p. 825. Afterwurm.

Pallas, Diss. de inf. viv. in Sandif. Thes. Vol. I. p. 257. *Ascaris Graecorum*.

Paullini, C. F. von einer Mutterwuth, die von Würmern entstand, in den Abh. der k. Akad. der Nf. Th. XV. S. 474.

Pechlini Obs. p. 66.

Phelsum, M. van, Hist. Ascarid. oder N. G. der Springwürmer Tab. I. F. 3—11. Tab. II. F. 1—3.

Ebenderselbe vom Eyerlegen der Askriden in Orteschi Giornale di Medic. Vol. V. Pla.

- | | |
|---|--|
| Plateri Prax. med. T. III. p. 786. | Unzers medic. Handb. n. 32. S. 198. |
| Rauh, D. C. de Ascaride lumbricoide Linn. Gött. | Valisnieri Oper. Vol. I. Tab. XX. F. 5—10. |
| 1779. | Werner Verm. intest. p. 72. Tab. V. Fig. |
| Sims (John) in Willans Hautkrankh. B. I. S. 67. | 133—137. |

So zahlreich das Verzeichniß der Schriften ist, welche von dieser Gattung der Askariden handeln, so sind doch *van Phelsums* und *Gözes* Beschreibungen zur Zeit die einzigen, welche in Beziehung auf die Naturgeschichte dieses Wurms einen klassischen Werth haben, ohngeachtet auch in diesen, wegen der Kleinheit des zu untersuchenden Gegenstandes, vieles unberichtigt und zweifelhaft gelassen worden ist.

Der von *σκαρῖζεν* (springen, tanzen) hergenommene Geschlechtsname *ἀσκαρίδες*, paßt vorzüglich auf diese Gattung, welche überaus unruhig und lebhaft in ihren Bewegungen sind und, wenn man ihnen ein Licht vorhält, wohl einige Zoll weit springen. Hierdurch unterscheiden sie sich genugsam von den jungen Spulwürmern, mit welchen man sie öfters verwechselt hat, wenn sich diese aus den entfernteren Theilen des Darmkanals in den Mastdarm hinabzogen, und, besonders bey Kindern, ähnliche Zufälle, wie die Afterwürmer verursachen.

Die gewöhnliche Länge der Spring- oder Afterwürmer beträgt nicht über vier bis fünf Linien, ihre Breite aber kaum den dritten Theil einer Linie. Am vorderen Ende (Tab. II. Fig. 1. a.) sind sie dick und stumpf, dann werden sie allmählich schmaler und endigen sich mit einem pfriemenförmigen Schwanze (b.). Ihre Haut ist nur an beyden Seiten des Körpers fein gekerbt, übrigens so glatt, daß man auch durch das Vergrößerungsglas keine Ringe, wie bey den Spulwürmern, wahrnehmen kann. Sie sind zwar gelblicht, verlieren aber diese von ihrem Aufenthalte herrührende Farbe auf eine gelinde Maceration bald, werden dann vollkommen weiß und an ihrem Schwanzende beynahe durchsichtig. Ihr gewöhnlicher Wohnort ist der unterste Theil des Mastdarms und nur selten werden sie im oberem Theile desselben und im Grimmdarm angetroffen. In die Mutterscheide nach *Hippokrates*, *Döverens*, *Kniphofs*, *John Sims*, *Beckers*, *Fabers*, und in die Urinblase nach *Platers* und *Akrels* Wahrnehmungen, konnten sie sehr wohl aus dem Mastdarme gelangen. In letzterem veranlassen sie hauptsächlich bey reizbaren Kindern ein unleidliches Jucken, einen öfteren Drang zum Stuhlgang, und, durch Mitleidenheit, einen Reiz in der Harnröhre und an der Eichel, welcher vielleicht öfter, als man glaubt, Gelegenheit zur Onanie giebt. Vielleicht war auch der durch Afterwürmer verursachte weisse Fluß, welchen *Rosenstein* beobachtet hat, erst die Folge der Abstumpfung ihres Reizes durchs Reiben in der Mutterscheide.

Auch

Auch ist es wahrscheinlich, daß die von *Paullini* beschriebenen Würmer, welche aus der Mutterscheide hervorkamen und bey einem Mädchen von neunzehn Jahren die Mutterwuth veranlaßten, nichts als Askariden waren. Gewöhnlich gehen sie in grosser Menge mit den Exkrementen ab und verrathen sich durch das Gewimmel in denselben, bisweilen kriechen sie aber auch nur einzeln aus dem After. So gedenkt *Fabricius* eines Mannes, welcher zehn Jahre lang, alle Nächte ein solches Abkriechen von Afterwürmern bemerkte. Überhaupt pflegen diese Würmer Abends und in der Nacht am unruhigsten zu seyn, und durch ihr Nagen ein unerträgliches, öfters die Nachtruhe störendes Jucken und Kitzeln im Mastdarne zu veranlassen. Schon *Hippokrates* machte diese Beobachtung, auch erzählt *Bianchi* einen merkwürdigen Fall dieser Art. In Rücksicht der Entstehung dieser Würmer hatte *Kratzenstein* die besondere Meinung, daß sie nichts als die Maden der Schmeisfliegen wären, welche ihre Eyer beym Stuhlgang im Mastdarne absetzen. Der Afterwurm verwandelt sich aber nie in eine Fliege, und ist auch nach seiner ganzen Bildung verschieden von einer Fliegenmade.

Bey der mikroskopischen Untersuchung zeigt sich, daß der Kopf (Tab. II. Fig. 2.) an seinem vordersten Theile mit drey kleinen Saugwärtzchen (*a.*) und zu beyden Seiten mit zwey häutigen Backenblasen (*b. c.*) versehen ist. Jene Saugwärtzchen enthalten zugleich die Mündungen der Saug- oder Speiseröhre (*a. d.*), welche immer breiter, und da, wo ihr Ende zu seyn scheint, bauchicht wird. Dieser bauchichte Theil wird aber mit einemmale wieder überaus schmal und geht dann in einen noch bauchichtern und beynahe runden Theil (*e.*) über, welchen *Göze* für den Magen hält. Von hieraus bleibt die Fortsetzung des Nahrungskanals ganz schmal und läuft im Schwanzende des Wurms allmählig spitzig zu (*g. h.*). Ein anderer ungleich stärkerer Kanal, welcher sich bald verengt, bald erweitert, und daher lauter Knoten bildet, umschlingelt beynahe zwey Drittheile des schmälern gewordenen Nahrungskanals (*f. g.*). Dieser knotichte und geschlängelte Gang enthält nach *van Phelsums* Beobachtung, der ihn für das Zeugungsorgan hält, eine weißlichte Feuchtigkeit, nach *Göze* aber beym weiblichen Afterwurme (Fig. 2.) lauter dunkle Körperchen, welche sich aus einem kleinen Gange (*l. k.*) hervorpressen lassen, der in einer kleinen getheilten Hervorragung (*k.*) am Vordertheile des Leibes seine Mündung hat. *Göze* hält diese dunklen Körperchen für Embryonen, welche unter dem Mikroskope (Fig. 3. und 4.) länglichtrund erscheinen, aber nach ihrer ganzen Form wohl schwerlich etwas anderes, als Eyer sind. Beym männlichen Afterwurme (Fig. 5.) ist das Zeugungsorgan (*f. g.*) einfacher, weniger geschlän-

schlängelt, in bestimmtere Knoten abgetheilt, und nicht mit dergleichen Embryonen, am bauchichten Ende aber mit einer kleinen Röhre (*g. i.*) versehen, deren Mündung (*h.*) ein über dem Schwanzende des Wurms sichtbarer Punkt ist. Die leichteren Wurmmittel, Merkuriallaxanzen, Milchklystiere mit Knoblauch, Stuhlzäpfchen von Speck, an welchen sie sich oft haufenweise ansaugen, dienen zu ihrer Entfernung.

3. Der Spulwurm. Tab. I. Fig. 11. und Tab. II. Fig. 6 — 13.

Ascaris lumbricoides, spithamea, cauda obtusa vel subincurva, ani rima transversa, intestino aurantio. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3029. n. 2. Habitat in canale intestinali.

Acta nat. cur. Vol. II. p. 173. enthält die Lanzoni-
schen Versuche über die wurmtödtende Kraft verschie-
dener Flüssigkeiten.

Aldrovandi insect. L. VI. p. 652. F. 4. 5.

Baldingers neues Magaz. B. VI. St. 1. S. 54. de
lumbricis effractoriis u. B. VI. St. 5. S. 473. Ueber le-
bendige Spulwürmer ausserhalb dem menschl. Körper.

Bartholini epist. med. Cent. II. h. 23.

Beireis Diss. de Febr. et Variolis verminosis
(Resp. Hinze) Helmst. 1780 p. 8.

Belkmeer, N. de Lumbrico ex intest. in hern.
inguin. procedente; in Comment. Soc. Harl. T. X.
P. 2. p. 429.

Berlinische Samml. B. IX. S. 131.

Bibliothek for nyttige Skrifter, p. 506.

Bingert von einer Durchbohrung der Därme von
Spulw. welche geheilt wurde, in Richt. chir. Bibl. B
VI. S. 25.

Blochs Abb. v. d. Erz. der E. W. S. 29. Tab. VIII.
F. 1 — 6. *Spulwurm*.

Blumenbachs Handb. der N. G. S. 411. n. 2.
Tab. I. F. 2. *Spulwurm*, *Herzwurm*, *Lumb. teres*;
Franz. *le Strongle*; Engl. *the round worm*.

Bomare Dict. des anim. Tom. XII. *Ver cylindrique*.

Caesalpinus duo tant. lumbric. gen. in intest.
reperi, quaest. Med. L. II. p. 237. 6.

Clerici Hist. lumbr. p. 218. *lumbr. teres* Tab. IV
et XI. F. 1. 4 und 5.

Codronchi de morb. Imolae Ao. 1602 vagatis,
impr. de Lumbricis. Bonon. 1603.

Coith, C. A. de lumbricis, intestino perforato per
abdomen egress. Bas. 1734.

Cse'r (Sam. Verestoi de) Specim. annot. helmin-
thol. quae naturalem spectant hist. lumbr. Franeq. 1772

Düverren, Abh. von den Würm. S. 68. *Spulwurm*,
Στρουγγύλα, le strongle Tab. VIII. F. 1. 2.

Fabricii, Oth. Faun. groenland. p. 271. n. 249.

Fermis Reise durch Surinam, Th. II. S. 318.

walzenförmiger Wurm.

Fischeri Taen. hydat. Hist. p. 39. Fig. 6. de
Ascaridibus intest. coec. perforantibus.

Gabucinus, H. de Lumbr. alv. occup. Lugd. 1549
12. Cap. II.

Garmann, von Würmern welche die Gedärme
durchfressen, ohne dafs dadurch die Kranken des Le-
bens wären beraubt worden, in den Abh. der k. Ak.
der N. F. Th. I. S. 277.

Gaukes (J. von) Prax. Med. Chir. ration. Groen.
1700. p. 17.

Göze, Ves. einer Nat. G. der Eingeweidew. S. 65.
Ascaris lumbricoides.

Halleri Opuscula patholog. Lausann. 1768. p. 20
Obs. 9.

Hannöversches Magazin 1773.

Harderi, J. J. Thesaur. obs. med. Basil. 1736.
Obs. 68.

Hippocrates Oper. I. p. 2.

Hoffmann, S. Diss. de Lumbricis in C. H. (Resp.
Scheffer) Helmst. 1621.

Hofmann Obs. Lumbrici totius Corp. tumoris et
epileps. causae; Act. nov. phys. med. Vol. VI. p. 425.

Holdefreunds Erzähl. merkw. Krankengesch.
S. 11.

Jonstoni Theatr. insect. p. 158. Tab. XXIV. n. 1.
Kavh., Diss. de Ascar. lumbricoid. Gött. 79.

Kirkland, Th. on the pres. stat. of Surg. Vol. II.
in Richt. chir. Bibl. B. X. S. 605. aus einem Leber-
abscesse kam ein langer rother Wurm.

Klein, Tentam. herpetologiae p. 63. Tab. I. F. 3.
Tab. II. F. 1 — 7. *Lumbric. intestinal. human. teres*.

Kniphof Diss. de Ped. ing. §. VI. de lumbrico.

Kramer, G. Diss. de lumbr. C. H. Vienn. 1753.
Lim.

- Limmer, Diss. de Verm. s. Lumbr. in C. H. ex insector. ovis generat. Servestae 1699.
- Lucius, J. G. Diss. de lumbricis alvum occup. L. B. 1694.
- Ludwig, Ch. Gr. Progr. de Lumbr. intest. perforant. Lips. 1762.
- Lüdücke von einer tödtlichen Durchbohrung der Därme, in Richt. chir. Bibl. B. V. S. 247.
- Monardus, J. de Verm. intest. s. lumbricis (Resp. Lasius) Rintel. 1668.
- Mauchart, B. D. Diss. Lumbrici teretes in Duct. pancr. repert. Hist. (Resp. Gmelin) Tubing. 1738. 4.
- Medic. essays Vol. I. n. XIV. (Ein Spulwurm kam aus der Leistengegend einer Frau hervor, von welcher man glaubte, daß sie daselbst einen Bruch hätte).
- Monardus, J. de Verm. intest. s. lumbricis (Resp. T. I. L. 3. Ep. 1. Fol. 36. et L. 4. Ep. 1. Fol. 50. b. Mouffetti Theatr. ins. p. 282. 296.
- Müller über den Regen- und Spulwurm im Händnivers. Magazin 1773. S. 418.
- Mülleri Hist. Verm. Vol. I. P. 2. p. 35. *Asc. lumbricoid. Dann. Menneske-orm; Spol-orm; Angl. Round Gut Worms; Ital. Verme tondo.*
- Müllers Linn. N. S. Th. VI. S. 36. *Darmwurm.*
- Murray, J. A. Diss. de Asc. lumbr. (Resp. Rauh) Gött. 1769. 4. Ejusd. Obs. de Lumbr. Setis. Goett. 1769. c. Tab. p. 66.
- Odellius, J. L. Erfahrungen v. Asc. lumbr. in den Schwed. Abh. B. XXXVIII. S. 144. 314. 318 und neue Abh. B. II. S. 13.
- Pallas Diss. de infest. viv. p. 265 *Lumbric. intestinal.* Er führt die mancherl. schreckhaften und gefährl. Zufälle an, welche die Spulwürmer veranlassen können.
- Peereboom, C. Descr. et Delin. novi gener. verm. Stomachidae dicti in C. H. acc. Obs. de lumbr. per urethr. excreto. Amst. 1780.
- Percival, Th. von einer Durchbohrung der Därme von Spulwürm. S. Richt. chir. Bibl. B. IV. S. 413.
- Poupe des Portes, Histoire des maladies de S. Dominique, Paris 1720. p. 12.
- Redi de animalc. viv. p. 19. Tab. X. F. 2. 3.
- Roudier, Obs. de Verm. 1 ped long. ex ingenti tumore hypogastr. egresso; Roux Journ. d. Med. Vol. LII. p. 125.
- Sabatier in den Memoires de Toulouse T. II. S. Richt. chir. Bibl. B. XII. S. 196.
- Santorini, J. D. Observ. anat. c. Icon. Lugd. 1739. Cap. IX. §. 9.
- Scardona, J. de cogn. et cur. morb. L. III. P. 74.
- Schenk Obs. med. Lib. III. Beyspiele von Würmern, welche den Magen, den Darmkanal, Nabel und Unterleib durchfressen haben.
- Schettla, C. C. Lumbric. in C. H. intest. productio, eorumque ex iis expuls. vt et Phaenomena occurrentia, Marburg. 1688.
- Schulze, J. H. Diss. de Lumbr. effractoribus (Resp. Behrens) Hallae 1740.
- Schulze, S. von Spulwürmern, die aus einer Eiterbeule an den Schamweichen hervorkamen, in den Abh. d. k. Ak. der Nf. B. IV. S. 242.
- Sereni (Quint. Ser. Samonici) Curationes morborum-Lumbricus saepe etiam scandens oppletis faucibus haeret, obsecussasque vias vitae praecludit anhelae.
- Swieten (van) Comment. in Boerh. aph. 1367.
- Thoms, G. Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arznei- Wundarznei- und Entbindungswissenschaft, Frankf. a. M. 1799. S. 95. Leichenöffnung eines Kindes dessen Unterleib Spulw. durchfressen hatten.
- Trallianus, Alex. d. lumbricis epist. graece et lat. Venet. 1570.
- Treutler Auctar. ad Helminthol. p. 17. *Asc. lumbric.*
- Tulpil Observ. Lib. III. C. XII. Beyspiele von Würmern, welche den Magen und Darmkanal durchfressen haben.
- Tyson Lumbricus teres, or some anatomical observ. on the Round Worm bred in the human Bodies, in philos. Trans. Angl. Vol. XIII. n. 147. p. 154. c. Fig.
- Valisnieri Op. I. p. 271. Tab. 34 und 35.
- Vesti, J. Diss. de Verme umbilicali (Resp. Scheel) Erf. 1710. 4.
- Vogels neue med. Biblioth. B. III. St. 1. S. 29.
- Vollgead, von Würmern, welche die Gedärme durchfressen und dadurch die Kranken des Lebens beraubt haben, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. S. 278.
- Wagnerus in Nov. litter. Balth. 1699. p. 153.
- Walceus, J. Diss. de Lumbr. intest (Resp. Hoorn) L. B. 1641.
- Warenii Diss. d. Lumbricis, Rostock 1603.
- Wedekind, über eine sehr merkwürdige Bruchkrankh. in Richt. chir. Bibl. B. XI. S. 304. wo sich bey der Sektion mehrere nicht ganz durchbohrte Oeffnungen in den dünnen Gedärmen von Spulwürmern fanden.
- Welsch, C. L. Diss. de verme cordis (rother Spulwurm) (Resp. Helvig) Lips. 1694.
- Werner, verm. intest. p. 75. Tab. VI. F. 144—148. Tab. VII. F. 153—159.
- Wichmann, vom Gürtel des Regenwurms in den Berlin. Beschr. naturf. Freund. B. III. S. 231.
- Zeders, J. G. H. Erster Nachtrag zur Naturgesch. der Eingeweidewürm. v. Göze, Leipz. 1800. 4. S. 26. b. *Spulwurm der Menschen, Fusaria lumbricoides.*
- Zwinger, Praedojatreja practica, Obs. 109. p. 437. *Herzwurm (vermis cardiacus)* worunter er den rothaussehenden Spulwurm versteht.

Auch diesen Wurm kannte schon *Hippocrates*, der ihn *ερωγγύλος* nannte, jedoch so wenig, als die Ärzte der folgenden Jahrhunderte, nach seiner Natur, sondern blos nach den Zufällen, welche er hervorzubringen pflegt. Seine Ähnlichkeit mit dem Erd- oder Regenwurm (*lumbricus terrestris*) erhielt sie alle in dem irrigen Wahn, den Spul- und Erdwurm für einerley Art zu halten, und verleitete noch neuerlich den Herrn *Beireis* zu der Behauptung, ihn im Flußwasser gefunden zu haben, welcher aber die Vergleichung der besonderen Merkmale beyder Wurmarten völlig widerspricht. Der Erdwurm ist braunroth und weicher von Substanz, hat nur eine runde Blase am Kopfende, weit stärkere Ringe und unter denselben einen dicken erhabenen, welchen neuere Naturforscher den Sattel oder Gürtel genannt haben, und der von *Wichmann* besonders beschrieben worden ist. Ausserdem ist er am Bauche mehr flach und nach *Murray* mit vielen harten Borsten versehen, die ihm bey dem Kriechen forthelfen. Überdies gehört er zu den lebendig gebährenden Thieren. Ganz anders verhält es sich aber mit dem menschlichen Spulwurme, den wir nun genauer kennen lernen wollen.

Der Körper dieses Wurms ist rund, und läuft an beyden Enden schmal zu (Tab. II. Fig. 6.). Seine gewöhnliche Länge ist sechs bis neun Zoll, und seine Dicke die einer mehr oder weniger starken Federspule, wovon er auch wahrscheinlich den Namen erhalten hat. Doch giebt es nicht selten weit längere und dickere Spulwürmer. Ich selbst habe einen von achtzehn Zoll Länge, und vier Linien Dicke einem fünfjährigen Knaben abgetrieben. Auch *Perreboom* kennt dergleichen ungewöhnlich lange Spulwürmer und hielt sie für eine eigene Art, die er unter dem Namen *Stomachida* beschrieb. Unter die Übertreibungen gehören aber wohl die bey verschiedenen Schriftstellern vorkommenden Angaben von zwey bis drey Ellen langen und eines Finger dicken Spulwürmern.

Die Farbe dieser Askariden hängt blos von der Verschiedenheit der Nahrung ab, welche sie im Darmkanale finden, und nach dieser sind sie bald weiß, bald röthlicht, bald ins Gelbbraune fallend. Ihr Kopf zeichnet sich vorzüglich durch drey Knötchen (Fig. 6. a.) aus, welche als kleine, den dreyeckigten Mund umgebende Kneipzangen anzusehen sind, womit er sich an die zottigte Darmhaut ankneipt, und dann mit dem aus dem Munde hervorgestreckten Saugrüssel seine Nahrung einzieht. Schließt er den Mund völlig durch die Annäherung der Kneipzangen, so ist er im Stande, die Darmhäute zu durchbohren. Das dem Kopfe entgegengesetzte Schwanzende (b.) ist weniger spitzig, und gleicht von der Rückenfläche der Eichel des männlichen Glieds. An der Bauchfläche sieht man aber,

etwan

etwan anderthalb Linien von der Schwanzspitze eine kleine Erhabenheit, unter welcher sich die Öffnung des Nahrungskanals, oder der After befindet.

Den ganzen Körper des Wurms nennt *Göze* mit Recht einen hohlen Muskel, in welchem die Eingeweide vertheilt und mit einem zellichten Gewebe befestiget sind. Dieser Muskel oder vielmehr diese Muskelhaut besteht aus lauter Cirkelfasern, welche an vier Seiten durch eben so viele erhabene Linien (Fig. 6. c. d. e.) unterbrochen werden, die vom Kopf- bis zum Schwanzende gehen und aus langen Muskelfasern zusammengesetzt sind. *Werner* vergleicht sie mit den Bändern des menschlichen Grimmdarms und glaubt, daß durch die langen Muskelfasern dieser Linien, alle Ringe des Wurms zusammengezogen und einander genähert werden können, wodurch die enthaltenen Kanäle und Gefässe den zur Bewegung ihrer Säfte erforderlichen Druck erhalten, und wenn diese Annäherung der Muskelringe in verschiedenen Theilen der Muskelhaut mit dem Nachlaß anderer dazwischen liegender Muskelringe wechselt, der Wurm seine kriechende Bewegung vollführet. Wird der Wurm aufgeschnitten und die enthaltenen Theile herausgenommen; so äussert sich die Wirkung jener langen, in vier Linien oder Bändern vereinigten Muskelfasern sehr auffallend durch das Zusammenziehen der ganzen langen Wurmhaut in einen kleinen Klumpen. Ohngeachtet die Muskelhaut ziemlich dick und fest ist, und die äussere Fläche derselben durch die Cirkelfasern rauh wird; so schimmern doch der Speisekanal und die fadenähnlichen Saamen- und Eyergefässe an verschiedenen Stellen sehr deutlich durch. Dieses ist um so mehr zu bewundern, da die innere Fläche der Muskelhaut flockicht und mit der trüben, ins Braungrüne fallenden Feuchtigkeit überzogen ist, welche alle Eingeweide des Wurms umgiebt. Letztere bestehen aus den Ernährungs- und Zeugungs-Organen, wovon jene den mittleren, diese mehr die Seitentheile des hohlen Muskels einnehmen. Der Nahrungskanal (Fig. 9. c. d. e. f.) ist nichts, als die Fortsetzung des Saugrüssels, welcher allmählich weiter wird, doch so, daß er sich an verschiedenen Stellen wieder mehr oder weniger verengt. *Van Döveren* und *Werner* betrachten diese Verengerungen als bestimmte Abtheilungen und unterscheiden daher die Speiseröhre, den Magen und Darmkanal, allein wohl mit eben so wenigem Rechte, als man bey dem Menschen den Darmkanal in sechs Theile getheilt hat. Der ganze Nahrungskanal ist vorzüglich an der Linie oder an dem Bande durch Zellgewebe befestiget, welches an der unteren Fläche des Wurms vom Kopfe bis zum Schwanzende läuft. Den dickeren oder mittleren Theil desselben umschlingen die Zeugungswerkzeuge. Er ist bald röthlicht, bald pomeranzengelb, bald dunkelgrün, nach

Verschiedenheit der enthaltenen Nahrung, und inwendig, gleich dem dicken Gedärme des Menschen, mit Falten versehen.

Ausser dem Nahrungskanale verdient noch ein anderes, weisses Gefäß (Fig. 9. *h. h.*) bemerkt zu werden, welches sich am Kopfe mit zwey Spitzen anfängt und längs dem Nahrungskanale bis zum Schwanz etwas gekrümmt fortläuft. Es wird von *Döveren* für das Herz, von *Werner* für eine Arterie gehalten, und hat viele Ähnlichkeit mit dem grossen Rückengefässe des Regenwurms.

Die übrigen Eingeweide des Spulwurms sind die Zeugungsorgane, welche bey dem immer etwas kleineren und seltner, als das Weibchen vorkommenden Männchen, durch kein äusserlich sichtbares Merkmal den Geschlechtsunterschied verrathen. Sie bestehen nemlich in einem fadenähnlichen, mit einer feinen Haarspitze (Fig. 13. *d.*) anfangenden, allmählich dicker werdenden Theil, der die Mitte des Nahrungskanals (Fig. 12. *i. i. i.*) umschlingelt, und sodann in einen noch dickeren, mehr gerade fortlaufenden Kanal (Fig. 12. *g. h.* und Fig. 13. *c. b.*) übergeht dessen konisches, ungefähr drey Linien langes Ende (Fig. 12. *f.* und Fig. 13. *b. a.*) in die Schwanzspitze tritt. *Thyson* nennt dieses konische Ende das männliche Glied, *Werner* den zwischen letzterem Gliede und den geschlängelten Fäden befindlichen Kanal, das Saamenbläschen, und jene Fäden die Saamengefässe. Alle diese Theile enthalten eine weit durchsichtigere und minder körnichte Feuchtigkeit, als in den weiblichen Geschlechtstheilen enthalten ist.

Der weibliche Spulwurm ist nicht nur ungleich grösser und dicker, als der männliche, sondern zeichnet sich auch noch durch eine ungefehr drey Zoll vom Kopfe entfernte Öffnung in der Bauchlinie aus. Diese Öffnung ist die Mündung der Mutterscheide oder des Eyergangs (Fig. 9. *i.* und Fig. 10.), welche anfangs dünne ist, sich aber bald in zwey Blasen erweitert und in die zwey dicken Hörner (Fig. 10. *b. b.*) des gabelförmig getheilten Uterus übergeht. Leztere Hörner behalten ihre, ungefehr eine halbe Linie betragende Dicke, eine Strecke von zwey Zoll nach dem Laufe des Nahrungskanals, sodann aber werden sie beynahe mit einem Male dünner (Fig. 10. *d. d.*) und nemen nach *Werner* den Namen der Fallopischen Röhren, nach *Göze* den Namen der Eyerleiter an. Sie haben nun eine so fadenförmige Bildung, wie die Saamengefässe des Männchens, schlagen sich gegen das Kopffende zurück, schlängeln sich sodann um den hintern Theil des Nahrungskanals immer vor- und rückwärts, spalten sich zuletzt in drey bis vier überaus feine, frey schwebende Fäden (*f. f.*), und haben überhaupt eine Länge, welche die des ganzen Wurms wohl zwölfmal übertrifft. In ihren Krümmungen werden sie
durch

durch ein feines Zellgewebe untereinander befestigt, und in ihren röhrenförmigen Höhlen von dem Eyerstoffe - einer weissen Materie - erfüllt, welche diesen Eyerleitern selbst eine ganz weisse Farbe mittheilt. Die Anzahl der enthaltenen Eyerchen schätzt *Klein* auf zehn tausend, *Werner* aber in jedem Horne des Uterus auf einige Myriaden. Durchs Mikroskop entdeckt man immer nur in gewissen Abständen (Fig. 10. c c. c c c.) Ansammlungen von diesen Eyern, so daß es scheint, als ob die unvollkommenen Eyerchen zu ihrer Vervollkommenung eine gewisse Stufenleiter zu durchwandern hätten, bis sie endlich im letzten Eyerhäufchen an der Vereinigung der Hörner des Uterus (Fig. 10. b. b.) diejenige Reife erhalten haben, die sie geschickt macht, durch den Eyergang oder die Mutterscheide (b. a.) ihren Ausgang zu nemen. Wirklich läßt sich auch die mit Eyern geschwängerte Feuchtigkeit durch die Öffnung des Eyergangs aus den Hörnern des Uterus hervordrücken, wodurch also *Gözens* Meinung von dem Zerplatzen der Mutter und dem Ausschütten ihrer Eyer in dem menschlichen Darmkanale, als der natürlichen Art ihrer Fortpflanzung, um so mehr widerlegt wird. In einer stärkeren Vergrößerung (Fig. 11.) entdeckt man, daß die Eyer (a. a. b. b.) in ihrem Umfange rauh und flockicht, in der Mitte aber durchsichtig sind, so daß man eine kleine spiralförmige oder geschlängelte Linie, als den Keim des künftigen Wurms darinnen entdecken kann. Wahrscheinlich geschieht die Befruchtung oder die Anregung des Lebens zur Entwicklung und Ausbildung dieses Keims, nach *Werners* Meinung, wie bey den Fischen. Er glaubt nemlich, daß das Männchen, in Ermangelung eines äusserlich sichtbaren Zeugungsgliedes, seinen Saamen über die vom Weibchen ausgeschütteten reifen Eyer ergießt, oder daß letzteres den vom Männchen ergossenen Saamen erst aufnimmt, und hierdurch die Veranlassung zur Ausschliessung reifer Eyer giebt, aus welchen sich die jungen Würmer in dem Schleime des Darmkanals vollends entwickeln.

Der bisher beschriebene Spulwurm ist blos auf den menschlichen Darmkanal angewiesen, und kann, der thierischen Wärme gewohnt, ausser demselben nirgends, am wenigsten, wie gleichwohl *Beireis* entdeckt zu haben glaubte, in kaltem Wasser fortleben. Er findet sich aber bey Wochenkindern, die blos von der Mutterbrust ernährt worden sind, so gut, als bey achtzigjährigen Greisen. Im Ganzen wird er jedoch immer mehr bey Kindern und beym weiblichen Geschlechte angetroffen. Sein gewöhnlichster Aufenthalt ist der Leerdarm und der Blinddarm, von welchen aus er aber oft nach oben und unten Auswege sucht. Weder der Pfortner, noch die Grimmdarmklappe halten ihn bisweilen auf, in den Magen und

und in das dicke Gedärme zu gelangen. Sogar hat man gefunden, daß er sich aus dem Zwölffingerdarme in den Ausführungsgang der grossen Magendrüse (*Ductus pancreaticus*) und durch den gemeinschaftlichen Gallengang (*Ductus choledochus*) in die Gallenblase gewunden hat. Es ist leicht einzusehen, daß der Reiz, welchen dieser Wurm schon durch die Ausdehnung dieser zarten Kanäle veranlaßt, öfters mancherley unerklärbare Zufälle hervorbringen muß. Wird er aber vollends durch besondere Umstände, z. B. in hitzigen Fiebern und bey vorhandener Todesgefahr des Menschen, ins Gedränge gebracht, so sucht er auch durch Nase, Mund und After seinen Ausweg. Im Magen veranlaßt er dann oft unstillbares Brechen; im Halse Zusammenschnürungen desselben und bisweilen gar Ersticken. *Serenus* schilderte schon diese Gefahr, und *Poupe des Portes* erzählt, daß ein in der Kehle steckender Wurm ein Kind plötzlich tödtete. Auch fand *Haller* bey der Leichenöffnung eines erstickten Mädchens einen Knäuel Spulwürmer in dem Rachen. Zwey davon waren in die Luftröhre gefallen und einer schon bis an die Lunge gelangt. Öfters veranlaßt ihre allzugrosse Anhäufung eine Verwicklung im Blinddarme, wodurch der Fortgang des Speisebreys und der Exkremente gehemmt, hartnäckige, ja tödtlich werdende Verstopfungen bewirkt, und die Würmer selbst gehindert werden, ihren Ausweg nach oben oder unten zu nemen. In solchen Fällen durchbohren sie wohl gar den Darmkanal und die äusseren Bedeckungen an der ihnen zunächst liegenden Stelle oder verirren sich in die benachbarten Theile. Man darf sich daher nicht wundern, wenn sie aus eingeklemmten Brüchen hervorgebrochen, oder ausserhalb dem Darmkanale in der Bauch- und Beckenhöhle und andern ungewöhnlichen Orten angetroffen worden sind. So erzählt *Fischer*, daß bey der Öffnung einer sechzigjährigen, den vorsezlichen Hungertod am zehnten Tage gestorbenen Frau, ein Spulwurm aus dem durchbohrten Blinddarme (Tab. I. Fig. 11. g.) heraussieng, daß ein anderer in der Beckenhöhle sich fand, der Blinddarm in der Gegend der Bauhinischen Valvel durchbohrt war und an seinem Grund noch zwey weite Löcher (*h.*) hatte. Mangel der Nahrung hatte offenbar in diesem Falle die Würmer bestimmt, so widernatürliche Auswege zu nemen. Ein ähnliches Beyspiel liest man bey *van Swieten*. Man fand nemlich bey der Leichenöffnung eines Knaben, welchem aus der Blase Würmer abgiengen, nicht nur den Mastdarm, sondern auch die Urinblase an mehreren Orten durchbohrt. Ferner erzählt *Sabatier*, daß aus einem Leistenbruche, welcher schmerzhaft wurde, aufschwoll und sich von selbst öffnete, ein sechs Zoll langer Wurm hervor kam, und *Holdefreund*, daß aus einem Abscess in den Weichen, aus welchem

chem Koth floß, ein langer Spulwurm hervorgezogen wurde, mehrerer Beyspiele von Durchbohrung des Magens, Darmkanals und Unterleibes, welche bey *Baldinger*, von *Gaukes*, *Harder*, *Kniphof*, *Scardona*, *Thom* und *Wagner* vorkommen, nicht zu gedenken. Doch sind auch öfters diese Spulwürmer in ungeheurer Anzahl vorhanden, ohne deswegen ihre Gegenwart durch einen bedeutenden Zufall zu verrathen. Dieß ist der Fall vorzüglich bey fetten, schleimichten Konstitutionen und bey solchen Personen, die durch zähe, klebrichte und mehlichte Nahrungsmittel einen solchen Kleister in ihrem Darmkanale unterhalten, der diesen Würmern zur angenehmsten, ihnen alles gewährenden und sie daher in steter Ruhe erhaltenden Herberge wird.

4. Das Kronenmaul. Tab. VII. Fig. 5 — 8.

Ascaris stephanostoma, fronte bicorni, proboscide acuminibus duodecim obsessa, incisuris corporis quatuordecim, cauda bifida. Habitat in canale intestinali.

Es folgen nun zwey neue Rundwurmgesellschaften, deren Beschreibung und Abbildung ich der gütigen Übersendung der in Spiritus aufbewahrten Exemplare des um die Naturgeschichte so verdienten Herrn Professors *Lenz* in Jena, und deren Entdeckungsgeschichte ich der Güte des Herrn Professors *Bretschneider* verdanke. Leztere folgt hier wörtlich. „Ein Jüngling von 22 bis 23 Jahren und blassen erdfahlen Ansehen, hatte die gewöhnlichen Zeichen von Askariden. Er bekam mehrere Klystiere aus Knoblauch und Milch, wozu man noch etwas Switznische Solution gemischt hatte. Da nun hierauf nichts abgieng, was nur die entfernteste Ähnlichkeit mit Wurmschleim oder Askariden gehabt hätte und dennoch die gewöhnlichen Wurmzeichen noch anhielten: so wurde ein Pulver aus *Mercurius dulcis*, *Baldrian*, *Jalappenwurzel* und *Semen santonici* verordnet, worauf eine Menge Würmer ausgeleert wurden, die ich, nach der oberflächlichen Beschreibung des Kranken, für Askariden hielt, und mich also nicht weiter um ihr Aussehen bekümmerte. Als mir aber den dritten Tag darauf der Kranke zufällig die Gestalt der oben erwähnten Würmer etwas genauer angab; so sah ich leicht ein, daß dieß unmöglich Askariden seyn könnten, ließ mir solche bringen und fand nun, daß es zwey, mir bisher ganz unbekannte Wurmgesellschaften waren. Ich übergab dieselben meinem Freunde, dem Herrn Professor *Lenz*, der durch seine vieljährigen mühsamen Untersuchungen, so manches in der Naturgeschichte der Wür-

Würmer aufklärte, zur näheren Untersuchung. Dieser nam sie unter das Geschlecht der Rundwürmer auf und nannte die eine Gattung *Stephanostoma*, die andere *Conosoma*. Sie werden jezt in der überaus zahlreichen Sammlung von Eingeweidewürmern aufbewahrt, welche ihre Entstehung gedachtem Herrn Professor *Lenz* verdankt, und nun dem hiesigen Herzoglichen Museum einverleibt ist.“

Das Kronenmaul (Tab. VII. Fig. 5.) ist ungefehr einen Zoll lang, am Vordertheile zwey Linien breit und läuft auf einmal hinten spitzig zu. Es hat überhaupt, seinen fürchterlichen Rachen ausgenommen, mehr die Gestalt einer Puppe, als die eines Wurms. Seine Farbe war anfänglich milchweiß, wurde aber im Weingeiste bräunlichschwarz. Am dicken und runden Kopfe (Fig. 7.) werden durchs Mikroskop eine Menge Erhabenheiten und Vertiefungen sichtbar (Fig. 8.), welche am obern und an beiden Seitentheilen des Kopfs mit überaus feinen Dornspitzen besäet sind. Eine jener Erhabenheiten sitzt vorne auf der Stirne und zeichnet sich vorzüglich durch ihre halbmondförmige Gestalt aus. Sie bildet nemlich in der Mitte eine starke Wulst, die auf jeder Seite in ein dickes, kurzes, nach oben gekehrtes Horn ausläuft. Um den, gleich unter jener Wulst hervortretenden Saugrüssel, bemerkt man einen starken Hakenkranz, der aus zwölf, immer paarweise und symmetrisch vertheilten Haken oder Stacheln von ungleicher Grösse besteht, und Herrn Professor *Lenz* bewog, diesem Wurm den Namen Kronenmaul zu geben. Zwey aufgeworfene Lippen umziehen die weite, querlaufende, eyrunde Öffnung des Mundes, welche im Rachen in eine feine Spalte zusammenfließt. Beynahe eben so ungleich und höckericht, wie der Kopf (Fig. 6. a.), ist der ganze Körper des Wurms, dessen Rückenfläche ebenfalls eine Menge überaus feiner und scharfer Stacheln deckt. Vierzehn Einschnitte bilden am Körper eben so viele Ringe von ungleicher Breite, wovon die sieben vorderen auf jeder Seite mit zwey kleinen, aneinander hängenden Erhabenheiten, an der Bauchfläche hingegen nur mit einer solchen warzenförmigen Erhabenheit besetzt sind. Das Schwanzende aber bildet eine obere, etwas gekrümmte, und eine untere, mehr grade auslaufende Spitze.

5. Der Kegelwurm. Tab. VII. Fig. 9 — 12.

Ascaris Conosoma, papillis in capite obtuso duabus, incisuris corporis decem, cauda simplice. Habitat in canale intestinali.

Die kegelförmige Gestalt dieses Wurms (Fig. 9.) gab die Veranlassung zu obiger Benennung. Er ist kleiner und dünner, als der vorhergehende, etwan an sei-

seinem breiten Theil eine Linie breit und überhaupt neun Linien lang. Sein sphärischer Kopf (Fig. 11.) führt in der Mitte zwey erhabne, Augen gleichende Punkte, welche aber in einiger Vergrößerung (Fig. 12. a. a.) eine warzenförmige Gestalt annehmen und in der Mitte noch mit einer kleineren, dunkelbrauneren, linsenförmigen Erhabenheit versehen sind. Der Körper selbst ist, wie der Kopf, größtentheils glatt, milchweiß und aus zehn Ringen zusammengesetzt, die in ihren Zwischenräumen von zwey erhabenen Linien reifförmig von unten nach oben umzogen werden, hier aber mit kleinen Häufchen, traubenartig vereinigter und mit borstigen Härchen bewachsener Körner bedeckt sind. Diese Körner nehmen von vorne nach hinten in dem Verhältnisse der Ringe ab. Am zahlreichsten, und in doppelter Reihe hinter einander, umziehen sie in einem halben Bogen die Rückenfläche des Zwischenraums zwischen dem Kopfe und dem ersten Ringe (Fig. 10 und 12 b). Der Schwanzring zeichnet sich noch durch eine, unten etwas knotichte, und nach oben gekrümmte Spitze (Fig. 10. c.) aus. Übrigens aber ist sowohl von dieser, als von der vorhergehenden Askaridenart nichts bekannt geworden, was über ihre Naturgeschichte mehr Licht hätte verbreiten können, und nie glückte es dem Herrn Professor *Bretschneider* in der Folge mehr diesen Wurm aufzufinden, ungeachtet er keine, der sich öfters sowohl in der klinischen Anstalt, als in seiner Privatpraxis darbietenden Gelegenheiten zu Untersuchungen dieser Art, vorbegehen ließ.

6. Der Lymphgefäfs-Hakenwurm. Tab. VI. Fig. 9 — 12.

Hamularia lymphatica, corpore lineari, teretiusculo, capite obtuso, infra duobus hamulis prominentibus instructo. *Treutleri* Auctarium ad helminthologiam humani corporis, p. 10. de vermibus filiformibus in glandulis conglobatis bronchiorum repertis. Habitat in vasis lymphaticis.

Treutlers sorgfältigen Bemühungen um die Bereicherung der Helminthologie des thierischen Körpers, ist es gelungen, auch ausserhalb dem menschlichen Darmkanale eine Rundwurm-gattung zu entdecken. Er fand in dem Leichnam eines Schwindsüchtigen von 28 Jahren, die Lungen voll Knoten, welche schon zum Theil in Eiterung gegangen waren, die Luftröhrendrüsen wohl um den dritten Theil grösser, als gewöhnlich und ihre Saugadern so widernatürlich ausgedehnt, daß man durch ihre Häute fremde Körperchen durchschimmern sah, von welchen sie aus ihrer eigentlichen Lage in den Drüsen gebracht worden waren.

Bey

Bey näherer Untersuchung zeigten sich sowohl in den Lymphgefässen der Oberfläche, als in der inneren Drüsensubstanz, fadenförmige Würmer. Vorzüglich waren hiermit vier Drüsen (Tab. VI. Fig. 9. *e. f. g. h.*) angefüllt, wovon die grösste (*e.*) vorne und unten über der Theilung der Luftröhre saß. In den Lymphgefässen selbst konnte man keine Valveln mehr entdecken (Fig. 10.), welche durch die Würmer theils vernichtet, theils unbrauchbar gemacht worden waren. Hierdurch wird es aber wahrscheinlich, daß jene Würmchen oder ihre Eyer durch die zuführenden Gefässe in die Drüsen gekommen sind. Denn wären sie auf dem entgegengesetzten Weg durch die ausführenden Gefässe dahin gelangt; so würden jene Valveln nicht so unkenntlich geworden, sondern unverändert geblieben seyn, da der Lauf der Flüssigkeiten und das Eindringen der Würmer in einer den Valveln entgegengesetzten Richtung, auf keine Art möglich zu seyn scheint. In diesen Lymphgefässen lagen bisweilen zwey Würmer neben einander, öfters zwey hinter einander, und zwar so, daß das Kopfende des einen das Schwanzende des andern berührte. Alle aber hatten sich mit ihren zwey Kopfhäkchen so fest an die dünne Haut der Saugadern angeklammert, daß es äusserst schwer hielt, diese Würmer davon loszumachen, ohne ihre Häkchen zu beschädigen und abzureissen.

Die Länge eines solchen Wurms (Fig. 10. *a.*) betrug bald mehr, bald weniger, als einen Zoll. Ihre Gestalt war rund, doch von beyden Seiten etwas zusammengedrückt und nach vorne etwas schmaler, als nach hinten, ihre Farbe weiß und hin und wieder (Fig. 11. *c. c. c. c.*) schwarz gefleckt. Das stumpfe Kopfende (Fig. 11. *a.* und Fig. 12.) hatte an der untern Fläche zwey bewegliche Häkchen, übrigens aber war der ganze Körper einförmig und das Schwanzende (Fig. 11. *b.*) wenig zugespitzt. Sobald sie todt waren, erschienen sie am Vorderende einwärts, am Hinterende aufwärts gekrümmt, wie sie in der Abbildung (Fig. 21.) vergrößert vorgestellt worden sind.

Dritter Abschnitt.

Bandwürmer, Taeniae.

- Acharius, *Animadvers. quaed. de Taenia*, Lundae 1782.
- Aegineta (Paulus) *Lib. IV. C. 57.*
- Aetii *Tetrabibl. III. Serm. 1.*
- Andreae, Gaj. *de Taenia*, Groningae 1768.
- Andry, vers solitaires et autres dont il est traité dans le livre de Mr. Andry de la generat. d. Vers, representes en plusieurs planches, Paris 1718. Ejusd. *Epist. ad Bagliv. Hujusq. respons. de Lumbr. lat. in Bagliv. oper. Antwerp. 1734. p. 687.*
- Aristoteles, *Hist. animal. L. V. C. 9.*
- Augenii, H. *hist. viri, qui vermem cucurbitinum deiecit longitudine cubitorum 25, in Epist. et Consil. T. II. L. VI. p. 530.*
- Baldingers neues Magaz. B. VII. St. 3. S. 193 und 197. B. XIII. St. 2. S. 148.
- Batsch, A. J. *Naturgesch. der Bandwurm gattung mit 5. Kupf. Hall. 1786.*
- Beddeus, *Diss. d. verm. Taenia dicto. Vienn. 1767.*
- Berlinische Samml. B. II. S. 453. vom Bandwurme, B. VII. S. 510. Mittel wider den Bandwurm. B. VIII. S. 345 und 401. von dem Nuferischen Mittel.*
- Biblioth. raison. T. XII. p. 33. von einem Bandwurme, der aus einem Absceß in der Leiste gegend hervorkam.*
- Binet, *Notae sup. Taen. in Vanderm. Journ. V. 34. p. 217.*
- Bisset, *de Taenia eamq. expellendi methodo, in ejus Medical Essays and Obs. 1766. p. 186.*
- Blochs Abb. v. d. Erz. der Eingeweidewürmer, S. 7. 8. 12. 31. Beschreib. der Bandw. S. 15.
- Boerhave, *Praelect. in propr. inst. rei med. T. VI. p. 180.*
- Boetticher, J. G. *d. verm. ex gen. Solior. 21 ulnar. longitud. aequante in Act. N. C. V. VII. Obs. 20. p. 63.*
- Bohnet *Diss. de verm. Taen. dict. in Mem. de Math. et Phys. T. I. p. 478. Ejusd. Nouvelles recherches sur la structure du Ténia. Journ. d. Ph. T. IX. 1771. Avril. p. 243.*
- Borde, *Obs. d. Taen. Roux. Journ. d. Med. V. 31. p. 35.*
- Borrichius, *Ol. de lumbr. lat. et cucurbit. in Act. Hafn. Vol. II. Obs. 47. p. 148.*
- Cazelles *Obs. d. verm. solitar. Roux Journ. T. XXIX. p. 26. c. f.*
- Clauder, G. *Lumbr. lat. Hist. Eph. N. C. D. II. an. 6. Obs. 192. p. 383.*
- Clerici *Hist. lat. lumbr. p. 153.*
- Cocchi, A. *Discorso sopr. i verm. cucurb. dell' Uomo, Pisa 1758.*
- Cohausen, D. S. E. E. *lumbr. lat. et cucurb. spec. Act. N. C. V. IX. p. 34.*
- Consolin *de verm. cucurb. in Roux. Journ. T. XX. p. 445.*
- Coulet, St. *Disput. med. d. Ascar. et lumbr. lat. L. B. 1728. 4.*
- Cusson, *remarques pratiques sur le Tenia, Journ. de Phys. T. XXII. 1783. Febr. p. 133.*
- Dionis, C. *Diss. sur le Taenia, ou Ver plat. Paris 1749.*
- Doeveren (W. van) *Observ. physico-medical. sur le ver solit. ou Tenia. Lyon. 1764. Dessen Abb. von den Würm. Leipz. 1776. S. 65.*
- Espiaud, *Epist. de duabus Taen. et usu Nuffe-riani specifi. Roux Journ. V. 47. p. 139.*
- Fabricii Hild. *Obs. d. lumbr. lat. in Obs. chir. Cent. II. Obs. 70 — 73. Genev. 1611. p. 268.*
- Faulhaber, *Gesch. und Abbild. eines Bandwurms in Gefsners Samml. v. Beobacht. aus der Arzneigel. B. III. n. 3.*
- Fehr, in *Hiera picra. p. 1251.*
- Fischer, *Taen. Hyd. p. 4. de Taen. intestinali.*
- Fontani, N. *Obs. analect. Amstel. 1641. p. 23. Utrum in intest. vermes cucurb. generentur.*
- Françus, G. *de verm. cucurb. in infante, Eph. N. C. Dec. II. ann. 5. Obs. 221.*
- Fränkische Samml. B. VIII. S. 480. vom Bandwurme.*
- Frisch, J. L. *de Taen. capitata et variis animal. Miscell. Berol. Vol. IV. p. 395. Vol. VI. p. 121. 129.*
- Geischlögger, A. *Bemerk. über Würm. u. Wurmmittel in Hufsl. Journ. B. X. St. 3. S. 157.*
- Gleichen, W. v. *Zergliederung und Mikroskop. Beobacht. des Band- und Kürbisw. Beschäft. d. Berl. naturf. Gesellsch. B. IV. S. 203.*
- Gontard, *de Taenia in Vandermonde Journ. V. V. p. 284.*
- Göze, N. G. *d. Eingeweidewürm. S. 268, derselb. v. d. Taenia in den neuest. Mannichfalt. Jahrg. I. S. 710.*
- Haen (de) *Ratio medend. T. XII. Cap. de lumbrico lato, p. 218.*
- Heide (A. de) *lumbric. lat. anatome, in ej. Ex- per. circa sanguin. mission. Amst. 1686. p. 49.*
- Hippocrates *de Morb. L. IV. p. 510.*
- Hückel *Obs. de colic. verm. c. Taeniis excret. Comm. Litt. N. 1742. p. 279.*
- Jacobaeus *de lumbr. lat. et cucurb. Act. Hav. Barthol. V. II. p. 143.*
- Jacquet *extrait d'une lettre écrite a Briancou 1718 au sujet d'un ver solitaire de 7. aunes, Journ. d. Scav. T. 64. p. 247.*
- Journ. des Scav. 1752. Aout. p. 194. Obs. de Taenia.*

- Jungius, J. de vermib. lat. Epist. in Greg. Horstii Obs. L. IV. p. 506. Ulm. 1625.
- Kaltschmied, C. F. de verm. et praec. d. Taen. (Resp. Jaenisch) Jenae 1755. Ejusd. Progr. d. Taen. Jen. 1766. c. Tab.
- Klein Herpetolog. Tent. access. Unzeri Obs. d. Taen. Leidae 1755.
- Kniphof, de Pedic. ing. §. XII.
- Koenig, E. de ore et probosc. verm. cucurbit. Act. Helvet. Vol. I. p. 27.
- Laborde Obs. d. Taen. Roux. Journ. V. 31. p. 35.
- Lagene remed. contr. Taen. Roux. Journ. V. 45. p. 220.
- Lancisius, J. M. quod Taen. lumbric. sint poly-
pi intest. in Oper. Genev. 1718. V. II. p. 268.
- Lengsfeld, J. Besch. d. Bandw. und deren Heil-
mittel, Wien 1794.
- Limburg, J. Ph. Obs. de Asc. et cucurb. potiss.
de Taen. Phil. Trans. V. LV. p. 126. c. Fig.
- Lindemann, Wirk. d. Zinnfeile gegen d. Bandw.
im Wittenberg. Wochenbl. 1791. S. 53.
- Linnaei Diss. de Taenia (Resp. G. du Bois) Ups.
1748. c. Tab.
- Lister of the Lumbr. lat. and cucurb. Phil. Trans.
n. 95. p. 6062. B. I. p. 430.
- Marx, M. J. vermischte Beob. Samml. II. von ei-
nem durch Zinn abgetrieb. Bandw. S. 4.
- Matthieus Mittel wid. d. Bandw. in Formeys me-
dicinisch. Ephemerid. von Berl. B. I. Heft 2. S. 118.
- Mem. lit. crit. pour serv. al'hist. de Med. Paris 1775.
t. n. 13. de remed. Nuffer.
- Monardi Epist. Med. Lib. IV. C. 1.
- Moulénq et Baumer de Taenia. Roux Journ.
V. LVI. p. 330 et 406.
- Müller Lettre aux auteurs du Journal sur les Taen.
d. différ. anim. Jour. d. Phys. T. XXI. 1782. suppl.
p. 39.
- Müller vom Bandw. Naturf. St. 14. S. 129.
- Neuhold, J. J. de inextirpabil. lat. verm. proge-
nie Act. N. C. V. III. p. 159.
- Pallas Diss. de inf. viv. p. 274. Bemerk. über d.
Bandw. in Menschen und Thieren, N. Nord. Beytr.
B. I. p. 39. c. F. Einige Erinner. d. Bandw. betreffend.
Ebendas. B. II. S. 58.
- Palmer, Diss. d. verm. intest. in Thes. Med.
Edinb. 1775. T. III. p. 38. de Taenia.
- Précis du Traitement contre le Ténia pratique à Mo-
rat en Suisse, examiné et approuvé à Paris, publié
par ordre du Roi, Paris 1775 (handelt vom Nuffer-
schen Mittel.)
- Postel de Franciere Obs. d. Taen. in Van-
derm. Journ. V. XVIII. p. 416.
- Rathier remed. in debelland. Taen. efficaciss. in
Roux Journ. V. XXVIII. p. 44.
- Ravatons Abh. vom breiten Bauch- oder Bandw.
aus dem Mercure de France 1756. p. 146. übers. von
Krünitz in Cartheusers vermischten Schriften, St. III.
S. 199.
- Robin de Taen. Roux Journ. V. 25. p. 222.
- Roederer, J. G. Progr. de Taen. Götting. 1760.
- Rosen, N. Untersuch. v. Bandw. in den Abh. d.
Schwed. Akad. B. IX. S. 129. B. XXII. S. 159.
- Rosenblad, E. Diss. d. Taen. (Resp. Acharius)
Lundini 1784.
- Rougere (M. de) Obs. tres de Taen. in Roux
Journ. V. XXIV. p. 521.
- Roux Journ. V. 44. p. 322. de Taenia propellenda.
Rozier Observat. T. XII. p. 229. (Ein Bandwurm
zwischen den Gedärm. und dem Netze.)
- Sarazeni, Ph. de lat. Lumbr. in Hilden. Obs. Chir.
1611. Cent. II. p. 268.
- Schachen, P. G. Diss. d. Taen. (Resp. Hahn)
Lips. 1717. 4.
- Schenck (Joh. a Grafenberg) Lib. III. Obs. med.
108.
- Schulze, S. de Lumbr. lat. Eph. N. C. Dec. I. ann.
3. Obs. 229. p. 357.
- Schwartz, S. H. J. Diss. d. Virt. Cort. Geoffrae
surinamens. contr. Taen. Goeth. 1792.
- Selle, Medicina clinica. p. 197.
- Sibbern, Obs. d. Taen. op. Stanni rasi expulsa;
in Collect. Hauniens. V. II. p. 116.
- Siblot de Taenia; Roux Journ. X. LX. p. 22.
- Simmons account of the Taen. or loog tapeworm.
Lond. 1778.
- Spöring, H. D. Bericht einer Frau, bey der ein
Stück Bandw. durch ein Geschw. im Unterl. gegangen
ist; in den Abh. d. Schwed. Ak. 1747. S. 117.
- Stromaieri et Widemanni Epist. d. lumbr.
lat. in Greg. Horst. Observ. p. 499 et 507.
- Thaddaeus Dunus in Misc. med. C. XV.
- Thomas Obs. d. Taenia; Roux Journ. V. XXIII.
p. 68.
- Tyson, E. de lumbr. lat. in Philos. Trans. n. 146.
p. 113. B. II. p. 185. c. f. Leskens Uebers. B. I. Th.
I. S. 101.
- Unzer, J. A. Obs. de vermib. cucurbit. Hamb.
Mag. B. VIII. p. 312. Ebendesselb. Obs. d. Taenii in
Kleinii Herpetol. exam.
- Valentini, M. B. de verm. lat. per intervalla eject.
Act. N. C. ann. X. p. 119.
- Valisnieri, de Taen. in Oper. T. III. p. 319.
c. Fig.
- Wagner, R. de verm. fascial. 12 ulnar. per alv.
excreto Nov. Lit. Mar. Balthic. p. 300.
- Weben, C. Obs. d. Taen. in ej. Obs. med. Fasc. I.
1764. p. 32.
- Weigels neue Method. d. Bandwürmer abzutrei-
ben, in Hufel. Journ. der prakt. Heilk. B. I. St. 3.
S. 439.

Welsch, G. H. de lumbr. lat. ulnar. longitud. Eph. N. C. Dec. I. ann. 8. Obs. 221.

Werlhof, C. G. d. lumbr. lat. Comm. L. Nor. 1734. p. 371.

Werner, verm. intest. p. 15. 43. 44.

Winkler, G. C. de lumbr. lat. Eph. N. C. Dec. I. an. 6 et 7. Obs. 104. p. 142.

Zeders erster Nachtrag, S. 206. 221 und 223. Kettenwürmer.

Zu den Bewohnern des menschlichen Darmkanals gehört noch ein überaus sonderbares und den Naturforschern lange Zeit räthelhaft gebliebenes Thiergeschlecht, welches, ausser dem Menschen, auch vielen Säugthieren, Vögeln, Fischen und Amphibien eigen und unter den Namen *Gliederwurm*, *Bandwurm*, *Nestelwurm*, *Kettenwurm*, Ελμινσ πλατῆια, Κερία, Ταυία, *Taenia*, *Lumbricus latus*, *Ver plat*, *Ver solitaire*, *Jointed worm*, *tape worm*, in Schweden aber unter dem Namen *Ficken* und in Finnland unter dem Namen *Finck* bekannt ist. Die Alten hatten von demselben sehr irrige Begriffe. *Hippokrates*, oder vielmehr der Verfasser der ihm untergeschobenen vier Bücher von den Krankheiten und *Aristoteles* sahen die einzelnen abgegangenen Glieder des Bandwurms für dessen Eyer an, *Ätius* und *Paulus Ägineta* aber hielten ihn für eine Ausartung der inneren Darmhaut in einen gewissen lebendigen Körper, der am Magen beständig nage und einen Heißhunger veranlasse. Diesen und anderen Meinungen hiengen noch viele in den späteren Zeiten an; so wie man sich überhaupt in Rücksicht der verschiedenen Theile dieses Wurms, seiner Entstehung, Fortpflanzung und seines ungewöhnlich langen Lebens, in mancherley Behauptungen, Erklärungen und Erdichtungen erschöpfte. Einige machten ihm den Kopf streitig oder hielten das Kopfbende für das Schwanzende, oder setzten ihn gar unter die Thierpflanzen, weil sie sich immer nur mit der Untersuchung abgerissener Stücke ausserhalb dem Wohnorte des Wurms begnügten. Andere waren ungewiß, ob der Bandwurm ein einziger oder eine Kette von Würmern sey, weil sie in jedem abgerissenen Gliede noch Bewegung wahrnahmen. Viele glaubten, daß er durch die Muttermilch, viele, daß er durch Speisen und Getränke überhaupt in unseren Körper gelange, die meisten aber wurden durch die beträchtliche Länge des Wurms verleitet, zu behaupten, daß der Bandwurm ein Thier sey, welches nicht aufhöre zu wachsen, und daß, wenn auch nur ein einziges Glied von demselben im Darmkanale zurückbliebe, aus diesem Gliede immer wieder der nemliche Wurm entstehe, und daß mithin sein Wachsthum und Alter keine Grenzen habe.

Den Geschlechtscharakter der Darmbandwürmer bestimmt eine Kette von mehr oder weniger breiten und langen, plattgedruckten Gliedern, wovon jedes seine eignen Eingeweide hat, und welche am Kopfe klein anfangen, gegen das Schwanz-

Schwanzende aber immer grösser werden. Die besonderen Unterscheidungszeichen der einzelnen Gattungen aber gründen sich auf die verschiedene Bildung des Kopfs, die besondere Gestalt und Verbindung einzelner Glieder, die Eingeweide jedes Glieds und den Stand der Eyergangmündungen oder Saugmündungen. Die menschlichen Darmbandwürmer sind nach allen diesen Stücken verschieden von den Darmbandwürmern anderer Thiere und können nie ausserhalb dem Gedärme des Menschen leben, in diesem aber nicht nur einzeln, sondern in grösserer Anzahl und in Gesellschaft anderer Darmwürmer vorhanden seyn. *De Haen* erzehlt, daß er einmal zwölf und ein andermal in dem Leichname einer Weibsperson achtzehn Bandwürmer gefunden habe; *Nitert* aber meldet in einem Schreiben an *de Haen*, daß er von einem Knaben in zwey Tagen siebenzehn Bandwürmer habe abgehen sehen. Nicht weniger führt *Werner* das Beyspiel einer Frau an, welche innerhalb einem halben Jahre von ein und zwanzig Bandwürmern befreyt worden ist, und versichert sogar, den Einsiedler, welcher doch der Idee, daß er nur einmal in einem Darmkanale vorhanden seyn könne, seinen Namen verdankt, sehr selten allein, sondern fast immer in Gesellschaft mehrerer Bandwürmer, auch wohl der Spulwürmer und Haarschwänze gefunden zu haben.

Die Farbe der menschlichen Darmbandwürmer ist ganz weiß, oder etwas ins Gelbe fallend und scheint überhaupt von ihrer Nahrung abzuhängen, welche der Milchsaft im dünnen Gedärme ist. Ihre Länge wird von verschiedenen Beobachtern verschieden und öfters unglaublich groß angegeben. Man findet hiervon Beyspiele bey *Augenius*, *Borrichius*, *Thaddaeus*, *Clericus*, *Rosen* und *Boerhave*. Letzterer will einen Bandwurm von dreyhundert Ellen von einem Russen abgetrieben haben. Wahrscheinlich sah er aber, als Anhänger der alten Meinung von dem nur möglichen Daseyn eines einzigen Bandwurms in einem Menschen, die abgegangenen Stücke mehrerer Bandwürmer für Theile eines Wurms an; denn es ist nicht glaublich, daß die Natur, welche im Wachsthum keines Thiers ein gewisses Maas überschreitet, blos bey den Darmbandwürmern eine Ausnahme gemacht haben sollte. Auch stimmt dieses ganz mit *Werners* Versicherung überein, der unter allen ihm vorgekommenen Bandwürmern keinen fand, welcher über neun Ellen lang gewesen wäre.

In Rücksicht der Bewegung hat man den Biegungen und Bewegungen, welche einzelne abgegangene Glieder, und ganze Gliederstrecken oft noch Stunden lang, besonders in lauem Wasser fortsetzen, auf die Bewegung des ganzen Wurms geschlossen, um so mehr, da selbst die Empfindung der mit diesem Wurm behaf

hafteten Kranken, diese Meinung unterstützte. Diese klagen nemlich öfters über ein den Krümmungen des Darmkanals folgendes, bisweilen äusserst schmerzhaftes, wellenförmiges Fortrücken oder Kriechen, welches auch *van Döveren* bewog, die Bandwürmer unter die kriechenden Thiere zu zehlen.

Was das Wachsthum dieses Wurmgeschlechts betrifft, so erfolgt es keinesweges, wie *Linné* und andere Naturforscher glaubten, durch das Ansetzen oder die beständige Erzeugung neuer Glieder; sondern durch das allmähliche Fortschieben, Entwickeln und Vergrössern der schon am Kopfe des Wurms anlageweise vorhandenen und als kleine Linien sichtbarer Glieder. Die Darmbandwürmer haben nemlich das Eigene, daß sie nicht, wie andere Geschöpfe in allen Theilen ihres Körpers verhältnißmässig und gleichzeitig an Grösse und Vollkommenheit zunehmen; sondern daß die Glieder am Kopfe lange in einem unausgebildeten Zustande bleiben, sich aber immer mehr und schneller entwickeln, je mehr sie sich vom Kopfe entfernen, bis sie endlich an den Theil des Wurmes gelangt sind, wo sie mit der größten Länge und Breite den höchsten Grad ihrer Vollkommenheit und Ausbildung erreicht haben, und wo sie sich sodann von freyen Stücken von den noch weniger ausgebildeten, oder unreiferen Gliedern abzusondern und unter den Exkrementen ihren Ausweg durch den Mastdarm zu nehmen pflegen. Diese sonderbare Eigenschaft der Darmbandwürmer hat zur nothwendigen Folge, daß das Abtreiben grosser Gliederstrecken vom hinterem oder reiferem Theile des Wurms nichts fruchtet, wenn das Kopfe unverletzt zurückbleibt, weil die Entwicklung seiner unvollkommenen Glieder hauptsächlich von der Verbindung mit dem die vorzüglichsten Organe der Ernährung und des Lebens enthaltenden Kopfe abhängt und der mit letzterem in Verbindung stehende, im Körper zurückgebliebene Wurmtheil bald wieder eine Länge erreichen kann, welche der ehemaligen Länge des ganzen Wurms gleichkommt. Durch diese eigenthümliche, vom Kopfe abhängende Entwicklungsart, wird auch die Meinung derjenigen widerlegt, die jedes von der übrigen Gliederkette des Wurms getrennte und im Darmkanal zurückbleibende Glied für fähig halten, über lang oder kurz zu einem neuen Bandwurme heranzuwachsen.

Den größten Schwierigkeiten bleibt noch die Erklärung von der Fortpflanzungsart der Bandwürmer unterworfen. In allen Gliedern der Darmbandwürmer, nur die feineren, und unentwickelten am Kopfe ausgenommen, macht das Mikroskop eine grosse Menge solcher Körperchen sichtbar, welche Eyern gleichen. Von diesen Eyern erscheinen die in den weniger ausgebildeten Gliedern

befindlichen, nur in den ersten Umrissen, die in den ausgebildeten Gliedern aber als ungleich grössere und dunklere Flecken. Letztere halten die Helminthologen für reife Eyer und *Bloch* versichert, daß Bandwürmer, welche noch nicht vier Monate alt sind, schon dergleichen vollkommene Eyer führen. Hierbey bleiben jedoch immer zwey nicht unerhebliche Fragen zu beantworten übrig: 1) ob nemlich diese Eyer als besondere Keime anzusehen sind, welche nicht, wie bey den bekannten Fortpflanzungsarten, einer Befruchtung zu ihrer Entwicklung bedürfen; sondern durch eine ihnen selbst, oder dem Wurm beywohnende innere Kraft immer vollkommener werden, bis sie endlich den Grad der Reife erreicht haben, der ihren Aufenthalt im Körper der Mutter überflüssig macht, sie bestimmt aus demselben ihren Ausgang zu nehmen, nur für sich in Wurmgestalt fortzuleben und zu wachsen? oder 2) ob sie wirklich eine Befruchtung zu ihrer Entwicklung nöthig haben, und ob hierzu zweyerley Geschlechter vorhanden, oder die zur Befruchtung erforderlichen Organe in einem Wurm vereinigt und die Darmbandwürmer mithin Hermaphroditen sind? Für erstere Meinung stimmen *Zeders* Beobachtungen, nach welchen sich die reiferen Glieder der Darmbandwürmer vom übrigen Körper trennen, durch ihre Bewegungen die reifen Eyer ausschütten, diese im Darmschleime ausgebrütet werden, und sich in der Folge auch da ernähren; für letztere Meinung, die vom *Werner* bey dem langgliedrichten Bandwurme entdeckten Organe, welche eine eigene Befruchtung zulassen und die Wahrscheinlichkeit der Selbstbefruchtung zur Gewißheit erhöhen würden, wenn auch bey andern Darmbandwürmern ähnliche Zwittergeschlechtstheile zu entdecken und die kleinen schreg lautenden Gänge, welche in jedem Eyer enthaltenden Gliede zu bemerken sind, nicht eben sowohl für Ausführungskanäle, oder Saugröhren angesehen werden könnten.

Anlangend die mancherley Beschwerden und Zufälle, welche die Darmbandwürmer veranlassen können; so haben sie mit denjenigen anderer Eingeweidewürmer gemein, daß sie bey manchen Personen unmerklich, bey anderen überaus heftig sind. Eine Frau, welcher ich in der Folge den langgliedrichten Bandwurm mit der in starken Gaben angewandten salzgesäuerten Schwererde abtrieb, und von welcher vorher viele Jahre lang, öfters einzelne Glieder abgiengen, klagte bey ihrer vom Geiz bestimmten, überaus einfachen Lebensart, über nichts, als bisweilen über ein unbedeutendes Drücken in der Nabelgegend. *Bloch* und *Lengsfeld* bestätigen eben dieses und versichern sogar, daß der Bandwurm vorhanden seyn könne, ohne die geringste Unbequemlichkeit zu verursachen. Öfters unter-

terscheiden sich aber die mehr oder weniger heftigen Zufälle nicht von denjenigen, welche auch andere Würmer veranlassen können. Die mit dem Bandwurm behafteten Personen haben z. B. unordentlichen Appetit, werden öfters von Ohnmachten, Schwindel, Convulsionen, Epilepsie, Veitstanz und anderen Nervenzufällen befallen, oder sie magern nach und nach ab und bekommen die Schwindsucht. Bey andern aber wird man mit und neben ähnlichen Zufällen, oder auch ganz ohne dieselben, doch gewisse eigenthümliche Merkmale gewahr. Sie bemerken nemlich auf das Drücken bey'm Stuhlgang, auf die Anstrengung bey'm Brechen oder die Erschütterung bey'm Niesen, eine wellenförmige Bewegung, und auf dieselbe eine Kälte im Unterleibe oder Rücken, als ein Kennzeichen, daß der Wurm aus einem Theile des Darmkanals in den andern wandert. *Lengsfeld* gedenkt noch der Empfindung, als ob eine Schnur von dem Magen nach unten, oder von der rechten nach der linken Seite angespannt wäre, und einer so grossen Gefühllosigkeit der ganzen linken Hälfte des Körpers, daß der Kranke in die leidenden Theile stechen und schneiden konnte, ohne etwas zu fühlen und mehr als höchstens einige Tropfen schwarzes Blut aus den in wenig Tagen heilenden Wunden zu verlieren. Viele an Bandwürmern Leidende bemerken auch öfters die Empfindung des Saugens in verschiedenen Gegenden des Unterleibes. Bey andern aber äussert sich diese, oder eine ähnliche Empfindung immer unverändert an der nemlichen Stelle. So fühlte eine Frau gewöhnlich gleich nach Tisch und ausserdem Abends um drey oder vier Uhr ein Greifen in der Gegend des Nabels, wobey sich letzterer einwärts zog. Dieses Greifen wurde immer schmerzhafter und es überfiel sie hierauf ein Schauer, auf welchen Hitze folgte. Sobald der Frost nachliess, empfand sie ein Drehen im Leibe von unten nach oben und ein Dämmen gegen die Brust, wobey es ihr den Athem versetzte. Diese Zufälle kamen richtig immer zu der nemlichen Zeit und nach gleichen Veranlassungen z. B. aufs Biertrinken wieder. In der Nacht störten sie häufig den Schlaf. Die Person war dabey sehr abgezehrt und klagte beständig über Leibesverstopfung. Mehr von den Bandwurmfällen findet man bey'm *Pallas*.

Da die gegen die Spulwürmer und Pfriemenschwänze gebrauchten Mittel, wenig oder gar keine Wirkung auf die Bandwürmer äusserten, so war man schon lange darauf bedacht, ein specifisches Mittel gegen letztere zu entdecken. Zur Zeit aber verdient noch keines der dafür ausgegebenen diesen Namen. Denn obgleich durch die *Lagenische*, *Nuffersche*, *Schmuckersche*, *Herrnschwandtsche*, *Clossius-Waglerische*, *Odiorsche* und *Matthieusische* Methode vielfältig Bandwürmer abgetrie-

getrieben worden sind; so sind sie doch keinesweges unfehlbar. Sie beruhen bloß darauf, den Bandwurm durch drastische Purganzen mit einem Male fortzustürmen; denn die übrigen dabey anzuwendenden Mittel und zu beobachtenden Nebendinge, sind wohl, wie auch *Selle* und *Bloch* bemerken, ohne wesentlichen Nutzen. Von ähnlicher Wirkungsart ist wahrscheinlich auch das *Lengsfeldische* Arkan, welches der Erfinder für 30 Gulden ausgedoten hat. Über diese drastische Methode, welche die Dauungskraft mehr, als die heftigste Dysenterie schwächt, hierdurch die Schleim- und Wurmerzeugung nur noch mehr begünstigt, oft die schmerzhaftesten Hämorrhoidalbeschwerden nach sich zieht, bey empfindlichen, zu Krämpfen geneigten Personen durchaus nicht anwendbar ist, und übriges noch das Abreissen und Zurückbleiben des auf angebrachte starke Reize oft die flockichte Darmhaut durchbohrenden und in den darauf folgenden Darmhäuten sich ansaugenden Kopfendes bewirkt, scheint man aber die langsame Kurart, welche *Weigel* neuerlich empfohlen hat, ganz aus der Acht gelassen zu haben. Diese besteht nun darinnen, durch den mehrere Monathe, in Verbindung mit Visceralmitteln, fortgesetzten Gebrauch auflösender Salze, den, den Wurm schützenden Schleim zu zerstören und ihn durch diesen, auf ihn selbst anhaltend wirkenden Reiz so zu schwächen, daß er endlich genöthiget wird, mit seinen Saugorganen loszulassen und seinen Abgang zu nehmen. Am meisten wird man mit diesem Verfahren gegen den hartnäckigen, langgliedrichte Bandwurm ausrichten. Sollte uns vollends, wie uns *Geischlögers* Versicherung erwarten läßt, die versprochene Bekanntmachung seiner Heilart sogar die den Kranken ermüdende, längere Dauer dieser Methode abkürzen helfen; so würde in dieser Rücksicht nichts zu wünschen übrig bleiben.

I. Der langgliedrichte Bandwurm. Tab. III.

Taenia Solium, osculis marginalibus alternatis. Linn. Amoen. acad. Vol. II. p. 74.

Tab. I. F. 1. Syst. Nat. T. I. P. VI. p. 3064. n. 1. Faun. Suec. 2264.

Taenia articulata teres. Habitat in canale intestinali.

Aldrovandi insect. L. VI. p. 652. T. I.
 Andry v. Erz. d. Würm. Kap. III. S. 66. *Der Bandwurm ohne Rückgrath, Ver solitaire sans epine.*
 Aristoteles, Hist. anim. L. V. C. 19.
 Batsch, Naturg. der Bandwurmgatt. S. 114. n. 3.
 F. 1—9. 9—11. 21—23 und 53.
 Bartholinus in Act. Havniens. II. p. 148. 3. p. 116.
 Berlin. Beschäft. 4. S. 203. T. 4. F. 10—13.
 Beverw. Thes. p. 202. T. 202. F. 3.

Blochs Abb. von der Erz. der Eingeweidew. S. 20 n. 20. *Der Kürbiswurm.*
 Blumenbachs Handb. der N. G. S. 414. n. 1. Tab. I. F. 5. *Der langgliedrige Bandwurm.*
 Bonnet Mem. prés. à l'acad. de Par. I. p. 511. et Journ. d. Phys. 1777. apr. p. 277. *Taenia à anneaux longs*; Desselb. Abh. aus d. Insektolog. v. Göße, S. 61. *Taenia articulata longioribus.*
 Clerici Hist. lat. lumbr. Genev. 1714. Tab. I. A. B. Cou-

- Coulet Diss. d. Ascarid. et lumbr. lato. L. B. 1728.
 Cuvier Tableau élémentaire p. 635, *le Cucurbitain*.
 Dionis, Diss. de Taenia. *Taen. articulos demittens*.
 Ernst, Diss. de *Taenia secunda Plateri*, Basil. 1743.
 Frank, G. von kürbiskernähnlichen Würm. bei einem Kinde in den Abh. d. k. A. d. N. F. Th. XV. S. 410. (Einem noch an der Brust trinkenden Kinde von 1 Jahre 2 Monathen, wurde ein 3 Ellen langes Stück dieses Bandw. abgetrieben.)
 Fischer, *Taen. hydat. in plex. chor.* p. 14. n. 1. *Taenia longe articulata*.
 Gleichen in den Besch. Berl. Naturf. IV. S. 203. T. VI. Fig. 10—13.
 Göze, Vers. einer N. G. d. Eingeweidw. S. 264. *Der langgliedrichte Bandwurm*.
 Haen, Rat. med. P. XII. C. 5. S. 210. *Lumbricus latus*.
 Hayd, Exper. 47. T. 47. *Lumbr. latus*.
 Hill, Hist. anim. p. 16. *Sicyonia*.
 Kniphof de Pedic. inguin. §. XIII. *Kürbiskernförmiger Wurm*.
 Koenig, E. in Act. Helvet. Vol. I. p. 27. de ore et proboscide vermium cucurbitinorum.
 Kratzensteins Abh. S. 34. F. 11.
 Limburg in Act. angl. V. LVI. art. 1766. p. 128. Tab. VI.
 Marx, vermisch. Beob. Samml. II. Berl. 1787. S. 1. nebst Zeichnung.
 Müllers Linn. N. S. Th. VI. S. 904. n. 1. *Der einmündige Bandwurm*. Tab. 36. F. 1.
 Müllers Naturforsch. St. XIV. S. 134. 144. 198—201. St. XXII. S. 34. *Der kürbiskernigte Bandwurm*.
 Oenomat. H. N. P. VII. p. 415. *Der Bandw. mit langen Gelenken*.
 Pallas Elench. Zoophil. p. 405. n. 1. *Taen. cucurbitina*, *Kürbiskernförmiger Bandw.* Ejusd. Diss. de inf. viv. p. 278. n. 4. Neue nord. Beytr. B. I. S. 46. n. 1. Tab. II. F. 1—9. *Taen. cucurbitina*.
 Palmer Diss. d. verm. intest. in Thes. med. Edinb. T. III. p. 39. *Taen. prim. species*.
 Plateri Prax. med. p. 933. *Taen. secunda*, *Vermis cucurbitinus*.
 Raulin, Morb. aer. 1752. app. F. 1—4.
 Roederer, Progr. d. Taenia 1760.
 Rozier Journ. d. Phys. 1777. avril. p. 257.
 Spigelius, A. de Lumbric. lat. *Taenia degener*.
 Thyson in Philos. Trans. V. XII. n. 146. Tab. I. et II. F. 2. 6. 10. Abh. z. Phys. übers. B. I. Th. I. Absch. 1. *Lumbr. lat. Vermis cucurbitinus*.
 Valisnieri Oper. p. 177. *Catena de cucurbin*.
 Werner verm. intest. p. 18. Tab. I. II. F. 1—46. *Solium*.

So wenig diesem Bandwurme der Name *Einsiedler*, *Taenia Solium*, *le Solitaire* zukommt; indem er sogar seltner, als der breite Bandwurm einzeln in dem Menschen gefunden worden ist; so hat man ihn doch beybehalten, um ihn von den zwey andern Arten menschlicher Darmbandwürmer zu unterscheiden. Weit angemessener bleibt indessen die Benennung *langgliedrichter Bandwurm*. Er hat mit den andern Darmbandwürmern gemein, daß er vorzüglich gewissen Gegenden eigen ist. Göze hat ihn besonders in der Gegend von Hanover und Berlin, Werner um Leipzig häufig gefunden. Mir selbst ist in der Gegend um Hof, ausser ihm, nie eine der zwey übrigen BandwurmGattungen vorgekommen. Die Merkmale seiner Gegenwart in dem Menschen sind so unsicher, wie von den anderen Bandwürmern. Doch giebt Göze eine grosse Unruhe und Angst, welche bey dem Anhören der Musik und besonders der bebenden Orgel rege wird, und Wagler den fruchtlosen Gebrauch des Herrnschwandischen und Nufferschen Mittels, als eigne Merkmale des nur dem Waglerischen Mittel weichenden, langgliedrichten Bandwurms an.

Ersterer Autor unterscheidet zwey Gattungen dieses langgliedrichten menschlichen Darmbandwurms, 1) die grosse, mit langen, dicken und gemästeten Gliedern, und 2) die flache, durchsichtige Spielart, bey welcher die dendritischen Fi-

guren in den reifen Hintergliedern überaus deutlich erscheinen sollen. Allein dieser Unterschied scheint blos auf der reichlicheren und vollkommneren Nahrung zu beruhen, die dieser Wurm in verschiedenen Subjekten findet, daher folgende Beschreibung im Wesentlichen diesen beyden Spielarten gemein ist.

Der langgliedrichte Bandwurm (Tab. III. Fig. 13.) hat, wie alle Darmbandwürmer, eine sehr flache, bandförmige Gestalt, fängt sich mit einem Knötchen fadenförmig an, wird dann immer breiter, und läuft am Ende wieder etwas schmaler und abgerundet zu. Seine Farbe ist weiß, die Grösse und Gestalt seiner zahlreichen Glieder überaus mannigfaltig. Letztere sind unter einander durch eine, am hinteren Rand jedes Glieds sich bildende Falte (Fig. 13. 8. 8.) vereinigt, welche das folgende Glied immer wie in einer Falz aufnimmt. *Werner* hat alle diese Glieder in neun Reihen abgetheilt, die zwar unmerklich in einander übergehen, in welchen man aber doch eine merkliche Verschiedenheit sowohl in der Länge und Breite der Glieder, als in der Deutlichkeit der durchlaufenden Kanäle und der Vervielfältigung der durchschimmernden dendritischen Figuren gewahr wird. Die erste Gliederreihe (Fig. 13. a. b.), die sich gleich am Kopfe (1.) anschliesst und als der Hals des Wurms angesehen werden kann, besteht, besonders im Anfange, aus so überaus kurzen und schmalen Gliedern, daß sie von einem unbewaffneten Auge kaum unterschieden werden können. Diese Glieder sind rauh von den unendlich kleinen Fasern, welche aushauchende Gefässe zu seyn scheinen, und unter welchen wieder nach der Länge und Breite der Glieder durch den ganzen Wurm, überaus feine lange und quere Muskelfasern laufen, durch deren Verkürzung sich der Wurm bewegt und fortrückt. Ungefähr eine Elle vom Kopfe gehen die kleinen und zarten Glieder in deutliche Vierecke (b. c.) über, in welchen die organischen Theile jedes Glieds immer sichtbarer werden, jemehr sich diese zweyte Gliederreihe der dritten (c. d.) nähert. Man sieht hier, entweder am rechten oder linken Rand jedes Glieds sehr deutlich ein kleines Wärzchen (s. s. s. s.) mit einem schwarzen Punkt, welches die Mündung eines überaus kleinen, schreglaufenden Kanals ist. Diese Wärzchen wechseln, gemeiniglich nach zwey Gliedern, in ihrer Stellung, so daß sie an den nächsten zwey Gliedern den linken Rand besetzen, wenn sie in den zwey vorhergehenden den rechten einnamen. Ausserdem sieht man an jedem Rand eine ganz schmale, in der Mitte aber eine etwas breitere Linie, aus welcher letzteren zu beyden Seiten kleine dendritische Figuren oder Ästchen ausfliessen. Alles dieses wird in der vierten Gliederreihe (d. e.) immer deutlicher, welche noch das Auszeichnende hat, daß die bisher nur einmal

mal gespaltenen Ästchen, sich nun schon zwey bis dreymal spalten. In der fünften Gliederreihe (*e. f.*) werden die länglichten Vierecke der hervorgehenden Reihen wieder gleichseitiger, die mit den Seitenrändern parallel laufenden Linien aber so breit, daß sie bey nahe der mittleren Linie an Stärke gleich kommen und nun schon deutliche Kanäle bilden. In der sechsten Reihe (*F. g.*) sind die breitesten Glieder des ganzen Wurms enthalten, und die zu beyden Seiten des mittleren Kanals auslaufenden Ästchen erreichen die beyden Seitenkanäle. In der siebenden Reihe (*g. h.*) nehmen die Glieder dadurch, daß ihr mittlerer Theil etwas bauchicht wird, eine kürbiskernförmige Gestalt an, in der achten (*h. i.*) aber werden die, schon in der vorhergehenden Reihe wieder schmaler gewordenen Glieder, über einen halben Zoll lang. Der mittlere Kanal (*33.*), die Seitenkanäle (*4. 4.*), die schreglaufenden kurzen Gänge, nebst den Mündungen der Randwärtchen (*s. s. s.*) die mit den Seitenkanälen zusammenfließenden, dendritischen Figuren (*7. 7.*) des weit stärker gewordenen mittleren Kanals, fallen hier deutlich in die Augen. In der hierauf folgenden letzten Reihe (*i. k.*) werden die Glieder wieder viel kürzer, so daß sie den Gliedern der fünften Reihe in Rücksicht der Grösse gleich kommen. Ihr leztes Glied bildet das abgerundete, weder mit schreglaufenden Gängen, noch mit Randwärtchen versehene Schwanzende (*k*), in welchem der mittlere Kanal (*g.*) nicht völlig das Ende dieses Glieds erreicht.

Da die inneren Theile des Wurms in keiner Gliederreihe deutlicher, als in der lezten und vorlezten gesehen werden können; so scheinen beyde die aus gebildetesten und reifsten des ganzen Wurms zu seyn, und hierinnen zugleich der Grund zu liegen, warum sich die Glieder dieser Reihen, öfters ohne alle Veranlassung, bald einzeln, bald in ganzen Strecken von dem übrigen Theil des Wurms abgesondern, und so unter den Exkrementen gefunden werden. Die Alten hielten dergleichen einzelne Glieder für ganze Würmer und nannten sie *Kürbiswürmer*, ganze abgegangene Strecken aber für Reihen, welche ihnen die einzelnen Kürbiswürmer durch das Ansaugen an einander zu bilden schienen.

Um jedoch von der thierischen Ökonomie des langgliedrichten Bandwurms eine genauere Kenntniß zu erhalten, ist es nöthig, die einzelnen Theile des Kopfs und die gemeinsamen organischen Theile der Glieder noch besonders kennen zu lernen.

Am Kopfe (*Fig. 3.*) entdeckt man schon mit bloßem Auge fünf Hervorragungen, wovon die mittlere (*a.*) die längste ist, die vier sie umgebenden (*b. b. b. b.*) aber stumpfer und breiter sind. Erstere, oder der Saugrüssel, erscheint schon un-

ter

ter dem einfachen Mikroskope von vorne gestreift (Fig. 7. *a.*), unter dem zusammengesetzten aber entdeckt man, daß jene Streifen dreyzehn Strahlen ausmachen. (Fig. 9.). Die aus einem mittleren, mit drey kleinen Wärzchen besetzten Kreis (*c.*) gegen einen grösseren Kreis (*b. d. e. f.*) auslaufen. Von der Seite betrachtet (Fig. 10.) bildet der Saugrüssel (*a.*) eine konische, vorne abgerundete Warze, deren Grundfläche von zwey gezackten Ringen (*b. b. c. c.*) in kurzer Entfernung hinter einander umzogen ist. Die nähere Untersuchung lehrt, daß diese Zacken die Decken oder Hüllen eben so vieler Bläsgen (Fig. 12. *b. b. d. d.*) sind. Jede Zacke (Fig. 11.) hat nemlich zwey spitzige Enden, wovon das eine (*a.*) am Kopfe befestigt, das andere (*b.*) frey ist. Zwischen beyden Enden befindet sich aber eine Grube (*c.*), in welche das darunter liegende Bläsgen paßt. Jedes Bläsgen ist durch ein feines und kurzes Saugröhrchen (Fig. 12. *c. c. e. e.*), welches sich in der Mitte des Bläsgens öffnet, wie durch einen Stiel am Kopfe befestigt und zieht sich auf jeden am Kopfe angebrachten Reiz, in die Vertiefung seiner Hülse zurück. Die Saugröhrchen selbst vereinigen sich in einem Kanal (Fig. 8. *a. d.*), der seinen Lauf in der Mitte des Wurms vom Kopfe bis zum Schwanzende nimmt. In der ersten Gliederreihe ist dieser mittlere Kanal überaus fein und einfach, in der zweyten Gliederreihe aber, ungefehr eine Elle vom Kopfe, gleicht er einem Stamm, der anfangs zwey, dann drey, dann vier bis fünf sich wieder in kleinere Ästchen theilende Zweige zu beyden Seiten verbreitet. Alle diese Ästchen sind feine Röhrchen, deren Mündungen sich hin und wieder mit einander selbst vereinigen (Fig. 17. *i. i.*), in der achten (Fig. 13. *h. i.*) und neunten Gliederreihe (*i. k.*) sehr oft in die Seitenkanäle übergehen. Sowohl der mittlere Kanal selbst, als seine astförmigen Seitenröhrchen, enthalten eine eyweißartige Feuchtigkeit und Kügelchen von verschiedener Grösse (Fig. 17.), welche so zahlreich sind, daß oft in einem Gliede mehr als hundert durchs Mikroskop gezehlt werden können. Ohngeachtet der mittlere Kanal eine aus einem Gliede in das andere ununterbrochen fortgehende Röhre zu seyn scheint; so geht doch die in demselben enthaltene Flüssigkeit auf keinen angebrachten Druck, aus einem Gliede in das andere über, und die dendritischen Figuren jedes Glieds scheinen daher immer ein für sich bestehendes Ganze auszumachen.

Ich gehe nun zu den übrigen vier Erhabenheiten des Kopfs, nemlich zu den vier Seitenwärzchen (Fig. 3 und 7. *b. b. b. b.*) zurück, deren Bau weit einfacher als der des Saugrüssels ist. Sie sind ebenfalls abgerundet, aber ungleich flacher und breiter als dieser Saugrüssel. Unter dem Mikroskope entdeckt man in der Mitte

Mitte jeder solchen Seitenwarze (Fig. 5. *a.*) die trichterförmige Öffnung eines Kanals, der sich in dem ersten Halbgliede mit dem Kanal der zweyten Seitenwarze des Kopfs vereinigt und so in den gemeinschaftlichen Seitenkanal übergeht. Da eben dieses von den Kanälen der zwey anderen Seitenwarzen des Kopfs geschieht: so entstehen hierdurch zwey Seitenkanäle (Fig. 8. *b. c. b. c.*), welche ununterbrochen vom Kopfe bis zum Schwanzende mit den beyden Rändern des Bandwurms parallel laufen, sich aber übrigens von dem mittleren Kanal noch besonders dadurch auszeichnen, daß sie der enthaltenen Feuchtigkeit den Durchgang aus einem Gliede in das andere verstatten.

Ausser dem mittleren, und den zwey Seitenkanälen, welche vom Kopfe ihren Ursprung nehmen, ist noch eine dritte Art Kanäle (Fig. 13. *s. s. s. s.*) vorhanden, die den Namen der schreglaufenden Gänge verdienen. Die breiteren Glieder des Bandwurms haben nemlich, wie schon oben erwehnt worden ist, entweder am rechten, oder am linken Seitenrand, ein Knötchen oder Wärzchen, dessen Mündung in den hinteren Gliedern schon dem bloßen Auge sichtbar ist. Jede dieser Randwarzenmündungen ist immer der Anfang eines Gefäßes, welches meistens schreg gegen das hintere Ende jedes Glieds läuft, und, wo nicht den mittleren Kanal selbst, doch den Ursprung der stärksten Äste desselben erreicht. Dieses, dem unbewaffneten Auge einfach erscheinende Gefäß (Fig. 13. *s. s. s. s.*) theilt sich, wenn es unter dem zusammengesetzten Mikroskope betrachtet wird (Fig. 16. und 17), nicht weit vom Rande des Wurms, in einen schmalen und mehr graden Gang (*b. c.*), der über den Seitenkanal (Fig. 17. *a. a.*) weglauft, sich dem mittleren Kanal (*g. g.*) nähert, und daselbst mit einem runden Knoten (*c.*) schließt, und in einen etwas längeren, dickeren, mehr gewundenen und knotichten Gang (Fig. 16. und 17 *d. e.*), der ebenfalls über den Seitenkanal weggeht und noch näher am Stamme des mittleren Kanals sich mit einem länglicht- runden Knoten (Fig. 16. *f.* und Fig. 17. *c.*) endiget.

Was den Nutzen und die Verrichtungen aller dieser Theile des langgliedrichteten Bandwurms betrifft, so ist es wahrscheinlich, daß der Saugrüssel durch die feinen Saugröhrchen der unter den zackichten Hülsen verborgenen Bläsgen, den feinsten, zur Fortpflanzung des Geschlechts erforderlichen Saft in den mittleren Kanal führt und zu dem Ende auch mit dem feinsten Gefühlsinne, der in jenen Bläsgen vorzüglich zu liegen scheint, begabt ist. Denn der Saugrüssel zieht sich auf die geringste Berührung zurück und der ganze Wurm krümmt sich hierauf ängstlich. Aus jenem vom Saugrüssel zugeführten, eyweißähnlichen Saft, schei-
nen

nen nun die kleinen Kügelchen entwickelt zu werden, welche im mittleren Kanal und dessen Ästchen (Fig. 17.) so zahlreich vorhanden sind. Diese Kügelchen sind wahrscheinlich Eyer und mithin der mittlere Kanal nebst seinen dendritischen Verbreitungen, nichts als eine Reihe kleiner Eyerstöcke, wovon jeder in seinem Gliede für sich besteht, aber, in der Verbindung aller Glieder, den langen, vom Kopfe bis zum Schwanzende des Wurms sich erstreckenden Eyerstamm bilden hilft. Da sich ferner im breiten und gekrümmten Zweige des schreglaufenden Gangs (Fig. 17. d. e.) ebenfalls eine Menge solcher eyerförmigen Körperchen befindet; so glaubt *Werner*, daß diese aus dem Eyerstock in den kleinen Knoten oder Sack dieses knotichten Zweigs (Fig. 16. u. Fig. 17. e.) als den Uterus, gelangen und bey ihrem Durchgang durch die Mündung des schreglaufenden Gangs (b.) in der Randwarze, von der Saamenfeuchtigkeit befruchtet werden, welche in dem Endknoten (c.) des graden und schmalen Zweigs (b. c.) vom schreglaufendem Gange abgesondert wird. Er hält mithin diesen Wurm für einen Hermaphroditen, der in jedem seiner grösseren und reiferen Glieder mit einem männlichen und weiblichen Geschlechtsgliede versehen ist. Dennoch lassen jene schreglaufenden Gänge und ihre Mündungen, noch eine andere Bestimmung zu. Sie scheinen nemlich zur Ernährung der vom Kopfe weit entfernten Gliederreihen und zur Bewegung des Wurms beyzutragen. Bey letzterer saugen sich wahrscheinlich die Randmündungen der schreglaufenden Gänge an die zottige Darmhaut in verschiedenen Abständen an, wenn sich der Wurm wellenförmig bewegt und fortrückt, und in allen Randmündungen ganzer Gliederstrecken, wenn er die nicht mit solchen Mündungen versehene erste Gliederreihe ausstreckt und mithin den Kopf vorwärts bewegt. Der Nutzen der vier Seitenwärtchen des Kopfs aber scheint sich, ausserdem, daß sie vielleicht Werkzeuge eines besonderen Gefühlsinns sind, vorzüglich auf die Ernährung der ersten Gliederstrecke durch die zwey Seitenkanäle einzuschränken. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß die in den Seitenkanälen enthaltene Feuchtigkeit, ohne ein besonderes Bewegwerkzeug, durch diese überaus feinen Haarröhrchen in die mehrere Ellen entfernten Gliederreihen des Wurms gelangen kann, und daher weit glaublicher, daß die schreglaufenden Gänge nicht blos Zeugungsorgane sondern vorzüglich Ernährungswerkzeuge der einzelnen, vom Kopfe zu entfernten Glieder sind.

Unter den menschlichen Darmbandwürmern hat der gegenwärtige am öftesten die bekannten drastischen Methoden verspottet. Ungleich sicherer und nachdrücklicher scheint hingegen die langsame Heilart auf ihn zu wirken. Ich wenigstens

stens habe von dem mehrere Wochen fortgesetzten Gebrauch, der, in starken, Schwindel erregenden, Gaben angewandten salzgesäuerten Schwererde, die erwünschteste Wirkung gesehen.

2. Der kurzgliedrichte Bandwurm. Tab. IV. Fig. 1—4.

Taenia vulgaris, osculis lateralibus geminis. Linn. Amoen. acad. Vol. II. p. 7. Tab. I. F. 2. Syst. Nat. T. I. P. VI. p. 3065. n. 2. Faun. Suec. 2262. *Taen. articulata plana*. Habitat in canale intestinali.

- | | |
|---|--|
| <p>Andry de generat. verm. T. II. F. 9. T. III. F. 16.
Bartholinus in Act. Havniens. II. p. 148. T. 39.
<i>Lumbricus latus</i>.
Batschs Naturgesch. d. Bandwurm gatt. S. 107.
n. 1. F. 33. 50. <i>Taenia orificio ovarum duplici</i>: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud posito papilliformi expressili.
Bewerd. Thesaur. 202. Fig. 202.
Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 415. n. 2.
Tab. I. F. 6. <i>Der kurzgliedrige Bandwurm</i>.
Bonnet in Mem. pres. à l'Acad. de Paris, Vol. I. p. 494. und im Journ. de Phys. 1777. p. 243. Tab. I. F. 3. 4.
Borrichius de Lumbr. lat. et cucurbit. in Act. Havn. Vol. II. 1673. Obs. 47. p. 148.
Clerici Hist. lat. lumbr. p. 132. Tab. VI. F. 2.
Lumbric. lat. p. 136. C. VII. Tab. 7. <i>Taenia prima</i>.
Cuvier Tableau élément. p. 635. <i>le Taenia commun</i>.
Doeveren, Gualt. de verm. intest. hum. praec. d. Taen. Lugd. 1753. p. 38.
Fabricii Obs. II. C. 70. <i>Lumbric. latus</i>.
Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 315.
Fischer, Taen, hyd. p. 14. n. 2. <i>Taen. grisea</i>, vel <i>membranacea</i>, vel <i>Taenia à anneaux courts</i>, vel <i>Taen. à épine</i>.
Göze, N. G. der Eingeweidew. S. 296. <i>Der häufige Bandwurm mit kurzen Gliedern</i>.</p> | <p>Merretti Pinax rer. natural. Brittanica. Lond. 1667, 1677, 1704. 206. <i>Lumbric. latus</i>.
Müller vom Bandwurm im Naturf. St. XIV. S. 134. <i>Der kurzgliedrichte Bandwurm</i>.
Müllers Zool. Dan. prodr. 2654. <i>Taenia osculis lateralibus geminis</i>.
Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. II. S. 906. n. 2. Tab. 36. F. 2. <i>Der zweymündige Bandwurm</i>.
Onomatol. Hist. nat. P. VII. p. 416. <i>Der gemeine od. graue Bandwurm</i>.
Pallas Elench. Zoophil. p. 408. <i>Taen. grisea</i>, Diss. de inf. viv. p. 30. n. 1. neue nord. Beytr. B. I. S. 59. n. 3. Tab. III. F. 13—16. <i>Taen. membranacea</i>, <i>der graue Bandwurm</i>.
Palmer d. verm. intest. Thes. Med. Edinb. T. III. p. 43. <i>Taen. secund. spec.</i>
Plater, Prax. med. 992. <i>Lumbr. lat. s. taen. intestinalis</i>.
Rosen, in den Abhandl. d. Schwed. Akad. B. IX. S. 128.
Sanchez in Op. Med. Tolos. 1636. p. 131.
Schenckii Obs. III. p. 408.
Spigel. Monogr. Barth. Act. 1673. p. 148. Tab. 39. <i>lumbr. latus</i>.
Tulp's Observ. p. 170. Tab. VII. F. 1.
Werner Verm. intest. p. 49. Tab. III. F. 47—57. <i>Taen. vulgaris s. dentata</i>.</p> |
|---|--|

Nur in Beziehung auf gewisse Gegenden kann der gegenwärtigen Bandwurm-art der Beynahme der *gemeinen* beygelegt werden, da eben ihre Seltenheit Ursache war, daß Göze und Werner mit ihr nicht die mancherley Beobachtungen, wie mit dem langgliedrichten Bandwurm anstellen und ihn so genau, wie letzteren, beschreiben konnten. In Schweden und Rußland soll er jedoch, nach Pallas, so oft vorkommen, daß er daselbst beynahe als ein endemisches Übel angesehen werden kann, und es wäre daher zu wünschen, daß wir von dorthier eine genauere Naturgeschichte dieses Wurms erhielten, als wir zur Zeit besitzen.

Er

Er (Tab. IV. Fig. 1.) ist der kürzeste unter den Darmbandwürmern, gewöhnlich fünf bis sechs, höchst selten sieben Ellen lang, wie *Fermins* gezählter Bandwurm, den er von einem Neger erhalten hat. Seine Farbe ist weiß, wird aber im Weingeiste bald grau, daher er auch von andern der graue Bandwurm genannt worden ist. Die ganze Oberfläche seines Körpers ist rauh und ungleich, weil jedes Glied aus drey längeren und zwey kürzeren Fältchen besteht. Übrigens sind seine Glieder flach, wie beym langgliedrichten Bandwurme, aber kürzer, breiter, dicker und von zäherer, hautartiger Substanz.

Verfolgen wir den besonderen Bau des Kopfs und der Glieder dieses kurzgliedrichten Bandwurms; so entdecken wir an seinem Kopfe ebenfalls fünf Wärzchen (Fig. 1. a. b. b.), die jedoch grösser, als beym langgliedrichten Bandwurme sind, daher auch die Öffnungen der Seitenwärzchen, und die von letzteren ihren Anfang nemenden Seitenkanäle (c. c.), welche durch den ganzen Wurm den beyden gezackten Rändern desselben parallel laufen, schon am Kopfe sichtbar werden. Die Ankettung der Glieder geschieht durch eine Falz am Hinterrande jedes Glieds, in welche der schärfere Vorderrand des nächstfolgenden gleichsam eingeschoben ist. Diese Verbindung ist an den kleinen Halsgliedern schon bemerkbar, weil sie etwas grösser sind, als beym langgliedrichten Bandwurme. Überhaupt ist in der Halsstrecke oder der ersten Gliederreihe dieses Wurms (c. d.), welche etwan eine viertel Elle lang ist, das Verhältniß der Länge zur Breite der Glieder nicht so ungleich, wie in der zweyten (d. e.) und dritten Reihe (e. f.), wo die Glieder nichts, als schmale Streifen sind, die zwar an Breite, aber nicht an Länge zunehmen. Beyde Gliederreihen unterscheiden sich noch dadurch von der ersten, daß man in der Mitte jedes Glieds eine Querlinie entdeckt, die dritte (e. f.) aber von der zweyten (d. e.), daß die einzelnen Glieder in jener weiter, als in dieser auseinander stehen. In der vierten Gliederstrecke (f. g.) bemerkt man auf jedem Gliede vier Querlinien, und an jedem Randzäckchen ein Knötchen. Die fünfte Gliederreihe (g. i.), als die breiteste des ganzen Bandwurms, hat, ausser den vier Querlinien jedes Glieds, welche hier mehr hervortreten und erhabner sind, zum Unterscheidungszeichen von der vorhergehenden Reihe, mehrere sichtbare Unebenheiten oder Knötchen am Rande. Sie endiget sich nach *Werner* mit einem etwas abgestumpften Gliede (i. i.), von welchem aber sicher das Schwanzende schon abgestossen war.

Das Mikroskop giebt sehr deutlich fünf Falten an jedem Gliede (Fig. 3. a. a. b. b.) dieser fünften Reihe zu erkennen. Hiervon hat die mittlere auf jeder Seite ein Rand-

Randwärtchen (*c. c.*), welches vor den übrigen Unebenheiten des Randes hervorragt und eine Mündung, die in einen ähnlichen schreglaufenden Gang (Fig. 2. *b. b.*) wie beym langgliedrichten Bandwurme führet. Dieser Gang ist jedoch einfach und theilt sich nicht in einen männlichen und weiblichen Ast; sondern ist blos an seinem Ende, gegen die Mitte des Glieds, in einem halben Kreise von kleinen eyerförmigen Körnern umgeben, welche unter dem einfachen Mikroskop als Pünktchen, unter dem zusammengesetzten (Fig. 4. *c. c. c.*) ovalrund erscheinen, und auch in der übrigen zellichten Substanz des Wurms, wiewohl im Ganzen weniger zahlreich, als beym langgliedrichten Bandwurme, sichtbar sind. Da übrigens kein mittlerer Kanal und ausser den Seitenkanälen (Fig. 3. *d. d. d. d.*) und schreglaufenden Gängen, keine andere Art von Gefässen zu entdecken ist; so scheint die innere Ökonomie des kurzgliedrichten Bandwurms weit einfacher, als die des langgliedrichten zu seyn.

3. Der breite Bandwurm. Tab. IV. Fig. 5 — 10.

Taenia lata, osculis lateralibus solitariis. Linn. S. N. P. 3072. n. 3. Faun. Suec. n. 2263. Amoen. ac. Vol. II. p. 80. T. I. F. 3. It. Gotland. 182. 250. *Hirudo depressa alba* lateribus acutis. Faun. Suec. 1274. Habitat in canale intestinali.

Andry v. Erz. d. Würm. *Der Bandwurm mit dem Rückgrad.*

Batsch Naturgesch. d. Bandwurm-gatt. S. 111. n. 2. F. 51. 66.

Beschäft. d. Berlin. Gesellsch. naturf. Freunde. B. IV. S. 204. T. VI. F. 1—9.

Beschreibung des breiten Bandw. nebst den Mitteln wider denselben, Kempten 1775.

Blochs Abh. v. d. Erz. der Eingeweidew. S. 17. n. 16. *Der breite Bandwurm.*

Bonnet in den Mem. présent. à l'Acad. d. Par. I. p. 478. Tab. XV. XVI. Ebenders. im Journ. de Phys. 1777. p. 262. Desselben Abh. aus der Insektolog. übers. v. Göze S. 61. *Taenia articulis brevioribus, der breite Bandwurm mit kurzen Gliedern.*

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 120. Tab. V—VIII. *Taen. primi generis.*

Cuvier Tableau élément. p. 634. *le Taenia large.* Dionis, Diss. de Taenia. b) *Taenia articulata non demittens.*

Fischer, Taen. hyd. p. 14. n. 3. *Taenia lata vel candida.*

Gleichen in den Beschäft. d. Berl. Naturfors. IV. S. 204. Tab. VI. F. 1—9.

Göze, Naturgesch. der Eingeweidew. S. 298. Tab. XXI. Fig. 8. *Der breite Bandwurm.*

Kaltschmidt, Diss. d. vermib. et praes. d. spec. illa vermium intest. quam Taen. vocamus. (Resp. Jaenisch) Jenae 1755.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. II. S. 907. n. 3. Tab. 36. Fig. 3. *Der breite Bandwurm.*

Müllers Naturforsch. St. XIV. S. 160.

Onomatol. Hist. nat. P. VII. p. 415. *Der breite Bandwurm mit kurzen Gelenken.*

Pallas Elench. Zooph. p. 110. n. 4. Diss. d. Inf. viv. p. 35. n. 2. Neue Nord. Beytr. I. S. 64. Tab. III. F. 17. 18. S. 69. T. II. F. 19. A. B. *Taenia tenella.*

Palmer Diss. d. verm. intest. in Thes. Med. Edinb. T. III. p. 44. *Taen. tert. spec.*

Plater, Prax. med. C. XIV. *Taen. prima.*

Ravantons Abh. vom breiten Bandw. aus dem Merc. de France 1756. Jenae Part. 2. p. 146. übers. v. Krünitz, in Cartheusers vermisch. Schrift. St. III. S. 199.

Tulpil Obs. Med. Lib. IV. c. Tab.

Sehr selten in Deutschland, am häufigsten in Frankreich und in der Schweiz ist gegenwärtige Bandwurmgattung vorgekommen, und am öftesten durch das Nuffersche und Herrenschwandische Mittel abgetrieben worden. Doch gesteht *Herrenschwand* selbst, daß er ihn nie ganz, sondern immer nur stückweise habe erhalten können, zum Beweise, daß er sehr schwer abzutreiben sey. Wahrscheinlich kam es auch daher, daß ihn viele mit dem kurzgliedrichten Bandwurme für einerley Art hielten, weil er ebenfalls sehr ungleiche, zackigte Ränder hat, und daß man sich geraume Zeit mit einer Menge erdichteter Abbildungen von demselben behalf, von welchen *Clerikus* einen Zusammentrag geliefert hat, bis *Bonnet* so glücklich war, diesen Wurm größtentheils zu erhalten und davon eine richtige Beschreibung und Abbildung zu liefern.

Die Länge des breiten Bandwurms ist verschieden, und richtet sich wahrscheinlich nach der grösseren oder geringeren Ausbildung desselben. *Pallas* will ihn nie über zehn bis zwölf Ellen lang gefunden haben. *Bloch* hingegen schickte *Gözen* eine von einem Frauenzimmer in Berlin abgetriebene Strecke, die eine ununterbrochene Länge von $60\frac{1}{4}$ Ellen hatte. Eben so verschieden ist seine Breite, die von einem halben, bis zu einem ganzen Zoll steigt, und die mithin so beträchtlich ist, daß er in der That den Namen des breiten Bandwurms verdient. Seine Farbe ist vollkommen weiß, seine Gestalt einem an beyden Rändern mit stumpfen Zäckchen versehenen Bande ähnlich, seine Oberfläche mit querlaufenden Furchen durchzogen und runzlicht, seine Substanz dichter und spröder, als beym gezähnten Bandwurme.

Am Kopfe (Tab. IV. Fig. 5. a.) sieht man durchs Mikroskop vier Saugrüssel (Fig. 6.), die an ihrem hinteren Ende, wo sie sich mit dem Halse vereinigen, konisch, fahlroth und schwärzlich punktirt sind, und ihren vorderen, breiten Theil bald zurückziehen, bald hervorstrecken. In erstem Falle bilden sie trichterförmige Öffnungen, (Fig. 6. a.), in letztem eine warzenförmige Erhabenheit (Fig. 7. a.) in deren Mitte noch ein kleines Knöpfchen hervorragt, welches mit einer kleinen Öffnung versehen ist. Das konische Kopfende geht in den überaus schmalen, beynahe fadenförmigen Hals (Fig. 5. a. b.) über, dessen Glieder anfangs so fein sind, daß sie kaum von einander unterschieden werden können, allmählich aber breiter werden, und dann beynahe kleine Vierecke bilden. Die folgende Gliederstrecke (b. c.) behält die nemliche Länge der Glieder, welche etwan eine halbe Linie beträgt, nimmt aber mit einem Mal an Breite zu. In ihrer Mitte ist, wie in der ersten Reihe, bloß eine einfache, durch alle Glieder laufende Linie sichtbar,

in

in der dritten Reihe (*c. d.*) aber, wo die Glieder noch die Länge der vorhergehenden beybehalten, verdoppelt sich diese Linie, und in der vierten (*d. e.*) deren Glieder bald etwas mehr, bald etwas weniger, als eine Linie lang sind, wird diese Linie dreyfach. Durchs einfache Mikroskop findet man, daß der Streif (Fig. 8. *a. b.*) welcher diese drey Linien in sich faßt, ins Röthlichte fällt, und die Mittellinie mehr an einander gereiheten Punkten gleicht. Das zusammengesetzte Mikroskop zeigt hingegen, daß die mittlere Linie (Fig. 9. *a.*), blos von dem blumenähnlichen Eyerstock, der sich in der Mitte jedes Glieds befindet, gebildet wird, und daß die zwey Seitenlinien (Fig. 9. *b. b. b. b.*) Kanäle sind, welche wahrscheinlich allen Gliedern des Wurms den ernährenden Stoff zuführen. Was die überaus zierlichen, Blumen bildenden Eyerstöcke (Fig. 10.) noch besonders betrifft; so bemerkt man an den untern, zwischen den beyden größten Blättern befindlichen Theil derselben, ein Grübchen (*a*), und in dessen Mitte eine Öffnung, welche die Mündung des Gangs ist, der bey dem lang- und kurzgliedrichtem Bandwurme am Rande, hier aber in der Mitte liegt, und durch welche wahrscheinlich die Eyer ihren Ausgang nehmen. Übrigens ist der Raum von jedem Seitenkanale bis am Rande des Wurms (Fig. 9. *b. c. b. c.*) mit einer Menge kleiner, den Hirsenkörnern ähnlichen Kügelchen angefüllt, von welchen es zweifelhaft ist, ob sie wirklich Eyer oder Drüsen sind. Mir wenigstens ist es wahrscheinlich, daß nicht alle die runden Körperchen, welche man für Eyer zu halten geneigt ist, wirklich Eyer sind, weil die Vermehrung dieses und der vorhergehenden Gattungen der Darmbandwürmer, doch noch nie so zahlreich gefunden worden ist, als die ungeheure Menge dieser Eyer erwarten lassen würde.

Das Ende des breiten Bandwurms ist nach *Bonnets* Abbildung, mit zwey Spitzen (Fig. 5. *e.*) versehen. Diese Spitzen scheinen aber keinesweges das letzte Glied des Wurms auszuzeichnen, sondern vielmehr die Gelenkspitzen einer noch fehlenden, abgerissenen Gliederstrecke zu seyn.

Zur Abtreibung des breiten Bandwurms hat man in vielen Fällen das Odiorsche Mittel, welches aus dem Pulver der *Rad. Filicis maris* und dem *Ol. Ricini* besteht, bewährt gefunden. Auch verdient seine Anwendung in so ferne es unter die gelindern Bandwurm treibenden Mittel gehört, mehr als andere Empfehlung.

Vierter Abschnitt.

Blasenwürmer, Hydatigenae.

- Blochs Abhandl. von Erzeug. der Eingeweidew. S. 24. *Vermis Vesicularis Eremita*, der Einsiedler; Derselben Beyträge zur Gesch. d. Blasenwürmer in den Berlin. Schrift. B. I. S. 335. Tab. X. F. 12. a. b.
- Cuvier Tabl. élém. p. 635. *les Hydatides*.
- Fischer, Taen. Hydat. Histor. p. 17.
- Göze, Naturgesch. der Eingeweidew. S. 196 und 249. Tab. XX. B. Fig. 12. a. b. *Taenia visceralis*, *Hydatigena*, *Blasenwurm*.
- Haen (de) Rat. med. II. 3. C. 16. §. 2. p. 282.
- Hartmann, in Misc. Cur. Dec. II. A. IV. Obs. 73. (bestätigte zuerst Thysons Entdeckung.)
- Kölpin in den Schriften der Berl. Gesellsch. naturforsch. Freunde B. I. S. 350.
- Linnaei Syst. N. Ed. Gmel. XIII. T. I. P. VI. p. 3059. n. 5. *Taenia visceralis*, pisiformi vesicae inclusa, antérieur lata, posterius acuminata.
- Müllers Linn. N. S. Th. VI. S. 891. n. 6. *Hydra hydatula*, die Wasserblase.
- Müllers ununterbroch. Bemüh. bey d. Intest. Würm. Berl. Schrift. B. I. S. 201, und Naturf. St. XIV. S. 129. *Blasenwürmer*, *Vesicariae*.
- Pallas Diss. de inf. viv. in Sandiforti Thesaur. Diss. p. 286. n. 6; ferner im Stralsund. Mag. Stück I. S. 64. und 81. und in den Nord. Beytr. B. I. S. 83. *Der Blasenwurm*, *Taen. Hydatoides*.
- Peyer, Miscell. nat. cur. Dec. I. ann. 7. Obs. 206. *Hydatis animata*.
- Retzii, A. J. Lectiones d. verm. intest. inpr. human. Holm. 1787. 8.
- Schranks Verz. der bish. bekannten Eing. Gattung, XII. S. 29.
- Thyson, E. Lumbricus hydropicus, or essay to prove that Hydatides often met with in morbid animal bodies are a species of Worme or imperfect Animal; in Philos. Trans. Vol. XVII. n. 193. p. 506.
- Werner, Verm. intest. p. 67. Tab. IX. F. 29—33. *Taen. hydatigena*.
- Zeders Erster Nachtrag z. Göz. N. Gesch. der Eingeweidew. S. 303. *Cysticerci*, *Blasenwürmer*.

Ein ganz neues, zur Zeit noch wenig bebautes Feld öffnete dem Fleise der Naturforscher Thysons erste Entdeckung derjenigen Eingeweidewürmer, welche sich ausserhalb dem Nahrungskanal in andern Theilen des menschlichen und thierischen Körpers überhaupt aufzuhalten und um so leichter dem Auge des Beobachters zu entgehen pflegen, da sie, wegen ihrer Kleinheit, grossentheils nur durchs Vergrösserungsglas erkannt werden können, und sich überdies in so verborgenen Theilen aufhalten, daß der Forscher oft blos zufälliger Weise auf sie stößt, oder in Blasen wohnen, die sich mit den bekannten Wasserblasen oder Hydatiden sehr leicht verwechseln lassen und daher sehr oft übersehen werden müssen. Ihre Ähnlichkeit mit diesen Blasen und die noch eingeschränkte Bekanntschaft mit diesem neuen Wurmgeschlechte selbst, bewog die Helminthologen, sie sämmtlich unter dem Namen der *Blasenwürmer* zu begreifen. Allein nur ein Theil derselben verdient diesen Namen, wie die bereits abgehandelte Naturgeschichte des Lymphgefäßshakenwurms bewiesen hat, und Treutlers weitere, unten vorkommende Entdeckungen noch beweisen werden.

Die eigentlichen Blasenwürmer, welche wir zuerst kennen lernen wollen, und die, nach Pallas, ebenfalls unter gewissen Himmelsstrichen häufiger vorkommen, halten sich vorzüglich im Zellgewebe und in der Nachbarschaft grosser und zahl-

zahlreicher Lymphgefässe auf. Sie sind daher schon überall im thierischen Körper nur nicht im Magen und Darmkanal angetroffen worden. Man hat sie in Menge im Zellgewebe der Muskeln, im Gehirne, in der Brusthöhle, in und auf der Leber, an der vorderen Fläche der Nieren und in dem sie umgebenden Fette, auf der ganzen inneren Fläche des Bauchfells, der äusseren Haut des dicken Gedärms, am Zwergfelle, im Gekröse, im Netze, in und auf der Gebärmutter und Urinblase etc. gefunden, so daß ihnen mithin die Gözische Benennung der Eingeweidebandwürmer (*Taenia visceralis*) nicht eigentlich zukommt, da sie nicht einzig auf die Eingeweide angewiesen sind. Immer liegen sie in Höhlungen, mit welchen sie durch zarte Einsaugungsgefässchen zusammenhängen, welche feinen Fäden gleichen und ihnen die feinste Lymphe als Nahrung zuführen. Hierdurch sind sie aber ausser Stand gesetzt, ihren Ort zu verlassen, und eine andere Bewegung vorzunehmen, als ihren Körper aus der Blase hervorstrecken und wieder zurückzuziehen, wie wir unten weiter sehen werden. Von den eigentlichen Wasserblasen unterscheiden sie sich dadurch, daß die Hydatid eine einfache, weit härtere, mit einer klaren Lymphe angefüllte Blase und höchst wahrscheinlich nichts anders, als eine widernatürliche Anschwellung oder ein Aneurisma eines lymphatischen Gefässes ist, der Blasenwurm oder die Hydatidene aber aus einer lebendigen Creatur besteht, die eine blaulichte, weiche Blase zum Anhang ihres Schwanzendes hat.

In menschlichem Körper hat man bisher drey verschiedene Gattungen dieser Blasenwürmer, nemlich die einfache, die gesellschaftliche und die in Kapseln eingeschlossene entdeckt. Bey der ersten Gattung ist ein einziger Wurm mit einer Schwanzblase vereinigt, bey der zweyten leben mehrere Würmer auf einer gemeinschaftlichen grossen Schwanzblase; bey der dritten liegt ein mit einer Schwanzblase versehener Wurm, noch in einer besonderen Blase, als in einer Kapsel, verborgen.

Um jedoch den Unkundigen der Helminthologie einen anschaulichen Begriff von diesen räthelhaften Geschöpfen zu machen, habe ich einen ziemlich grossen Blasenwurm letzterer Art aus dem Netze eines Schweins zergliedert, und die an demselben mehr sichtbaren einzelnen Theile (Tab. VII. Fig. 15 — 20.) abgebildet. Die Kapsel oder die Blasendecke (Fig. 15.), welche der besondere Aufenthalt dieser Blasenwurmgattung nothwendig machte, um den Wurm selbst vor jedem Reitz und Druck zu sichern, besteht aus dem Zellgewebe der benachbarten Theile, und ist bald vollkommen rund, bald oval, bald mehr oder weniger verzogen, je nachdem sie in mehreren oder wenigern Punkten an den benachbarten Theilen hängt.

Ihre

Ihre untere Fläche ist gemeiniglich platt, ihre obere erhaben rund. Gegenwärtige war nur von einer Seite mit dem Fette des Netzes verwachsen, (*a. a.*) und hatte von ihrer hängenden Lage eine mehr birnförmige Gestalt. Wird diese zähe und dicke Kapselhaut gegen das Licht gehalten; so sieht man die Schwanzblase der Hydatigene schon deutlich durchschimmern, wird sie aber durch einen Kreutznchnitt geöffnet (Fig. 16.) und ihre Lappen (*a. b. c. d.*) zurückgeschlagen; so erscheint der eigentliche Blasenwurm, als eine Wasserblase von ungleich zarterer Haut (*e.*), welche völlig los in der Kapselhaut liegt. Nimmt man nun diese innere Wasserblase (*e.*) aus ihrem äusseren Gehäuse heraus (Fig. 17.), so entdeckt man an ihrem einen Ende den Wurm selbst, in der Gestalt eines kleinen hervorstehenden Knöpfchens (*a.*), welches am Hintertheile mit einer kleinen, häutigen, sich an die Schwanzblase anschliessenden Wulst (*b.*) umgeben ist und sich ausdehnt, wenn die Hydatigene in laues Wasser gebracht wird. Das Ende dieses Knöpfchens, bildet zwey, durch eine Querspalte getheilte, erhabene Lippen (Fig. 18. *a.*), welche aus jener häutigen Wulst hervorstehen und nur dann sichtbar werden, wenn das Ende der Schwanzblase abgeschnitten und diese Blase (*b.*) sodann umgekehrt wird. Trennt man endlich die Schwanzblase ganz vom Körper der Hydatigene (Fig. 19. und vergrössert Fig. 20.); so erscheint letztere als ein ziemlich kleiner Körper, dessen Vordertheil (*a.*) mehr oder weniger runzlicht und gefurcht, dessen Hintertheil aber mit einer Spalte (*b.*) versehen ist, vor welcher die Schwanzblase (*c. d.*), um die wulstigen Lippen, ihren Ursprung nimmt. Sowohl die eigenthümliche Schwanzblase aller drey Gattungen, als das äussere Involukrum der Kapselwürmer, ist mit einem klaren Wasser so angefüllt, daß man einen Springbrunnen vor sich zu sehen glaubt, wenn man mit einer Nadel in dieselben sticht. Dieses Wasser ist von lymphatischer Beschaffenheit und nicht immer in gleicher Menge vorhanden, indem die Blasen bey manchen Hydatigenen mehr, bey manchen weniger angefüllt sind. Vielleicht wird es, nach *Blochs* Meinung, bisweilen von den Saugmündungen des Wurms eingesogen, und nach einiger Zeit wieder abgesetzt, und durch eine Art von Cirkulation vor der Fäulniß gesichert. Überhaupt aber scheint diese Feuchtigkeit aus den benachbarten Lymphgefässen durch die Blasenhäute zu schwitzen und mithin nur aus dem reinsten und feinsten Theil der Lymphe zu bestehen. Denn nach *Blochs* Versuchen bildet es im kochenden Wasser kein häutiges Wesen, und gerinnt weder durch die Beymischung des stärksten Weingeistes, noch der mineralischen Säuren.

Der durch seine Runzeln bey dem ersten Anblick gegliedert scheinende Körper

per der Blasenwürmer, hat einige Ähnlichkeit von einem Bandwurme und daher Gözen und Pallasen bewogen, sie unter die Bandwürmer zu zehlen. So lange aber die bandförmige Gestalt nicht mit der cylindrischen verwechselt werden darf, so lange kann der Name der Blasenbandwürmer höchstens auf eine und die andere Art passen. Denn nach Blochs, Walters, Kölpins, Treutlers, Lettsons, Gözens gelieferten Beschreibungen und Abbildungen, ist die Bildung des Blasenwurmkörpers, wenn nicht bisweilen mikroskopische Teuschungen obgewaltet haben, wie es vorzüglich bey Gözen der Fall gewesen zu seyn scheint, überaus verschieden. Lezterer vergleicht seine dem blosen Auge, als Körner erscheinenden Blasenwürmer, durchs Mikroskop betrachtet, bald mit einem Herze (Tab. V. Fig. 1.), bald mit einem Becher (Fig. 3.), bald mit einem Kegel (Fig. 4. u. 5.), und stellt die meisten mit Saugblasen (*a. b. a. b.*), einige mit Hakenkränzen (Fig. 4. 5. *c. c.* und Fig. 6. *e.*), deren einzelne Haken halbmondförmige dreyzacken (Fig. 7.) bilden, und an ihrem spitzigen Ende bald mit (Fig. *d.*), bald ohne Öffnung (Fig. 4. *d.*) vor. An einem, unter dem Preßschieber stark vergrößert abgebildeten Blasenwürmchen (Fig. 6.) sah er vier Saugmündungen (*a. b. c. d.*) in einer Reihe, und eine Menge länglicht-runder Körnchen (*g. g.*), welche er für Eyer hielt. Fischers und Zeders neuere Beobachtungen lehren aber, daß alle zur Zeit bekannt gewordenen Blasenwürmer einen einfachen oder doppelten Hakenkranz führen, und die meisten am Kopfende mit vier Saugmündungen versehen sind. Der Nutzen dieser Theile läßt sich nur muthmaßlich angeben. Wenn der Wurm hungrig ist, so streckt er den Körper aus der inneren Blase hervor, reizt mit seinem Hakenkranze die innere, gefälsreiche Fläche der Kapselhaut und bewirkt hierdurch einen grösseren Zufluß ernährender Säfte zu seiner Unterhaltung. Diese werden von den Saugmündungen aufgenommen, dem übrigen Körper des Wurms zugeführt und vielleicht in der Schwanzblase, wie in einem Reservoir abgesetzt, um in Ermangelung des äusseren Zuflusses, aus sich selbst Nahrung zu schöpfen.

Nicht minder beruht die in ein eben so grosses Dunkel gehüllte Fortpflanzung der Blasenwürmer, auf blosser Vermuthung. Nach Göze, Pallas und Retze pflanzen sie sich durch lebendige Jungen fort. Es geschehe diese Fortpflanzung aber durch lebendige Jungen oder durch Eyer; so ist es immer schwer zu begreifen, wie diese Nachkommenschaft, vorzüglich bey dem in eine äussere Blase eingeschlossenen Kapselwurm, von den benachbarten Gefässen absorbiert, zu den übrigen Höhlen des Körpers, und zu der Gebärmutter gebracht werden und von da zu denjenigen Eingeweiden des Fötus gelangen kann, welche die der Natur dieser

Bla-

Blasenwürmer angemessensten Wohnplätze sind; man müßte denn annehmen, daß die in der Schwanz- oder Kapselblase abgesetzten Eyer, durch das endlich erfolgende, den Tod des Wurms nach sich ziehende Zerplatzen dieser Blasen ausgeschüttet, und nun erst von den Saugadern aufgenommen, anderen Theilen zugeführt, oder gleich in der Nähe ausgebrütet werden könnten. Bey dieser und anderen Schwierigkeiten bleiben sie dennoch Menschen und Thieren angeboren, da sie von der Natur so gebildet sind, daß sie zur Erhaltung ihres Lebens den thierischen Körper nicht entbehren können, und schon in neugebohrnen Kindern, aber nirgends ausserhalb dem thierischen Körper angetroffen worden sind. Eben so unbekannt, wie ihre Fortpflanzungsart, ist ihre Lebensdauer, die Art, wie sie von der Natur aus dem Körper geschafft werden, wenn sie umgekommen sind, und der Schaden, welchen sie dem menschlichen Körper zufügen können. Im Gehirne der Schafe veranlassen sie die Drehkrankheit. Eine bedeutende Anhäufung derselben im Gehirne des Menschen, läßt wohl ähnliche, oft unerklärbare, die Störung der Verrichtungen des inneren und der äusseren Sinne verrathende Zufälle erwarten. Vorzüglich scheinen sie an den in so vielen Fällen unheilbaren epileptischen Krankheiten, an manchen Arten der Schlafsucht und an verschiedenen Verstandesverwirrungen einen wichtigen Antheil zu nemen und, wegen ihrer Verborgenheit, zu den unüberwindlichsten Feinden unserer Kunst zu gehören. Die bis jetzt bekannt gewordenen Arten dieser Blasenwürmer sind: 1) die *Taenia visceralis Treutleri*, 2) die *Taenia muscularis*, 3) die *Taenia pyriformis*, 4) die *Taenia albopunctata* und 5) der *Polycephalus hominis*.

I. Treutlers Eingeweide-Blasenwurm. Tab. V. Fig. 8—11

Taenia visceralis, vesicula simplice inclusa, capitis tuberculis tribus, totidemque corporis articulis, basi vesicae affixis. Habitat in peritoneo.

Treutleri Auctarium ad Helminthologiam, p. 14. Tab. III. Fig. 1—4.

An der inneren, leicht entzündeten Fläche des Bauchfells eines an der Wassersucht gestorbenen Weibes, fand *Treutler* verschiedene gelbe, halbdurchsichtige, grössere und kleinere Blasen (Tab. V. Fig. 8. *b. c. d. e.*), und, nachdem er ihre Haut durch einen Kreuzschnitt geöffnet hatte (Fig. 9.), bisweilen in der Mitte, bisweilen an einer oder der anderen Seite, ein kleines nur dem bewaffneten Auge erkennbares Körperchen, welches oft in kleinen Blasen groß, oft in grossen Blasen

sen klein, und nie in einem bestimmten Verhältnisse mit diesen Blasen war. Die nähere Untersuchung lehrte, daß dieses Körperchen aus einem runden Knötchen bestand, unter welchem zu beyden Seiten zwey kleine blattförmige Spitzen (Fig. 9.) hervorragten. Wenn man diese Spitzen von der Seite betrachtete, (Fig. 10.); so ergab sich, daß sie nebst jenem Knötchen, den Kopf dieses Blasenwurms ausmachten. Nach diesem Kopfe folgten noch drey, immer an Grösse abnehmende Glieder, wovon das letzte mit der inneren Blasenhaut zusammenhieng. Der ganze Wurm konnte sich gegen letzteres Glied zurückziehen, indem er seine Glieder in einander schob, oder sich überhaupt verkürzte. Hierdurch kam es, daß bisweilen nur der Kopf (Fig. 12.), bisweilen nur zwey Glieder sichtbar waren. Übrigens hat *Treutler* am Kopfe weder Saugmündungen, noch einen Hakenkranz, als die gewöhnlichen Merkmale des Geschlechtscharakters, wahrnehmen können, und nur die Bildung der Glieder bewog ihn, diesen Wurm unter die Bandwürmer zu zehlen.

2. Der Muskelblasenwurm. Tab. V. Fig. 12—16.

Taenia muscularis seu *Finna humana*, capsula vaginali cartilaginea, vesicula caudata apicibus obtusis. Fischer in Contin. secund. verm. intest. Werneri, p. 2.

Tab. I. Fig. 1—8. Habitat in Tela cellulosa musculorum.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 415. n. 1.
Tab. I. F. 7. *Hydatid humana*.

Göze, neueste Entdeckung, daß die Finnen im Schweinefleisch keine Drüsenkrankheit, sondern wahre Blasenwürmer sind.

Linnaei S. N. T. I. P. VI. p. 3059. n. 6. *Taenia Cellulosae*.

Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturforsch. Freunde, B. I. S. 349.

Treutleri Auctar. p. 27. *Taenia Cellulosae*.

Die bey den Schweinen häufig vorkommenden Finnen, welche lange Zeit von den Ärzten für eine Krankheit der Drüsen, von anderen unwissenden Personen aber für ein mit der Lustseuche beym Menschen verwandtes Übel gehalten worden sind, hat *Fischer* neuerlich auch in menschlichen Leichnamen entdeckt. Sie sind nichts anderes, als die Wohnungen einer Gattung Blasenwürmer, und in dem Zellgewebe beynahe aller Muskeln des ganzen Körpers zerstreut gefunden worden, wobey man gleichwohl nie die geringste widernatürliche Beschaffenheit oder Veränderung der gesunden Röthe der Fleischsubstanz in der Nachbarschaft dieser von Würmern bewohnten, länglicht - runden Blasen wahrgenommen hat. Ohngeachtet *Fischer* dafür hält, daß in Rücksicht der Finnenkrankheit vorzüglich sehr abgemagerte Leichname untersucht zu werden verdienen, bey welchen dem Druck des Fingers nachgebende Knöten unter der Haut gefühlt werden könnten; so ist es

doch wahrscheinlich, daß eben sowohl wie bey den Schweinen, auch bey dem Menschen, daß Fett der Thierischen Ökonomie dieser Würmer am angemessensten sey, und daß vielleicht ein schleichendes Fieber das Fett zwischen den Muskeln des Leichnams aufgezehrt habe, an welchem er seine Beobachtung der menschlichen Finnen anstellte. Auch macht es das Übermaas vom Fett erklärbarer, warum die von demselben umhüllten Finnen nicht früher bey dem Menschen wahrgenommen worden sind, und warum man zur Zeit noch durch keine auffallende Erscheinung am menschlichen Körper auf die wahrscheinliche Gegenwart derselben geleitet worden ist? In den Schriften der Berlinischen Gesellschaft wird zwar ein Beyspiel von einem damit behafteten Kranken angeführt, der einen harten Leib mit ungleichen Erhöhungen bey einer übrigens gesunden Gesichtsfarbe hatte, und *Bloch* macht hierauf, als auf ein wahrscheinliches Merkmal der Finnenkrankheit, aufmerksam. Allein dieser Umstand hat noch immer zu wenig Auszeichnendes, um nicht eben sowohl auf andere Krankheiten des Unterleibes, vorzüglich bey Kindern, schliessen zu lassen. Doch ich eile zur Beschreibung dieser Blasenwurm-gattung selbst.

Die menschliche Finne unterscheidet sich nicht nur durch ihren Sitz, sondern auch durch die Zahl und Beschaffenheit ihrer Blasenhäute sehr von den übrigen Würmern dieses Geschlechts. Sie ist aus drey verschiedenen Blasen zusammengesetzt, nemlich aus der äusseren Blase (*Vesica vaginalis*), aus der knorplichten Linsenblase (*Capsa lenticularis*), und aus der getheilten Innenblase (*Vesica caudata*).

Die äussere Blase (Tab. V. Fig. 13.) ist ungefähr einen Zoll lang, in der Mitte drey bis vier Linien breit, und läuft von da gegen beyde Seiten schmaler in zwey abgerundete Enden aus. Sie liegt bisweilen locker im Zellgewebe zwischen den Muskelfasern (Fig. 12. d.), bisweilen ist sie aber auch durch dieses Zellgewebe und durch die Blutgefässe (Fig. 13. b.), welche sie umschlängeln, so befestiget, daß sie nicht ohne einige Gewalt getrennt werden kann. In der Mitte dieser äusseren, weissen, oder röthlichten und überaus festen Blase, schimmert ein rundes, knorpelartig anzuführendes Körperchen (Fig. 13. c.) durch, welches gegen die beyden Enden der äusseren Blase in zwey schmale und stumpfe Spitzen ausläuft. Dieses ist die, nur den mittleren Theil der äusseren Blase ausfüllende Finne selbst. Sie besteht 1) aus der knorplichten Linsenblase (Fig. 14. b. und Fig. 15. a.) — einer erhabenen, linsenförmigen, knorpelartigen, nur auf einen starken Druck zer-springenden Kapsel, die an ihrer vorderen und dünneren Seite mit einem Grüb-
chen

chen versehen ist, in welches sich der enthaltene Wurm auf jedem angebrachten äusseren Reitz zurückzieht; 2) aus der getheilten, festen, durchsichtigen gleichsam die Grundfläche der Linsenblase ausmachenden, eigentlich aber aus zwey, in der Mitte (Fig. 15. c. mit einander vereinigten Bläsgen zusammengesetzten Innenblase (Fig. 14.) a. a. und Fig. 15. b. b.); und 3) aus dem Wurne (Fig. 15. d. e.) selbst, dessen Schlupfwinkel theils die äussere Blase, hauptsächlich aber die knorplichte Linsenblase sind, welche jedem nachtheiligen Druck der sich zusammenziehenden Muskelfasern von ihm abwenden. Er besitzt in der getheilten Innenblase so viel Spielraum, daß er sich nach allen Seiten frey bewegen kann. Streckt er seinen Kopf aus der Linsenblase hervor; so entdeckt man schon mit blosem Auge an ihm die charakteristischen Merkmale des Bandwurms, nemlich den Saugrüssel nebst den Seitenwärtchen des Kopfs (Fig. 15. d.). Unter dem Mikroskope erscheint alles dieses weit deutlicher, und man wird eine auffallende Ähnlichkeit zwischen diesem Blasenwurm und dem langgliedrichten Darmbandwurme gewahr. Hinter dem Saugrüssel (Fig. 16. a.) befinden sich, wie bey letzterem, zwey Reihen kleiner Saugbläschen (b. b.) mit ihren Blasenstielen, am breitesten Theil des Kopfs aber, vier Saugwärtchen, wovon in gegenwärtiger Zeichnung nur zwey (c. c.) sichtbar sind. In den sich am Kopfe anschliessenden zwanzig und mehr Gliedern des Leibes, bemerkt man ebenfalls drey, die ganze Länge des Wurms durchlaufende Linien (f. e. f.), wovon die mittlere (e.) der vom Saugrüssel seinen Anfang nemende mittlere Kanal, die zwey übrigen (f. f.) aber die beyden Seitenkanäle sind. Jeder dieser Seitenkanäle vereinigt in sich die Mündungen zweyer Seitenwärtchen des Kopfs. Die Glieder des Körpers selbst sind an den Rändern (d. d. d. d.) gezackt und werden immer breiter, je mehr sie sich vom Kopfe entfernen, das letzte aber hängt mit der Linsenblase (Fig. 15. a.) zusammen. Über die Veränderungen und Zufälle welche die Finnen im menschlichen Körper zu veranlassen pflegen, können erst künftige, zahlreichere Beobachtungen Aufschluß geben.

3. Der birnförmige Blasenwurm. Tab. V. Fig. 17 — 21.

Taenia piriformis, capite globoso, proboscide obtusa, papillis sugentibus quatuor multum prominentibus, hamulorum serie duplici, collo tenui, vesica in cauda piriformi. Habitat in plexu choroideo.

Fischer, J. L. *Taeniae hydatigenae in plexu choroideo inventae Historia*, p. 25. Fig. 1 — 5.

Als Fischer 1788 den Leichnam eines jungen, an einem hitzigen Fieber gestorbenen Menschen öffnete, dessen Gefässe er eben ausgesprützt hatte, fand er
die

die in dem dreyeckigen oder Seitenhirnhöhlen (*ventriculi tricornes s. laterales*) befindlichen Adergeflechte (*Plexus choroidei*), welche aus den Ästchen der Kopfschlagader oder (*Arteria carotis*), aus Venen und Lymphgefässen bestehen, und eine dünne Haut bilden, mit kleinen Wasserblasen besetzt (Tab. V. Fig. 18.) Diese Wasserblasen waren alle eyrund, oder vielmehr birnförmig. Sie hiengen mit dem schmalen Ende fest an jenen Adergeflechten, der breite Theil aber schwam frey in der Feuchtigkeit der Hirnhöhlen. Sobald er den grössten Theil des Adergeflechtes (Fig. 18.), an welchem ungefehr 23 Blasen (*a. a. a.*) hiengen, in warmes Wasser geworfen hatte, fiengen die Wasserblasen an, mehr aufzuschwellen und an dem breiten und freyen Theil derselben, der verborgene Wurm in Gestalt eines weißlichten, runden Körperchens (Fig. 19. *a.*) sichtbar zu werden. Dieses runde Körperchen verlängerte sich allmählich und streckte zuerst den Körper, dann den in letzteren zurückgezogenen Hals und Kopf weit hervor (Fig. 20. *a. a.*), welches um so mehr Bewunderung zu verdienen schien, da der Leichnam zu Anfang des Winters einen hohen Grad der Kälte ausgesetzt gewesen war. Allein, diese scheinbare Lebensäusserung hieng blos von der Wärme ab, durch welche die Blase ausgedehnt und hiermit der Wurm von innen nach aussen getrieben wurde.

Es war dieses also ein Blasenwurm ohne äussere Blase oder Kapsel, dessen Kopf, wie bey den Bandwürmern, einen Rüssel (Fig. 21. *a.*), vier Saugwärzchen (*c. c.*) und einen doppelten Hakenkranz (*b. b.*) hatte.

Der Rüssel (*a.*) war abgerundet und ragte vor den vier Saugwärzchen hervor. An seinen hinteren Theil schloß sich der doppelte Hakenkranz (*b. b.*) an, welcher aus zwey Reihen überaus kleiner, zur Verwundung geschickter Håkchen bestand, deren spitziger Theil nach dem Hals des Wurms gerichtet, und deren erste Reihe etwas grössere, deren zweyte Reihe aber kleinere Håkchen, alle von röthlicher Farbe und einer gewissen Härte und Festigkeit, hatten. Die vier Saugwarzen (*c. c.*), welche auf jenen doppelten Hakenkranz folgten und durch welche der Kopf eine mehr kugelförmige, als lange Gestalt erhielt, gaben zugleich den Anschein, als ob der Kopf in vier Theile getheilt wäre. Jede Saugwarze hatte einen wulstigen Rand und in der Mitte eine Öffnung oder Saugmündung. Aus jeder dieser Saugmündungen nam ein Nahrungskanal (*d. d.*) seinen Anfang, welcher in den Hals (*e.*) und in den übrigen Körper des Wurms (*f.*) übergieng. Der Hals selbst war überaus dünne, hatte lauter Querrunzeln, und schien hierdurch, gleich den Darmbandwürmern, gegliedert zu seyn. Diese Runzeln entstanden aber blos, wenn sich der Wurm zusammenzog und verschwanden, wenn er sich ausstreck-

streckte. Der Körper selbst machte den dickeren und längeren Theil des Wurms aus, war eben so runzlicht und endigte sich in der Blase (g.), diesem eigenthümlichen Theil des Wurms, ohne welchen derselbe nicht bestehen kann.

Der Entdecker dieser neuen Gattung Blasenwürmer, konnte übrigens keine widernatürliche Veränderung in den Theilen wahrnehmen, wo sie sich aufgehalten hatten. Auch war der Kranke schon beynahe halb todt, als er ins Lazareth gebracht wurde, und da man keine weitere Nachricht von ihm einziehen konnte, schwer zu bestimmen, ob die besondere Stumpfheit seiner Seelenkräfte, welche er äusserte, Folge der Krankheit, oder der Würmer oder ein angeborener Fehler war.

Ausser diesem Fall gedenkt *Fischer* noch eines anderen, wo er an verschiedenen Stellen der harten Hirnhaut eines anderen männlichen Cadavers, vorzüglich in der Gegend des rechten Seitenbeins (*Ossis brechmatis dextri*), eine Menge kleiner, der Gestalt nach den birnförmigen Blasenwürmern völlig gleichkommender Bläsgen (Tab. V. Fig. 17. a. a. a. a.), in mehreren Häuffchen vertheilt, antraff. Da er wegen ihrer Kleinheit keine Spur eines Wurms an ihnen entdecken konnte, und gleichwohl die Form dieser Bläsgen ganz von derjenigen, der gewöhnlichen Hydatiden abwich; so blieb er ungewiß, ob sie blosse Wasserbläschen, oder die Wohnungen kleiner, birnförmiger, vielleicht eines Wachsthums fähiger Blasenwürmer waren?

4. Der weifspunktirte Blasenwurm. Tab. VI. Fig. 1 — 2.

Taenia albopunctata, velamento externo capsulari, capite sessile, papilla suctoria una, una tantum sex hamulorum corona, vesica in cauda rotunda.

Habitat in plexu choroideo.

Treutleri Auctarium, p. 1. Tab. II. Fig. 1. 2.

Eine neue Gattung Blasenwürmer, welche *Treutler* in den Adergeflechten des Gehirns (*Plexus choroidei*) einer acht und zwanzig jährigen, nach einem hartnäckigen Wechselfieber wassersüchtig gewordenen Frau entdeckt hat. Diese Person klagte in dem letzten Monate ihres Lebens über eine grosse Schwere des Kopfs in der rechten Seite des Hinterhaupts, über unwillkührliches Thränen und öftere Verdunklung der Augen. Sie schlief mit nicht völlig geschlossenen Augenliedern so fest, daß sie nur mit Mühe geweckt werden konnte. Gehör und Sprache wurden von
Tag

Tag zu Tag schwerer und sie konnte sich auf nichts mehr besinnen. Alle freywilligen Muskelbewegungen fielen weg, so daß sie weder im Stande war, den Kopf aufzurichten, noch einen Arm oder Fuß zu heben. Hierzu gesellten sich bisweilen Convulsionen und apoplektische Anfälle. Endlich sank sie, als sie sich wieder zu erholen schien und Versuche herumzugehen machte, plötzlich todt zur Erde.

Bey Öffnung des Kopfs wurden die Adergeflechte varikös und vom Blute strotzend angetroffen. Im rechten Plexus (Tab. VI. Fig. 1.) befanden sich vierzehn, im linken zwey Hydatiden, welche überall mit dem benachbarten Zellgewebe verbunden, und daher schwer zu trennen waren. Sie hatten keine bestimmte Grösse, und ihr in einer dünnen Haut bestehender, sowohl mit dem Körper des Wurms, als mit der Schwanzblase an mehreren Stellen zusammenhängender Überzug (Fig. 2. b. b.), schien von der Haut der ausgedehnten, varikösen Lymphgefäße entlehnt zu seyn.

Die Würmer selbst gehörten unter die einfachen Blasenwürmer. Sie führten am Schwanzende eine nicht vollkommen runde, sondern etwas zusammengefallene Wasserblase, deren Durchmesser von zwey zu sieben Linien stieg und in welcher von der enthaltenen Feuchtigkeit immer etwas Schleimichtes auf dem Boden zurückblieb. Mit der Schwanzblase war ein langes, deutliche Einschnitte führendes Würmchen (Fig. 2. c.) verbunden, dessen Länge verschieden in verschiedenen Hydatiden war; denn manche waren zweymal, manche dreymal so lang als die Schwanzblase. Die ungeränderten kurzen Glieder wurden immer kürzer und winklichter gegen den Kopf, dessen kurzer, niedergedrückter, nur mit einem einzigen Saugbläschen versehener Saugrüssel (c.), mit sechs, im Verhältnisse des Wurms ziemlich langen Häkchen umgeben war. Es schien, daß der Wurm den Saugrüssel mit diesem einfachen Hakenkranz zurückziehen konnte, weil ihn *Treutler* an vielen gar nicht bemerkte.

5. Der Menschenvielkopf. Tab. VII. Fig. 21 — 23.

Polycephalus hominis, corona uncorum simplici, capite imperforato, corporibusque pyriformibus. Zeders erster Nachtrag, S. 309. Tab. II. Fig. 5 — 7.

Habitat in hominis encephalo.

Herr Professor *Meckel* in Halle hatte gegenwärtige Blasenwurmart in dem Gehirne eines Menschen gefunden und sie dem seligen *Göze* zur Untersuchung übersandt,

sandt, aus dessen hinterlassenen Papieren Herr Dr. Zeder Beschreibung und Abbildung mitgetheilt hat.

Die gemeinschaftliche Blase (Tab. VII. Fig. 21. *a. b. c. d. e.*) dieser geselligen Blasenwurm-gattung ist von aussen ganz glatt, fahlgelb, ziemlich dick und fast lederartig. Ihre Grösse steigt von der einer welschen Nuß bis zu der einer geballten Faust. Einige sind etwas durchsichtig und man sieht in denselben eine Lymphe mit einer gelblichen Materie schwanken. Von den sie bewohnenden Würmern sind oft 3, 5, 15 ja 50 auf einer Blase vorhanden, welche sich mit ihren einfachen Hakenkränzen (*f. g. h. i. k.*) in dieselbe zurückziehen. Werden sie aus der gemeinschaftlichen Blase (Fig. 22. *c. d.*) herausgepreßt und unter das Mikroskop gebracht; so erscheinen sie (*a. b.*) ohne Saugmündungen, erhaben und glatt an ihrem Vordertheile, sodann umzogen von einem einfachen Hakenkranze, nach ihrer gänzlichen Trennung von der gemeinschaftlichen Blase aber (Fig. 33.) bauchicht und am Ende birnförmig verengt und abgerundet.

Zeder versichert, daß er ähnliche Vielköpfe von verschiedener Grösse aus dem Gehirne eines Mädchen besitze und erzehlt von ihrer Krankheit und Leichenöffnung folgendes: „Sie war zu Anfang ihrer zwey letzten Lebensjahre häufig mit Kopfweh und Schwindel geplagt, und brauchte dagegen viel ohne sonderlichen Nutzen. Ein halbes Jahr vor ihrem Tode schien sie sich etwas zu bessern und besuchte einen Anverwandten in Franken. Hier trank sie nun, trotz des Verbotes ihrer Ärzte, fleissig recht starken Kaffée und hielt sich dabey an ihre verbotenen Ausländerweine. So lebte sie vergnügt einige Wochen, bis sie auf einer Wasserfahrt an einem drückend heissen Tage von ihrem Kopfweh und Schwindel so heftig überfallen wurde, daß sie ohne Besinnung auf die Flösse hinstürzte. Sie klagte über Spannen in der Stirne, Abnahme des Gedächtnisses und des Gesichts, abwechselndes Kopfweh und Schwindel. Bald wurden diese Zufälle so heftig, daß sie ihre Bekannten zur Noth aus der Sprache, durch das Gesicht aber gar nicht mehr erkannte; daß sie auch das schwächste Licht nicht ertragen konnte; daß sie endlich nicht mehr aufrecht zu gehen vermochte, sondern mit vorgehängtem Oberleib gerade ausschloß, und, wenn Gegenstände vorstanden, darauf hinstieß, fast wie die Schafe, welche den Dreher haben. Sie starb endlich und wurde geöffnet.“

„Nach durchschnittenen und zurückgeschlagenen Balken und Gewölbe, entdeckte man in der dritten Hirnhöhle nebst dem noch vorhandenen Wasser, auch eine besondere Art Wasserblasen, welche eine, dem aufgelösten Gummi ähnliche

Fench-

Feuchtigkeit enthielten. In dem Zugange zur Wasserleitung des Sylvius und zum Theil unter dem hintern Ende der Wurzel des Sehnervens der linken Seite, fand man eine ähnliche Blase, welche die Grösse eines Hünereyes überstieg, und an welcher noch drey kleinere anhiengen. Beym Herausnehmen aber zersprang sie und enthielt nebst vorbeschriebener Feuchtigkeit noch drey kleinere Blasen in sich. Nach abgeschnittenen Nerven bemerkte man das Gezelt des kleinen Gehirns sehr in die Höhe getrieben; nach dessen Durchschneidung und nach dem Herausnehmen des kleinen Gehirns aber fanden sich in der vierten Höhle, nebst Wasser, auch noch mehrere Blasen, welche diese Höhle widernatürlich ausdehnten, daß sie ein Hünerey in sich fassen konnte. Im Grunde dieser Höhle auf der rechten Seite, fand sich eine verhärtete Stelle von der Grösse einer Mandel und von gelblicher Farbe, wie mit Eiter bedeckt. Von dieser Verhärtung an verbreiteten sich nach verschiedenen Richtungen andere Verhärtungen in Gestalt von Darmsaiten. Da man nun, ausser dem vielen Wasser, welches gegen ein Viertelmaas betrug, zwölf Blasen von verschiedener Grösse, welche an Figur den Eyern im Eyerstocke der Hühner gleichen, vorgefunden hatte, und sich sowohl die Krankheits- als die Todesursache hieraus erklären ließ, so stund man von aller weiteren Untersuchung ab.“

F ü n f t e r A b s c h n i t t .

Blattwürmer, Ligulae.

Zu den helminthologischen Entdeckungen der neueren Zeiten gehört auch die des Blattwurmgeschlechts im menschlichen Körper, dessen Ähnlichkeit mit einem Pflanzenblatte zur teutschen, und dessen Ähnlichkeit mit einem Züngelchen zur lateinischen Benennung Veranlassung gegeben hat. Man kennt hiervon gegenwärtig drey, sich ausserhalb dem Darmkanale aufhaltende Gattungen, nemlich den *Leberblattwurm*, den *Fettblattwurm* und den *Venenblattwurm*.

1. Der Leberblattwurm. Tab. VII. Fig. 13. 14.

Fasciola hepatica, ovata plana, Buchholzii. Habitat in vesicula fellea.

Bauhinus, J. ap. Bonetum anat. pr. L. IV. S. I.
Obs. 60. §. 11.

aliorumque animantium hepate detectis, ad Virum
celebr. A. van Leuwenhoek. Delft, 1698. c. Fig.

Pallas, Diss. de Infest. viv. in Sandif. Thes. Diss.

Bidloo, Observatio de Animalculis in Ovino,

Vol. I. p. 252.

Es

Es ist bekannt, daß in der Leber und nach *Lenzens* mir schriftlich mitgetheilten Beobachtung, auch in der Gallenblase kranker Schafe, sehr häufig eine Art Würmer vorkommt, welche *Leberegel*n (*Fasciolae hepaticae*) genannt werden. Von ähnlichen, selbst in menschlichem Körper wohnenden Würmern, findet man hin und wieder bey den Schriftstellern Spuren. So entdeckte *Bidloo* einst in und an der menschlichen Leber Würmer, welche zwar von den bey den Schafen vorkommenden verschieden waren, hielt sich aber überzeugt, selbst die eigentlichen Leberegel in der menschlichen Leber gesehen zu haben, und *Bauhini* liefert eine ähnliche Beobachtung von einem an den Masern gestorbenen Knaben, in dessen Pfortaderästen und Gallengängen sich viele, zum Theil lebendige, grössere, rothe länglichte und weiche Würmer befanden. Ferner versichert *Pallas*, daß er in einem weiblichen Leichname einen Ast des Lebergallengangs (*ductus hepaticus*) von todtten Leberegel n (*Fasciolis*) angepropft gefunden habe. Das Zweifelhafte dieser und ähnlicher Beobachtungen entfernt des verstorbenen Herrn Bergraths *Buchholz* in Weimar neuere Entdeckung. Er fand nemlich im Jahre 1790 in der Gallenblase eines am Faulfieber gestorbenen Züchtlings eine grosse Menge Würmer, welche er dem Herrn Professor *Lenz* übersandte, der mir sie gefälligst aus der Herzoglichen Sammlung zur Abbildung und Aufnahme in gegenwärtige Schrift mittheilte.

Sie (Tab. VII. Fig. 13.) waren sämmtlich drey bis vier Linien lang, höchstens anderthalb Linien breit und etwan einer Viertellinie dick. Ihr Vorder- und Hinterende zeigten sich unter dem Mikroskope beynahe gleich schmal und gleich stumpf abgerundet (Fig. 14.). Von jenem (*a.*) aus nam der Körper schnell an Breite zu, gegen letzteres (*b.*) wurde er aber schon in einer beträchtlicheren Entfernung schmaler. Die überaus durchsichtige, weißgelbe Substanz des Wurms verstattete unter dem Vergrößerungsglase den schönen Anblick eines Geflechtes zahlreicher Gefässe, welche von einem geschlängelten, mittleren Hauptkanal zu entstehen schienen, der sich gegen das Schwanzende (*b.*) vereinfachte. Wahrscheinlich war dieses der Nahrungskanal und die feineren, zu beyden Seiten herablaufenden und sich unter der Mitte des Wurms endigenden Geflechte, die Fortpflanzungsorgane.

Leider! hat *Buchholz* nichts von den besonderen Krankheitszufällen des Züchtlings und den in dessen Leichname gefundenen widernatürlichen Veränderungen mitgetheilt. Nach *Pallas* aber waren dergleichen Cadaver immer wassersüchtig von den zerrissenen oder wenigstens gepreßten Lymphgefässen, ihr Netz zu-

sammengeschrumpft, ihre Nieren ungewöhnlich klein, ihre Leber sehr groß, die Gallengänge überaus ausgedehnt, die Galle geschmacklos, dick und körnig, und beynahe alle inneren Theile mit Hydatiden besetzt.

2. Der Fettblattwurm. Tab. VI. Fig. 3 — 5.

Hexathyridium Pinguicola, labio distincto, retractili; capite in fine ostiis sex perforato; cauda curvata; ventre biporeo. Habitat in pinguedine.

Treutleri Auctarium ad Helminth. p. 19. Tab. III. Fig. 7 — 9.

Bey der Leichenöffnung einer zwanzigjährigen, nach einer schweren Geburt plötzlich gestorbenen Frau, entdeckte *Treutler* im Fette des linken Ovariums in der Gegend, wo das breite Mutterband seinen Anfang nimmt, eine verhärtete Stelle von der Grösse einer grossen Haselnuss und von rother Farbe, welche so locker im Zellgewebe saß, daß sie sich hin und her schieben ließ. Er machte in dieselbe einen Einschnitt und fand, daß sie aus verhärtetem Fette bestand, und in der Mitte eine länglichtrunde Höhle hatte, welche eine überaus zarte, feuchte und glatte Haut auskleidete. Im Boden der Höhle traf er endlich ein lebendiges, organisches Körperchen (Tab. VI. Fig. 3.) an. Es lag frey und unangewachsen in derselben und war bey näherer Untersuchung ein kleiner, acht Linien langer Wurm (Fig. 4.), von Gestalt lang und flach, vorne etwas abgerundet, in der Gegend des Halses schmaler, dann aber am Hinterleibe wieder sehr breit, hinten spitzig, oben etwas convex, und unten etwas concav.

Das Kopfende dieses Wurms umzog eine lippenartige Wulst, die sich zu beyden Seiten des Halses verschmälert herabzog und sechs kleine Löcher oder Saugmündungen (Fig. 5.) in einem halben Kreise am Vorderrande hatte. Wegen dieser sechs Saugporen gab ihm *Treutler* den Namen *Hexathyridium*, und wegen seines Aufenthalts im Fette den Beynamen *Pinguicola*. Am Halse, oder an dem hinter dem Kopfende verengerten Theil, sahe man mehrere verblichene Runzeln, am Körper zu beyden Seiten gelbe Ränder, am runzlichten und etwas durchsichtigen Hinterleib auf beyden Seiten die Eingeweide. Das Ende des Hinterleibes war in der Gegend, wo sich der spitzige, etwas geränderte und etwas gegen die linke Seite gekrümmte Schwanz anfieng, mit einer kleinen warzenartigen Erhabenheit und einer Öffnung, weiter hinten aber, nahe an der Schwanzspitze mit einer zweyten etwas kleineren Öffnung versehen.

3. Der Venenblattwurm. Tab. VI. Fig. 6—8.

Hexathyridium venarum, corpore elongato, depresso, lanceolato; capite labiato, infra poris sex obsito; collo indistincto; dorsi areola ex albo caerulea; ventre, poris duobus dissitis; cauda recta; margine nullo. Habitat in venis. Treutleri Auctar.

p. 23. Tab. IV. Fig. 1—3.

Baratte et Bousquet de vermibus in sanguine; in Vandermon. Journ. T. VI. p. 300. et T. VII. p. 65.

Bartholinus, Th. von Würmern im Blute, in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. I. S. 107.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 281. vermes in sanguine, qui e vena secta prosiliunt.

Fränkische Sammlungen, B. VIII. S. 322. Fig. 2.

Ein Jüngling von sechzehn Jahren, der alle Zufälle hatte, welche die Afterwürmer hervorzubringen pflegen, gieng einsmals allmählich ins Wasser, um sich zu baden. Mit einem Male sprang ihm die vordere Schienbeinvene des rechten Fusses auf, und es erfolgte eine nicht unbeträchtliche Verblutung. Aus der Venenöffnung ragte eine dickere Materie hervor, welche Treutler anfänglich für geronnenes Blut hielt. Bey genauerer Untersuchung boten sich aber zwey lebendige Thierchen dar, nach deren Herausname aus der Vene, das Bluten sogleich nachliefs, die Wunde aber heilte erst nach drey Wochen. Von dieser Zeit an fühlte sich der Kranke etwas erleichtert; doch war dieses von keiner Dauer und die alte Krankheit kehrte schon nach einigen Wochen zurück. Die Anwendung aller bekannten Wurmmittel war fruchtlos und kein Afterwurm gieng ab, woraus er schlofs, daß die Zufälle des Kranken mehr von den die Blutgefäße bewohnenden Würmern, als von Askariden herrührten.

Die Würmer selbst (Tab. VI. Fig. 6. 7.) hatten eine lanzettenförmige Gestalt und stumpfe Seitenränder, waren am Vordertheile schmaler und zusammengedrückt. Der abgestumpfte Kopf war mit Lippen und sechs Poren unter diesen Lippen versehen, und gieng, ohne eine deutliche, halsförmige Verengung zu machen, in den Körper des Wurms über. Auf dem Rücken (Fig. 7.) sah man hinter der Kopf- lippe bis gegen die Mitte, eine länglichte, etwas erhabene, weißblaulichte Stelle und an den Seitenrändern die Eingeweide in zwey punktirten Linien durchschimmern. An der untern Fläche des Wurms (Fig. 6.) erschien in der Gegend des Halses eine grössere und am Schwanzende eine kleinere Öffnung. Auch schimmerten die Eingeweide noch deutlicher, als auf der Rückenfläche, in zwey Reihen mit feinen Ästchen durch. Das Schwanzende war gerade, halbdurchsichtig und ungerändert.

Es ist, wie Treutler selbst versichert, nichts unerhörtes, daß Blutgefäße von Wür-

Würmern bewohnt worden sind und oft tödliche Krankheiten veranlaßt haben. Bey den Thieren kommen dergleichen Beyspiele nicht selten vor. Doch fehlt es selbst nicht an Beyspielen ähnlicher Art bey dem Menschen. Man liest unter andern in den Fränkischen Sammlungen eine merkwürdige, mit obigem Fall viele Ähnlichkeit habende Geschichte. „Eine Frau von dreysig Jahren, im sechsten Monate schwanger, ausser einem halbseitigen Kopfweh, weiter mit keinen Zufällen behaftet, liess vorigen Merz am Arm zur Ader. Die Öffnung war groß, als aber kaum zwey Unzen heraus waren, hemmte sich der Lauf des Bluts auf einmal. Der Barbier wischte mit dem Schwamm an der Öffnung, und dann floss es wieder so stark, wie vorher. Nachdem das Blut in einem Becken einige Stunden gestanden, entdeckte der Mann gedachter Frau auf der Oberfläche des Bluts einen Wurm, der noch lebte, und da er gewiss wuste, daß ihn niemand von aussen auf das Blut bringen können; so schloß er, daß er mit dem Blute aus der Ader gekommen seyn müsse. Dieser Wurm kam genau mit den im *Journal de Medecine de Vandermonde* beschriebenen Blutwürmern überein und schien in das Geschlecht der Wasseregeln zu gehören, hatte siebenzehn Ringe, klammerte sich mit seinem breiten, blutegelförmigen, concaven Fuß- oder Schwanzende an dem Boden, oder den Seiten des Gefässes an, war glatt, durchsichtig weiß, und hatte einen Viertelszoll grossen, spitzig zulaufenden Rüssel.“ Der Herausgeber setzt hinzu, daß er vor mehr den zwanzig Jahren das Blut von einer Weibsperson erhalten, welches, nachdem es kaum vier und zwanzig Stunden gestanden, mit kurzen runden, sehr dicken, von der obigen Art aber völlig verschiedenen Würmern angefüllt war. Auch schreibt *Bartholinus* in den Abhandlungen der k. Ak. d. Nf. „ein mit Würmern angefülltes Blut floss aus einer geöffnetem Ader.“ Ebendasselbst sind noch verschiedene Beobachtungen von Würmern im Blute angeführt, z. B. daß dem Herrn Beveron, königl. Stadthalter in der Normandie 1658 ein Wurm einer Spanne lang, aus einer geöffneten Ader gezogen worden, worauf der Kranke nach drey Tagen gestorben sey.

Ältere Schriftsteller behaupteten, daß das Blut besonders in Faulfiebern Würmer zu enthalten pflege. Hierüber müßten freylich erst mikroskopische Untersuchungen des im Faulfieber frisch aus der Ader gelassenen, aber nicht des schon eine Zeit lang gestandenen Bluts entscheiden. Denn die erst in letzterem zum Vorschein gekommenen, und von verschiedenen Schriftstellern beobachteten Würmer, waren sicher nichts, als Insektenlarven, welche sich aus den in dasselbe abgesetzten Eiern entwickelt hatten.

Sechster Abschnitt.

Infusionsthierchen, Chaos infusorium.

- Baker's zum Gebrauch leicht gemachtes Mikroskop. *Beschäftigung*. der Berlin, naturf. Gesellsch. Th. III. S. 375. c. f.
- Bonani, *Observat. circa viventia*, p. 175. (hält diese Thierchen nur für Bläschen).
- Bonnets Abhandl. aus der Insektologie, S. 444.
- Desselben *Considerations sur les corps organisés*, à Amsterd. 1762. T. II. p. 208.
- Büffons allgem. Hist. d. Nat. Hamb. Ausgab. Th. I. B. 2. S. 110.
- Cuvier *Tableau élémentaire* p. 658, *animaux infusoires*.
- Ellis, in *Observations sur la Physique etc.* de Mr. l'Abbé Rozier, T. V. p. 185.
- Erlang. *Beytr.* 1753. S. 111, 125 und 1754. S. 749.
- Fränk. *Samml.* B. V. S. 45 und 57. Beobachtung einiger Infusionsthierchen.
- Gleichen (W. F. v.) Abhandl. über die Saamen- und Infusionsthierchen und über die Erzeugung, nebst mikroskopischen Beobachtungen des Saamens der Thiere und verschiedener Infusionen, mit Kupf. Nürnberg. 1778. 4. S. 65.
- Hugenius, Ch. in *opusculis posthum. de Dioptrica*. L. B. 1703. 4. p. 227.
- Joblot, L. *Observations d'histoire naturelle faites avec le Microsc.* Paris 1754. 4.
- Müller, Oth. Fr. *Verm. terrestr. et fluv. s. animal.* infusor. *succincta Hist.* Havn. 1773. 4. p. 21.
- Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. II. S. 922. n. 5. *Infusionsthierchen, Chaos infusorium*.
- Needham, Th. *Nouvelles Decouvert, faites par le Microsc.* Leid. 1747. p. 200. (widerlegt durch entscheidende Versuche die Entsteh. d. Infusionsthierchen aus Eiern).
- Reaumur, *Hist. des Ins.* T. IV. P. 2. p. 190.
- Spalanzani physikal. mathemat. Abh.
- Terechowsky, M. *Diss. de Chao infus.* Argent, 1775. 4.
- Tübing. *Berichte* 1752. St. 54. und 1754. St. 45.
- Wittenb. *Wochenbl.* B. XV. S. 337. 353. von den Infusionsthierchen und ihrem Verhältnisse zu den Saamenthierchen.
- Wrisberg, H. A. *Observationum de animalcul. infus. satura.* Goetting. 1765. Obs. IX. p. 29. c. Fig.

Wenn thierische oder vegetabilische feste und flüssige Substanzen mit etwas Wasser eingeweicht oder überschüttet und dann an einen mässig warmen Ort gestellt werden; so entwickeln sich zu der Zeit, wo diese Einweichungen oder Aufgüsse in Gährung und Fäulniß zu gehen anfangen, die sogenannten, nur mit bewaffneten Augen zu entdeckenden Infusionsthierchen. Bringt man alsdann nur einen Tropfen der Infusionsflüssigkeit unter das Mikroskop; so erblickt man ein ganzes Meer voll Geschöpfe der einfachsten Organisation, die kaum die Grösse eines Sandkörnchens erreichen und gleichwohl voll der lebhaftesten Lebensäusserung sind. Ausser diesen Infusionen oder Einweichungen bewohnen aber einige Arten jener Thierchen auch verschiedene thierische Säfte z. B. die Saamenfeuchtigkeit. Doch kommen selbst diese mit den eigentlichen Infusionsthierchen darinnen überein, daß sie eine mehr oder weniger eyrunde Form haben, und Bläschen von verschiedener Grösse bilden, die mit einem spitzigen sich immer voraus bewegendem Ende versehen sind.

Die Entdeckung dieser gegenwärtigen Geschöpfe datirt sich erst vom Ende des siebenzehnten und Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, wo *Hugenius* die Bewegungen derselben zuerst wahrnam. Wie jede neue Entdeckung fand auch sie bald

bald eine Menge Anhänger und Bezweiffer. Zu ersteren gehörten *Bonnet*, *Joblot*, *Reaumur*, *Spalanzani*, *Oth. Fr. Müller*, *Göze*, *Gleichen* etc. Sie stützten sich sämmtlich auf zahllose Beobachtungen mit den besten Vergrößerungsgläsern und machten die überwiegende Parthey aus, indem sie sich zu der mehr raisonnirenden, als beobachtenden, wie 5 zu 1 verhielten. Doch hatte letztere zwey grosse Männer, einen *Linne* und *Büffon* an ihrer Spitze, welche in der Erklärung ihrer Herkunft und in der Ungewissheit in welche Thierklasse sie eigentlich aufzunehmen wären, unüberwindliche Schwierigkeiten fanden. *Linne* war daher zweifelhaft, ob er die Infusionsthierchen nicht vielmehr für ölichte oder salzichte Bestandtheile der inorganischen Natur, als für lebendige, organische Wesen halten sollte. *Büffon* behauptete sie überall, selbst in allen thierischen Säften angetroffen zu haben und hielt sie für ein Produkt der Gährung. *Needham*, der sie durch schlechte Mikroskope gesehen und daher auch schlecht abgebildet hat, erklärte ihre Entstehung durch die Vegetation. *Bonnet*, *Backer* und *Reaumur* vertheidigen hingegen mit scheinbaren Gründen die Entstehung dieser Thierchen aus Eiern, welche aus der Luft in das zu den Infusionen genommene Wasser gefallen wären, oder schon in diesen Infusionen präexistirten. *Wrisberg* fand den Grund ihrer Entstehung bloß in der Gährung und Fäulniß, übrigens eine grosse Ähnlichkeit zwischen den Infusionsthierchen und den Polypen, indem die meisten Polypenwohnungen in stillen und stehendem Wasser gebildet werden, und glaubte, daß die Grenzen zwischen den Polypen, Infusions- und Saamenthierchen kaum bestimmt werden könnten. Letzterer Meinung waren auch *Ellis*, *Gleichen* und *Ph. L. St. Müller*, welcher übrigens aus der anscheinenden Willkührlichkeit der Bewegung in diesen Körperchen, noch nicht den Schluß folgen läßt, daß sie Thiere sind.

Unter allen diesen Meinungen und Hypothesen verdienen wohl die sich auf eine Menge Beobachtungen gründenden Beweise für die Animalität dieser Thierchen und die Erzeugung- und Fortpflanzungstheorie derselben, welche *Müller* in *Copenhagen* und *Gleichen* aufgestellt haben, die vorzüglichste Aufmerksamkeit. Nach ersteren ist es falsch, daß die Infusionsthierchen nur in faulenden Flüssigkeiten gefunden werden, ob sie gleich zahlreicher in letzterem vorkommen. Auch hören sie nicht auf dazuseyn, wenn Vegetation und Fäulniß aufhören, und einige Arten derselben bewohnen sogar das ganz reine Wasser. Übrigens rechtfertigen die thierischen Affektionen dieser unendlich kleinen Geschöpfe sattem die Behauptung, daß sie wirklich Thiere sind. Sie ruhen und bewegen sich nach Willkühr bald geschwind, bald langsam und verschieden, nach Verschiedenheit der Ar-

Arten. Sie weichen den ihnen im Wege kommenden Hindernissen aus und nehmen ihre Richtung nach verschiedenen Gegenden. Sie suchen das Zusammenstossen mit anderen zu vermeiden und von schädlichen Dingen, z. B. von eingetröpftem Urin, sich schnell zu entfernen. Sie äussern Bewegung des Herzens und der Eingeweide, ja man hat sogar bey einigen offenbare Ausleerungen von Unreinigkeiten wahrgenommen. Die meisten dieser Thierchen sind ferner im Stande, die Gestalt ihres Körpers augenblicklich zu verändern, sich zu verkürzen, zu krümmen und auszudehnen, sich schmaler zu machen bey einem engen Durchgang zwischen zwey Schleimtheilchen. So bald die Feuchtigkeit des unter das Mikroskop gebrachten Tropfens abnimmt; so ziehen sie sich plötzlich alle gegen den Punkt, wo sie noch etwas von der Flüssigkeit gewahr werden. Sie geben hierbey eine ängstliche Sorge zu erkennen, dieses Asyl für ihre augenblickliche Lebensrettung zuerst zu erreichen, und verdoppeln die Anstrengung der Organe, durch die sie Wasser schöpfen, bis sie endlich dem Todeskampf unterliegen.

Zur Erklärung ihres Ursprungs und ihrer Entstehung nimmt *Müller* präformirte Fötus an und drückt sich hierüber so aus: Die thierischen und vegetabilischen Theile werden durch die Zersetzung in blasenartige Häutchen aufgelöst, deren allmählich von der gemeinschaftlichen Masse getrennte Bläschen oder Kügelchen wiederaufleben und die Infusions- und Saamenthierchen darstellen. Diese aus rohen und scheinbar unorganischen Theilen gebildeten einfachsten und kleinsten Thierchen sind von den übrigen mikroskopischen, welche die Gegner mit jenen verwechseln, nach Substanz und Organisation verschieden, nehmen jedes Fluidum ein und scheinen alle Arten thierischer und vegetabilischer Gestalten, und durch die reichlichere oder geringere Beymischung der Erdtheile, die festen und flüssigen Theile der Körper hervorzubringen. In freyem und ungebundenem Zustand aber machen sie wahrscheinlich das ätherische Fluidum aus, welches das Wachsthum befördert und das Leben unterhält. Werden sie endlich durch den Tod von den Banden ihres Werks allmählich getrennt, so leben sie wieder auf, beginnen nach Gelegenheit ein neues Werk und werden so durch einen ewigen Cirkel aus roher Materie organische Wesen und aus dieser wieder rohe Materie nach dem Willen des Schöpfers. Hiernach waren also alle Thiere und Pflanzen eine Zusammensetzung von Infusionsthierchen und alle Flüssigkeiten damit angefüllt — alles Thier und empfindendes Wesen.

Gleichens Theorie weicht hiervon in soferne ab, daß er nicht in den Ingredienzen der Aufgüsse, sondern in der Flüssigkeit, womit sie überschüttet oder ein-

ge-

geweicht werden, die Entstehung der Infusionsthierchen sucht. Nach seiner Meinung enthält das Wasser für das Thier und Pflanzenreich die Grundstoffe des Lebens, deren Eigenschaften und Kräfte, weil sie dazu bestimmt sind, die Organisation und das Leben hervorzubringen, aller Zerstörung, wir mögen kochen und destilliren so oft und viel wir wollen, widerstehen. Diese organischen zur Animalität bestimmten Grundstoffe oder Urkeimchen ruhen so lange in jeder Flüssigkeit, bis sie durch die eine gelinde Wärme bewirkende Gährung in Bewegung gesetzt und mit dem balsamischen Lufttheil gleichsam geschwängert werden. Alsdann wird man gemeiniglich unter dem Mikroskope die Bewegung vieler, sehr kleiner, sich dicht an einander schliessender Bläschen gewahr. Nach zwölf bis vier und zwanzig Stunden sieht man schon fadenförmige, geschwänzte, kugel- oder eyrunde Thierchen in einem Gewimmel kleiner Punkte. Diese Geschöpfchen erscheinen nur als die ersten ihres Geschlechts, nicht als erzeugte, sondern als zur Zeugung durch die Spaltung geschickte Thiere, und die Verschiedenheit ihrer Gestalt und Form, setzt auch eine gleichmässige Verschiedenheit der Wassertheile voraus, aus welchen sie hervorgekommen sind. — Hiernach müßten aber die verschiedensten thierischen und vegetabilischen Substanzen, wenn ihre Infusionen mit einem und demselben Wasser bereitet würden, und der Saame aller Thiere einerley Infusionsthierchen enthalten, welchem hingegen die grosse Mannigfaltigkeit derselben offenbar widerspricht. Es scheint daher Müllers Theorie immer noch so lange den Vorzug zu verdienen, bis die Zukunft vielleicht hierüber mehr Licht verbreiten wird, wenn es uns anders verstattet ist, ins Innere der Natur tiefer einzudringen.

Zu den allgemeinen Eigenschaften der Infusionsthierchen gehören vorzüglich: die ausserordentliche Feinheit und glasartige Durchsichtigkeit ihrer Haut; die wahrscheinliche Gegenwart gewisser Sehorgane, welche sie im Stande setzt, einander auszuweichen und zum öfteren spielend mit einander fortzugehen; eine mundförmige Öffnung, welche *Gleichen* vorzüglich an derjenigen Art von Infusionsthierchen bemerkt hat, die unter dem Namen der Panteloquenthierchen bekannt sind; ihre Kraftäusserung, die so stark ist, daß sie achtmal grössere Shleimmassen, als sie selbst sind, fortstossen, anziehen und mit sich fortschleppen; die Geschwindigkeit und Mannigfaltigkeit ihrer Bewegungen, nach welcher sie sich oft langsam fortwälzen, oft zitternd hin und her wanken, oft schnell fort- und nach allen Richtungen hin und her fahren, bald in die Höhe steigen und bald sich untertauchen, und wohl in einem Augenblick einen Weg von zwanzig Durchmessern ih-

res Körpers, und in einer halben Stunde einen Weg von vier bis fünf Zoll zurücklegen; ihre Paarung, bey welcher sich immer zwey Thierchen gleicher Grösse mit ihren spitzigen Enden vereinigen und in beständig kreisförmigen Bewegungen immer näher zusammenkommen, bis sie endlich sich fest an einander schliessen und in dieser Vertraulichkeit ihre weitschweifige Kreisfahrt fortsetzen; und dann ihre Fortpflanzung, durch ein allmählich für sich vorgehendes Spalten dieser Thierchen in zwey gleiche Theile erfolgt. Diese Theilung macht, daß man bey einer weniger abgewarteten und genauen Beobachtung, die in der Theilung oder Spaltung begriffenen Infusionsthierchen für ganz neue, von den übrigen verschiedene, oder in der Begattung begriffene Thierchen hält.

Die Infusionsthierchen suchen und finden ihre Nahrung in den Schleimhäuten der Infusionen. Sie gedeihen hierbey und vermehren sich, wenn die Infusionen nicht verdicken, sondern immer in einer gewissen Flüssigkeit erhalten werden und der gehörige Wärmegrad ihr Wohlseyn begünstigt. Hingegen zerplatzen und zerstäuben sie bey völlig verdunstender Flüssigkeit. Wird aber vor der gänzlichen Zerplatzung nur ein Tröpfchen frisches Wasser dem verdunsteten Infusionstropfen beygemischt; so kehrt Leben und Bewegung, wiewohl mit minderer Lebhaftigkeit, nach diesem Zustande der Ohnmacht zurück. Dennoch ist auch ihnen, wie andern Thieren, ein gewisses Lebensziel gesetzt. Einige Arten überleben kaum einen Tag, andere Wochen, Monathe, noch andere Jahre in nicht erneuerten, doch nicht stinkenden Infusionen. Unempfindlich gegen Kälte und Frost, schwimmen manche, nach aufgethauetem Wasser, mit ihrer ehemaligen Lebhaftigkeit herum.

Müllers seltner Beobachtungsgabe und unablässiger Forschung ist es gelungen, das Geschlecht dieser, dem unbewaffneten Auge unerreichbaren Thierchen in systematische Ordnung zu bringen und 149 Arten unter besonderen Namen aufzuführen, wovon blos die Kreisthierchen des Zahnschmutzes und die Saamenthierchen zu unserem Zwecke gehören.

1. Das Kreisthierchen des Zahnschmutzes. Tab. VI. Fig. 15.

Cercaria tenax, membranacea, antcrius crassiuscula truncata, cauda triplo brevior.

Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3891. n. 2. Habitat in aqua sordibus dentium infusa, post 4 dies apparens, lente paulo major, obovata.

Agricola, J. Not. in Popp. de Tartaro.

Andry, N. la Generat. des vers. Paris 1741. Cap. IX.

Berdmore, Th. on the Disorders and Deformities of the Teeth and Gums, in Richt. chir. Bibl. B. I. c. S. 25.

Clauder, G. von einem sehr beschwerl. Wurm, der sich in einem hohlen Zahn aufhielt, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XV. S. 368.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 312. Historiae vermium in dentibus cavis variae.

Du Four im Journ. d. Vanderm. T. VII. p. 271. (von einem Wurm, der aus einem Zahn gezogen worden).

Fränkische Samml. B. III. S. 163. (von den Würmern in den Zähnen — widerspricht Schäffers Behauptung).

Holler in perioch. ad Lib. V. Gal. d. Comp. med.

Kniphof, Diss. de pedic. ing. §. XXV.

Krazenstein, C. G. von Erzeug. der Würm. S. 5. F. 1. (Abbild. eines Zahnwurms).

Krügers, J. G. Naturlehre. Th. III. Kap. 31. S. 301, 302.

Kulmus, J. A. Diss. an in dentibus vermiculi? (Resp. Schilberg) Gedani 1733. 4.

Leeuwenhoek de vermibus, qui ex dentibus desumpti esse dicuntur. Phil. Trans. n. 159 et n. 264.

p. 635. Leskens Uebers. B. I. Th. 2. S. 66. Ejusd. Arcana naturae detecta. L. B. 1719. p. 42.

Magellan, Observations sur les insectes poly-piers qui forment le Tartre des dents. Journ. de Phys. T. XXII. 1783. Mars, p. 178.

Mülleri Hist. verm. Vol. I. P. I. p. 69. n. 62. Dan. Seihaleren, Zool. Dan. prodr. 2487.

Pechlin, J. N. vom Zahnwurme, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. IX. S. 58. (eine Frau lockte verschiedene Würmer durch eingelegtes Honig aus dem hohlen Zahn).

Salmuth, Observat. med. p. 125.

Schaarschmidts Pathologie Th. II. Abschn. VI. Kap. 2. S. 306.

Schäffer, J. Chr. die eingebildeten Würm. in den Zähnen, nebst den vermeintlichen Hülfsmitteln wider dieselben, mit 1 Kupf. Regensb. 1757. 4.

Schulz, G. von Würm. in d. Zähnen, in den Abh. d. k. Akad. d. Nf. Th. IX. S. 254.

Scriberi Largi Compositiones medicamentor. p. 54.

Sloane, in Transact. philos. An. 1733. p. 122.

In dem Aufgusse des Zahnschmutzes kommen nach Müllers Versicherung innerhalb vier Tagen Thierchen zum Vorschein, deren Vorderende abgestumpft, deren Hinterende spitzig ist oder sich in einen kurzen Schwanz endiget, welche ferner eine durchsichtige Haut haben und in einem Kreis nach verschiedenen Richtungen schnell herumirren. Diese Thierchen hatte Leeuwenhök zuerst entdeckt. Er war gewohnt des Morgens seine Zähne mit Salz zu reiben, hernach den Mund mit Wasser auszuwaschen, nach dem Essen sich jedesmal des Zahnstochers zu bedienen und so Zähne und Zahnfleisch überaus rein und gesund zu erhalten. Bey alle dem konnte er aber nicht verhüten, daß nicht hin und wieder etwas weisse, mehlichte Materie zwischen den Zähnen sitzen blieb. Von dieser Materie, worinnen er mit blosen Augen keine Bewegung wahrnehmen konnte, vermischte er etwas mit reinem, durchs Mikroskop von allen lebendigen Wesen verlassen gefundenen Regenwasser, und eben so zu wiederholten Malen mit seinem Speichel, den er schon 1678 in der Absicht, Infusionsthierchen darinnen gewahr zu werden, vergebens untersucht hatte, und entdeckte zu seiner grossen Verwunderung, daß dieser verdünnte Zahnschmutz eine Menge ausserordentlich kleiner, das angenehmste Schauspiel durch ihre unablässige Bewegung gebender Thierchen enthielt. Die grösste länglichtrunde Gattung derselben (Tab. VI. Fig. 15. a.) bewegte sich äusserst schnell und lebhaft; die zweyte zahlreichere, kürzere und an beyden Enden stumpfere Art (b.) machte cirkel- und schlangenförmige Bewegungen (b. c.); die Gestalt

stalt der dritten Gattung (*d.*) gab sich aber selbst dem bewaffneten Auge nur undeutlich zu erkennen, und erschien bald länglicht - bald vollkommen rund. Übrigens glich das undurchdringliche Gewimmel dieser Gattung einem Mückenschwarme. In einem die Grösse eines Sandkörnchens nicht übersteigenden Theil des mit Zahnschmutz vermischten Wassers oder Speichels, befanden sich wohl einige Tausende dieser Thierchen, und gleichwohl enthielt das Wasser oder der Speichel nur den zehnten Theil von jener Materie aus den Zähnen. Überdies bestand der vorzüglichste Theil dieser Materie noch aus einer ausserordentlichen Menge Streifchen (*e.*), die zwar in der Länge sehr verschieden, aber von einerley Dicke, zum Theil gekrümmt, zum Theil gerade, jedoch ohne Leben waren.

Um sich zu überzeugen, ob der Speichel und der Zahnschmutz anderer Menschen ähnliche Resultate lieferten, unterwarf er auch den Speichel zweyer Frauenzimmer, welche sich den Mund täglich zu reinigen pflegten, und eines achtjährigen Knabens, ähnlichen mikroskopischen Untersuchungen, konnte aber so wenig, als in seinem eigenen Speichel, ein lebendiges Geschöpf entdecken; hingegen sah er, die oben beschriebenen Thierchen in dem Schmutze, welchem er mit einer Nadelspitze von ihren Zähnen nam, in gleich grosser Menge. Unglaublich groß war diese aber in der Materie, welche in den äusserst schmutzigen Zähnen eines Greises saß. Die größte Art der in derselben wohnenden Thierchen (Fig. 15. *f.*) krümmte ihren Körper im Kriechen wie ein Afterwurm. Mit diesen Untersuchungen noch nicht zufrieden, brachte *Leeuwenhöck* auch etwas von der in den hohlen Zähnen sitzenden Materie unter das Mikroskop und fand die Anzahl der in derselben wohnenden Thierchen so groß, daß er tausend auf den hundertsten Theil eines Sandkörnchens rechnen konnte. Sobald er aber allen diesen Infusionen des Zahnschmutzes nur den geringsten Theil Essig beymischte; so war das Leben aller sie bewohnender Thierchen dahin.

Andrys Beschreibung der unter der Kruste schmutziger Zähne sich aufhaltender Würmchen, weicht von der *Leeuwenhöck*'schen darinnen ab, daß sie einen runden Kopf mit einem schwarzen Punkt und einen langen und dünnen Körper, beynahe wie die *Essigaale* haben. Übrigens läugnet er; daß es eine besondere Art Würmer gäbe, welche die Zahnschmerzen verursache und aus den Zahnhöhlen gezogen werden könne. Die Würmer des Zahnschmutzes hält er jedoch für fähig den Gestank aus dem Munde zu veranlassen und die Zähne nach und nach anzugreifen. Beyde Nachtheile machen daher alleine schon, besonders beym weiblichen Geschlechte und bey solchen Personen die fleissige Mundreinigung nothwendig

dig

dig, welche durch übermässigen Genuß alkaliscirender Speisen ihrem Zahnfleische eine skorbutische Beschaffenheit zuziehen und den Absatz eines scharfen Schaums an ihren Zähnen vermehren, oder wegen beständiger Kopfanstrengung und aus anderen, die Verdauung störenden Ursachen, nie rein verdauen, und bey welchen daher noch im Schlafe durch die scharfen Exhalationen des Magens, ein übelriechender Kleber an den Zähnen, wie auf der Zunge, abgesetzt wird.

Mit den nur durchs Mikroskop zu erkennenden Kreisthierchen des Zahnschmutzes sind die mit bloßen Augen sichtbaren Würmchen nicht zu verwechseln, welche in den hohlen Zähnen wohnen sollen, als eine vorzügliche Ursache des Zahnschmerzes angeklagt worden sind, und zu mancherley Streitigkeiten Gelegenheit gegeben haben. *Scribonius Largus* gedenkt schon dieser Zahnwürmer und empfiehlt, den Rauch des Bilsenkrautsamens in den offenen Mund gehen zu lassen, worauf diese Würmer zum Vorschein kommen sollen, wenn der Mund alsdann mit warmen Wasser ausgespült wird. *Holler* erklärt diese Sache aber für fabelhaft und behauptet, daß bloß gewisse Flocken für Würmer angesehen worden wären, welche aus dem am Feuer aufspringenden Samen davon fliegen. Ähnlicher Meinung ist auch *Schäffer*, welcher folgende Geschichte erzehlt: Eine hiesige Person vom Stande hatte einige Tage hinter einander unleidliches Zahnweh. Alle dagegen gebrauchten Mittel halfen nichts. Endlich ward gerathen, sich mit Judenkirschen zu räuchern, weil dieses hartnäckige Zahnweh von nichts als Würmern herrühren könne, die durch ihr Nagen in den Zähnen den Schmerz verursachten, durch dieses Mittel aber nicht nur getödtet, sondern auch aus den Zähnen getrieben und dann hauffenweise in dem untergesetzten Gefäße mit Wasser gefunden würden. In der That erfolgte alles so, wie es vorausgesagt worden war. Die Kranke war in weniger als fünf Minuten von ihrem Zahnschmerz befreiet und man fand wirklich eine Menge solcher Körperchen, welche Würmer zu seyn schienen. Er beschreibt nun die, zugleich in einer Abbildung beygefügte, sonderbare Vorrichtung zu dem ganzen Verfahren und die seyn sollenden, mikroskopisch untersuchten und abgebildeten Würmer, welche nichts anderes, als die Keime von den Samenkörnern der Judenkirschen waren. Wirklich gleichen diese Keimchen so sehr kleinen Würmern, daß sie von Nichtkennern leicht dafür gehalten und noch weit geschickter zu Betrügereyen benutzt werden können, als die Käsemaden, welche, nach *Sloanes* Erzählung, ein Charlatan ins Wasser fallen ließ, während er mit dem in die Höhlung des Zahns geleiteten Rauch der Tollkrautskörner (*Sm. Hyosciami*) den Zahnschmerz vertrieb.

Kniphof läugnet ebenfalls die Existenz der Zahnwürmer, glaubt aber, daß bey Personen, die im Sommer harten, mit einer Milbenrinde bedeckten Käse essen, von diesen Milben, welche die innere Knochenhaut des hohlen und faulen Zahns benagten, Zahnschmerzen entstehen könnten. *Berdmore* hingegen will das, was man für Würmer angesehen hat, für wildes schwammigtes Fleisch, welches zuweilen in hohlen Zähnen wächst, gehalten wissen. Dennoch sind wohl schwerlich alle vorhandenen Fakta über die Existenz der Zahnwürmer abzustreiten, da es sehr wohl gedenkbar ist, daß Insekteneyer in hohle Zähne gelangen, und die in denselben auskommenden Larven für Würmer gehalten werden können. So erwähnt *Salmuth* eines grossen Zahnwurms; so versichert *Agricola* durch den Gebrauch seines *Arcani Tartari* zwey Zahnwürmer herausgetrieben zu haben; so gedenkt *Clauder* eines Mannes, der an den heftigsten, keinem Mittel nachgebenden Zahnschmerzen litte, bis er sich endlich entschloß den Zahn ausreissen zu lassen. Als man diesen Zahn mit einem Hammer zerschlug, fand man denselben inwendig hohl, angefressen und von einem Wurme bewohnt, der den Käsemaden sehr ähnlich war. Wahrscheinlich zog diese vielleicht aus einem Eye der Quarkfliege entstandene Made ihre Nahrung durch eine feine Öffnung, welche von dem sich in die Zähne setzenden Speisen verstopft wurde. In dieser eingesperrten Lage mußte aber die Made nothwendig beängstigt und beunruhiget werden und durch ihre heftigen Bewegungen und vielleicht durch ihr Nagen an dem in die Wurzel des Zahns tretenden Nerven, die unerträglichsten Schmerzen erregen.

2. Das Samenthierchen. Tab. VI. Fig. 13. 14.

Chaos spermaticum, corpore ecliptico, antrorsum nonnihil acuminato; cauda longa, tenuissima. Habitat in spermate humano.

Asch Diss. de natura spermatis.

Berlin. Samml. B. VII. St. 4. S. 473. von den Erscheinungen bey dem Spiel der Milchgefäße des Kalmars.

Bernard, J. Nouvelles de la Republique des lettres. T. I. Mois de Mai 1699. articl. p. 532.

Blumenbachs Handb. S. 475. C. Tab. I. F. 13.

Burggravius, J. Ph. de aëre etc. urbis Francof. ad Moen. accidit disquisit. de Orig. et indol. animalculor. spermatic. Francof. ad Moen. 1751. 8.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 287. vermes spermatici.

Cuvier Tableau élémentaire p. 661. les Cercaires.

Gleichens Abb. über die Saamen- und Infusions-thierchen.

Helle, J. S. Naturgesch. der Thiere in systemat. Ordn. nebst der Naturgesch. d. Menschen, S. 74.

Hambergeri Physiologia Medica et Epistola D. Lieberkuhnii p. 707. §. 1414.

Journ. de Phys. T. XXIV. 1784. Juin. p. 437. Observat. sur la liqueur séminale.

Kratzensteins Abb. v. Erzeug. d. Würm. S. 43. Fig. 14.

Ledermüllers physikal. Beob. der Saamenthierchen, Nürnberg, 1756. T. VIII. Ebendessalb. Versuch

zu einer gründl. Vertheid. d. Saamenthierchen, Nürnberg. 1758. T. VI.

Lister, M. Objection to the new Hypothes. of the Creation of Animals from Animalcula in semine masculino; in Philos. Transact. V. XX. p. 337. n. 244.

Marggraf, G. L. existentia animalculor. in semine virili probatur. Wittenb. 1799.

Müllers Beobachtungen über einige chaotische Thiere, Gewürme und Insekten, mit Anmerk. v. Göze, Naturforsch. St. VII. S. 97.

Needham nouvelles Recherch. sur les découvertes microsc. T. I. p. 196.

Paulini de morte verminosa, p. 57.

Robinet, J. B. von der Natur. Wien 1764. Th. I. Kap. 1.

Segner, J. A. Diss. περί τῶν Σπερματικῶν Ζῴων (Resp. Dietericus) Götting. 1736. 4.

Wrisberg Observationum de animalcul. infusor. satur. p. 95. Fig. 14.

Die zu den edelsten Säften des männlichen Körpers gehörende Samenfeuchtigkeit enthält in männbarem Alter und wenn sie durch das Verweilen in den Samenbläschen ihre Reife erhalten hat, ausser verschiedenen, blos durch mikroskopische Beobachtungen zu entdeckenden Salzarten, auch eine zahllose Menge Thierchen, welche wohl zweymal hunderttausend mal kleiner, als die Hirsekörner sind. Nur muß diese Beobachtung gleich nach Ergiessung desselben oder mit dem noch warmen, und etwas lauem Wasser verdünnten Samen eines kürzlich verschiedenen Mannes angestellt werden. Wird hingegen die Samenfeuchtigkeit erst in einem verschlossenen Gefässe aufbewahrt, so entdeckt man in derselben noch einige langsamere Wesen, die bey einer Verdünnung des verdickten Samens mit etwas Wasser, sich in vier und zwanzig Stunden zu länglichten Thierchen ausbilden und sich zitternd bewegen, aber nichts anderes, als Infusionsthierchen sind, welche sich erst in der schon in Fäulniß gehenden Samenfeuchtigkeit entwickelt haben, und, wie *Gleichens* Abhandlungen beweisen, von den in frischem und unverdorbenem Samen wohnenden Thierchen überaus verschieden sind. Jene eigentlichen, dem berühmten *Leeuwenhök* schon vor hundert Jahren bekannt gewesenen Samenthierchen, hat *Gleichen* bey seinen, bis zu seiner vollkommenen Überzeugung unzählige Male angestellten Beobachtungen, nach zwey Stunden öfters von gleicher Beschaffenheit, in der vierten aber matt und hernach gar nicht mehr gesehen. Ihre Länge beträgt unter einem, den Durchmesser vier- bis fünfhundert mal vergrößernden Mikroskope, vom Kopfe bis zum Schwanzende ungefähr einen halben Zoll und ihre Dicke ungefähr eine Linie (Tab. VI. Fig. 13. a. b. c. etc.) Sie haben der Gestalt nach viel Ähnlichkeit mit den erst aus dem Froschlaich herauskommenden jungen Fröschen, nur sind ihre Schwänze im Verhältnisse des Körpers viel länger und so fein, daß sie in der stärksten Vergrößerung kaum die Dicke des feinsten Haares erreichen. Der Körper selbst läuft gegen den Ursprung des Schwanzes etwas schmaler und spitziger zu, und hat eine ekliptische Form:

Ihre

Ihre Bewegung ist in dem noch zähen Samen träge und schleppend, ja es scheint, als ob sie ihre kleben bleibenden Schwänze durch ein beständiges Hin- und Herwanken loszumachen und so fortzurücken bemühet wären. In einem zu grossen und dicken Tropfen gehen manche so tief, daß man sie nur wie im Schatten gewahr wird (*d.*), andere erheben sich mehr vom Boden, rücken kaum eine oder zwey Linien vorwärts und tauchen dann wieder unter. Hierbey wird immer nur der dickere Theil des nachschleppenden Schwanzes sichtbar (*e.*) und das Ende bleibt jedesmal unter der Flüssigkeit. Noch andere wenden bisweilen die untere Seite ihres Körpers so, daß sie flach und heller, als die obere erscheint (*e.*). Verdünnt man aber den Samen mit lauem Wasser; so wird ihre Bewegung freyer und lebhafter. Sie durchfahren sodann den ganzen Tropfen nach allen Gegenden und durchkreuzen sich, ohne an einander anzustossen. Mit ihrem Schwanz scheinen sie zu rudern und mit ihrem Körper schwanken sie hin und her. Hierdurch kommt es aber, daß sie auf ihrem Wege immer eine Schlangenlinie (*b.*) beschreiben.

Aus der Vergleichung dieser Eigenschaften mit den oben beschriebenen der Infusionsthierchen, ergeben sich folgende, nicht zu verkennende Abweichungen in Rücksicht der Gestalt, der Beschaffenheit des Körpers, der Bewegung und der Verschiedenheit der Flüssigkeit, worinnen sie wohnen. Kein einziges Thierchen hat sich in den vielen hundert vom *Gleichen* untersuchten Infusionen, vorgefunden welches die Gestalt eines Samenthierchens und einen Schwanz, wie dieses gehabt hätte. Ferner ist der Körper der Samenthierchen immer minder durchsichtig und ihr Gang weniger geschwind, als bey den Infusionsthierchen, ihr Aufenthalt aber in mehr als einer Hinsicht verschieden. Jene können nur in einer reinen warmen, mit riechbarem Stoff und Salztheilchen geschwängerten Feuchtigkeit; diese hingegen nur in verdorbenen, kaltgewordenen, übrigens aber keine scharfen und flüchtigen Theile enthaltenden Aufgüssen leben. Jene vertragen also sehr wohl, was diese tödtet und sind sogar der Einwirkung der schärferen Urintheile bey ihrem Durchgange durch die Harnröhre gewohnt, da diese von dem kleinsten Urintheilchen umkommen.

Die Entdeckung der Samenthierchen zog vorzüglich deswegen die Aufmerksamkeit der Naturforcher auf sich, weil man diese Geschöpfchen für fähig hielt, eine besondere Rolle bey der Zeugung zu spielen, hierdurch aber Veranlassung zu sehr verschiedenen Behauptungen gab, wobey die Meinungen über die Animalität derselben lange Zeit getheilt blieb. *Büffon*, welchem *Robinet* und viele andere blind-

blindlings folgten, läugnete ihre Existenz und hielt sie für Molekulen oder Unförmlichkeiten vom geronnenen Samen. Er irrte sich aber, da er die Samenthierchen in kaltem Samen suchte und die geronnenen Samentheilchen (Fig. 13. f. f.) dafür ansah. Leztere sind, nach *Gleichens* Versicherung, ebenfalls in beständiger Bewegung und werden von einer Seite zur andern fortgestossen, so daß der mit der vorhergehenden inneren oder geistigen Bewegung des Samens aller Thiere nicht bekannte Beobachter, leicht verleitet werden kann, sie für eine andere Gattung von Infusionsthierchen zu halten. Der ungenannte Verfasser des Aufsatzes in den Berlinischen Sammlungen glaubte die Samenthierchen vollkommen mit den Milchgefäßen des Kalmars, einer Gattung von Blackfischen, vergleichen zu können, aber die Gestalt und Bewegung dieser Milchgefäße weicht zu sehr von der Gestalt und Bewegung der Samenthierchen ab, als daß man sie für einerley und leztere bloß für mechanisch halten könnte. *Wrisberg* ist geneigt die Samenthierchen unter die Polypen zu zählen und hält ihre Schwänze für abgerissene Stücke derjenigen Fadenäste, welche sie an irgend einen anderen Körper befestigen. Er glaubt, daß sie, von ihren Adhäsionspunkten nur durch die Vorschrift getrennt werden können, den zu untersuchenden Samen immer mit lauem Wasser zu vermischen, wodurch nothwendig die meisten Vereinigungsstiele abgerissen werden müßten. Auch geschähe die Samenentleerung schon mit einer Gewalt, welche im Stande wäre, viele dieser Thierchen von ihrer Verbindung frey zu machen, so daß sie um mit den Anhängen der Stiele, als geschwänzt erscheinen und in der Samenfeuchtigkeit frey herum schwärmen könnten. Und in der That scheint diese Meinung das Meiste für sich zu haben. *Gleichen*, der ihnen nicht nur Animalität zugesteht, sondern sie auch für den wesentlichen Theil des Zeugungsstoffs, für organisirte und belebte Keime der Frucht hält, die der Vater den Säften des Eyes der Mutter, wie der Sämann seine Samenkörner der Erde übergiebt, gründet seine Behauptung vorzüglich auf zwey Beobachtungen, nach welchen in dem Samen zweyer alten, sechzigjährigen Ehemänner kein einziges Samenthierchen entdeckt werden konnte, und glaubt daher annemen zu können, daß derjenige, wenn gleich noch junge Mann, dessen Same eben so verlassen von diesen Thierchen ist, ebenfalls keine Nachkommenschaft zu hoffen habe. In dieser Vermuthung findet er sich noch mehr durch *Andrys* Beobachtung, der im Samen unvermögender Männer kein einziges Samenthierchen angetroffen haben will, und *Ledermüllers* und anderer Bemerkung unterstützt, nach welcher der Same venerischer, so gut wie anderer zeugungsfähiger Männer, Samenthierchen enthalte,

halte, welches auch mit der täglichen Erfahrung, daß das venerische Gift das Zeugungsvermögen nicht störe oder aufhebe, vollkommen übereinstimmt. Er glaubt hieraus den Schluß ziehen zu können: das Mikroskop könnte in unfruchtbaren Ehen den Streit über die Ursache der Unfruchtbarkeit zwischen Mann und Frau, zumal wenn letztere zuvor in einer fruchtbaren Ehe gelebt hätten, bald entscheiden und manches Ehegeheimniß entdecken, anderer Familienfortpflanzungsvortheile nicht zu gedenken. So scheinbar aber auch die Gründe sind, welche *Gleichen*, dieser gelehrte und eifrige Vertheidiger der Zeugung durch Samenthierchen, den zu seiner Zeit bekannt gewesenen Zeugungstheorien entgegensetzte; so scheinen doch jene Thierchen keinen wesentlichen Antheil an dieser thierischen Verrichtung zu nemen, sondern nur als Gäste da und in der weiblichen Samenfeuchtigkeit, deren Daseyn wohl nicht geläugnet werden kann, eben sowohl, als in der männlichen vorhanden zu seyn, übrigens aber, nach neueren Beobachtungen, die Ursache der Unfruchtbarkeit ungleich häufiger in organischen Fehlern, in Mangel der Lebensenergie oder Conceptionskraft der inneren weiblichen Geburtstheile, als im männlichen Geschlechte gesucht werden zu müssen.

Mit den eigentlichen Samenthierchen und den oben erwähnten im Inneren der kalten, schon in animalische Verderbniß gehenden Samenfeuchtigkeit sichtbar werdenden Infusionsthierchen, ist noch eine andere Art dieser Thierchen (Tab. VI. Fig. 14. a. a. a.) nicht zu verwechseln, welche *Wrisberg* auf der nach einigen Tagen mit einem Häutchen bedeckten Oberfläche des mit Wasser vermischten männlichen Samens entdeckt hat, und welche, je mehr die Mischung in Fäulniß übergeht, an Grösse zunemen, sich schnell in der Flüssigkeit bewegen, sich in Haufen vereinigen und unter das Häutchen begeben. In grosser Anzahl vereinigen sich diese Infusionsthierchen zu einer neuen Haut, wenn von jenem Häutchen nichts mehr auf dem unter das Mikroskop gebrachten Tropfen sichtbar ist. Sie werden aber augenblicklich von dem kleinsten Theilchen Scheidewassers getödtet und vernichtet.

Ich übergehe hier, der Kürze wegen, diejenigen Gattungen der Infusionsthierchen, welche besonders unter dem Namen der Monaden (*Monas*) bekannt sind und in den Einweichungen aller thierischen Theile, und also auch der menschlichen, nach einigen Tagen sichtbar werden. Sie sind so ausserordentlich klein, daß sie auch in der stärksten Vergrößerung nur undeutlich, als kleine runde oder ovale Punkte erscheinen und zu Myriaden den kleinsten Tropfen der Infusionsflüssigkeit erfüllen.

Zweyte Abtheilung.

Geschichte derjenigen Würmer, welche dem menschlichen Körper nur zufällig schädlich werden.

Würmer sind in Ermangelung der Füsse, Flügel und der eigentlichen Fresswerkzeuge, im ganzen weniger geschickt, an unsere Oberfläche zu gelangen, sich an unseren Kleidungsstücken, an unserer Haut festzuhalten und diese schmerzhaft und gefährlich zu verletzen. Nur einige Arten machen hiervon eine besondere Ausname und können vermöge der eigentlichen Schärfe und Feinheit ihrer Saugorgane, vermöge ihrer feinen, die Stelle der Füsse vertretenden Runzeln ihrer Oberfläche, ihren schlüpfrigen Körper an unsrer Haut befestigen und oft mit bewundernswürdiger Schnelligkeit auf derselben oder unter derselben fortrücken. Diese wenigen Arten sind aber auch nur die einzigen, welche im Stande sind uns, wie andere Thiere, äusserlich zu verletzen. Innerlich sollten sie ihrer Natur nach weit öfter, als es wirklich geschieht, durch das Wasser, welches wir trinken, worinnen sich viele Gattungen derselben aufhalten und ihre Eyer absetzen, durch Früchte und Pflanzen, welche wir geniessen und an welchen sie und ihre Brut nicht selten angetroffen werden, unserer Gesundheit nachtheilig werden und manche gefährliche Zufälle veranlassen. Die Seltenheit solcher Beyspiele beweist aber, daß ihre Natur die thierische Wärme der inneren Theile nicht auszuhalten vermag und läßt vermuthen, daß sie, als nicht in den menschlichen und thierischen Körper gehörende Geschöpfe, durch die Thätigkeit der Verdauungsorgane und die Schärfe und Widerwärtigkeit der verdauenden Säfte, in den allermeisten Fällen bald, und gewöhnlich schon vor ihrer Entwicklung aus dem Eye, ohne noch die geringsten Beschwerden veranlaßt zu haben, umkommen und ihren Abgang mit den Exkrementen nemen.

Erster Abschnitt.

Würmer, die sich zufällig an die äusseren Theile des Menschen ansaugen.

Baker, of the Egesucker. Philos. Transact. n. 472.

Bartholinus, Th. de morte ex Hirudinibus. Act. Hafn. Vol. II. p. 319.

Bergmanns, Th. Abh. von den Egeln; Schwed. Abh. B. XIX. S. 292. c. Fig.

Berkenmeyer, B. N. über die Vermehr. des Blutigels, in den neuen Schwed. Abh. B. V. S. 80.
Bar-

Berthelot, Diss. de venen. Gall. Animal. Monspel. 1763. p. 9.

Galenj Lib. d. Cucurbitul. Hirudinibus etc. interprete Fr. Balamio. Lugd. 1550.

Gazette Salut. 1767. n. 21. Mort occasioné par les Sangsues.

Gesneri Hist. Animal. Lib. IV. de Pisc. et Aquatil. natura c. Fig.

Hannöv. Magaz. 1773. S. 1223 und 1779. S. 834.

Knackstedt, über die Blutigel; in Baldingers neu. Mag. B. VIII. St. 1. S. 91.

Kniphof Diss. de Pedic. ing. §. XVIII.

Ledel, S. von Blutegeln, die ein Mädchen getödtet, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf Th. XII. S. 267.

Morand, Obs. sur l'Anatomie de la Sangsue, in den Mem. de l'Acad. des Sc. 1739. p. 191. c. F.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. S. 47.

Muralto, J. de Anatome hirudinis; in Exercit. med. p. 579.

Onomat. Hist. nat. P. IV. p. 197.

Passerat de la Chapelle vier Wahrnehmungen von Verblutungen, die durch Blutigel sind erregt worden; in den Samml. auserles. Wahrnehm. B. VIII. S. 67.

Plinij Hist. natural. Lib. XXXII. C. 10.

Poupart Anatome hirudinis. Phil. Trans. n. 233. p. 722. B. III. p. 231.

Rösels Insektenbel. Th. III. S. 199.

Schenkii Observ. Lib. VII. Obs. 19.

Sennerti Oper. T. III. C. 20. p. 654.

Spielmanni Diss. de Animal. noc. Alsat. p. 55.

Die wenigen hieher gehörigen Wurmarten sind aus dem Geschlechte der Blutigel, griech. Βόλλα, lat. *Hirudo*, franz. *Sang-sue*, engl. *Leech*, holländ. *Bloed-Zuiger*, welche alle einen langen, vorne mehr spitzigen und mit einer triangulären Mundöffnung versehenen, nach hinten aber allmählich dicker und breiter werdenden Körper haben, der oben convex, unten flach, im Ganzen mehr platt gedrückt, aus lauter schmalen Ringen zusammengesetzt, sehr weich, immer mit einem Schleim überzogen ist; und sich an der Bauchseite mit einem kurzen, ziemlich breiten, konischen Absatze endiget. Auf der bald mehr spitzigen, bald mehr stumpfen, immer aber mit einem mehr oder weniger erhabenen Rand eingefassten Oberlippe hat *Bergmann* bey drey Gattungen schwarze Punkte entdeckt, welche er sowohl wegen der Stelle, die sie einnehmen, als wegen ihrer Gestalt für Augen hält. Und wirklich scheinen die Blutigel nicht nur gut sehen, sondern auch hören zu können, da sie bey einem starken Geräusche die Flucht ergreifen und sich zu verbergen suchen. Die zwey überaus beweglichen Mundlippen nemen sehr verschiedene Gestalten an und machen, wenn sie völlig geschlossen sind (Tab. I. Fig. 5.), drey kleine, ein Dreyeck bildende Einschnitte, und eben so fällt die Wunde aus, welche sie auf der Haut des Menschen damit machen. Dieses setzt voraus, daß diese Lippen von überaus harter, wenigstens knorpelartiger Substanz und so scharf, wie ein Scheermesser sind. Auch giebt diese Schärfe das Mikroskop bey geöffnetem Munde des Blutigels (Tab. VII. Fig. 4.) zu erkennen. Zugleich entdeckt man aber durch dasselbe im Rachen einen zungenförmigen, wahrscheinlich mit feinen Saugröhrchen versehenen Theil, welcher das eingesogene Blut aufnimmt und dem Magen zuführt. Dieser Magen oder vielmehr Nahrungskanal erstreckt sich bis zum Schwanze des Blutigels und theilt sich endlich in vier und zwanzig geschlängelte Gefässe.

fasse. Vielleicht haben diese eben so viele feine Öffnungen im konischen Absatze des Schwanzendes, da man keine deutliche Aftermündung zur Zeit hat wahrnehmen können, und blos einen verblichenen Punkt an der Oberfläche des Absatzes (Tab. VII. Fig. 1. b.) dafür gehalten hat. Andere glaubten sogar, daß die Blutigel in Ermangelung eines Afters ihre Exkremente verdünsteten und davon der ihre Oberfläche stets überziehende und sich von Zeit zu Zeit als faserichtes Wesen von der Haut absondernde Schleim herrühre.

Ruhend (Fig. 1) verkürzt sich der Blutigel durch die Annäherung seiner Ringe und hält sich mit Mund und Absatz, oder dem Kopfe am Schwanzende, auch an den glättesten Körpern und an der Wand des Zuckerglases, worinnen man ihn verwahret, fest. Betrachtet man ihn durch letzteres von der unteren oder der Bauchseite, so kann man dann leicht das Kopf- und Schwanzende mit einander verwechseln, weil letzteres ebenfalls in der Mitte ein Grübchen (Fig. 2. b.) oder einen luftleeren Raum bildet, um welches sich in einem Kreise die weiche Substanz des Wurms anschliesset. Sobald er aber zu kriechen beginnt (Fig. 3.), so streckt er vorerst den Kopf mit offenem Munde vor- und aufwärts, um eine schickliche Stelle zu suchen, wo er sich fest saugen kann. Wenn letzteres geschehen, rückt er mit den Absatz dahin fort, wo der Mund ist, formt ihn unterwärts rundlich und macht einen luftleeren Raum; der Druck der äusseren Luft oder des Wassers auf die obere Fläche des Absatzes aber hält ihn dann fest. Er macht nun wieder den Mund los und kriecht, indem er ersteres Verfahren immer wiederholt, in lauter wellenförmigen Biegungen seines Körpers, so schnell, als irgend eine Raupe mit ihren sechzehn Füßen davon. Ausser dem Gang hat er mit den Raupen noch gemein, daß er seine feine Haut vom Kopfe gegen den Schwanz zu abstreift, welche alsdann wie Seitenflocken im Wasser herumschwimmt. Dieses Häuten geschieht alle drey Wochen. So oft es bevorsteht, ist der Blutigel krank, hängt oder sitzt unbeweglich still und hält sich blos mit dem Kopfe fest. Er ist dann aus Mangel des Appetits auf keine Art zum Blutsaugen zu bringen. Ist aber das Häuten vorüber, so ist er überaus munter und schwingt sich im Wasser, als ob die Sonne eine besondere Wirkung auf ihn äusserte.

Die Blutigel sind Hermaphroditen und führen die männlichen und weiblichen Geschlechtstheile dicht hinter einander an der Bauchfläche, in einer Entfernung vom Kopfe, welche ungefähr den dritten Theil der ganzen Länge des Wurms beträgt. Das männliche Glied ist nur in den Monathen Julius und August als ein ziemlich langer hervorstehender Faden (Fig. 2. c.) bisweilen sichtbar. Aus-

ser dieser Zeit ist es aber völlig im Leibe zurückgezogen, so daß man die Öffnung, wo es hervortritt, nur an einem etwas lichterem, runden Fleckchen erkennet. Noch unmerklicher aber ist die Öffnung des weiblichen Geschlechtstheils, die bloß einen feinen Punkt (*d.*) gleicht. Man hat noch keine Erfahrung, ob sich jeder Blutigel selbst befruchtet, oder ob sich je zwey wie die Schnecken einander gleichzeitig befruchten. Einige Blutigelgattungen legen Eyer, die sie entweder am Leibe tragen, oder einzeln und in Häufchen an allerley Wasserkräuter befestigen; andere aber gebären lebendige Jungen. Ich fand, nachdem ich mehrere wilde oder sogenannte Rofsigel (*Hirudo sanguisuga*) in einem mit etwas Wasser gefüllten Zuckerglase gut verwahrt hatte, nach acht Tagen einige fünf Linien lange, weisse beynahe perlemutterfarbige Würmchen auf dem Boden des Glases. Sie hatten eilf Glieder, ein spitziges und ein stumpfes, mit zwey längeren, und zwey kürzeren braunen Wärmchen versehenes Ende, und waren höchstwahrscheinlich junge Blutigel, da vorher nichts in dem Wasser sichtbar war, und durch die doppelte Leinwand, womit ich das Glas gut verbunden hatte, nichts in dasselbe gelangen konnte.

Ausser den bisher gedachten Eigenschaften zeichnen sich die Blutigel vor vielen anderen Wurmarten noch durch ihr überaus zähes Leben aus. Auch zerschnitten leben sie wohl noch einige Wochen fort, ja man will sogar behaupten, daß sie sich nicht im Saugen stören liessen, wenn man ihnen das Schwanzende abschnitt, und daß sodann hinten so viel Blut ausflösse, als sie vorne einsaugten. Das Öl, welches bey anderen Würmern die Luftöffnungen des Körpers verschließt und sie dadurch tödtet, schadet ihnen eben so wenig, wie aufgestreutes Salz; aber etwas Weingeist raubt ihnen augenblicklich das Leben.

Ohngeachtet sie sich im Wasser aufhalten und die meisten sehr fertig darinnen in wellenförmigen Bewegungen auf und nieder schwimmen; so scheint doch das bloße reine Wasser für sie nur wenig nahrhafte Theile zu enthalten, indem sie darinnen nach und nach abmagern. Tröpfelt man ihnen aber nur dann und wann etwas Blut hinein, so erhalten sie sich sehr gut bey ihrer Volleibigkeit. Überhaupt sind sie sehr blutgierig, saugen sich fast durchgängig an die Haut der Thiere an, und fallen nicht eher ab, als bis sie vom Blute strotzen, es müßte denn seyn, daß sie mit Salz bestreuet würden, auf dessen Reiz sie sich krampfhaft zusammenziehen, sich winden und krümmen und endlich das eingesogene Blut mit vielem Schleim wieder ausspeyen. Doch erholen sie sich nach dieser Entledigung bald wieder, wenn man sie in frisches Wasser bringt.

Diese

Diese Eigenschaft der Blutigel, sich überall anzusaugen, wo sie Blut gewahr werden, macht es nachtheilig, wo nicht gefährlich, barfuß in Sümpfen und solchem Wasser zu verweilen, wo sich Blutigel aufzuhalten pflegen. *Ledel* bekräftiget dieses durch ein warnendes Beyspiel. Bey dem Dorfe Podemockel, nahe an der Stadt Bonest in Pohlen, hütete ein Mädchen von neun Jahren das Vieh auf dem Felde. Sie sah einen Reuter, der nach der Stadt eilte, schnell herbeykommen, und verkroch sich aus Furcht hinter das Gebüsche in einen Sumpf. Dieser wimmelte aber von Blutigeln, welche sich an die nackenden Füße des Mädchens setzten und sie so aussaugten, daß man sie todt und ganz mit Blutigeln besetzt fand. Einen ähnlichen Fall findet man in der *Gazette salulaire*, wo ein Bauer, der mit blossen Füßen ins Wasser gieng, an dem Blutverluste starb, welchen die Blutigel auf gleiche Art veranlaßt hatten. Eben diese besondere Eigenschaft der Blutigel hat auch Veranlassung gegeben, daß man sie schon in den ältesten Zeiten zu örtlichen Blutausleerungen in verschiedenen Krankheiten benutzte. Nach *Galens* Versicherung waren sie schon dem *Hippokrates* in dieser Hinsicht bekannt. Auch rühmen ihren Gebrauch *Aretäus*, *Dioscorides*, *Ágineta*, *Celsus*, *Plinius* und die arabischen Ärzte, und *Horaz* gedenkt ihrer in seinen Satiren mit den Worten: *Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo*. In den neuern Zeiten fand ihre Anwendung ungleich häufiger statt und gegenwärtig ist wohl schwerlich ein Arzt zu finden, der ihren Nutzen nicht in seiner Praxis bestätigt gefunden hätte. Es ist jedoch nicht zu läugnen, daß die Blutigel auch als Heilmittel schädlich und gefährlich werden können. *Plinius* war der irrigen Meinung, daß sie bisweilen die Köpfe zurückliessen, wenn sie entweder durch das Gewicht des eingesogenen Bluts losgezogen, oder durch den Reiz des aufgestreuten Salzes genöthiget, plötzlich abfielen, hierdurch aber unheilbare Wunden und zuweilen den Tod verursachten. Dieses sey der Fall bey einem Patricier, aus dem Geschlechte des Consuls Messala gewesen, der auf die Ansetzung der Blutigel an die Knie, gestorben sey. Auch meldet *Schenk*, ihre Applikation habe bey zwey Personen den heissen Brand zur Folge gehabt und *Sennert*, daß die aus unreinem Wasser genommenen Blutigel, böartige Geschwüre, ja oft gar den Tod bewirken könnten. Weit öfter mögen sie wohl durch eine zu grosse Blutausleerung schaden, weil ihre triangulären, immer etwas gekneipten Wunden sich ungleich schwerer schliessen, als die Wunden der Lanzette, des Schnepfers und des Schröpfeisens, und daher oft noch Stunden lang fortbluten, nachdem die Blutigel abgenommen worden sind. Vorzüglich ist dieses der Fall an solchen Theilen, wo keine Compression

anzubringen ist, daher z. B. oft aus den Hämorrhoidalgefäßen entkräftende Verblutungen nach der Applikation der Blutigel zu erfolgen pflegen. Im Ganzen ist aber wohl die nachtheilige Wirkung derselben, als Heilmittel, mehr ihrer verkehrten und unvorsichtigen Anwendung, als ihrer physisch-schädlichen Beschaffenheit zuzuschreiben.

Man kennt gegenwärtig vierzehn Arten Blutigel, wovon ich hier nur die zwey ihrer Blutgierigkeit wegen am meisten bekannten ausführlich beschreiben werde. Allenfalls verdient hier noch *Rösels* sechste Gattung einer kurzen Erwähnung. Sie hält sich nur in einigen stehenden Wassern, meistens aber in zahlloser Menge auf, und ohngeachtet sie nicht über drey Linien lang ist, so fällt sie doch Leute, die mit blossen Füßen in ein solches Wasser gehen, so heftig an, daß sie vor grossem Schmerz öfters heftig schreyen, und allezeit mit blutigen Füßen zurückgehen.

1. Der Rofsigel. Tab. VII. Fig. 1 — 4.

Hirudo sanguisuga, elongata nigra, subtus cinereo-virens: maculis nigris. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3095. n. 3. Faun. Suec. 2078. Amoen. acad. 7. p. 44. Habitat in fossis, stagnis, palustribus, ultra 4 pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculato, a Norlandis medicinalis instar adhibita, cruoris adeo avida, ut novem sanguine et vita privare equum dicantur.

Bergmanns Abhandl. von Egel in den Abh. der Schwed. Ak. d. Wissensch. B. XIX. S. 294. T. VI. F. 3. 4.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 417. n. 2.

Gisler vom Gebrauch der Blutegel in der Heilkunst in den Schwed. Abh. B. XX. S. 95.

Gmelins Gesch. d. Gifte Th. I. S. 306.

Hill Hist. anim. p. 16. *Hirudo nigra abdomine plumbeo*.

Mülleri, O. F. Verm. terrest. et fluv. Hist. V. I. P. 2. p. 38. n. 168. *Hirudo sanguisuga*; Dan. *Blodiglen*; Suec. *Snegel*; Gall. *Sangsue de Cheval*; Angl. *Horse Leech*.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. I. S. 50. n. 3. *Der gemeine Blutsauger*.

Onomatol. Hist. nat. P. IV. p. 215. Der Blutigel mit einem gelben Rand an der Seite.

Petiveri Gazoph. T. 130. F. 7.

Raji Hist. ins. 3. *Hirudo maxime vulgaris*.

Es giebt sehr kleine, aber auch sehr grosse Blutigel dieser Gattung, welche wohl fünfthalb Zoll und drüber lang sind. Alle haben einen ziemlich platt gedruckten Körper und erhalten, wenn sie sich zusammenziehen, eine rauhere Oberfläche, als die übrigen Arten durch die stark hervortretenden Runzeln, welche die tieferen und daher deutlicheren Einschnitte zwischen ihren Ringen veranlassen. Die Farbe der Rückenfläche (Tab. VII. Fig. 1. 3.) ist bald braungrün, bald schwarzgrün, die Bauchfläche aber (Fig. 2.) hat eine hellgrünere Grundfarbe und führt auf dersel-

selben irreguläre, gelbe und schwarze Flecken und Adern. Die beyden gezackten Seitenränder des Körpers, so wie die Basis des Absatzes werden von einer gelben Kante eingefasst.

Stehende Wasser und die mit solchen angefüllten Gräben und Sümpfe sind der gewöhnliche Aufenthalt dieser Blutigel. Doch gedeihen sie in wärmeren Seen, wo sie nicht selten in Gesellschaft der folgenden Gattung angetroffen werden, ungleich mehr, als in kalten und waldigten Gegenden, wo sie gewöhnlich nur klein und mager vorkommen. Ihre Nahrung sind, ausser dem Blute anderer Thiere, wahrscheinlich die feineren Theile des Schlamms. Auch verschlingen sie ganze Regenwürmer, nach *Bergmanns* Beobachtung. Dieser warf einmal einen Regenwurm in die Flasche, worinnen er zwey Rofsigel verwahret hatte. Sogleich verschluckte jeder ein Ende des Regenwurms, so daß zwey Thiere mittelst eines dritten zusammenhiengen. Sehr gerne hängen sie sich den Pferden, die durch Moräste und Sümpfe gehen, an die Füße, und überhaupt scheinen sie das Blut der Pferde, mehr, als das anderer Thiere und der Menschen zu lieben und hiervon auch den Namen *Rofs-* oder *Pferdeigel* erhalten zu haben. *Linné* erzehlt, daß neun solcher Rofsigel einem Pferde so viel Blut ausgesogen haben, daß es darüber an Entkräftung starb. Eben sowohl beißen sie sich aber auch an die Haut des Menschen, vorzüglich in nördlichen Gegenden an, wo man sich derselben auch statt der medicinischen Blutigel bedient. Immer beißen sie jedoch nur in ihrem wilden Stande und nicht mehr, wenn sie länger als einen Tag in einer Flasche verwahret worden sind. Sie müssen daher lieber gleich angesetzt werden, so bald man sie nur aus ihrem Aufenthalte geholt hat.

2. Der medicinische Blutigel. Tab. I. Fig. 3 — 5.

Hirudo medicinalis, elongata nigricans: supra lineis versicoloribus, subtus maculis flavis. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3095. n. 5. Habitat in stagnis et paludosis, praestantissimus phlebotomus, inprimis haemorrhoidum, supra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis constans, lineis in dorso utrinque 4, prima rufa, altera rufa nigro maculata, tertia nigra, quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis orisque uncis, ut videtur, nullis.

Almindelige Natur-Historie, Tom. II. p. 279.

Bergmanns Abh. v. Egeln in den Abh. d. Schwed. Akad. B. XIX. S. 297. Tab. VI. F. 1. 2.

Berlin. Mannichfaltigk. Jahrg. I. S. 665. Jahrg. III. S. 385, 697, 713.

Berlin. Magaz. B. I. St. 1. n. 11. Blutigel, eine Art von lebendigem Barometer.

Blumenbach's Handb. der N. G. S. 417.

Bonnet, Lettre sur les Sangsues, considérées non comme Baromètres mais comme Thermomètres, Journ. de Phys. T. V. Jan. 1775. p. 70.

Cuvier Tableau élém. p. 632. *la Sangsue des Chi-rurgiens.*

Fermin's Reise durch Surinam, Th. II. S. 321.

Gesneri Hist. aquat. 425. *Hirudo major et varia*

Gisler, N. vom Gebrauche der Blutigel in der Heil-kunst. Schwed. Abh. B. XX. S. 94.

Götting. gel. Zeit. 1785. St. 208.

Göze, Gesch. schädli. Ins. S. 232.

Hartmann, J. B. Diss. de Hirudine med. Vienn.

1777. 8.

Heisteri Chirurg. P. II. Sect. I. C. 17.

Hill, Hist. anim. p. 16. *Hirudo nigrescens flavo-variegata.*

Knackstedt, in Baldingers neuem Mag. B. VIII. St. 1.

Kniphof, Diss. de ped. ing. p. 17.

Linnaei, G. Diss. de Hirud. medicinali (Resp. Weser) Ups. 1765. Ejusd. Faun. Suec. 2079.

Müller, verm. terrest. et fluv. Vol. I. P. II. p. 37. n. 167. *Hirudo medicinalis*; Dan. *Dokter-Iglen*; Angl. *Common Leech*; Gall. *Sang-sue*, *Suce-Sang*.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. I. S. 49. n. 2. Tab. I. Fig. 8. *Der Aderlasser.*

Onomat. Hist. nat. P. IV. p. 215. *Der Blutigel*, den man in der Arzneykunst gebräucht.

Raji Hist. Ins. 3.

Riems physikal. Zeit. 1785. S. 182.

Rondeau (du) Mem. sur la Sangsue medicinale, in Rozier Journ. de Phys. T. XX. p. 284.

Salomon, E. D. vom Gebrauch der Blutigel, Schwed. Abh. B. XXII. S. 132. und B. XXVI. S. 61.

Schmuckers, J. L. Abh. v. d. Blutigeln, in dessen chir. Schrift. B. I. Berlin 1776. c. F. *Hirudo medicinalis.*

Schulze, G. von einem schädli. Bisse eines Blutigels, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XIV. S. 47.

Trumphius, J. C. de Hirudinib. morbosas partes non appetentibus, Comm. Nor. 1745. p. 376.

Unzers, J. A. medic. Handb. Leipz. 1789. S. 655. §. 70.

Willius, J. V. de Hirudinibus — quem potiss. sanguinem sugant; in Barthol. Act. Hafn. V. III. p. 117.

Der plattgedrückte Körper dieser Blutigelgattung (Tab. I. Fig. 3.) zeigt in seiner ganzen Länge ebenfalls lauter feine ringförmige Einschnitte, welche zu Runzeln werden, wenn der Blutigel sich zusammenzieht oder verkürzt, sich aber gänzlich ausgleichen, wenn er sich ausdehnt und oft von drey zu fünf Zoll sich verlängert. Die Grundfarbe der Rückenfläche ist sehr verschieden, gemeinlich grau; doch fällt diese Farbe bey einigen mehr ins Grüne, bey anderen mehr ins Braune, bey noch anderen mehr ins Schwarze. Sie ist gewöhnlich mit vier schmalen, bald orangegelben, bald braungelben Längsstreifen durchzogen, welche gleich hinter der obern Mundlippe anfangen, und wovon sich die zwey mittleren und schmälern, und hinter denselben die zwey äussern und breitem in einer Bogenlinie am Schwanzende vereinigen. Jeder dieser Längsstreifen erhält durch die kurzen, schwarzen Striche und Punkte, welche in einer Reihe auf denselben fortlaufen, viel Ähnlichkeit mit einer Kette. Die Seitenränder des Leibes sind mit einer gezähnten Kante von gleicher Farbe eingefalst, die in die untere Fläche des Körpers so weit, als in die obere Fläche desselben tritt. Dieses ist die gewöhnliche Zeichnung des Rückens. Es fehlt jedoch auch hier an Abweichungen, wo z. B. die breitere Kettenlinie getheilt ist, und hierdurch noch eine schmalere, unterbrochene Längslinie sichtbar wird, welche Veranlassung gegeben hat, daß Linné Müller und Bergmann auch die zwey einfachen, ungeketteten Randstreifen oder Seitenkanten, den Kettenlinien des Rückens gleichhielten und somit acht Rückenlinien herausbrachten. Die Grundfarbe der unteren Fläche des Körpers (Fig. 4.) ist

gewöhnlich aschgrau, bey manchen aber ganz schwarz, mit schmutzig gelben, bisweilen ins Grünlichte fallenden Flecken marmorirt.

Geöffnet bilden die zwey Mundlippen eine mehr oder weniger runde, oft irreguläre Öffnung, über welche die Oberlippe stets hervorragt; einander genähert oder gänzlich geschlossen (Fig. 5.) aber gleichen sie einem dreyschneidigen Instrumente, welches auf einmal drey Wunden macht. Viele behaupten, daß die Mundlippen mit drey spitzigen und starken Zähnen besetzt wären, welche ich aber so wenig, als irgend eine Spur von Augen, entdecken konnte. Von den Rofsigeln unterscheiden sie sich auch durch ihre lebhaftere Bewegung. Schnell schwimmen sie unter der Oberfläche des Wassers hin, welche sie oft berühren, um wahrscheinlich Luft zu schöpfen.

Sie sind nicht nur fast überall in Europa, sondern auch in Amerika zu Hause und *Fermin* meldet, daß man sie auf den sumpfigen Savannen findet. Vergebens sucht man sie jedoch in kalten Waldpfützen, da sie sich nur in den Gräben, Flüssen und kleinen Seen wärmerer Gegenden aufhalten, und ihre Stärke und Länge mit der Wärme des Klimas und der Fettigkeit des Bodens zunimmt. Man fängt sie auch nur bey warmem Wetter, wenn die Fische bey erster Frühlingswärme laichen und in den Monathen Junius und Julius bey starker Sonnenhitze, Windstille oder sanftem Südwinde, um sie zu chirurgischen Gebrauch in Zuckergläsern, die man mit wenig Wasser füllt, aufzubewahren. Dieses Wasser muß aber im Sommer immer nach vier, im Winter immer nach zwölf Tagen erneuert werden. Auch ist es nöthig, ihnen von Zeit zu Zeit etwas Blut hineinzutropfeln, um sie bey guten Kräften zu erhalten. *Knackstedt* empfiehlt sie nach jeder Applikation auszustreichen. Er faßt sie nemlich so bald sie sich vollgesogen haben und abgefallen sind, mit etwas reiner Leinwand unmittelbar bey dem Schwanz an, und streicht mit den Fingern der andern Hand, das eingesogene Blut vom Schwanzende gegen das Kopfende, wo es sodann aus dem Mund in einem feinen Strom ausfließt. Nun wirft er sie wieder ins Wasser des Zuckerglases, worauf sie munterer als zuvor und zum Saugen bald wieder geschickt werden.

An den in Gläsern aufbewahrten Blutigeln dieser Art, hat man noch eine besondere Eigenschaft wahrgenommen, nach welcher sie eine ausserordentliche Empfindlichkeit bey jeder bevorstehenden Veränderung der Luft äussern und daher als Barometer gebraucht werden können. Bey heiterem und beständigem Wetter rollen sie sich, sowohl im Sommer, als im Winter zusammen und liegen ohne Bewegung ruhig auf dem Boden des Glases. Will es aber regnen, so erheben

heben sie sich und verweilen an der Oberfläche des Wassers so lange, bis die Wolken sich wieder verlieren und anhaltender Sonnenschein erfolgt. Ein zu erwartender Sturmwind beunruhigt sie ausserordentlich. Sie durchkreuzen sich dann im Wasser und sind so lange in unablässiger Bewegung, bis Windstille eintritt. Steht aber ein Gewitter am Himmel, so verweilen sie an der Oberfläche des Wassers unter beständigen Convulsionen und Krämpfen.

Viele ältere und neuere Ärzte, und unter diesen auch *Unzer*, glaubten, daß die Bisse dieser Blutigel zuweilen giftig und letztere daher nicht ohne Ausnahme zu gebrauchen wären. *Kniphof* giebt sogar die Merkmale dieser schädlichen Blutigel an, und rechnet hierzu alle diejenigen, welche einen grossen Kopf, hin und wieder blaue und gelbe Flecken haben, und in Pfützen, Teichen und stehenden Wassern gefunden werden. Selbst *Schmucker* ist der Meinung, daß man nur solche Blutigel nemen dürfe, die sich in reinem, klarem und sandigem Wasser aufhalten, und daß die aus unreinen, sumpfigen, stehenden Wassern genommenen, Schmerzen, Geschwulst und Entzündung veranlassen. *Gmelin* aber schreibt diese und andere üble Zufälle und den in manchen Fällen erfolgten Tod mehr der Verletzung edler Theile oder einer darauf gefolgten starken Verblutung, als einer gewissen Giftigkeit zu, welche er überhaupt allen Insekten und Würmern streitig macht. Dennoch möchte eine, theils durch Aufenthalt und Nahrung, theils durch Reizung zum Zorn bewirkte Kausticität ihrer Säfte und ihres Mundschleims nicht ganz abzuläugnen seyn, da auch *Schulze* erzehlt, daß ein durch aufgestreutes Salz zum Abfallen gebrachter und gleich darauf wieder an die Seite der Nase gesetzter Blutigel, einen fast unerträglichen Schmerz mit harter Geschwulst veranlaßt habe, die in etlichen Stunden den größten Theil des Gesichts und den Hals bis an die Schlüsselbeine einnam. *Unzer* empfiehlt in solchen Fällen die Wunde mit Salzwasser zu waschen und mit Öl zu reiben.

Z w e y t e r A b s c h n i t t .

Würmer, welche gerne die Haut des menschlichen Körpers durchbohren und unter derselben ihren Aufenthalt suchen.

Die vorhergehende Klasse der zufällig schädlichen Würmer machte eine dreyeckigte Hautwunde, die gegenwärtige beißt oder bohrt sich ein rundes Loch in die Haut, welches dem ganzen Körper des Wurms den Durchgang verstattet.

Mit

Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit schlüpft er durch dasselbe und setzt nun seinen Weg im Zellgewebe fort. Mancherley, oft gefährliche Zufälle, folgen auf den hierbey statt findenden Reiz der Hautnerven und machen diese Würmer um so furchtbarer, jemehr die Zartheit derselben sie der Achtsamkeit des Menschen entzieht. Es gehören unter diese Klasse der *Fadenwurm*, der *Hautwurm* und der *Höllenzwurm*.

1. Der Fadenwurm. Tab. I. Fig. 2.

Gordius aquaticus, filiformis fuscus. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3082. n. 1. Faun. Suec. 2068. *Gordius pallidus*, extremitatibus nigris. Itergoth. 282. Habitat in rivis, aliisque aquis fundi potissimum argillacei, quem, uti piscis aquam tranat, scaturiginum plurium auctor, opacus, saepe in spiram varie se contorquens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper acuminatus, morsura paronychiam excitare, opio felicissime sanandam, fertur in Waldai pisces occidere, hominibus non perinde infestus.

Aldrovandi de animal. insect. p. 720. T. 765.
Seta s. vitulus aquaticus.

Berlinische Sammlungen, B. VIII. S. 30. *Der Fadenwurm.*

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 410. n. 1.
Das Wasserkalb.

Cuvier Tableau élémentaire, p. 638. *le Dragonneau des ruisseaux.*

Degeers Abb. z. Gesch. d. Ins. B. I. Quart. 4. S. 8.
B. II. S. 407. Tab. XIV. F. 13. Schwed. *Tagel-math.*
Gesneri Hist. aquatil. p. 547. *vermis aquaticus, vitulus aquaticus, seta aquatica.*

Göze, Anmerk. z. Deg. B. II. S. 409.

Hanows Seltenh. d. Nat. Th. I. S. 286. vom *Zwirnwurm.*

Hill, Hist. anim. p. 14. *Chaetia.*

Instonii Hist. ins. Tab. XXV. *Meerwürm.*

Klein, Tent. herpet. p. 68. *Lumbric. aquaticus* 4.

Lepechins Tageb. d. Reise durch Rußland, Th. I. S. 42.

Lyonet sur Lesser, T. I. p. 96.

Martin, A. R. Knoten- und Fadenwürmer bey Fischen u. Menschen, Schwed. Abh. B. XXXIII. S. 258.

Müller, O. F. verm. terrestr. et fluv. Hist. V. I. P. 2. Helminth. Cl. XVIII. Sp. 161. p. 30. *Gord. seta.* Dan. *den brune Traad-orm; vand-tarmen.* Suec. *Onda-betet; Tagelmath.* Gall. *la Chanterelle.* Angl. *the Hair Worm.* Desselben Naturgesch. einiger Wurmart des süßen und salzigen Wassers, mit Kupf. Kopenhagen 1800. 4. S. 111. 112.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. II. S. 30. n. 1. *Der Wasserfaden.*

Naturforscher St. XI. S. 186.

Onomatol. Hist. nat. P. IV. p. 29. *Der Fadenwurm.*

Planci, J. Lib. d. Conchis minus not. Venet. 1739.

4. Cap. XXII. Tab. V. Fig. F. *Seta patustris.*

Spielmann, Diss. de Anim. noc. Als. p. 55.

Velschii, G. H. Exercit. d. Ven. medin. A. V. 1694. 4. Tab. ad p. 84. *Seta aquatica.*

Die verschiedenen Benennungen, *Zwirn- Nerven- und Haarwurm*, unter welchen dieser *Gordius* noch bekannt ist, sind meistens von seiner Gestalt hergenommen. Der unschikliche Name *Wasserkalb* aber soll nach *Gesner* davon herrühren, daß die Kälber diesen Wurm oft beym Trinken mit verschlucken, darauf abmagern und sterben. Seine Länge giebt *Degeer* zu zwey Fuß oder eine schwedische Elle, *Müller* hingegen nur zu sechs und sechzig Linien, seine Breite aber zu einer Sechstel- oder Drittel-Linie an. Überhaupt hat er ungefehr die Dicke ei-

nes

nes starken Zwirnfadens und diese bleibt sich durch den ganzen Körper des Wurms gleich. Diejenigen, welche ihn mit einem Roßhaare vergleichen, nemen ausser seiner gleichförmigen Dicke, noch auf seine völlig hornartige Härte Rücksicht, welche kein Zerquetschen zuläßt. Seine Farbe ist weißlicht, bisweilen auch aschgrau und an jedem Ende schwarz. In der Mitte des ganzen Körpers schimmert eine dunkle Linie durch, welche der Darmkanal ist. Man wird übrigens keine Spur von einer Mundöffnung, auch keinen Unterschied am ganzen Körper gewahr, ausser daß das eine Ende etwas spitziger ist. Doch soll es nach *Müller* eine Spielart geben, deren eines Ende sich gabelförmig spaltet.

Man findet die Fadenwürmer vorzüglich in den Monathen Julius und August in den meisten Ländern unseres Welttheils in Morästen und Bächen. Sogar hat ihn der ungenannte Verfasser der Abhandlungen in den Berl. Sammlungen in Berliner Brunnen angetroffen. Sie lieben jedoch immer mehr einen lettigen Boden und *Linné* versichert, daß sie vorzüglich im Thon, als in ihrem natürlichen Elemente leben. Auch sollen sie, als wahre Minirwürmer, zur Entstehung vieler Quellen Veranlassung geben. Im Wasser sind sie ausserordentlich unruhig, bewegen sich schlangenförmig und krümmen ihren Körper auf die mannigfaltigste Weise. Oft verschlingen sie sich in einen Knoten und mehrere zusammen in einen Knäuel.

Was ihre Vermehrung betrifft, so entdeckte *Göze* in diesen Würmern durchs Mikroskop eine ungeheure Menge kleiner Körperchen, die er für Eyer hielt. Bey näherer Untersuchung fand er aber, daß sie sich in lauter junge Würmer auseinander legten, welche vorher schneckenförmig bey einander im Mutterleibe lagen. Sie gehören daher unter die Lebendig gebährenden und ihre Vermehrung ist beynahe Beyspiellos in der Natur. Denn *Göze* hat berechnet, daß ein sechszölliger *Gordius* 36000 junge Würmer bey sich führe. Fabelhaft ist wohl, was *Linné* von einer andern Art der Vermehrung durch die Theilung behauptet, daß nemlich jedes Stückchen von dem in hundert, ja tausend Theile zerschnittenen Wurm, nicht nur fortlebe; sondern auch wieder zur Länge des ganzen Wurms heranwachse.

Müller in seiner Naturgeschichte verschiedener Wurmarten erklärt sich über den Nachtheil, welchen diese Würmer hervorzubringen im Stande sind, auf folgende Art: die Fadenwürmer sind den Fischen, ja selbst den Menschen fürchterlich und tödtlich. Lezteres versteht er wohl von den in den Nahrungskanal gekommenen Würmern dieser Gattung, wovon der dritte Abschnitt handeln wird,

erste-

ersteres bezieht sich aber vorzüglich auf die schmerzhaftige Entzündung und Vereiterung der Fingerspitzen an den Seiten und Wurzeln der Nägel, welche unter den Namen *Paronychia*, *Panaritium*, der *Wurm an den Fingern* bekannt ist, und welche man neuerlich einzig auf den schnellen Wechsel von Wärme und Kälte, durch das plötzliche Eintauchen der erkalteten Hände in warmes und der aus ganz warmen Wasser gezogenen Hände in ganz kaltes, zu schreiben geneigt war. Da dieses Übel hauptsächlich Fischer, Wäscherinnen und andere im Wasser arbeitende Personen befällt; so bleibt es allerdings zweifelhaft, welche von beyden Ursachen zur Entstehung desselben Veranlassung giebt. Wahrscheinlich sind aber beyde im Stande, dasselbe zu bewirken und die Fadenwürmer nicht ganz davon freyzusprechen, da sie nicht nur die Landleute in Schweden, wo dieser Wurm zu Hause ist, für die einzige Ursache dieser Krankheit halten und ihn daher *Ondabebet* nennen; sondern auch *Spielmann* schreibt: der Ursprung der *Paronychia* vom Bisse des *Gordii aquatici* ist auch bey uns beobachtet worden.

2. Der Hautwurm. Tab. I. Fig. 1.

Filaria medinensis, tota pallida. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3039. n. 1. Habitat in Guinea, America et Asia meridionali, nudipedum obambulantium servorum pedes intrans, dolorem febremque excitans, caute extrahendus, ad 12 pedes longus; mercurio sublimato corrosivo in spiritu frumenti soluto intra 20 dies, qui alias demum post 40 dies, educitur.

Aali Ebn Aabassus v. Guido de Cauliaco
Chirurgia, Lugd. 1572. Tr. II. C. VIII. *Vena famosa*.

Abhandl. der Schwed. Ak. Th. XXX. S. 158.

Abhandl. aus der Naturgesch. prakt. Arzneykunst und
Chirurg. aus den Schriften der Harlemer und anderer
Holländ. Gesellsch. B. IV. Leipz. 1777.

Actuarius, J. Opera. Parisiis, 1556. Meth. med.
Lib. IV.

Aegineta, Paul. Lib. de re medic. C. 59. *ἐλμυσ-
θων το ζου*.

Aetii Tetrabibl. Basil. 1512. Lib. 4. Serm. 2. C. 85.

Albertus, J. Jac. Diss. in qua quaeritur an et
quid grandini in sue cum scorbutio in homine sit com-
mercii, p. 306. ad Calc. Coll. Sennerti de Scorbuto.

Albucasis Method. med. L. II. p. 160.

Aldrovandi, U. Serpent, et Dracon. Hist. L. II.
ed. Barth. Ambrosini Bonon. 1640. L. II. p. 328.

Alsabrahvii Lib. theor. et practicae ex edit. P.
Ricci, Vindob. 1519. C. XII. Tr. XXVIII. *Vena exiens*.

Andry, N. gründlicher Unterricht v. Erzeug. d.
Würm. im menschl. K. Leipz. 1676. Kap. III. 5.

Avicenna Canon. Libr. III. Fen. III. Tr. 2. Cap.
21 et 22. *Vena Medinensis*.

Baion de Drancunc. in Memoir. pour. serv. à l'hist.
de Cayenne et de la Guiana françoise avec des plan-
ches, Tom. I. 1777. Tom. II. 1778. S. Richt. chir.
Bibl. B. V. S. 169.

Bancroft, E. Naturgesch. v. Guiana in Südame-
rika, aus dem Engl. Frankf. und Leipz. 1780. 4ter
Brief, S. 239. *la Chanterelle*.

Bartholinus, Th. de morb. biblic. p. 31. C. VI.
idem de luce hominum et brutor. L. III. Havn. 1669.
p. 268.

Bauhinus, J. Hist. font. admirab. Bollens, L. I.
C. 5. Casp. Swenkfeld in Hist. stirp. et font. Siles.
p. 404. *Serpigo*.

Berlinische Samml. B. VII. St. 11. S. 242. aus Pet.
Carere Beschr. von Guiana.

Bertapalea, Comment. in fen. Can. IV. Avic.
in collect. veter. chirurgor. Venet. 1498. p. 240. C. 28.

Blochs Abh. v. Erz. der Eingeweidew. S. 1.
Hautwurm.

- Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 410. n. 2.
Der Nervenwurm, Farenteit.
- Borellus, P. Hist. et Obs. medico phys. Cent. Francof. et Lips. 1676. Cent. I. Obs. 28.
- Bosmanns Reise nach Guinea, S. 139.
- Cartheuser de morb. endem. Libell. Francof. ad Viad. 1771. p. 207. *Nark und Peiunk in Persien, Ickon auf Guinea.*
- Castelli, Barth. Lex. med. graeco lat. Ed. Brunon. Genev. 1746. p. 273. *δρακόντιον.*
- Cauliaco (Guido de) Chirurgiae Tract. II. C. 8. p. 129. Ed. Lugd. 1572. *Vena elongata.*
- Clerici Hist. lat. lumbr. C. XIII. p. 253.
- Colle, J. Elucidarum Chirurgia s. Commentar. in Ebensin, Sect. IV. Tr. II. C. 21. *pustula vermicularis.*
- Constantini, F. G. Cur des Haarwurms, Hanov. Mag. 1773. S. 114.
- Csacer, de Annotat. Helmintholog. Franequer. 1772.
- Cuvier Tableau élém. p. 638. *le ver de Médecine.*
- Dampiers Voyages Tom. III. p. 340.
- Döverens Abh. v. d. Würm. im menschl. Körper, S. 39. *Drachenwurm.*
- Donatus (Marcellus) de Hist. med. mirabil. Lib. VI. Francof. ad Moen. 1613. L. IV.
- Ettmüller, in Act. erudit. Lips. 1682. Obs. 2. p. 317.
- Fallopious, G. de Tumoribus XXIV.
- Faventi, B. Opus de rebus natural. Tr. VII. de apostemat. p. 42.
- Fermins Reise durch Surinam Th. II. S. 316. *Wurm der Neger.*
- Forbes, G. Geschwüre vom Dracuncul. Edinb. Vers. B. V. Th. 2. S. 1022.
- Forestus, P. Observ. et Curat. medicinal. L. XXVIII. Francof. 1602. L. XX. Obs. 39.
- Freind Histoire de Médecine par Etienne Coulet T. I. p. 78. T. II. p. 88. 89.
- Fuchsii, G. F. Ch. Commentat. historico-med. de Dracunculo Persar. s. Vena medin. Arabum. Jenae 1781.
- Fürstenau, J. H. Spicilegium obs. d. Indor. morb. et medicina. Rint. 1735 p. 160.
- Galandat, D. H. de Vena med. s. Dracunc. in Nov. Act. N. C. T. V. app. p. 103. übers. im neuen Hamb. Magaz. St. 96. S. 526.
- Galenus de Locis affectis. Lib. VI. C. 3.
- Geschichte der neuesten Entdeckungen, welche von verschiedenen Reisenden in Russland und Asien gemacht worden, Th. I. 1777.*
- Gmelins Reisen durch Russland, S. Samml. d. best. Reisebeschreibungen in einem ausführl. Auszuge, B. 11. Berl. 1774. S. 49. in Bucharien *Irschasta.*
- Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 1758. S. 817. aus Haselquists Reisejournal.*
- Gorreus, J. Definit. medicinae, L. XXIV. Lut. Par. 1564. p. 87.
- Griffith Hughes natural Hist. of Barbados, Lond. 1750.
- Grundleri, G. A. Obs. de Verm. ven. med. in Comm. Litt. Nor. 1740. p. 329. c. Fig.
- Gruneri Morbor. antiquitates, Vratislav. 1773. p. 216. Idem d. Ven. med. Arab. in Act. Ac. Mogunt. 1777.
- Handbuch d. Naturgesch. oder Vorstell. d. Allmacht, Weish. u. Güte Gottes etc. B. IV. Nürnberg. 1774. S. 331.*
- Hanow von dem Zwirnwurm, Merkwürd. B. I. S. 586.
- Heurnius, J. Opera omnia Lugd. 1658. T. II. de morb. novis et mirandis epist. ad Henr. a Brä. p. 119.
- Hillary, W. Beobachtungen über die Veränderungen der Luft und die damit verbund. epid. Krankh. auf d. Insel Barbados, aus dem Engl. v. J. G. Ackermann, Leipz. 1776. S. 377.
- Hofmann, F. Comm. Litt. Nor. V. X. p. 309. Ejusd. Dissert. physico-med. Dec. L. B. 1713. Diss. III. de morbis certis regionibus et populis peculiari-bus. p. 11.
- Hunters, J. Versuche über das Blut, die Entzünd. und die Schusswund, aus dem Engl. v. Hebenstreit, Th. II. Kap. 1. Leipz. 1797. 8.
- Hussen de Gord. med. in de Genootschap de Vlissing, T. II. p. 443.
- Jaeger, J. H. Spicileg. d. patholog. animat. Götting. 1778.
- Ingrassia, Phil. de tumoribus praet. nat. Neap. 1552. Tr. I. C. 1.
- Joel, J. Opera medic. Amst. 1701. Sect. III. L. X. - Kaempferi Amoenit. exoticae, Lemgo, 1712. p. 524.
- Klein Erpet. p. 60. *Lumbricus aquaticus.*
- Kniphof de Pedic. ing. §. XIV. *Dracunculus, Cu-lebrilla, der Drache, Nestelwurm, das Fadenschlinglein.*
- Kratzensteins Abh. v. Erz. der Würm. S. 33. F. 10. *Nervenwurm.*
- Lachmund, F. von wunderbaren Würmern, welche in Guinea in den Füßen, Lenden und Hodensack der Menschen wachsen, im Th. IV. d. Abh. d. k. Ak. d. Nf. S. 279.
- Le Gentil, Nouveau voyage aut. de monde T. I. Amst. 1721. Lett. I. p. 11.
- Lemberg, J. L. Epistolar. medicinal. volum. bi-part. Hanov. 1503. L. IV. Epit. 13. p. 585.
- Leoni, D. Method. curandi febres, tumoresq. praet. nat. Bonon. 1562. p. 106.
- Lesser, F. C. Insectotheologie, Band II. Buch 6. Kap. 2. S. 436.
- Licetus, F. de spont. vivent. ortu Vicentiae 1618 L. III. C. 11.
- Linds Versuch über d. Krankh. d. Europ. in heiss. Klimat. B. I. Absch. 2. Kap. 2. S. 52.
- Linnaei Amoenit. acad. p. 103. Ebenness. von Gord. Medin. in der Schwed. Abh. B. XXX. S. 158.

- Lister a Lett. from St. George in the East. Indies, giving an account of de long- Worm in Phil. Trans. V. XIX. n. 225. p. 417.
- Löfflers Wahrnehmungen, in Richt. Chir. Bibl. B. VII. S. 785. vom *Dracunculus*, Desselb. Beitr. zur Arzneywissenschaft, in Richt. chir. Bibl. B. XII. S. 334. *Dracunc.* eder *Zen. Medin.*
- Lorry, C. Abh. v. d. Krankh. d. Haut, aus dem Lat. v. C. F. Held, Leipz. 1729. K. 3.
- Lusitanus (Amatus) Curation. medicinal. Centur. VII. Lugd. 1570. Curat. 64.
- Mead, Rich. Monita et praeec. med. Lips. 1759. S. III. Cap. de Lumbr.
- Mercurialis, Hier. Variet. lect. Venet. 1587. Lib. II. C. 20.
- Messonnierus, Lazar. Tract. de morb. novis, L. IX. Morgen, in Transactions of the americ. philosoph. Society, Vol. II. n. XLIII. p. 383.
- Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. I. S. 32. n. 3. Tab. I. F. 1. *Der Hautwurm.*
- Naturforsch. Stück XI. S. 186.
- Niebuhr, Carst. Descriptiones animal. av. insect. verm. quos Forskal. observ. p. 26. *Era.* Desselb. Beschreib. v. Arabien, Kopenh. 1772. *Maru, Arx, Arkel.*
- Oldendrops Gesch. d. Mission d. evangel. Brüd. auf den karaibischen Ins. St. Thomas, St. Croix und St. Jean, Herausg. v. J. J. Bössart, Barby 1777. B. II. Absch. 7. S. 125. *Tsicken.*
- Onomat. Hist. nat. P. IV. p. 32. *Der ganz blasse Nervewurm.*
- Paillass Diss. de infest. viv. intr. vivent. Lugd. Bat. 1760. *Vitulus aquaticus*, Desselb. Reisen durch verschied. Provinz. des Russischen Reichs, Frankf. und Leipz. 1776. Abschn. VIII. p. 8.
- Paludanus in Notis in Linscoti Itinera, Cap. VI.
- Paracelsus, Theophr. de Apostem. et ulceribus, Cap. XXXI.
- Paraeus, Ambr. Opera, Paris 1552. Lib. de tumoribus contra natur. particularibus VII. p. 243. C. 21.
- Paullini de Morte verminos. p. 120.
- Pedemontanus, Franc. de apostemat. sanguin. Sect. II. Part. II. Summ. 1. §. 2. p. 185. ad calcem operum Mesuae *Vena egrediens.*
- Péré de Ven. med. in Roux. Journ. T. XLII. p. 321.
- Petersburgisches Journal Nov. 1778. S. 386.
- Petit, Histoire de l'Acad. Roy. d. Sciences, p. 23.
- Plateri Prax. med. P. III. C. 3. p. 283. *Phlyctäna.*
- Plutarchi Chaeronensis oper. T. II. Francof. 1620. Symp. LIIX.
- Pollux, Jul. Anomast. L. IV. C. 4. *τινερυγδες φιδυμένον.*
- Rauchin, Francisc. de morb. puer. Sect. II. C. 6. p. 345.
- Reies (Casp. de) Elysium iucundar. quaest. campus, Francof. 1670. p. 426.
- Rhases ad Almansorem de re medica, Libr. VII. C. 24. *Vena civilis.*
- Robertson, Robert. a physical journal kept on board his Majestyes Ship Rainbow doring threc voyages in years 1772. 1773. to which is prefixed a particular account of the remitting Fevers etc. Leid. 1779.
- Salicetus, Guil. Chirurgia L. I. C. 66.
- Sauvages, Nosol. meth. Ed. Daniel. T. V. p. 203. *Dragoneau.*
- Scanarellus, Ant. de morb. gallicis, T. I. p. 116.
- Schenk de Graefenberg Obs. VI. L. V. p. 701. dicit a Galeno *Tenus* vocari.
- Scholz, Lauremberg Epist. phil. med. chym. Vol. Francof. 1598. Ep. 27. p. 32.
- Schoeeller Diss. sist. obs. super morb. Surinamens, Goett. 1781. p. 40.
- Schwenkfeld, Therotroph. Siles. 1603. p. 556.
- Sennert, Dan. Inst. med. 1667. L. II. P. II. C. 10.
- Sloane Voyage to the Isl. Madera, Barbadoes etc. and Jamaica with the natural History Lond. 1725. Vol. II. p. 350. Tab. 233. Fig. 1. *Vena Medeni, i. e. Dracunculus, Gerard Crem.*
- Spiegel, de Lumbr. lato. Cap. IX.
- Tagaultius, Jac. Institut. Chirurg. II. v. de Chirurgia scriptores optimos veteres et recent. Vol. I. Fig. 1555. p. 19.
- Unzers med. Hamb. Leipz. 1789. §. 70. p. 656.
- Varenius, H. Nosolog. hermet. et Galenic. Disp. XXI. Thes. XII. *Schnader Spulwurm.*
- Veiga (Thom. de) Commentar. in Galeni Oper. Antw. 1561. T. I. Comm. ad Lib. de affect. L. VI. p. 298. n. 3.
- Vogel, A. R. Aph. de cognosc. et cur. morb. p. 641.
- Wagneri, Rheinhold. Nova litterar. Maris Baltici, ann. 1698. Mens. Febr. *Dracunculus.*
- Warenii, H. Diss. d. lumbr. *Dracunculis*, (Resp. Fassius) Rost. 1603.
- Welsch, G. H. exercit. d. ven. med. Aug. Vind. 1674.
- Wepfer, J. J. v. Miscellan. cur. s. Eph. Acad. imp. Leopold. 1691. Dec. II. ann. X. p. 316. Obs. 171.
- Wierus, J. Opera omnia, Amst. 1640. Obs. med. L. II. p. 947.
- Woyts Gazoph. medico-phys. p. 2386.

Δράκοντιον und *Dracunculus* war die bey den alten Griechen und Römern gebräuchliche Benennung dieses Wurms, welche Linné beybehielt, der ihn von sei-

seinem Aufenthalte in Persien *Dracunculus Persarum* und von seinem Aufenthalte in Medina in Arabien *Gordius Medinensis* hieß. Die Schweden nennen ihn noch besonders *Onda-Betet*; *Tagelmack*, die Engländer *The Hair worm*, die Holländer *den brune Traad-orm*; *Vand-Tarmen*, und *Draakworm*, die Italiäner *Dragoncelle*, die Teutschen den *guineischen Drachen* oder den *guineischen Hautwurm*. In Guinea selbst wird er *Ickon* und in den spanischen Westindien *Peiunk*, *Jvaru*, auch *Colebrilla*, wegen seiner schlangenförmigen Gestalt genannt. Den älteren Schriftstellern war er ein Räthsel. *Avicenna* wußte nicht, ob er ihn zu einem Thier oder zu einer Hautkrankheit machen sollte. *Galenus*, *Marcellus Donatus* und *Pollux* hielten ihn für eine verdorbene Nervensubstanz, *Messonner* für den Auswuchs einer Vene, *Cartheuser* für einen eigenthümlichen Wurm der Haut (*lumbricus subcutaneus*), *Licetus* für die feuerige Schlange, womit Gott die murrenden Israeliten heimsuchte, eine Menge anderer Meinungen nicht zu gedenken.

Beynahe so verschieden, wie die Meinungen von der Natur dieses Wurms, sind auch die Angaben von seiner Grösse, welche nach dem Alter, dem Klima, der angemessenen Nahrung desselben, sehr vielen Abstufungen unterworfen zu seyn scheint. *Bancroft* meldet, daß er einige Schuh lang und einer Violinsaite dick sey, und *Grundler*, daß der malabarische Hautwurm, welchen er aus Indien geschickt erhalten, vierthalb rheinländische Schuh in der Länge und die Dicke eines Brieffadens habe. *Bajon* hat einen solchen Wurm gesehen, der sechs Fuß lang war, *Barrere* aber versichert, daß er oft sechs, und *Fermin*, daß er sogar acht Ellen lang sey. Von der wahren Gestalt des Hautwurms besitzen wir noch keine treue Abbildung. *Sloane* liefert den Wurm ohne Kopfende, und andere mit einem Kopfe, dem man es sogleich ansieht, daß er erdichtet ist. Er hat überhaupt einen einfachen schmutzig weissen, cylindrischen Körper, ohne ringförmige Gliederreihen, und gleicht unter der Haut des Menschen einem Nerven, ausser derselben und trocken aber einer Violinsaite. Den Kopf (Tab. I. Fig. 1. a.) beschreibt *Grundler* als eine dem Blutgelmund ähnliche Saugmündung, *Fermin* platt und mit zwey kleinen Hörnern versehen, *Kämpfer*, der ihn zweymal lebendig ausgezogen haben will, als einen mit sehr feinen Härchen besetzten und in der Mitte einen schwarzen Punkt führenden Rüssel. Wahrscheinlich ist, wie bey dem Fadenwurme, das Kopfende von dem Schwanzende nur durch seine etwas stumpfere Spitze unterschieden. Der Schwanz (b.) ist nach einigen hakenförmig, nach anderen mit einem Punkt versehen, welcher einer Aftermündung gleicht. Aus dem durchschnittenen Wurm hat *Löffler* einigemal eine milchichte Feuchtigkeit fließen sehen.

Bancroft, *Doeveren*, *Linné*, *O. F. Müller* und *Pallas*, welche den Hautwurm mit dem Fadenwurme verwechselt und beyde für eine und dieselbe Art gehalten haben, behaupten, daß er im Morgenthau, in stehendem süßen Wasser, so gar im Meere häufig vorkomme. *Sauvages* versichert aber gerade das Gegentheil, daß er nemlich nur in sandichten, sterilen Gegenden und um desto häufiger gefunden werde, je trockner der Winter war. Dieser Meinung treten die meisten andern Schriftsteller und vorzüglich *Löffler* bey, der sich sowohl in Afrika, als in Amerika vergebens darnach erkundigte, ob jemand diesen Wurm im Wasser gesehen habe und daselbst das Wasser oft und aufmerksam untersuchte, nie aber denselben darinnen entdecken konnte. — So viel von seinem Aufenthalte ausserhalb dem menschlichen Körper. Innerhalb demselben bewohnt er das Zellgewebe unter der Haut und zwischen den Muskeln aller von Kleidungsstücken entblößten Theile. Am häufigsten hat man ihn in den unteren Extremitäten von den Knien bis zu den Füßen angetroffen, seltener im Hodensacke, in den Weichen am Rücken, Halse und an den Armen. Zweymal will ihn *Bajon* sogar unter der äussern Haut des Augapfels gefunden und glücklich ausgeschnitten haben. Sehr oft kann man ihn deutlich an der Oberfläche des Körpers fühlen und nach *Agineta* seine Bewegung wahrnehmen. Liegt er aber tief unter den Muskeln so giebt er seine Gegenwart durch Schmerzen und beschwerliche Bewegung des Theils, in welchem er sich befindet, zu erkennen. Bey Thieren hat man ihn nie angetroffen, wahrscheinlich weil ihre dickere, festere, mit Haaren besetzte Haut für ihn undurchdringlich ist.

Über die Ursache seiner Entstehung oder die Art, wie er unter die Haut kommt, geben uns auch die neuesten Reisebeschreiber keine sichere Auskunft, so daß wir uns, nachdem Jahrhunderte darüber gestritten worden ist, noch immer mit Muthmassungen begnügen müssen. Die ältesten Schriftsteller suchten seine Entstehung in einer üblen Beschaffenheit der Säfte, andere in den mit den Speisen verschluckten Eyern, noch andere in der üblen Beschaffenheit der Luft, und in dem trocknen, sandichten Boden. *Hillary* und *Sloane* waren der Meinung, daß er mit dem Wasser verschluckt würde, und letzterer behauptete sogar, ohne sich auf besondere Beweise einzulassen, daß nur solche Personen mit diesem Wurm beschweret würden, welche das in Cisternen aufbewahrte Regenwasser tranken. Sollte er aber durchs Trinken in den menschlichen Körper kommen; so müßten ja ungleich mehr Menschen damit behaftet seyn, als die Erfahrung wirklich aufzuweisen hat. Eine Menge nach Afrika segelnder und daselbst Wasser einnemender Schif-

Schiffer, kommen aber gleichwohl ohne den Hautwurm zurück. Überdies ist weder einzusehen, wie es kommt daß die Eyer dieses Wurms durch das Schlagadersystem immer gegen die Haut gefördert werden, nie im Magen und Darmkanale sitzen bleiben und sich daselbst entwickeln, und der Hautwurm daher nie in diesen Eingeweiden gefunden wird; noch ist zu begreifen, wenn er auch wirklich eine gewisse Verwandschaft zur Haut hätte, warum seine Eyer und Embryonen denn immer in so unbedeutender Menge verschluckt werden, daß allermeist nur ein, selten zwey und mehr solche Würmer, bey einem Menschen unter der Haut angetroffen worden sind. Diesen Schwierigkeiten glaubte *Löffler* dadurch zu entgehen, wenn er ein Insekt die Haut unbemerkt verletzen, in die kleine Wunde ein Ey legen und nun den Wurm aus dem Eye unter der Haut ausbrüten ließ. Alsdann könnte aber der Wurm doch nicht immer Larve bleiben, sondern müßte sich einmal in ein vollkommenes Insekt verwandeln. Wahrscheinlicher ist daher die Meinung derjenigen welche den Hautwurm mit dem Fadenwurm verwechseln, beyde im Wasser leben, nur nicht durch den Mund in den Körper gelangen lassen, und behaupten, daß er noch sehr klein und unausgebildet bey dem Waschen oder Baden, bey dem Herumgehen mit nackenden Füßen im Wasser in die Haut dringe und unter derselben sich zu einer ungewöhnlichen Grösse entwickele. Denn es ist nicht gedenkbar, daß ein in ausgewachsenem Zustande so langer Wurm, ohne Schmerzen und ohne daß es der Kranke gewahr werden sollte, sich in die Haut einfressen oder einbohren und zwischen Muskeln und Haut mit einer solchen Geschwindigkeit fortrücken könnte, daß er nicht gleich zu erhaschen und wieder auszuziehen wäre. Er muß daher nothwendig zur Zeit seines Eintritts in dieselbe ausserordentlich fein seyn, und kann durchaus kein stumpfes, sondern nur ein borstenförmiges Kopfe haben, welches alleine geschickt ist, leicht und unbemerkt in die Hautporen einzudringen. Doch kann dieses nur in sandichtem Boden und im Staube, nicht aber im Wasser geschehen, dessen Bewegung so leichten Körperchen nicht verstaten würde, an der Haut einen festen Punkt zu fassen.

Der Hautwurm kann, so lange er lebt, Monathe, zuweilen Jahre lang unter der Haut ohne grosse Beschwerlichkeit verborgen liegen und sein Daseyn blos durch die schmerzlose Empfindung, welche das Kriechen verursacht, zu erkennen geben. So bald er aber todt ist, reizt er, wie *Hunter* bemerkt, als ein fremder Körper und erregt in seiner ganzen Länge Eiterung. Nur durch starke Bewegung durch einen Stoß oder Schlag soll der lebendige Wurm so gereizt werden können, daß

daß er einen Schmerz im Gliede veranlaßt, welcher den Gichtschmerz übertrifft. Bisweilen soll auch eine gleichfarbige Geschwulst an der Stelle, wo er verborgen liegt, entstehen. Sonderbar ist es, daß er, nachdem er eine gewisse Zeit unter der Haut zugebracht hat, endlich von freyen Stücken seinen Ausgang sucht und eine schmerzhaft e Entzündung erregt, in deren Mitte sich ein Bläsgen bildet, welches platzt, eine milchichte Feuchtigkeit ergießt und aus welchem er nach und nach hervorbricht. *Wepfer* erzehlt nach *Cromers* mündlichen Versicherung, daß er im Herausziehen sogleich stürbe, der unter der Haut zurückbleibende Theil aber das Leben behalte und heftige Schmerzen verursache, wenn er durch Berührung gereizt würde, und *Löfflers* Erfahrung scheint diese Meinung zu bestätigen. Er entblöste einen solchen bloß unter der Haut des Unterleibes gelegenen Wurm durch einen Schnitt beynahe in seiner ganzen Länge, nam ihn heraus, bemerkte aber nicht die geringste Bewegung mehr an ihm, ohngeachtet er ihn gleich in warmes Wasser gelegt hatte.

Über das ursprüngliche Vaterland dieses räthelhaften Geschöpfs haben verschiedene Naturforscher ganz widersprechende Erfahrungen aufgestellt. *Grundler*, der ihn unfehlbar mit dem Fadenwurme verwechselte, will ihn fünf Zoll lang, in einer sumpfigten Gegend bey Saalfeld gefunden haben und *Fr. Hoffmann* erzehlt, daß er im Jahre 1688, wo er das Hornhausische Wasser besuchte, unter der Menge anwesender Kranker auch einige Bettler angetroffen habe, welche aus ihren Waden fünf bis sechs Zoll lange, dem vom *Grundler* beschriebenen Hautwurme ähnliche Würmer zogen. Eben so versichert *Pallas* von dem Herzoglich - Strelizischen Leibarzte *Hempel* einen dreyzehn Zoll langen Gordius aus dem Wanzker - See erhalten zu haben, der lange im Wasser lebte, sich sonderbar krümmte, öfters in Knöten verschlang und daraus wieder entwickelte, eine schwärzlichte Farbe, eine kaum bemerkbare, dunkelbraune Mundöffnung und eine ganz glatte Oberfläche hatte, Zugleich fügt er die ihm von eben diesem Leibarzte mitgetheilte Beobachtung bey, daß ein Mann aus Neu - Brandenburg, einige Tage, nachdem er sich in einem benachbarten Fluß aufgehalten, eine Entzündung auf dem Rücken des Plattfusses und nach einem Fußbade eine hervorragende Spitze gewahr wurde, welche er faßte und somit einen anderthalb Fuß langen schwärzlichten Gordius herauszog. Auch im europäischen Rußlande soll der Hautwurm zu Hause seyn. Wenigstens gedenkt *Gmelin* einer in der Ukraine unter dem Namen Wolosez bekannten Krankheit, welche das Eigne hat, daß man unter der Haut Haare findet, welche man mit Schilf auswindet und nichts anders als Hautwürmer seyn sollen.

Bey aller Glaubwürdigkeit, welche diese und ähnliche Beobachtungen verdienen, bleiben sie doch nicht von dem Verdachte einer Verwechslung des Hautwurms mit dem Fadenwurme frey, und die Meinung, daß ersterer Arabien, Persien, Ägypten, Äthiopien und vorzüglich Guinea eigenthümlich zugehöret, wohl mehr als wahrscheinlich. Nach *Löfflers* Versicherung trifft man ihn am häufigsten in der Gegend der englischen und holländischen Besitzungen in Afrika an. Von 220 Sklaven die zu *Cap Monte*, *Messerade* und *la Hou* gekauft wurden, hatte nur einer den Wurm in der grossen Fußzehe, von sechszig Sklaven hingegen, die man zu *St. George Delminna* kaufte, war der dritte Theil mit dem Wurm behaftet. Im Ganzen soll er mehr Knaben als Erwachsene, besonders aber solche Personen befallen, welche üble Säfte und schwammichte Körper haben. Übrigens sind nicht allein Neger, sondern auch Europäer, wenn sie eine Zeit lang in jenen Gegenden sich aufgehalten haben, den Verfolgungen dieses Wurms ausgesetzt. Dieses bestätigt nicht nur *van Döveren* durch die Erzählung seines aus Guinea gekommenen Freundes; sondern auch *Lachmund* und *Wepfer*, welcher versichert, daß der Wundarzt *Cromer*, der 1652 aus Ostindien und Guinea zurückgekommen war, noch zwey solche Würmer unter der Haut hatte, wovon sich der eine aussen am linken Schienbeine neben dem Knöchel, und der andere an der äusseren Seite des rechten Fusses unter dem Knöchel aufhielt. An beyden Stellen hatte der Wurm die Haut durchfressen und es hieng ein ungefehr zwey Zoll langes Stück, welches einer sehr dünnen Saite glich, heraus. Ein vier wöchentliches Lager bey dem heftigsten, alle nächtliche Ruhe raubenden und von einem unstillbaren Durst begleiteten Schmerz, welcher auf das Abreissen des aus Verdruss mit Gewalt angezogenen Wurmstückes erfolgte, machte ihn äusserst behutsam in der Behandlung der hervorstehenden Wurmenden. Nach Amerika, den Inseln St. Thomas, St. Croix und St. Jean und wahrscheinlich auch nach Pensilvanien, wo ihn *Morgen* mehrmal wahrgenommen haben soll, bringen ihn bloß die von den afrikanischen Küsten ankommenden Negersklaven, die eingebohrnen, kreolischen Neger aber sind davon gänzlich befreyet.

Was die Präservation betrifft; so ist es für alle Europäer, welche die afrikanischen Küsten betreten, eine Hauptregel, ihre Füße möglichst reinlich zu halten, nie barfuß zu gehen, nie ganz ungekleidet zu schlafen, und beständig lederne Strümpfe zu tragen. In der Kur haben sich innerliche Mittel nach neueren Versuchen ganz fruchtlos bewiesen. Der Sublimat sollte nach *Galandat*, vorzüglich in der *Swietnischen* Solution, den Wurm in zwanzig Tagen austreiben,

Löff-

Löffler aber hat davon gar keine Wirkung auf den Gordius selbst gesehen, sondern bemerkt, daß die Sklaven dabey allen Appetit verloren, mager und traurig wurden. Eben so unwirksam zeigten sich auch die Aloe und *Hillarys* Mittel, welches aus zwey Loth Schwefel, eben so viel Knoblauch, Pfeffer und Kampher besteht, die mit einem Viertelmaas Rum digerirt und wovon täglich Früh und Abends eine halbe Tasse genommen werden sollen. Alles kommt wohl auf die unmittelbare Entfernung des Wurms aus dem leidenden Theile durch das Auswinden und die Verhütung der Geschwulst und Entzündung an, welche dasselbe erschwert. Da sich der Wurm gewöhnlich gegen das Auswinden sträubt und hierdurch vorzüglich eine entzündliche Geschwulst veranlaßt; so suchte man denselben vorerst durch das Einreiben der Quecksilbersalbe und ähnlicher Mittel zu tödten. Alleine, die bisherigen Versuche haben gelehrt, daß er, so lange er sich unter der Haut befindet, auch durch kein äusseres Mittel zu tödten ist und daß er also allermeist lebendig ausgewunden werden muß. Doch hat *Löffler* das Einreiben der flüchtigen Salbe mit *Sydenhams Laudanum* zur Zertheilung der Geschwulst und zur Linderung des Schmerzes sehr wirksam gefunden. Das Auswinden selbst geschieht bey manchen Personen ganz leicht und bey nahe ohne alle Empfindung, bey andern aber hält es überaus schwer und ist mit den heftigsten Schmerzen und dem Ausfluß eines verdorbenen Eiters begleitet. Es beruht hierbey überaus viel auf der Empfindlichkeit des Subjekts, auf der Reizbarkeit einzelner Theile und auf der Länge des Wurms. Aus dem Hodensack und aus den Waden ist er gewöhnlich leicht und in kurzer Zeit, aus den Füßen hingegen oft kaum in zwanzig Tagen ausgezogen worden. Lezteres war auch der Fall bey sehr langen Gordien, da im Gegentheile kürzere dem Anzuge leichter folgten. Einige lassen, ehe sie die Auswindung unternehmen, das Geschwür, welches der Wurm, wahrscheinlich nach vollendetem Wachsthum, an der Stelle seines Kopfendes macht, von ihm selbst durchbohren, andere aber bedienen sich erweichender Pflaster, um die Geschwulst zur Reife zu bringen, noch andere verfahren nach *Löfflers* Vorschrift, welcher die Haut an einer bequemen Stelle über dem Gordius öffnet, quer unter demselben eine stumpfe Sonde durchschiebt, ihn aufhebt, in der Mitte durchschneidet, und nun jedes Ende besonders aufwindet. Dieses Aufwinden verrichtet er auf folgende Art: Er spaltet ein kleines hölzernes Stäbchen bis zur Hälfte, klemmt das Ende des Wurms in diese Spalte und windet nun so lange, bis er einen Widerstand bemerkt, der ein Zerreißen besorgen läßt. Höchst selten ist es möglich, wie gleichwohl *Bajon* versichert, auf einmal ein drey Zoll langes Stück

Stück aufzuwinden; sondern man ist oft schon nach einem Zoll genöthiget, das aufgewundene Stück nebst dem Stäbchen neben der Wunde mit Heftpflastern zu befestigen, damit es sich nicht zurückzieht. Über das Ganze wird alsdann noch Bleycerat und eine Binde applicirt. Alle folgende Tage wird das Auswinden Morgens und Abends wiederholt und das Geschwür jedesmal vom Eiter gereinigt. Schnelles und starkes Anziehen hat gemeiniglich das Abreißen des Wurms zur Folge, welcher sich hierauf sogleich und oft mehrere Zoll zurückzieht, so daß man alsdann genöthiget ist, ihn durch lange und tiefe Einschnitte aufzusuchen. Wird er tief abgerissen, so erfolgen heftige Schmerzen nach der ganzen Länge des Wurms, Entzündung und Eiterung, nicht selten böartige, fistulöse Geschwüre, ja der Brand und mit ihm der Verlust des Gliedes und nicht selten des Lebens. Ist aber der Wurm glücklich ausgewunden worden; so wird das Geschwür nach den gewöhnlichen Regeln leicht zur Heilung gebracht.

3. Der Höllenwurm.

Furia infernalis, corpore lineari, aequali, filiformi, utrinque ciliato, aculeorum reflexorum corpori appressorum serie simplici. Linn. S. N. T. I. P. VI. p. 3081. n. 1. Amoen. acad. Vol. III. p. 322. et Vol. V. p. 103. Faun. Suec. 2070. Habitat in Bothniae paludibus vastis cespitosis, unguis longitudine, carnea vel ochroleuca, apice saepius nigra, carices crebro fruticesque adscendens, ventoque per aërem ducta hominum equorumque partes nudas non perpendiculariter sitas per cutem intrans, sensationem primo acupuncturam mentientem, excitans, locoque, per quem introgressa est, punctum nigrum et vehementem pruritus, mox dolorem atrocem, maculam rubram, et gangraenam a puncto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriam, frequentibus animi deliquiis et deliciis stipatam, altero, aliquando primo die, imo paucas post horas morte terminatam, nisi cito citius, quae summa difficultas est, vermis extrahatur; aut si jam profundius penetraverit, caro, quam ferit, excindatur, oleumque, vt fertur, betulae empyreumaticum infundatur, vel lac coagulatum caseusve imponatur.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften, Leipz. 1757. Th. IX. S. 311. von den Wunden der Insekten — ist die Uebersetz. folgender Diss.

Avelini Dissert. de Miraculis Insect. Praes. Linn. Upsal. 1752.

Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 408. *Die höllische Furie*.

Beckmanns phys. ök. Bibl. B. V. St. 4. S. 556.

Cuvier Tableau élémentaire p. 631. *la Furie*.

Döverens, Abhandl. von den Würmern, S. 55.

Fränkische Sammlungen, B. II. S. 101 etc. Nach-

richten von der Krankh. unter dem Hornvieh, Pferden und Wilde im Januar 1756.

Gazette littér. de l'Europe 1764. Septemb. 138.

Glaser's Abhandl. von der tödtlichen Knotenkrankheit unter dem Rindvieh und dem Rothwildpret in den Wäldern, Leipz. 1780.

Müllers Anmerk. über die Furia, Naturf. St. XIX. S. 160.

Müllers Linn. N. S. Th. VI. B. 2. S. 915. *Der Tollwurm*.

Naab.

Naaldyk, Petr. in Lib. Philippicorum de equis, Lugd. Bat. 1531. p. 42.

Onomatol. Hist. nat. P. III. p. 1003. Der Brandwurm.

Pallas n. nord. Beytr. B. I. S. 113. von der tödtlichen Krankheit die Brandbeulen genannt, und B. IV. Desselben Reise durch versch. Provinzen des russisch. Reichs, Th. II. S. 308; Desselb. Diss. de Ins. viv. in Sandifort. Thes. Diss. Vol. I. p. 255.

Sauvages Nosolog. T. V. p. 205. *Malis furialis*. Snellman Beskrifning öfver Skattisukan; Stockh. 1759.

Solander, D. Furia infernalis, vermis et ab eo concitari solitus morbus, in Nov. Act. Upsal 1773. Vol. I. p. 44. Desselben Abhandl. von dem Mordwurm, übers. v. Göze im Naturf. St. XI. S. 183.

Unzers medic. Handb. Leipz. 1789. S. 654.

Vogels medicinische Biblioth. B. VII. S. 58.

Dem Geschlechte der Gordien oder Zwirnwürmer sehr nahe verwandt, ist gegenwärtiges, nur wenige Linien langes, überaus zartes allenthalben gleich schmales, haardünnes Würmchen, welches weder Einschnitte, noch Ringe hat, dessen Farbe weißgelblich und fleischfarbig und dessen eines Ende schwarz ist. Nur weicht es von demselben durch die einfache Reihe, ungemein zarter, rückwärts stehender und an den Körper angedrückter Stacheln oder Wiederhaken ab, womit es auf jeder Seite besetzt ist. *Linné*, der dasselbe nur aus einem ihm vom Pastor Ervast in Kimi zugesickten, getrockneten, und dadurch ganz unkenntlich gewordenen Exemplare kennen lernte, sah sich ausser Stand gesetzt, Geschlechts- und Gattungs-Merkmale näher zu bestimmen, so daß wir uns gegenwärtig noch mit *Solanders* unvollständigen Beschreibung begnügen müssen. Sein Vaterland sind Ost- und Westbothnien, Tornelappmark, Kimilappmark und andere am bothnischen Meerbusen gelegene Gegenden. Es fällt daselbst aus der Luft auf alle entblößte Theile des menschlichen Körpers, den Hals, die Arme, die Hände etc., wenn sie sich nicht gerade in einer senkrechten, sondern in einer horizontalen Lage befinden, dringt auch in die Haut der Zug- und Lastthiere ein, und wurde schon vom *Linné*, noch mehr aber vom *Solander* für die Ursache einer Menschen und Thiere in jenen Gegenden häufig befallenden Krankheit gehalten. Diese Krankheit wird daselbst Skatt, Wurf oder Schuß genannt, wahrscheinlich von der Geschwindigkeit, mit welcher sie in der Nähe der ungeheuren Moräste des unbebauten Bothniens die Reisenden oder sich im Freyen aufhaltenden Einwohner und Thiere befällt, wovon letztere plötzlich toll werden, niederfallen und sterben, erstere aber auf einmal einen Stich, wie von einer Nadel fühlen und an der Stelle desselben einen schwarzen, ein heftiges Jucken veranlassenden Punkt entdecken. Dieses Jucken verwandelt sich bald in den unerträglichsten, mit dem wachsenden Übel zunehmenden, stechenden und reissenden Schmerz, und jener Punkt in einen rothen Flecken, der in kurzer Zeit in den Brand übergeht. Ohnmachten und Raserey wechseln mit einander ab, und oft schon nach wenig Stunden,

den, gewöhnlich aber nach einem oder zwey Tagen, endigt sich das Fieber mit dem Tode. Nur wenige überstehen dasselbe, behalten aber alsdann zeitlebens an der verletzten Stelle ein häßliches, bösartiges Geschwür. *Solander* ist in Westbothnien seinem Vaterlande und in dem benachbarten Lapplande, von einigen solchen Fällen, wovon die meisten im Frühling und Sommer, und wenige nur im Winter vorkommen, selbst Augenzeuge gewesen, andere aber erzehlt er nach glaubwürdigen Berichten. Nach diesen soll der wie ein Pferdhaar aus der Wunde hervorstechende Wurm von selbst seinen Ausgang suchen und nie zurückbleiben, sobald der Kranke stirbt. Das Auffallende dieser Erscheinung hat die Bewohner Bothniens verleitet, die Ursache jenes Übels in etwas Übernatürlichen und in einer verborgenen Zauberkraft der Lappen zu suchen, welche nach ihrer Meinung im Stande sind, die Tyren, worunter sie die von den verschluckten Haaren in dem Magen und Darmkanal des Viehes entstehenden Haarbälle verstehen, durch die Luft zu schleudern. Hiervon sollen sich nun im Fluge einzelne Haare absondern und in die Haut derjenigen Menschen, ihrer Pferde und Ochsen dringen, welchen die Lappen gefährlich zu werden suchen. Bisweilen glückt es jedoch den kleinen Wurm oder das vermeinte Hexengeschloß durch aufgelegten frischen Käse oder geronnene Milch herauszulocken, durch eine feine Zange oder mit den Zähnen, wiewohl mit unerträglichem Schmerz, herauszuziehen, oder auszuschneiden, oder durch das Brennen in der Haut zu zerstören und somit den Kranken zu retten. Doch muß dieses augenblicklich geschehen, da jede Verzögerung die Lebensgefahr vermehrt. Auch darf nicht das geringste vom Wurme zurückbleiben, weil dieses ausserdem Ursache der fortdauernden Krankheit wird. Alte Weiber, welche sich dieser Kur in jenen Gegenden unter allerley abergläubischen Possen unterziehen, pflegen die Wunde nach der Operation mit Birkenteer zu verbinden.

Alle diese Umstände und Erzählungen wurden bald von verschiedenen berühmten Naturforschern für abentheuerlich und die Existenz eines, ohne Flügel sogar im Winter fliegenden Wurms, für chimärisch gehalten und *Solander* schreibt selbst „hätte ich nun die Krankheit nicht mit meinen Augen gesehen und den Wurm in meinen Händen gehabt, so würde ich das Übrige, was man davon erzehlte, schwerlich geglaubt haben. Allein die Natur ist so mannigfaltig und ihre Grenzen sind so unerreichbar für unsere Sinnen, daß wir, wo sie uns etwas ungewöhnliches zeigt, besser thun, wenn wir ihren Fußstapfen sorgfältig folgen, als wenn wir solche sogleich aus Eigensinn verlassen. Ich habe zwar, welches man

jenen Erzählungen am meisten zum Vorwurf machte, in den Schriften der neuern Ärzte nichts davon gefunden. Dieses dient aber blos zum Beweis, daß die von Mitternacht abgelegenen Provinzen davon nichts wissen.“ Es wäre freylich lächerlich, wenn man annemen wollte, daß sich der ungeflügelte Wurm aus eigenen Kräften hoch in die Luft erheben könnte. Seine Bewegung ist vielmehr leidend und hängt vom Winde ab, der ihm aus dem Rietgras und Gesträuche jener Moräste in die Luft führt, und bey der ausserordentlichen Zartheit und durch die, das Schweben des Würmchens, wie den Flug mancher Samenarten begünstigenden Häkchen, leicht in derselben erhält, bis die nachlassende Bewegung der Luft ihm verstattet, sich niederzulassen und auf die ihm zufällig aufstossenden Menschen und Thiere abzusetzen. Wurden ja Spinnen, die Larven der *Cantharis fusca*, kleine Käfer, Staphylinen und Grasraupen durch Sturmwinde in der Luft mit fortgeführt, und gaben die Erscheinungen des Insektenregens (S. *Hist. de l'Acad. des Sciences. Amst.* 1750 p. 39. und *Eph. N. C.* 1673 u. 74 p. 80.), warum sollten nicht noch leichter so zarte Würmchen hierzu geschickt seyn, deren rückwärts stehende Stacheln übrigens sehr wohl als Widerhaken, die Heftigkeit der Schmerzen und die Schwierigkeit, den Wurm wieder aus der Haut zu bringen, erklären lassen?

Noch mehr gewinnt die Wahrscheinlichkeit der Existenz des Höllenwurms, und noch mehr verliert im Gegentheile das Wunderbare der schwedischen Luftseuche, wenn man ähnliche, auch in anderen Ländern vorgekommene Seuchen damit in Vergleichung stellt. In verschiedenen feuchten Gegenden des russischen Reichs kennt man z. B. eine, vorzüglich bey grosser Dürre im Sommer vorkommende Krankheit, welche auf eine ähnliche Ursache zurückführet. Der ältere *Gmelin* war der erste Beobachter derselben in Sibirien und hat sich im vierten Theile seiner Reise sowohl über die Zufälle, als die Kur derselben verbreitet; nach ihm aber hat *Pallas*, dessen interessante Nachrichten hier in einem gedrängten Auszuge folgen, auch in anderen Gegenden des russischen Reichs dergleichen Seuchen zu beobachten Gelegenheit gehabt. „Die offenen Ebenen vom uralischen Gebürge an, längs dem Uifluß oder der sogenannten uischen Linie, die ganze ischische und barabynische Steppe, so weit selbige längs dem Irtysh hinauf unter Rußland gehören, und selbst die zwischen dem Jaik und Irtysh gelegene Steppe der mittlern Kirgisenhorde, sind das weitläufige Feld, in welchem der Zunder dieser Krankheit alle Sommer ausgebrütet wird, und mehr oder minder häufig an Menschen und Vieh sich äussert. Niedrige, feuchte, etwas salzhafte Gegenden dieser ungeheuren Ebene, die in der trocknen Jahrszeit austrocknen, ähnliche Nie-
dri-

dringungen längs den Flüssen und die Nachbarschaft bracker Seen, von deren Ufern sich das Wasser in der Dürre zurückzieht, sind die gefährlichen Gegenden, wo man die Krankheit am leichtesten fängt, und wo die Pferde und andere glatthaarige Thiere im Sommer nie sicher auf der Weide gehen können. Im nördlichen und östlichen Sibirien, desgleichen im Gebürge, weiß man von dieser Seuche nichts. Die Seuche, welche man dort mit dem schlimmen Namen Morowaja Jasma oder Pest belegt, äussert sich am meisten in den heissen Sommermonaten, wenn schwüle südliche Winde regieren; sobald kaltes Wetter und Winde einfallen, spürt man keine neuen Anfälle derselben mehr. Erfolgt diese Veränderung nicht, so läst sich das Übel oft bis in den Herbst an Pferden und Menschen spüren. Nimmt man noch dazu, daß Menschen niemals in Städten und Festungen, besonders wenn sie wenig aus den Häusern kommen; sondern nur auf Reisen und auf Weiden, mit der Brandbeule heimgesucht werden, daß selbige hauptsächlich die mit Kleidung gar nicht oder nur dünn bedeckten Theile des Körpers angreift u. s. w. so wird man, wenn die Zufälle selbst daneben erwogen werden, natürlich auf den Schluß gebracht, daß etwas beynahe unsichtbares von aussen in den Körper eindringe, und durch seine giftige Eigenschaft die Brandbeule erwecke. Muthmaßlich muß dieses etwas Lebendiges seyn, welches von der Luft auf den trocknen Sümpfen fortgeführt wird, sich an lebendige Körper ansetzt und in selbige einzudringen vermag. Was es aber sey, ist noch durch keine sichere Wahrnehmung bestimmt.“

„Die Zufälle selbst sind, wie man sie sonderlich an den mit dem Übel befallenen Menschen vom Beginnen an zu bemerken pflegt, hauptsächlich folgende: Ganz gesunde Menschen, von allerley Alter und Geschlecht, empfinden, wenn sie über Feld gewesen sind, ganz unvermuthet ein Jucken, welches eine kleine harte Geschwulst begleitet, die man anfänglich für die Folge eines unbemerkten Mücken- oder Bremsenstichs zu halten geneigt ist. Sie nimmt aber sehr geschwind an Grösse und Härte zu, und ehe man darauf achtet, pflegt es gemeiniglich schon soweit damit gekommen zu seyn, daß man an der geschwellenen und verhärteten Stelle mit einer Nadel in die Haut stechen kann, ohne daß der Kranke eher Schmerzen fühlt, bis man ins gesunde Fleisch kommt. Man sieht alsdann gemeiniglich im Mittelpunkte der Verhärtung äusserlich einen rothen oder blaulichen Punkt, einem Insektenstich ähnlich, bey welchem auch, wenn nicht Mittel gebraucht werden, Brand oder Gangränе anfängt, und von da um sich greift. Auf der ersten Stufe des Übels spürt der Leidende keine innerlichen Be-

schwer-

schwerden, allein mit zunehmender und brandig werdender Geschwulst, die doch immer ohne heftige Schmerzen bleibt, soll sich auch Kopfweh, Beängstigung und innerliche Unruhe einstellen.“

„Das Vieh geht bey dieser Krankheit gemeinlich verloren, theils weil man die Geschwulst zu spät gewahr wird, theils weil das nachlässige gemeine Volk sich nicht gerne um die Genesung bemüht. Hingegen gelingt bey Menschen die Heilung fast unfehlbar, wenn zeitige Hülfe gesucht wird. Die unter dem gemeinen Volk übliche Kur, da nemlich die harte und fast noch knorplichte Geschwulst mit einer langen Nadel in verschiedenen Richtungen durchstochen und mit einer Mischung von Salmiak und Taback eingerieben, dem Kranken aber alles kalte Getränk und gewisse Speisen untersagt werden, ist schon in des älteren *Gmelins* Reisen angeführt. Man hat aber diese Kur jezt noch einfacher gemacht und verschiedene andere Mittel wirksam gefunden. In Irtytsch bedient man sich jezt oft einer starken Lauge von Wermuthasche, auch wohl eines Tabackdekokts mit Salmiak oder Alaun, ohne Skarifikation vorhergehen zu lassen. An der uischen Linie will man unfehlbare Hülfe von einem warmen Unschlag aus gepülverten rankenden Nachtschatten, Salmiak, Hefen und Habermehl erfahren haben. Diese durch langen Gebrauch bewährten Mittel sind alle von der Art, daß sie Ungeziefer tödten, und begünstigen die obige Muthmassung von der Grundursache dieser Krankheit.“

„In den weiten Niedrigungen an der Wolga, von Saratof abwärts bis Astrachan wird das Vieh, hauptsächlich die Pferde, wenn sie zu früh nach Ablauf des hohen Wassers dahin zur Weide getrieben werden, gar nicht selten durch harte brandige Beulen getödtet, die an der Brust oder dem Bauch auffahren, und ohne Zweifel mit der beschriebenen sibirischen Seuche von einerley Art sind. Die Kalmücken nennen diesen Zufall Mohmo, verwechseln aber, wie es scheint mit diesem Namen auch andere Viehseuchen und böse Beulen. Indessen ist gewiß, daß an der Wolga auch bey Menschen die eigentliche, hier beschriebene Art von Brandbeulen bemerkt worden ist. Der Zufall ist im trocknen Sommer und Herbst am gewöhnlichsten. Die Männer, welche mehr in der freyen Luft sind, werden öfter als die in und bey ihren rauchenden Hütten lebenden Weiber befallen. Die Soongaren unter den wolgischen Kalmücken, welche diesen Zufall auch in ihrem vorigen Vaterlande am altaischen Gebürge kennen gelernt haben, rathen dawider auf der Beule ein Stückchen von einer chinesischen Raucherkerze, die sich wie Luntten verzehrt, brennen zu lassen, und dann mit einer kupfernen oder
eiser-

eisernen Nadel in den schwarzen Punkt, welcher sich in der Mitte zeigt, bis auf das empfindliche Fleisch durchzustechen. Es muß aber vor Verfliessung des zweyten Tags Hülfe geschehen, sonst ist dieses Mittel ohne Wirkung. Nach einigen mir neuerlich mitgetheilten Bemerkungen, soll das Purgiren den mit diesen Brandbeulen Befallenen schädlich seyn. Hingegen werden stärkende, geistige Mittel dienlich befunden, wenn sie angewandt werden ehe die Schlafsucht dazu kommt, die in dortigen Gegenden selten ausbleibt und zuweilen zwey bis drey Tage dauern soll. Die Kalmücken sind, wie ich höre, auch geneigt, die Mohmobeulen einem giftigen Stich oder Unflath eines Ungeziefers, und also einer äusserlichen Ursache zuzuschreiben.“ — Soviel von der russischen Luftseuche.

Nicht ohne Grund nam *Linné* auch die Existenz eines holländischen Mordwurms und einer daher entstandenen Luftseuche an. Er berief sich in dieser Hinsicht auf *Peter Naaldycks* Nachrichten, der ungefähr um das Jahr 1631 schrieb und eines Wurms gedenkt, welchen die Holländer damals *de Viver* oder *Cyclus* (den Zirkelwurm) nannten und dessen Stich so gefährlich war, daß der Tod oft schon nach einer Stunde erfolgte, weswegen man diesen Wurm auch noch mit dem besonderen Namen *de Moord* belegte. Nur das auf der Stelle vorgenommene Ausschneiden oder Ausbrennen der verletzten Stelle konnte den Verletzten retten. Der Grund, warum dieses Übel in den neueren Zeiten nicht mehr in Holland beobachtet worden ist, scheint wohl in der Austrocknung der Moräste durch die vielen neuerlich gezogenen Kanäle zu liegen, wodurch sich jener Wurm selbst verloren haben mag.

Wenn man ferner *Glaser's* Abhandlung von der Knotenkrankheit und die in den fränkischen Sammlungen enthaltenen Nachrichten vergleicht; so ergiebt sich die höchste Wahrscheinlichkeit, daß der schwedische, dem Höllenwurme zugeschriebene *Skatt*, die sibirische *Morowaja Jasma*, und die kalmückische *Mohmo*, auch in Teutschland zu Hause und *Beckmann's* Äusserung gegründet sey; der bey Gelegenheit des Höllenwurms schreibt: „vielleicht ist dieses Ungeziefer sogar noch jetzt in einigen Gegenden von Teutschland, welche Vermuthung ich glaube wahrscheinlich machen zu können.“ Wenigstens scheint unser Fränkischer *Flugbrand* ziemlich einerley Krankheit mit jenen auswärtigen Luftseuchen zu seyn, nur daß in unseren Gegenden die Menschen gewöhnlich davon verschont bleiben. Denn in den Fränkischen Sammlungen (Stück 8. S. 115.) findet sich nur eine einzige dahin deutende Geschichte, wo ein Bauer zu Moritzreuth bey Gefrees im Junius um Mittag auf dem Felde unversehends eine schmerzliche Empfindung auf der
rech-

rechten Achsel verspürte, worauf starke Schmerzen, eine schwärzlich rothe, grosse, harte Beule, Fieber, *Delirium* u. s. w. erfolgte, wo aber, nach der Äusserung des kranken Bauers, ein grösseres Thier, als *Solanders* Furie, im Spiele war. Wenn aber die Ursache von jenen Krankheiten in Schweden, Rußland und Holland, welche gemeiniglich Luftseuchen genannt werden, noch nicht weiter aufgeklärt ist, als daß sie von *Linne* und *Solander* der Furie zugeschrieben wird; so sind wir in Teutschland und in unserem Franken doch vor der Hand berechtigt, auf die Ehre, eine *Furia infernalis*, sey sie was sie wolle, zu haben, ebenfalls Anspruch zu machen. Ich benutze hier zum Belege, die sich hierauf beziehenden, mir von meinem unvergesslichen Gönner und Freund, den viel zu früh uns entrissenen Geheimen Hofrath *Schöpff* mitgetheilten Aktenstücke.

„Die ersten Nachrichten vom Flugbrande in unserem Vaterlande, sind vom Jahre 1756, wo er sich gegen Ende des Junius und Anfang des Julius unter dem Hornvieh, Schweinen, Wild und zum Theil unter den Pferden äusserte. Das Vieh erkrankte unversehens auf der Weide. Man sah Beulen an den Füßen, in den Weichen, am Halse oder auf der Brust in der grössten Geschwindigkeit auflaufen und das Vieh nach vier und zwanzig bis sechs und dreysig Stunden sterben. Bey andern, wo sich solche Beulen am Kopfe fanden, folgte der Tod schon nach sechs bis acht Stunden. Der allgemeine Verdacht der Entstehung gieng auf Stiche von Insekten, besonders der grossen Holzwespe. Ähnliche Ereignisse ergaben sich im Junius 1778, neuerlich aber in den Jahren 1796 und 1797. In vorlezterem Jahre wurde das Rindvieh in dem der Stadt Ansbach zunächst liegenden Eichstädtischen Oberamte Ahrberg und Wahrberg von dem Flugbrande ergriffen, wovon H. Physikus *Mayer* zu Herrieden folgende Nachrichten in seinem darüber nach Eichstädt erstatteten Gutachten ertheilte. „Der Sitz der gemeiniglich in der heissen Zeit, nie im Winter und Frühling herrschenden und selbst im höchsten Sommer, wenn Regen, Kälte und Nässe lang anhalten, wieder verschwindenden Krankheit, fiel bey dem ersten Anblick durch die sich bald an den Vorder- bald an den Hinterfüßen, bald am Halse, bald auf dem Rücken zeigende starke Geschwulst, deutlich in die Augen. Diese Geschwulst gab ein knisterndes Geräusch von sich, wenn man mit dem Finger darauf drückte, die feurigen Augen thränten, der Athem war kurz und ächzend, die Kräfte so schwach, daß das Thier den Kopf nicht mehr halten konnte. Die Haut sah bey dem Abziehen violet, der ganze geschwollene Theil schwarz aus und rauschte bey dem Durchschneiden, die Beinhaut trennte sich von den Knochen, das Fett war gelb und das Zellgewebe von Luft aufgetrieben. Bey

Eröff-

Eröffnung des Unterleibes war nicht nur das Netz, sondern alle Eingeweide brandig.“

„Die Ursache dieser Krankheit ist noch sehr verborgen. Sie hat einen äusserst schnellen Gang, fängt gemeiniglich mit einer Geschwulst und mit Hinken auf einem der Vorder- oder Hinterfüsse an, steigt gewöhnlich aufwärts, zerstört schnell den ergriffenen Theil bis auf den Knochen, und verbreitet sich von da, wie ein Flugfeuer über den übrigen Körper, daher man ihr auch den Namen Flugbrand beygelegt hat.“

„Ist man ja so glücklich gleich in den ersten Stunden den Flugbrand wahrzunehmen, so hat sich erst ein einziges Mittel ausgezeichnet, wodurch hie und da schon mehrere Stücke sind gerettet worden, nemlich folgendes: Man schneide die Geschwulst sogleich aus und zerstöre sie gänzlich mit einem glühenden Eisen und unterhalte alsdann in der Wunde eine starke Eiterung. Voriges Jahr hatte ich in Stadeln die nemliche Seuche zu behandeln, ohne zu diesem Mittel meine Zuflucht zu nemen, nöthig zu haben. Die Gemeinde liefs auf mein Zureden ihr Vieh zu Hause und von demselben Tag an fiel nicht ein Stück mehr.“

„Es ist wahrscheinlich, daß die Ursache dieser Krankheit nicht im thierischen Körper zu suchen sey, sondern von aussen durch den Biß oder Stich eines unbekannten Insekts demselben beygebracht werde. Denn der Flugbrand befällt meistens ganz gesunde Thiere und kann nur in den ersten Stunden seiner Entstehung ganz allein durch äusserliche Mittel, nemlich das Ausschneiden und Brennen geheilt werden. So wie das Gift durch das Messer oder Feuer ausgerottet ist, hört seine zerstörende Wirkung auf und die Thiere genesen, welches nicht möglich wäre, wenn das Gift von einer inneren Ursache entstünde und im ganzen Körper verbreitet wäre; denn ohne das Messer und glühende Eisen ist noch keines gerettet worden. Bedenkt man ferner, daß der Flugbrand jederzeit aufwärts steigt und den Lauf der Blutadern folgt, daß er nicht ansteckend ist, indem aus einem Stall oft nur ein oder das andere Stück Vieh umkommt, daß er nicht wie jede Seuche gemeiniglich nur eine Gattung Vieh, sondern auch andere zahme und wilde Thiere zu gleicher Zeit befällt; so wird man noch mehr überzeugt, daß ihn eine äusserliche Ursache, der Stich irgend eines Insekts oder Wurms hervorbringen müsse.“

D r i t t e r A b s c h n i t t .

*Würmer, welche sich zufällig in den inneren Theilen des menschlichen Körpers
eingefunden haben.*

So lange wir den Erzählungen einer Menge erfahrner, Wahrheit liebender und einsichtsvoller Ärzte nicht allen Glauben absprechen können, sind wir genöthiget anzunehmen, daß die Eyer verschiedener Wurmart, welche nicht in den menschlichen Körper gehören und einzig ausserhalb demselben zu leben gewohnt sind, mit gewissen Speisen und Getränken in den Magen und Darmkanal gelangen, der Kraft der verdauenden Säfte und Organe bisweilen widerstehen, in die Säfte übergehen, mit diesen circuliren, aus diesen hin und wieder in verschiedenen Theilen unsers Körpers abgesetzt und daselbst ausgebrütet werden können. Freylich setzt dieses wohl immer eine gewisse Atonie des Nahrungskanals und selbst des Gefäßsystems, eine gewisse Wässerichkeit und Unschmackhaftigkeit der verdauenden Säfte voraus, weil ausserdem die Beyspiele von solchen ungewöhnlichen, aus dem menschlichen Körper abgegangenen oder in demselben gefundenen Gästen ungleich häufiger vorkommen müßten. Dennoch würde ich auch schon durch die Aufzählung aller bereits hin und wieder bey den Schriftstellern vorzufindenden Beobachtungen dieser Art, eine, manchem Leser vielleicht lange Weile veranlassende Mühe unternehmen und ich begnüge mich daher blos einige der vorzüglicheren Fälle hier anzuführen.

Würmer im Auge.

Bonneti Sepulchr. s. Anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis, Genevae 1679. L. I. Sect. XVIII. Obs. VI. p. 331.

Mongin in Roux Journ. de Med. et Chir. Vol. XXXII. p. 338. von einem aus der Tunica conjunctiva des Auges genommenen Wurme.

Transactions of the american philosophical Society, Vol. II. Philadelphia 1786. 4. n. XVIII. p. 183. Account of a Worm in a Horse's Eye etc. By Hopkinson et nr. XLIII. p. 383. of a living Snake in a living Horse's Eye and of other unusual Productions of Animals. By John Morgan.

Nach Bonnet sind Würmer in der gläsernen Feuchtigkeit des Auges entdeckt worden, und Mongin fand bey einer Frau, die sich über einen stechenden Schmerz im Auge beklagte, einen Wurm unter der Vereinigungshaut (*Tunica conjunctiva*) des Auges.

Bey dieser Gelegenheit scheinen mir zwey ähnliche Fälle aus den Transactionen der Amerikanischen philosophischen Societät, wo Würmer in den Augen leben-

bender Pferde gesehen worden sind, der Erwähnung nicht unwürdig zu seyn, da sie zur Bestätigung der Monginschen Erfahrung beytragen können. *Hopkinson* erzehlt nemlich, daß ein Wurm von dritthalb bis drey Zoll Länge, weisser Farbe, dürrer Körper und leichter Bewegung, als er sich der Iris näherte, deutlich und unlängbar im Auge zu sehen war. Da sich das Pferd übrigens wohl befand, so entgieng dessen fernere Beobachtung dem Erzähler. Nach *Morgens* Versicherung aber ist ein Wurm von der Dicke einer Stricknadel und, wegen seiner lebhaften Bewegung, nicht zu bestimmender Länge, deutlich und von vielen Menschen, im linken Auge eines lebenden und sonst gesunden Pferdes gesehen worden.

Würmer im Gaumen und in der Zunge.

Abhandl. d. k. Ak. d. N. F. Th. VIII. S. 174.

De la Croix Memoirs for the ingenious, July 1693.

Thomas Dent in den philos. Transact. Vol. XVIII. n. 213. p. 219.

Lezterer Autor erzehlt, daß eine berühmte Wurmdoktorin *French* in *Leicester* in die kleinen Geschwülste, die er auf seiner Zunge hatte, mit einer Lanzette stach und bald darauf fünf bis sechs lebendige Würmer herauszog, und versichert, daß sie ungefehr in acht Tagen aus seiner Zunge mehr als hundert und aus seinem Gaumen über dreysig Würmer mit merklicher Besserung genommen habe. Aus allen Theilen des Landes kamen Leute vom Stande zu dieser Frau *French*. Die Wahrheit der Sache wird in derselben Numer p. 222 von Herrn *Lewis* bestätigt.

Einer ähnlichen berühmten Wurmärztin *Sarah Hastings* gedenkt *de la Croix*. Sie hatte eine ausserordentliche Fertigkeit in der Entdeckung der Würmer im Gesichte, Gaumen und in der Zunge und verband hiermit eine gleichgrosse Fertigkeit der Hand, so daß sie die Würmer blos mit einer Gänsefeder aus den leidenden Theilen nam.

In den Abhandlungen der kaiserl. Akad. der Naturforscher kommt auch ein Beyspiel von Würmern vor, die aus einer unter der Zunge geöffneten Ader hervorkamen. Einem funfzigjährigen Manne fieng nemlich nach mehreren Fieberanfällen die Zunge an plötzlich zu schwellen und schwarz zu werden. Es wurde eine Ader unter der Zunge geöffnet, worauf ein kleiner lebendiger Wurm und nach dem Ausfluß einiger Blutropfen noch ein anderer grösserer zum Vorschein kam. Das Fieber ließ hierauf sogleich nach und der Kranke gelangte allmählich wieder zu seiner vorigen Gesundheit.

Würmer im Herzen.

Baglivi Opera omni. Lúgd. 1710. p. 699.
Bonneti Sepulcr. Anat. Lib. I. Sect. XVIII. Obs.
VI. p. 331.

Polisius, G. S. von Würmern, die man in den
Herzkammern angetroffen hat, in den Abh. d. k. Ak.
d. Nf. B. IX. S. 37.

Baglivi versichert, daß in der Höhle des Herzbeutels ein spannenlanger, haarichter Wurm vorgekommen sey. Nach *Bonnet* sind sogar Würmer in den Herzhöhlen selbst gefunden worden und nach *Polisius* kamen bey der Leichenöffnung eines im Duel tödtlich verwundeten Cavaliers, als man die Herzkammern durchschnitt, mit einer Menge schwarzen geronnenen Bluts, zwey weißse, einen halben Zoll lange Würmer zum Vorschein, welche aber beyde todt waren.

Würmer in der Leber.

Morgen in den Transact. of. the americ. phil. Soc. Vol. II. n. 43.

erwehnt gelegentlich, daß ein gegliederter Wurm (*a jointed Worm*) von etwa zwanzig Zoll Länge und bey nahe drey Zoll Circumferenz aus der Leber einer *Mm. Holt* in Philadelphia gekommen sey, welchen er nachher noch in Hunters Sammlung gesehen habe, und eines ähnlichen Wurms, welcher im zweyten Band *of Edinburgh Medical Essays* abgebildet ist.

Blutigel im Magen.

Bondelotius de Hirudine deglutita; in Blegny
Zodiaco gallico ann. II. obs. 9. p. 147.

Borellus, P. Haemoptois ab hirudine inscie deglutita; in ejus Hist. et obs. med. Francof. 1670.
Cent. I. p. 33.

Fabricius de animal. Wetteraviae, Helmst. 1749
p. 54.

Gmelins Gesch. d. Gifte, Th. I. S. 306.

Hofmanni, F. Diss. de animal. hum. corp. infest. Hospit. p. 47. §. VI.

Langius Opp. Lips. 1704. c. Rivin. praef. edit.
P. II. C. XIII. p. 70. not. sub Litt. p.

Observat. sur de Vomissements de sang, produit par
une sangsue; Gaz. lit. de Berlin 1767.

Pallas, Diss. de inf. viv. p. 5.

Passerat in Vandermonde Journ. de med. 1758.
Febr.

Rhodus, J. de Cardialgia ab Hirudinum morsu,
in ejus observ. med. Francof. 1676. Cent. II. p. 89.

Riverius, L. de vomitu sanguinis ab hausta in
potu hirudine; in ejus obs. med. Cent. IV. obs. 26.
et in operib. p. 541.

Sauvages Nosol. meth. Edit. Daniel. T. IV. p.
480. n. 5. Haematemesi ab hirudine.

Unzers medic. Handb. S. 655. §. 70.

Zwinger, Th. de Cardialgia hirudinosa; Misc.
Nat. Cur. Cent. 7. obs. 25.

Blutigel können sehr leicht in den Magen gelangen, da einige Arten derselben ihre Eyer an verschiedene Wasserpflanzen abzusetzen pflegen und die Jungen der Lebendig gebährenden so überaus klein sind, daß man sie mit dem Wasser

un-

unbemerkt verschlucken kann. *Hoffmann* schreibt „auch mit dem gewöhnlichen Salat können wir Blutigelbrut verschlucken, welche als die durchsichtigste Gallert unten an den Blättern der Brunnenkresse (*Nasturt. aq.*) zu hängen pflegt. Wenn nun Jemand begierig dergleichen Salat isst und ihn nicht wohl kaut; so wird jene Brut wohlbehalten in den Magen und Darmkanal gelangen, durch die feuchte Wärme ausgebrütet werden und der groß gewordene Blutigel Blut zu saugen anfangen.“ Selbst ausgewachsene Blutigel sind, vermöge ihres schlüpferichen Körpers geschickt, schnell mit im Schlunde hinabzufahren, wenn Jemand so unvorsichtig ist, aus einem Wasser geschwind und vielleicht gar bey Nacht zu trinken, in welchem sich Blutigel aufzuhalten pflegen. Durch ihr Saugen im Magen erregen sie dann das heftigste Blutbrechen, Entzündung, Cardialgien und Koliken, Schluchzen, Convulsionen und haben nach *Langius* und anderen wohl gar den Tod zur Folge. *Borellus* erzehlt einen zwar nicht tödtlich abgelaufenen, aber doch merkwürdigen Fall dieser Art. Einem in der Gegend von Montpellier practicirendem Arzte wurde die Heilung eines Kranken übertragen, der schon geraume Zeit Blutspeyen und dabey weder Brustschmerz, noch andere diese Krankheit begleitende Zufälle, ausser der unangenehmen Empfindung hatte, als ob ein Stückchen Fleisch ihm an der Kehle hängen geblieben sey. Alle Mittel das Blutspeyen zu heben waren fruchtlos und nur ein Zufall befreyte den Kranken von dieser Beschwerde. Er bestieg nemlich ein sehr wildes Pferd, um eine Reise zu unternehmen. Hierüber wurde er von einem Husten befallen, der so erschütternd war, daß er einen Blutigel auswarf, worauf das Blutspeyen sogleich völlig aufhörte. Ähnlich ist der Fall, welchen *Passerat* erzehlt, wo ebenfalls ein Blutspeyen von einem an dem Gaumen hängenden Blutigel veranlaßt wurde. *Sauvages* stellt das von Blutigeln veranlaßte Blutbrechen sogar als eine eigne Spezies auf und *Fabricius* führt wirklich einen Fall an, wo ein verschluckter Blutigel, Blutbrechen, Cardialgie und den Tod zur Folge hatte.

Wäre Jemand überzeugt, daß er Blutigel verschluckt hätte, so würde er den größten Theil der durch sie veranlaßten Beschwerden, durch nichts sicherer entfernen können, als wenn er gleich starken Brandwein oder Liqueur tränke, welcher sie augenblicklich tödtet. Ein Brechmittel, wenn noch kein Blutbrechen vorhanden ist, ausserdem aber ein abführendes Mittel, würde sie dann vollends aus dem Körper entfernen. *Sauvages* empfiehlt Meersalz und dann zum Blutstillen adstringirende Mittel.

Fadenwürmer im Magen.

Berlinische Sammlungen B. VIII. S. 30.

Gesneri Hist. aquatil. p. 547.

Hanows Seltenheiten der Nat. Th. I. S. 589.

Linnaei Iter Gothland, p. 282.

Müllers, O. F. Naturgesch. einiger Wurmarten,

S. 112.

Die den Augen wegen ihrer Kleinheit oft entgehenden Eyer der Fadenwürmer schwimmen vorzüglich in solchen Wassern herum, welche einen thonartigen Boden haben, kommen mit diesem Wasser in den Magen und werden nicht selten daselbst ausgebrütet. Schwedische Provinzialärzte melden sogar, daß der Wurm selbst in ihrem Vaterlande oft mit dem Wasser getrunken werde und viele Menschen unter Zuckungen tödte. Nach der Eigenschaft, welche er besitzt, die Haut unsrer Oberfläche mit einer unglaublichen Geschwindigkeit zu durchbohren, wird er allerdings auch fähig seyn, die Eingeweide zu durchlöchern und hierdurch allerley befremdende Zufälle hervorzubringen. Linné war der Meinung, daß vielleicht die *Cardialgia sputatoria*, ein Magenkrampf, welcher die Lappländer befällt, wenn sie eine Zeit lang Quellwasser trinken, davon herrühren möchte. Hanow hält diese Würmer sogar für giftig und für die Ursache der Schwindsucht, so bald sie verschluckt würden. Es ist daher in Gegenden, wo sie zu Hause sind, nie rathsam, das Wasser unabgesotten zu trinken. Doch wird sie der Weingeist ebenfalls tödten.

Schnecken im Magen und Darmkanale.

Duncan Medical Commentaries Vol. II. S. Richt.
chir. Bibl. B. X. S. 544.

Heer (Henricus ab) Observat. XIII.

Ledel, S. von Schnecken, welche durch ein Er-

brechen ausgeworfen worden, in den Abh. d. k. A. d.
Nf. Th. III. S. 129.

Paullini, C. F. Schnecken gehen durch den
Stuhlgang ab, in den Abh. d. k. A. Th. XV. S. 472.

Duncan erzählt „eine Frau, welche lange Zeit mancherley Magenbeschwerden gehabt hatte, leerte einst nach einem genommenen Purgirmittel von Quecksilber, durch den Stuhlgang ein Thier aus, das vollkommen einer Schnecke ohne Schaaale glich und befand sich darauf besser; Heer aber gedenkt eines jungen Menschen, der nach genommenem Liebestrank in eine schwere Krankheit verfiel, welche von den schrecklichsten und sonderbarsten Zufällen begleitet war, worunter auch derjenige gehörte, daß er einsmals vierzehn grosse, rothe, gehörnte, lebendige und kriechende Schnecken ausleerte. Nach Ledel klagte ein Mädchen, welches frischen, von anklebender Schneckenbrut nicht gereinigten Salat

lat genossen hatte, geraume Zeit über Magenkrampf, Geschwulst des Unterleibes und schweren Athem. Ein ihr gegebenes Laxirmittel leerte endlich nach oben und unten viele kleine Schnecken aus. Eben so gab eine für wassersüchtig gehaltene Frau, welche Doktor Keller, nach *Paullinis* Versicherung, in der Kur hatte, von freyen Stücken viele weiche Schnecken durch den Stuhlgang von sich, welche etwas kleiner, als die sich gewöhnlich in den Kohlblättern aufhaltenden Schnecken waren.

Ein Polype im Magen.

Verdeil, Beobachtungen über ein neues Thierchen, welches von einem jungen Mädchen gegangen, | S. Bernisches Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften, B. I. St. 1. S. 215. nebst Abbildung.

Ein Mädchen von sechs Jahren war schon seit einigen Jahren sehr schwächlich und ungesund, geplagt von einem widernatürlichen Hunger und gleichwohl dabey ausserordentlich mager. Eingefallene, verwirrte, mit einem schwarzen Ring umzogene Augen machten ihr Aussehen schreckhaft. Ihr Mund war immer mit schleimichten Speichel angefüllt und ihr Bauch so groß und hart, daß dadurch die falschen Rippen hervorgetrieben wurden und dem Gefühle nach ein Scirrhus vorhanden zu seyn schien. In einem Anfalle der öfters eintretenden Verschlimmerungen ihrer Krankheit, bekam sie plötzlich Übligkeits und Brechen, worauf ein kaum stillbarer Durst erfolgte. Jede Schaafe Wassers, welche die Kranke hinunter schluckte, wurde gleich wieder mit starker Gewalt zurückgetrieben. Endlich brach sie einen Spulwurm mit einiger Erleichterung aus. Nunmehr aber klagte sie über heftige Schmerzen im Magen und Unterleibe und wurde von einem Starrkrampfe befallen, in welchem sie ohne Bewustseyn, Bewegung und Empfindung lag. Auf die innerliche und äusserliche Anwendung verschiedener Wurmmittel giengen in acht und vierzig Stunden mehr als dreysig Spulwürmer und in Gegenwart des D. Verdeil ein Thierchen durch Erbrechen ab, wovon er eine ausführliche Beschreibung mit beygefügtten Abbildungen liefert. Es war ungefehr vier Linien lang und anderthalb Linien breit, von schmutzig weisser, ins Gelbe fallender Farbe und überall mit schwarzen Härchen besetzt. Das Kopfende hatte eine fast trichterförmige Gestalt, eine runde, grosse Öffnung, die der Mund zu seyn schien. Der schmalere Theil desselben gieng in den zweymal längeren, bauchichten, fast birnförmigen, und übrigens höckerichten Körper über. Dieser hatte hinten und seitwärts eine kleine cylindrische Verlängerung, welche Verdeil für das Ende des Mastdarms

darms hielt, an seinem stumpfen und abgerundeten Ende aber noch drey schmälere Glieder, welche den Gliedern des langgliedrichten Bandwurms nicht unähnlich waren. Offenbar gab das letzte Glied zu erkennen, daß es entweder von einer längeren Gliederreihe, oder von irgend einen Theil abgerissen worden sey. Er beschrieb nun die Haut, den Magen, die Muskeln, das Gehirn und die Nerven, die Gefäße und die Verdauungsart dieses sonderbaren Geschöpfs, wie er sie durchs Mikroskop beobachtet hat. Wahrscheinlich gehörte es in das Geschlecht der Polypen (*Hydra Linn.*) mit welchen es nach seiner äusseren Gestalt ziemlich überein kommt. Nur weicht es von denselben durch den Mund und dem ihm entgegengesetzten After ab; der bandwurmformige Anhang aber scheint der von dem Theile des Magens oder Magenschlundes des Kinds, woran er befestiget war, abgerissene Stamm oder Styl des Polypen gewesen zu seyn.

Würmer in den Harnwegen.

Albrecht, J. P. von einem Wurm, der durch den Harngang abgieng, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XI. S. 111.

Alix Observata chirurgica in Richt. chir. Bibl. B. IV. S. 645.

Anvity Observation sur des Vers sortis par le Canal de l'urethre, Journ. d. Ph. T. XIII. 1779. Mai. p. 379.

Baldingers neues Magaz. B. III. S. 19. von besonderen Würmern, die durch die Urinwege excernirt worden sind.

Balme, Journ. de Med. et Chir. T. LXXXVI.

Blasius Obs. med. II. part. 6.

Clerici Hist. lat. lumb. p. 275. vermes cum urina excreti.

Cousin Obs. de verme per urethram ejecto; Act. helv. Vol. VI. p. 192.

Desault, Journal de Chirurg. S. Richt. chir. Bibl. B. XIII. S. 392.

Hannemann, J. L. von Würmern, die mit dem Urine abgegangen, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XVI. S. 74.

Henkels chirurg. Beobacht. in Richt. chir. Bibl. B. V. S. 430.

Janssonii Mercur. Gallo-belg. T. II.

Lochner, M. F. Disquisit. de verm. c. urina excreto.

Moublot de vermibus, qui per renes et urethram infantis exierunt. Vandermon. Journ. T. IX. p. 244.

La Peyre in Roux Journ. d. Med. et Chir. T. LXV.

Raisin de verme cum urina eiecto. Roux Journ. T. XIX. p. 458.

Rozier Journ. Vol. XIII. p. 379. et Vol. XIX. p. 458. Beobachtung einiger mit dem Urine ausgeworfener Würmer.

Ruyschii Cent. Obs. 64. p. 83.

Schacher, P. G. Progr. de Lumbricis in renibus repertis. Lips. 1719.

Tuner two Cases of insects, voided by the urinary passage, in Philos. Trans. n. 391. p. 410. B. VIII. p. 66. und in Leskes Uebers. Th. II. S. 150.

Verbek Diss. de Syncho putrida epidemica vermibus stipata, Sect. II. §. 6.

La Peyre hat in der rechten Niere einer Weibsperson, die einen Abscess in der Lendengegend hatte, drey Würmer, welche vierthalb Zoll und drey andere, welche sieben Zoll lang waren, gefunden. Wahrscheinlich waren es Spulwürmer, so wie diejenigen, welche nach Blasius, Jansson, Ruysch, Schacher u. a. m. ebenfalls in den Nieren angetroffen worden sind und blos in Eyergestalt durch die

die Cirkulation dahin gelangen konnten. Daß letztere Wurmart aus dem Darmkanal in die Urinblase kommen könne, wenn sie beyde durchbohrt, ist schon oben in der Geschichte der Spulwürmer erwähnt worden. Eben so wohl kann sie aber durch die Harnleiter aus den Nieren in die Urinblase gebracht werden und dieses war unstreitig der einzig mögliche Weg in allen den Fällen, wo Spulwürmer ohne tödtliche Folgen ihren Abgang durch die Harnröhre namen. Man findet hiervon unter andern ein Beyspiel in den Abhandlungen der kaiserl. Akad. der Naturforscher, wo nach *Albrechts* Erzählung ein an der schmerzhaftesten, beynahe vollkommenen, mit grosser Spannung und Geschwulst des Unterleibes verbundenen Urinverhaltung leidender Soldat endlich einen drey Finger langen und einer Schreibfeder dicken Wurm aus der Harnröhre zog, und hierauf noch viel Blut verlor.

Afterwürmer scheinen bey Weibspersonen von aussen in die Urinblase zu gelangen, wenn sie aus dem After abschleichen und zwischen den Schamlippen zufälliger Weise auf die Mündung ihrer kurzen Harnröhre treffen. Bey Mannspersonen läßt dieses aber die mehr geschlossene Mündung und die Länge dieser Röhre wohl schwerlich zu und es ist daher nothwendig, daß sie ebenfalls aus den Nieren in die Harnblase gebracht werden. Dieses war unfehlbar der Fall bey einem Kinde von sechzehn Monaten, welches, nach *Turners* Erzählung, einige Tage an Kolik gelitten hatte, wobey es die Füße anzog, der Harn mit vieler Anstrengung ausgeleert und der Ausfluß desselben endlich ganz gehemmt wurde. Es zeigte sich hierauf am Ende der Harnröhre ein Wurm, welchen man herauszog und der denjenigen ähnlich sah, welche zuweilen durch den After ausgeleeret werden, nur daß er etwas weisser war. Eben so gedenkt *Alix* einer Urinverhaltung, die, nach dem Abgang vieler Spulwürmer und Askariden durch Brechen und Laxiren, von einem Wurme in der Harnröhre verursacht wurde, und welche verschwand, sobald dieser Wurm mit dem Urin abgegangen war. Ähnlich ist die vom *Balme* angeführte Beobachtung einer Urinverhaltung, wobey den neunten Tag der Krankheit mit dem Urine ein Wurm und den vier und zwanzigsten abermals einige Würmer abgiengen. Nicht weniger scheinen die kleinen Würmer, welche, nach der Beobachtung des ungenannten Verfassers der kleinen Aufsätze in *Baldingers* Magazin, sehr zahlreich von einem Manne von mittlerem Alter auf dem Gebrauch eines Maiwurms mit dem Urine zu verschiedenen Malen abgiengen, Askariden gewesen zu seyn, die ihren Weg aus den Nieren, wo sie als Eyer von den zuführenden Gefäßen abgesetzt und sodann ausgebrütet worden sind, durch die Harnleiter in die Urinblase genommen hatten.

Bey-

Beyspiele von Würmern unbekannter Art in den Harnwegen findet man bey *Henkel* und *Verbek*. Ersterer Autor erzehlt, daß ein dreyjähriges, an böartigen Pocken krankes Mädchen zu verschiedenen Malen Würmer mit dem Urine ausleerte, die einen sehr dicken Kopf hatten und fünf bis sechs Linien lang waren, letzterer Autor aber, daß er von einer Frau fünf weisse, runde, haarichte, drey Zoll lange Würmer, nach und nach mit dem Urine habe abgehen sehen, wovon er Seite 16 seiner Schrift die Zeichnung mittheilt, welche ich Tab. VII. Fig. 24. aufgenommen habe. Dieser Abbildung nach hatten jene Würmer viele Ähnlichkeit von *Müllers* geperlten Nereide (S. dessen Naturgesch. einiger Wurmarten des süßen und salzigen Wassers. Kopenhagen 1800. Tab. IX. Fig. 1). Da aber die Nereiden sich blos im Meere aufhalten, so hätte der Kranke ihre Eyer mit Seewasser verschluckt haben müssen.

Urinverhaltungen von Würmern hebt gemeiniglich der Catheter ohne Schwierigkeit.

Würmer in den Brüsten.

Paullini, C. F. in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XV. S. 502. von Würmern in den Brüsten.	Rondelet, S. Gronov. de pisc. Lugd. 1554. p. 374.
--	---

Eine Soldatenfrau bekam nach *Paullini's* Beobachtung, in dem Kindbette heftige reissende Schmerzen in den Brüsten. Man machte aromatische Bähungen, worauf sich die Schmerzen legten. Hierauf melkte sie zugleich mit der Milch kleine weisse Würmchen aus. Eben so versichert *Rondelet*, daß er einen Gordius aus einer Brust gezogen habe.

Würmer in den inneren weiblichen Geburtstheilen.

Becker, N. W. von kleinen Würmern, so aus der Gebärmutter gekommen, in den Abhandl. d. k. Ak. d. Nf. Th. VIII. S. 111.	in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. IX. S. 32.
Scharf, B. von Würmern in der Gebärmutter,	Stalpart van der Wiel, Observat. rariorum Centuriae. Leid. 1727. in post. Cent. obs. 29. de vermibus ex utero prodeuntibus.

Eine funfzigjährige Frau hatte seit drey Jahren ein unleidliches Jucken mit darauf folgendem beissenden und gleichsam brennenden Schmerz, der etliche Tage anhielt. Endlich kam aus der Scham eine grosse Menge Würmchen, worauf zwar das Jucken sich in etwas minderte, aber doch nicht gänzlich gehoben ward. Bisweilen wurde dieses wieder ärger und es stellten sich dann immer hysterische Zufälle

fälle mit einem heftigen Gestank ein, wobey sich jedesmal Würmer in grosser Menge zeigten. Aus übertriebener Schamhaftigkeit ertrug sie lange Zeit diese Beschwerden. Ähnliche Fälle erzehlen *Becker* und *Stalpart van der Wiel*. Überhaupt aber findet man eine Menge Beyspiele von Würmern, die beynahe in allen Theilen und Säften des menschlichen Körpers gefunden, und für die Ursache vieler Krankheiten angesehen worden sind, noch in folgenden Schriften:

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 320. Vermes aurium,
p. 322. Vermes in corde, pulmonibus, hepate, sple-
ne, p. 326. Vermis umbilicalis;
Kircherus de Peste;
Langius, Christ. Pathologia animata;

Morgagni de sedibus et causis, morb. Epist. XXXIV
art. 36. p. 56;

Pallas, Diss. de inf. viv. intra viv. und

Paullini, Disquisitio de morte verminosa.

A n h a n g.

Ich hatte anfänglich diese Rubrik bloß einigen erdichteten Würmern und verschiedenen Amphibien gewidmet, welche als ausserordentliche Erscheinungen in dem menschlichen Körper vorgekommen sind oder vorgekommen seyn sollen. In der Folge aber drang sich mir noch eine unbestimmte und zweifelhafte Insekten- und Wurmart auf, die zu den zufälligen Feinden des menschlichen Körpers gehöret und hier den ersten Platz einzunehmen verdienet.

I. Das Condiruinsekt.

Brunelli (Johann Angelo) in Comment. de Bono-
niens. Scient. et art. institut. atq. Academia Tom.
VII. 1791. 4.

Meyer in Voigts Magaz. für das Neueste aus
der Physik und Naturgeschichte, B. IX. St. II.
S. 84.

Brunelli, der in den Bolognesischen Commentarien Nachricht vom Amazonenflusse giebt, schildert ein Insekt so unvollständig und schlecht, daß kein Entomolog im Stande ist, sicher das Geschlecht anzugeben, unter welches dasselbe eigentlich gehöret. Mit vieler Wahrscheinlichkeit glaubt jedoch *Müller*, es zu dem Geschlechte des *Oscabiöres* (*Cymothoa Fabricii*) zählen zu können. Wenigstens wird man, schreibt er, nicht weit von der Wahrheit sich entfernen, wenn man *Brunelli's* Insekt so lange als eine noch nicht recht bekannte Art dieses Ge-

schlechts ansteht, bis seine Naturgeschichte mehr Aufklärung wird erhalten haben. *Brunelli* meldet überhaupt davon folgendes: „*Condiru* nennen die Brasilianer ein Insekt, in Gestalt eines kleinen Wurms, welches sich, wenn es nach einer Richtung, gestrichen wird, glatt, nach der andern Richtung gestrichen aber, so rauh anfühlt, daß es den Finger verletzt. Es ist begierig nach dem Blute, welches aus Wunden hervorkommt, daher verwundeten Krokodilen im Wasser gefährlich und findet sich an manchen Orten in zahlloser Menge. Es kriecht gerne in das männliche Glied, und ist dann fast nicht, ohne Zerreißung des Theils, herauszubringen, daher sich Mannspersonen, wenn sie sich in den Fluß begeben wollen, an diesem Theile wohl verwahren müssen.“

2. Der Makakewurm.

Artur in *Historia et Comment. Acad. Scient.* 1753.
Barrere, P. Beschreibung von Guiana.
Berlinische Sammlungen B. VII. S. 241.

Güttingsche Anzeigen von gelehrten Sachen 1759. S. 244
Güttingsche Sammlungen von Reisen Th. II.
Kniphof Diss. de Pedic. inguin. §. 14. p. 13.

Dieser Wurm soll die Länge eines Zolls und die Dicke eines Federkiels, eine rothbräunliche oder dunkelbraune Farbe und der Gestalt nach viele Ähnlichkeit von einer Raupe haben. Er wächst zwischen der Haut und den Muskeln und wird am meisten um die Fußgelenke, in den Schenkeln, besonders am Knie und unter der Haut der Fußsohlen angetroffen. Im Anfange verräth er sich durch ein Jucken in der Haut. Hierauf folgt aber bald ein Geschwür mit Entzündung und Fieber, bis der Wurm sich selbst durch die Haut gebohrt hat. Öffnet man dieses Geschwür, so findet man den Wurm im Eiter verborgen. Man drückt oder faltet sodann die Haut und faßt ihn mittelst eines kleinen gespaltenen Stückchen Holzes. Einige legen auf den Ort, wo er verborgen liegt etwas Tabakssaft und versichern hierdurch den Wurm desto geschwinder herauszubringen. Nach Entfernung desselben heilt die Wunde gewöhnlich von selbst, ohne Anwendung irgend eines Mittels. Die Indianer, Neger und Kreolen sind den Verfolgungen dieses Wurms gewöhnlich unterworfen, Fremden hingegen wird er erst durch die Länge des Aufenthalts in jenen Gegenden gefährlich.

Erdichtete Würmer.

Zur Berichtigung der Geschichte der unsere Eingeweide bewohnenden und unsere Oberfläche verletzenden Würmer, zur Tilgung gewisser Vorurtheile, welche

che auf die Behandlungsart einiger Krankheiten Einfluß haben, hielt ich es nicht für überflüssig, hier auch das Nöthige über die Nichtexistenz gewisser Würmer beizubringen, deren Erdichtung sich noch aus den Zeiten des Aberglaubens und der Finsterniß in den meisten Theilen der Naturgeschichte herschreibt.

1. Der menschliche Bindwurm.

Fasciola hominis. Linn. Syst. Nat. T. I. P. VI. p. 3053. n. 2. — Ohne Charakter, Ejusd. Diss. de Taenia (Resp. Dubois) Ups. 1748.

Baglivii, G. Epistola Nicolai Andry Operi de Generatione vermium annexa.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 210. *Ligula teres, praelongus hominum canumque lumbricus.*

Döverens Abhandl. v. den Würmern in den Gedärmen des menschlichen Körper. S. 54.

Ludovici, D. von einem sehr langen Spulwurm, in d. Abh. d. k. Akad. d. Nf. Th. III. S. 385.

Montin von einer *Fasciola intestinali* mit mancherley Würmern bey einer Kranken, in den Abhandlungen der Schwed. Ak. d. Wissensch. vom Jahre 1763. S. 122.

Spigelius de Lumbrico lato, Cap. V.

Die Unbestimmtheit in der Angabe der äusseren Gestalt und des ursprünglichen Wohnorts dieses Wurms, die Übertreibungen seiner Länge, und die fruchtlosen Bemühungen aller neuen Helminthologen, ihn in dem menschlichen Darmkanale irgend einmal anzutreffen; lassen vermuthen, daß seine Entdeckung auf einer Verwechslung mit dem kurzgliedrichtigen oder breiten Bandwurme oder einem ungewöhnlich langen und dicken Spulwurme beruhe. Clericus scheint schon diesen Irrthum eingesehen zu haben, wenigstens läßt sich dieses aus folgender Äußerung vermuthen: Wenn auch schreibt er, solche runde und überaus lange Spulwürmer, wirklich im menschlichen Darmkanal gefunden worden sind; so sind sie doch gewiß überaus selten. Bey den Alten geschieht hiervon gar keine Erwähnung. Von den Neuern sagt zwar Wecker in *Valle Gregoriana*, daß er ein Weib von 35 Jahren gesehen, welche einen achtzehn Fuß langen, dünnen, nicht völlig runden Spulwurm von der Dicke eines Erdwurms mit sehr stinkenden Exkrementen von sich gegeben habe. Dem Spigelius hingegen scheint dieser Wurm von dem breiten Bandwurme, der sich an beyden Rändern so zusammenzieht, daß er bisweilen rund erscheint, nicht verschieden zu seyn. Eine zweyte Beobachtung von diesem Wurme liefert Baglivi, welcher erzählt, daß im Jahre 1696 ein junger Mensch in Rom vom Geruch einer zerschnittenen Zwiebel zum Brechen gebracht wurde, und einen runden, dreysig Fuß langen Wurm wegbrach. Eine dritte Beobachtung findet man bey Ludovici, der versichert, daß ein Jüngling auf ein

ein genommenes Brechmittel einen drey Ellen langen Wurm durch den Stuhlgang von sich gab.

Linné hält diese *Fasciola* für eine vom Bandwurme verschiedene Wurmart, welche weiß, lang, bandähnlich, übrigens ungleich dicker, als der Bandwurm, auch nicht wie dieser gegliedert, mit drey länglichten Streifen auf der oberen und unteren Fläche geziert, an beyden Rändern gezackt und an den Enden abgerundet ist. Sie kommt nach seiner Meinung öfter in Hunden und Fischen, als bey dem Menschen vor und ist bisweilen einer Elle lang.

Nach *Montin* ist dieser Wurm dick, hat einen eingedrückten, scharf gezähnten Rand zu beyden Seiten, welcher die Ursache seyn soll, daß er mit Schneiden abgeht. Das eine Ende hat eine stumpfe, das andere aber verlängert sich allmählich in eine feine Spitze, womit sich der Wurm in den Fischen so stark anhängt, daß er fast allemal abreißt, wenn man ihn herauszieht, ohne den Fisch in recht kaltes Wasser gelegt zu haben. Überhaupt hat er nach *Montins* Versuchen ein ungemein zähes Leben. Glühende Kohlen von Buchenholz löschte er zwey bis dreymal mit seinem Schleime aus, ehe er darinnen umkam und hieraus erklärt er die Möglichkeit, daß er in den Örtern von Holland und Schonen, die in Wäldern liegen und wo so viele Fische in den innländischen Seen gefangen werden, welche man wenig oder nicht reiniget, und weniger als anderswo kocht, noch lebendig mit verschluckt werden könne und daher sehr gewöhnlich bey den Menschen vorkomme. Er belegt dieses mit einem im Grunde nichts beweisenden Beyspiele, wo ein Frauenzimmer in Holland mit einer Brassenzunge ein Stück einer lebendigen *Fasciola* in den Mund bekam, aber dasselbe, als etwas Ungewöhnliches mit ihrer Zunge bald gewahr wurde und daher wieder herausnam. Eben so wenig kann seine angeführte Krankengeschichte beweisen, daß die *Fasciola* wirklich in dem Menschen vorkomme. Ein Fräulein von 25 Jahren empfand nemlich jedem Abend eine wälzende Bewegung von der linken Seite nach der rechten Seite und so zurück, nebst starken Spannungen unter der Brust, Ohnmachten, Herzklopfen und Reissen im ganzen Körper, unter welchen sie meistentheils an der linken Seite zusammengezogen wurde. Sie hatte vordem bey einer Brunnenkur *vermes cucurbitinos* bemerkt und es war daher kein Zweifel an der Gegenwart eines Bandwurms mehr übrig. Es wurde einige Tage Alstons englisches Zinnpulver und sodann ein Mercuriallaxans gegeben, worauf viel Schleim, wie dicker saurer Rahm, *vermes cucurbitini* und ein Paar Bandwurmstückchen abgiengen. Nach wiederholten Wurm- und Abführungsmittel kamen wieder einige Stücke eines breiten

ten und dünnen Bandwurms und endlich eins, das eine Viertelelle lang und dessen breites Ende stumpf zugespitzt war, genau so wie bey dem in Holland in den Karauschen etc. vorkommenden Wurme. Alle abgegangenen Stücke betrugen $2\frac{1}{4}$ Elle, worauf sich nach und nach alle obige Zufälle verloren.

Unverkennbar ist in dieser Geschichte wohl die Verwechslung des Bandwurms mit dem Bindwurme und daher die Behauptung der Existenz des letzteren Wurms auf nichts gegründet.

2. Der Veitswurm.

- | | |
|---|--|
| <p>Brenggerus, J. G. in Epistol. ad Hechstetterum.
Camerarius, R. Centur. memorab. med. XII.
§. XCIV.
Clerici Hist. lat. lumbr. p. 326. <i>Vermis umbilicalis</i>.
Kniphof de Ped. ing. §. X. <i>Vermis Sancti viti</i>.
Michaelis, B. Diss. de vermibus in homine 1628.
Müllerus, M. Diss. singularis. Tubing. 1625.
Olevianus, F. apud Hier. Reusnerum, obs. XCVII.</p> | <p>Paullini, C. F. von einem <i>Nabelwurm</i>, in den Abh. d. k. Ak. d. Nf. Th. XV. S. 492.
Plateri Prax. med. L. III. C. XIII.
Sulzbergerus, R. apud Sennertum III. Pr. part. X. C. 4.
Velschius de vermibus infantum.
Vasti, J. Diss. de verme umbilicali. Resp. Scheef. Erfurt 1710.
Zacutus Prax. admir. obs. CXXIV.</p> |
|---|--|

Unter die Geschöpfe der Phantasie gehört vorzüglich der *Veitswurm*, welcher von andern auch *Geitz-* oder *Nabelwurm* genennt wird und in der Nabelblutader seinen gewöhnlichen Aufenthalt haben soll. Die angeführten Schriftsteller hielten ihn für die Ursache einer bey ganz zarten Kindern häufig vorkommenden Krankheit, wobey die trockne, duftlose Haut kaum die Knochen bedeckt, das ganz magere, verfallene Gesicht in lauter Runzeln gefaltet, die Farbe des ganzen Körpers bleyfarbig, der Unterleib aufgetrieben und knoticht ist, und welche man gewöhnlich unter den Namen Atrophie, Darrsucht, Altvater kennt. Man verband damit die sonderbare Idee, daß ein gewisser Wurm unablässig am Leben des Kindes nage, alle nährenden Theile aufzehre und nothwendig den Tod des Kindes zur Folge habe, wenn seine Gefressigkeit nicht auf eine andere Art befriediget würde. Der Zufall lehrte, daß eine lebendige, auf den Nabel gebundene Schmerle oder Grundel nach vier und zwanzig bis dreysig Stunden bis auf die Gräten verzehrt gefunden wird und nothwendig mußte sich der Veitswurm daran gesättiget haben. Man bedachte aber nicht, daß ein so kleines Fischgen, wenn es vorzüglich, wie allermeist geschieht, nebst einem Stückchen Spießglas aufgebunden wird, bald den grössten Theil seiner unbedeutenden Fleischsubstanz abreiben und der Rest derselben, durch die in dieser Krankheit widernatürliche Wärme des Unterleibes

an den Gräten vollends vertrocknen könne. Sobald die Schmerle verzehrt gefunden wurde, bediente man sich einer Salbe, um den Veitswurm zu tödten, und noch in unseren Tagen hat der aus den Köpfen des Pöbels unverilgbare Aberglaube diesem Heilverfahren, vorzüglich bey der niederen Volksklasse, seine Dauer gesichert.

3. Die Mitesser.

Ackermann, J. Ch. G. über die Mitesser bey Kindern, in Baldingers neu. Mag. B. III. St. 9. S. 313.

Acta erudit. Lipsiens. Ann. 1682. p. 316. de Crinonibus et Comedonibus infant. Tab. XVII.

Castro (Ezechiel a) de igne lambente. C. VI.

Clerici Hist. lat. lumbr. p. 288. *vermiculi capillares infantum*, seu *Crinones* et qui gallice *Soyes*, item *Masclois* dicti sunt. Tab. II. Fig. G. H. J. K. nach Ettmüller.

Ettmüller valetudinarium infantile Cap. II. §. 33.

Eysel, J. Ph. Diss. de Comedonibus. Resp. Lentin. Erf. 1711. 4.

Göze Gesch. schäd. Insect. p. VII.

Hafenreffer, S. de cutis affectibus, I. 11.

Hartmann, J. Prax. chymiatr. p. 152.

Hoffmann, F. Herc. medic. VII. 6.

Johnston, J. Idea medic. pract. IX. V. 4.

Kniphof de Pedic. ing. §. XX. *Vermiculi capillares infantum*, Mitesser, Mitfrass, dörre Maden, zehrende Dinger, zehrende Würmer. Tab. II. G. H. I. K.

Kratzensteins Abh. v. Erz. d. Würm. S. 42.

Lorry, A. L. Abh. v. d. Krankheiten der Haut, übers. v. Held. Leipz. 1779. B. II. S. 349.

Ludwigii, Christ. Fr. Diss. de Comedonibus (Resp. Wolff.) Lips. 1789.

Montuus, Hieron. de Morb. infant. P. III. L. I. p. 110.

Paraei, Ambr. Opera chirurg. lat. don. Jac. Guillemeau.

Paullini de Morte verminosa, p. 114.

Sauvages Nosol. meth. T. V. p. 202. *Malis a crinonibus Ettmülleri; morbus pilaris Horstii; Setae; Comedones, Dracunculus, Cridones, Masclois.*

Sennert, Dan. Prax. II. P. 2. C. 24.

Stentzel, Diss. de insector. in C. H. genit. varia forma et inaele (Resp. Vaghi) Vitemberg. 1741. §. 15 et 17.

Stolberg, J. St. Manduct. ad pueril. affect. curat. Cap. 4.

Velschii Exercit. de vermicul. capillar. inf.

Vogel, R. A. Praelect. de cognoscend. et curandis praec. corp. hum. effectibus §. 728.

Wichmanns Aetiologie der Krätze, S. 73.

Bey ganz zarten Kindern von wenigen Wochen und Monathen bis zu einem Jahre, und nur in seltenen Fällen noch im dritten Jahre bemerkt man öfters eine gewisse widernatürliche Rauheit der übrigens mehr als gewöhnlich feinen, kränklich- weissen und sich oft in grossen Stücken absondernden Haut, welche durch zahllose harte, mehr oder weniger braune und schwärzlichte Punkte veranlaßt wird. Ein hiervon abhängendes unablässiges Hautjucken, ein zehrendes Fieber macht sie äusserst unruhig, raubt ihnen allen Schlaf, und magert sie nach und nach ab, so daß sie zuletzt, bis auf den stark angeschwollenen und harten Unterleib, völlig Gerippen gleichen. Ihre äusseren Gliedmaassen erkalten, wenn sie nur etwas der freyen Luft ausgesetzt werden und die Reizbarkeit und Beweglichkeit ihres Nervensystems ist so groß, daß sie auf die geringsten Veranlassungen in Convulsionen verfallen. Werden solche Kinder in ein warmes Bad gebracht, mit Seife oder

oder einem anderen erweichenden und auflösenden Mittel gerieben; so kommen vorzüglich am Rücken, an den Schulterblättern, Armen und Füßen, kleine länglichte, madenförmige, mehr oder weniger braune, dicke und zähe Körperchen, oft in solcher Menge aus den Hautporen hervor, daß die Oberfläche des Leibes beynahe ganz damit bedeckt ist. Man hat diese Körperchen, in der Meinung daß sie den Kindern die Nahrung entzögen, *Comedones* oder *Mitesser* von der damit verbundenen Auszehrung *Zehrwürmer*, und weil sie bisweilen wie kurze schwarze Haare hervorstechen, *Crinones* genannt. Die alten Griechen und Araber kannten sie nicht. Auch scheinen sie überhaupt in den heissen Erdstrichen der alten und neuen Welt nicht vorzukommen. Die Arabisten, welche als blinde Anhänger des *Galens* und *Avicennas*, nichts glaubten, was diese nicht gelehrt hatten, verwechselten die ihnen bekannt gewordenen Mitesser mit der *Vena medinensis* der Araber und beschrieben sie theils unter diesem Namen, theils unter dem Namen *Dracunculus*. Neuere Ärzte und unter diesen besonders *Ettmüller*, *Hartmann*, *Friedrich Hoffmann*, *Johnston*, *Kniphof*, *Paullini*, *Sennert*, *Strobelberg* hielten sie für eine besondere Gattung Würmer, den aus der Haut hervorstehenden, von der Luft und dem anklebendem Schmutz dunkler gewordenen Theil derselben für den Kopf, den tiefer steckenden und spitzig zulaufenden Theil aber für den Schwanz und einige wollten sogar Bewegung an demselben wahrgenommen haben. In den *Actis Eruditorum Lipsiensium* wurden diese Würmer in einer beträchtlichen Vergrößerung vorgestellt, welche auch *Paullini*, *Kniphof* und andere in ihren Schriften aufgenommen haben, und in dieser erscheinen sie als Thiere von schrecklichem Ansehen mit langen Fühlhörnern, kurzen und breiten Köpfen, runden grossen Augen, dicken birnförmigen Körper und einem langen, am Ende zottichten Schwanz.

Andere, wie *Castro*, *Kratzenstein*, *Sauvages* hielten sie für eine Ausartung der Haare oder Haarwurzeln, welche in kleine Eiterbeulen übergiengen, mit ihren Spitzen die Haut durchbohrten und sodann als steife Borsten hervorragten. *Vogel* widersprach zuerst diesen scheinbar richtigen Behauptungen und zeigte, daß die Mitesser bloß ein in den Hautporen verdickter und schwarz gewordener Schleim sind, der sich theils durch erweichende, die Haut erschlaffende und die Hautporen erweiternde Mittel, theils durch den Druck des Fingers als madenförmige Körperchen herauspressen lasse. Hiermit stimmen auch *Ackermanns* mit den Mitessern angestellte Versuche überein, nach welchen sie aus einer rotzigen Substanz bestehen, die im Wasser größtentheils auflösbar ist, und nach welchen die Köpfe
der

der Mitesser von dem Körper und Schwanz derselben blos in soferne verschieden sind, daß ein dichter und mithin dunklerer Rotz erstere Farbe und Consistenz verschieden macht, und daß der gemeinlich mit abreissende und an dem vermeintlichen Kopfe kleben bleibende Theil des Oberhäutchens, ihnen ein besonderes Aussehen giebt.

Die Mitesser sind die gewöhnlichen Begleiter der Darrsucht, in welcher durch zähe, stopfende, rohsaftige Nahrungsmittel, die Drüsen zarter Kinder verstopft werden, die Ernährung des Körpers nicht gehörig von statten geht, die Säfte überhaupt eine schleimichte Beschaffenheit annehmen, und die Ausdünstungsmaterie selbst dicker und zum Gerinnen geneigter wird. Vernachlässigung des Wechsels der Wäsche, Unterlassung fleissiger Hautreinigung durch Waschen und Baden bewirken unter diesen Umständen, daß die Ausdünstungsmaterie vollends in ihren Ausführungsgefäßen unter der Haut stecken bleibt und Schleimwälgern bildet, welche nach und nach eine dunkle Farbe annehmen. Unabhängig von der Darrsucht können Mitesser aber auch blos durch ein zu warmes Verhalten veranlaßt werden. In manchen Gegenden wickelt man die Kinder nicht nur in dicke Küssen, so daß nichts als das Gesicht frey bleibt; sondern man vergräbt sie noch überdiß in warme, meistens in der Nachbarschaft des Ofens stehende Betten und läßt sie in diesem, höchst lästigen Dampfbade unablässig schwitzen. Hierdurch wird aber ihre Haut so erschlaft, daß ihr Gewebe keiner Zusammenziehung mehr fähig ist und die Schweißlöcher immer offen stehen. Aller Staub und Schmutz sammelt sich in diesen Löchern, erhält durch den fettigen Schweiß Zusammenhang und Festigkeit, und nach der Form der feinen Ausführungsgänge, eine madenförmige Gestalt, wenn man ihn aus den Hautporen hervorpfeßt. Dieses warme Verhalten ist auch die Ursache, daß man die Mitesser ungleich seltener bey Kindern antrifft, welche schon laufen können, als bey solchen, die man noch in Windeln und Küssen gehüllet herumträgt.

Zur Entfernung der Mitesser empfiehlt *Ackermann*, nach einem warmen Bade, eine in möglichst starke Gährung gesezte Mischung aus zwey Esslöffeln voll Weizenmehl, einen Eßlöffel voll Honig und zwey Eßlöffeln voll Bierhefen, warm mit der Hand der durchs Bad erschlaften Haut gelinde einzureiben, und diese Salbe nach einigen Minuten wieder abzuspülen. Hierauf werden die Mitesser in einer oft zahllosen Menge sichtbar, so daß man sie nun leicht mit einem wollenen Lappen mit Seife abreiben kann. Doch verhütet diese Methode nicht ihre Wiederentstehung, wenn die Haut nicht durch den fleissigen Gebrauch mehr kalter,

als

als warmer Bäder und durch öfteres Reiben mit Flanell rein erhalten und gestärkt wird. Man sieht dieses schon an den Mitessern, welche bey manchen erwachsenen Personen im Gesichte und vorzüglich an der Nase sichtbar sind. Sie werden immer grösser, je öfter sie ausgedrückt werden, weil die, ohne Anwendung zusammenziehender und stärkender Mittel, immer offen bleibenden Hautporen, von Zeit zu Zeit einer grösseren Menge Staubtheilchen den Eingang verstaten, hierdurch aber immer mehr ausgedehnt werden. Wirkliche Darrsucht oder vorhandene Anlage dazu, machen noch, ausser dem Gebrauch äusserlicher Mittel, die Anwendung innerlicher, auflösender und eröffnender Mittel nothwendig, wenn man sich eine gründliche und bleibende Hülfe versprechen will. Immer versteht sich, daß zugleich die Ursachen vermieden werden, welche zur Entstehung des Übels Gelegenheit gegeben haben.

Verschiedene Amphibien und andere Thiere, welche als ausserordentliche Erscheinungen in dem menschlichen Körper vorgekommen sind, oder vorgekommen seyn sollen.

Baldingers Arzneyen; eine physicalisch-medizinische Monatschrift, Langensalza 1766. B. II. St. 5.
 Bianchi, J. B. Nat. in H. C. vitiosa, morbosaque generatione, historia, Aug. Taurin, 1741. p. 298.
 Blumenbachs Handb. d. N. G. S. 220.
 Kratzensteins Abh. v. Erz. d. Würm. S. 38.
 Lambsna, ventris fluxus multiplex, 8. Amstel. 1756. p. 140.

Purcell, J. von der Kolik, aus dem Engl. mit Anmerk. v. J. A. Ph. Gesner. Nördlingen 1775. 8. S. 70.
 Vogels, R. A. Vorlesungen über die Kenntniss und Heilung der vornemsten Krankheiten des menschlichen Körp. übers. v. Pohl, Leipz. 1780. S. 723. §. 736.
 Weikard, von der Zuverlässigk. menschl. Beobachtungen, in Baldingers neuen Mag. B. II. St. 3. S. 222.

In dem Zeitalter, wo Leichtgläubigkeit und Aberglaube noch die Hexenprozesse begünstigten, gab es nur wenig Weise im Volke, welche nicht der herrschenden Meinung beygetreten wären, daß Eidexen, Frösche, Kröten etc. durch eine gewisse Zauberkraft in den menschlichen Körper gebracht und somit von Übelgesinnten zur Erregung der schreckhaftesten Zufälle gebraucht werden könnten. Auch datiren sich von dorthier die meisten Erzählungen und Beobachtungen der von solchen ungewöhnlichen Gästen herrührenden Krankheitsfälle. Kein Wunder! wenn die Zweifelsucht der Neuern hiervon Gelegenheit nam, alle, sowohl ältere, als neuere Fakta dieser Art abzuleugnen, sie für Werke der Erdichtung, der Teuschung und des Betrugs zu erklären. Und allerdings mochte der allgemeine Beyfall, die theilnemende Aufmerksamkeit, welche man solchen Erzählungen schenkte, damals, wie jezt, das Interesse spekulirender Köpfe öfters zur Er-

dichtung solcher Beobachtungen verleitet und die herrschende Idee von möglicher Behexung, auch ohne Beweise, solche Fälle für zuverlässige Thatsachen angenommen haben, wo dergleichen Amphibien nur zufälliger Weise unter die weggebrochenen oder wegpurgirten Abgänge gekommen waren, die Gewinnsucht dürftiger Betrüger aber die Leichtgläubigkeit des Publikums nicht selten benutzt und ihm vielleicht manches Spektakel dieser Art gegeben haben. Beyspiele solcher Betrügereyen von Seiten der Kranken liefern unter andern *Lambsna* und neuerlich *Weikard*; von Seiten des Arzts aber *Kratzenstein*. Letzterer erzählt, daß ein alter Arzt, welcher seinem Sohne bald Ruf und Kundschaft verschaffen wollte, diesem den Rath gab, eine Eidexe in den Nachtstuhl einer seiner Patientinnen zu prakticiren. Der junge Doktor folgte seinem Mentor, gab vor, die Eidexe durch seine Arzneyen abgetrieben zu haben und nam hiervon Gelegenheit, nicht allein die Vortreflichkeit seiner Mittel zu rühmen, sondern auch auf den gefährlichen Zustand aufmerksam zu machen, worinnen sich die Kranke vorher befunden habe. Leider! wurde aber durch eine unglückliche Verrätherey dieser Betrug in der Folge entdeckt und der junge Arzt lächerlich gemacht.

Weikard schreibt: „ich habe im dritten Stücke meiner medicinischen vermischten Schriften eine Beobachtung eingerückt, die immer einige Aufmerksamkeit verdient. Sie betrifft Eidexen, die ein hessischer Mann haufenweise ausbricht. Die Beobachtung hat das völlige Gepräge der Wahrscheinlichkeit, bis auf jenen Punkt, daß ich die Eidexen nicht selber gesehen habe. Mancher anderer Beobachter, der diese Geschichte an meiner Stelle erfahren und zu erzählen gehabt hätte, würde gar hinzugesetzt haben, daß er ein lebendiger Augenzeuge gewesen wäre.“

„Ich muß die ganze Eidexensache noch einmal von vorne an erzählen. Im Sommer 1779 hinterbrachten die Angehörigen eines Mannes aus dem hessischen Amte Brandenstein, welches an unsern Kurort bey Brückenau gränzet, daß gedachter Patient eine Eidexe ausgebrochen hätte. Vorher, sagten sie, war der Leib geschwollen: der Mann konnte nichts trinken, als Brandtewein und Sauerwasser. Nach ausgebrochener Eidexe war Geschwulst und jeder Zufall gemindert. Die Leute waren noch so gut, die Farbe und Gestalt der Eidexe genau zu beschreiben. Die Sache kam vor das Amt. Die Herren Beamten sorgten selber, daß man diesem Unglücklichen helfen möchte. Denn er vermuthete bald selber wieder mehrere Eidexen im Leibe, da bald wieder Geschwulst und andere Zufälle kamen. Der Mann bekannte, daß er einstens in einem Rausche auf der Strasse wäre
liegen

liegen geblieben, wo er wegen Durst aus einer Pfütze getrunken, und vermuthlich die Eidexenbrut bekommen hätte.“

„Das war nun eben noch keine grosse Sache, eine Eidexe auszubrechen. Es blieb auch nicht lange hierbey. Der Mann brach nun mehr als vierzig theils todte, theils lebendige Eidexen aus. Man schickte einen Boten mit dieser Nachricht zu mir. Ich hatte zwar noch nichts unternommen, doch war mein Plan gemacht, auf welche Weise ich diese Thiere aus dem Leibe exorciren wollte. In meinem Sinne war ich schon so siegreich als *Gafner*, da er es mit den vielen Teufeln zu thun hatte.“

„Der Mann klagte nun bald wieder die vorigen Zufälle, woraus er wieder auf einen Haufen Eidexen schloß. Nun kam die Sache nach Cassel. Der Mann stellte sein Unglück und seine Armuth vor, verlangte von Sr. Durchlaucht, dem Herrn Landgrafen, Beysteuern zum Unterhalt. Aber in Cassel müssen sie das Ding besser verstehen. Es kam geheimer Befehl an Herrn *Alix*, der als Physikus jenes hessische Amt versieht, die Geschichte der Eidexen mit aller Genauigkeit und Vorsicht zu untersuchen. Er that es, und entdeckte, daß keiner von den angegebenen Zeugen mit Wahrheit behaupten konnte, Eidexen gesehen zu haben, daß der Mann ein Säufer und viel mit Aufblähung des Leibes gequält war.“

„Nun wünschte ich die ganze Eidexenobservation aus meinen Schriften; ich sehe, wie nöthig es ist, äusserst hartgläubig, oder gar ungläubig, bey fremden Erzählungen zu seyn, wie vielfältig uns Betrug für Wahrheit verkauft wird.“

Dieser und ähnlicher Überführungen des offenbaren Betrugs ungeachtet, haben doch angesehene Ärzte, selbst in den neusten Zeiten, die Möglichkeit und Wirklichkeit solcher Geschichten nicht in Zweifel gezogen. *Purcell* schreibt zum Beyspiel: „Die Magenkolik kann auch von Würmern und Läusen verursacht werden. Die Beobachter setzen noch audere Thiere, als Kröten, Schlangen, Eidexen unter diejenigen, so in diesem Eingeweide gewachsen sind und unaussprechliche Schmerzen erweckt haben.“ Er führt verschiedene Beyspiele aus anderen Schriftstellern an und setzt hinzu: „dem, der die Wahrheit solcher befremdenden Fälle bezweifelt, kann ich keinen andern Beweis geben, als die Zeugnisse glaubwürdiger Männer, die sie in ihren Schriften nachschlagen können. Ich finde sie möglich und dem gewöhnlichen Lauf der Natur gleichförmig.“ Auch *Gesner* zweifelt in seinen Anmerkungen zum *Purcell* nicht daran und *Vogel* äussert sich über diese Materie auf folgende Art: „Ausser den Würmern findet man zuweilen in den Därmen noch andere Thiere, Kröten, Schlangen, Blutigel, Gordios, Eidexen, Frösche

sche etc. Diese erregen eben sowohl, wie diejenigen, von denen bisher gehandelt worden, schlimme Zufälle.“ Ganz neuerlich aber stimmt *Blumenbach* für diese Meinung, indem er versichert „man hat ungezweifelte Beyspiele von Wassermolchen und Fröschen, die sowohl im Magen und Darmkanal von Menschen gelebt haben, als auch ihrem Leben unbeschadet in dichte Eisschollen eingefroren sind.“ Nimmt man ferner die Analogie zur Hülfe und geht auf das zurück, was schon im ersten Bande dieses Werkchens S. 291 unter der Rubrik von Insektenlarven, Puppen und vollkommenen Insekten im Darmkanale angeführt worden ist; so möchte man *Bianchi's* Schlussfolge, welche er, nach Aufzählung aller alten Geschichten von solchen ungewöhnlichen Gästen in menschlichem Körper, macht, nicht ganz ungereimt finden, daß es nemlich nicht wahrscheinlich sey, daß alle die grossen und berühmten Männer, welche dergleichen Geschichten aufgezeichnet haben, betrogen worden seyn sollten, und es für glaublich halten, daß auch in dieser Rücksicht manche Begebenheit, die ehemals zum Wunderbaren und Lächerlichen gezehlt wurde, bey genauerer Nachforschung und unparteyischer Prüfung ähnlicher, sich in unseren Tagen vielleicht ereignenden Fälle, als zuverlässig bestätigt werden möchte.

So lange inzwischen allen diesen und ähnlichen Autoritäten noch nicht der Stempel der Zuverlässigkeit durch aktenmässige und durch gehörige Zeugschaft erhärtete Belege aufgedruckt ist; so bleibt immer noch der erste Punkt unsrer Streitfrage: ob es nemlich wenigstens mit einem grossen Theile solcher Geschichten seine vollkommene Richtigkeit habe? unentschieden und noch die Erörterung der zweyten Frage übrig: ob aus der möglichen Aufnahme, Entwicklung, Lebensdauer und Fortpflanzung der Amphibien in menschlichem Körper, die Annahme solcher inneren Bewohner desselben bewiesen werden könne?

Was die Aufnahme betrifft; so ist es nicht ganz unwahrscheinlich, daß Personen, welche einen sehr festen Schlaf haben, wenn sie auf blossem Erdboden, im Grase oder Heu, in der Nachbarschaft der Sümpfe, Teiche u. s. w. mit offenem Munde schlafen, wohl eine ihnen in den Mund kriechende Kröte, Eidexe etc. in der Unbesonnenheit und dem Taumel, mit welchen solche Festschlafende gemeinlich erwachen, oder auch im Traume selbst, lebendig verschlucken können. Noch weit möglicher ist aber wohl der Fall, daß Jemand, der aus heftigem Durst trübes Pfützen- oder anderes unreines Wasser, vorzüglich des Nachts trinkt, mit diesem Wasser die überaus schlüpferichen Eyer oder selbst die noch jungen ganz kleinen Amphibien verschluckt. Dieser Fall kommt vielleicht auf dem Lande nicht

so selten vor, und ist vielleicht öfter, als man denkt, die Ursache unerklärbarer Zufälle, hartnäckiger Cardialgien und Koliken, bey welchen der rohe und gegen die Hülfe des rechtlichen Arzts meistens theils eingenommene Landmann, der völligen Vernachlässigung oder dummen Empirie unterliegt.

Eben so wenig widerspricht die Natur dieser Thiere ihrem Fortkommen in menschlichem Körper. Das Laich der Kröten, Frösche, Eidexen und selbst mancher im Wasser lebenden und mit Schleim überzogene, an einander gekettete oder in Klumpen vereinigte Eyer legender Schlangen, kann in der feuchten Wärme des Magens und Darmkanals sehr wohl ausgebrütet werden und die ausschließenden jungen Amphibien können sehr wohl in dieser Wärme gedeihen. Zweifelhafter ist es aber, ob jene Eyer ihrer Grösse wegen von den Saugadern des Darmkanals, so gut wie die Eyer der Insekten und Intestinalwürmer aufgenommen und durch die Cirkulation auch in andere Theile des Körpers gebracht werden können, welches gleichwohl nothwendig seyn würde, wenn die unten vorkommenden Beobachtungen des *Sorbait*, *Isibordus*, *Borellus* u. a. m. von Kröten und Fröschen in Beulen und Geschwülsten nicht unter die Fabeln gehören sollen. Übrigens kann der Magen und Darmkanal für mehr oder weniger vollkommene und ausgewachsene Amphibien kein ihr Leben in Gefahr setzender Aufenthalt seyn, da sie bekanntlich ein überaus zähes Leben haben, nach *Blumenbach* lange das Athemholen entbehren, lange ausser ihrem Elemente auch in luftleerem Raume und in eingesperrter Luft, wie die Kröten in engen Höhlen mitten in durchsägten Baumstämmen oder in Steinblöcken, ja selbst geraume Zeit in einer Atmosphäre von Kohlengesäuerter und fixer Luft sich aufhalten und einen unglaublichen Grad von Hitze und Kälte ertragen können. Wo aber das gewöhnlich lange, sich bey Fröschen auf zwölf bis sechzehn Jahre, bey Schlangen noch ungleich höher erstreckende Leben der Amphibien bestehen kann, da ist sicher auch ihre Fortpflanzung möglich, und daher keinesweges unbegreiflich, wie diese Thiere oft viele Jahre lang in dem menschlichen Körper verweilen und ohne wieder von neuem in dem Körper gebracht worden zu seyn, dennoch von Zeit zu Zeit aus demselben ausgeworfen werden können.

Nach dieser Voraussetzung liefere ich noch einige Beobachtungen und Erzählungen von solchen ungewöhnlichen Bewohnern des menschlichen Körpers, um die Leser selbst im Stande zu setzen, über ihren Werth zu urtheilen und zu entscheiden.

1. Kröten im Magen, Darmkanale und in Abscessen.

Bartholini, C. *Annalecta Observ. anat. cent. IV.* Obs. XIX. p. 525.

Berlinisches Magazin, B. I. S. 679. Sonderbare Bemerkung von einer lebendig durch den Mund ausgeworfenen Kröte.

Blancardi Anat. pract. Obs. 17. Bufonum vomitus.

Horstii, G. Opp. T. I. p. 478.

Rheinesii, Th. de ancilla Altenburgensi ranas evomente, in Thom. Bartholini Act. med. et philos. Hafn. Vol. II. p. 110.

Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu

gehörigen Kunst- und Literaturgeschichten. Vierzehnter Versuch S. 437. Von dem Schlesischen Kröten-speyer in Skarsine.

Schröks, L. Wahrnehmung von einer Kröte, die durch den Stuhlgang abgegangen, in den Abh. d. A. d. Nf. Th. IX. S. 220.

Seger, G. von einem Erbrechen, wodurch drey Kröten ausgeworfen wurden, in d. Abh. d. k. A. d. Nf. Th. II. S. 109.

Sorbait, P. v. von einer Eiterbeule am Halse, woraus eine Kröte hervorgekommen, in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. II. S. 158.

In dem zwey Meilen von Breslau entlegenen Dorfe Skarsine befand sich im Jahre 1720 ein etliche vierzig Jahre alter Mann, der seit vier und zwanzig Jahren über Schlaflosigkeit, Leibesverstopfung, Übligkeith und Brechen, Beissen und Grimmen im Leibe etc. klagte und immer behauptete, daß er etwas Lebendiges im Leibe habe. Auf den Gebrauch verschiedener, blos von einer Dame angeordneter Mittel, fand er auf längere oder kürzere Zeit Erleichterung. Endlich aber überfiel ihm einmal ein heftiges, Ersticken drohendes Erbrechen, wobey zwey lebendige Kröten, von der Grösse kleiner Laubfrösche ausgeworfen und nachher noch lebendig in einem Glase mit Wasser aufbewahrt, erhalten wurden.

Ähnlich ist Segers Erzählung von einem Fleischer, der von einem stillstehenden Wasser sehr begierig getrunken hatte und gegen Abend über Magenschmerzen zu klagen anfieng, welche von Tag zu Tag zunamen. Des Morgens fühlte er immer eine Bewegung im Magen, wie von einem lebendigen Thiere. Nachdem er so ein halbes Jahr lang an den heftigsten Kopf- und Magenschmerzen, öfteren Ohnmachten gelitten hatte und dabey sehr an Kräften herabgekommen war, brach er, nach genommenen Schlangenfette, drey Kröten weg, worauf er seine vorige Gesundheit wieder erlangte.

Von der berühmten Kröten- und Eidexenspeyerin Catharina Geißlerin, geben Bartholinus, Rheinesius und Wolgnad Nachricht. Sie hatte im Frühlinge aus einem stehenden Wasser getrunken, nicht lange hernach ein heftiges Grimmen und eine Bewegung wie von lebendigen Thieren im Magen bemerkt, welche ihr die heftigsten Beschwerden verursachten, wenn sie nicht die gehörige und angemessene Nahrung erhielten. Ohngeachtet sie öfters Kröten und Eidexen von freyen Stücken wegbrach; so gerieth sie doch in Lebensgefahr, sobald man sie durch ein Brechmittel fortzuschaffen bemühet war. Ihrem Schicksale überlassen starb sie daher

1662 im Hospitale zu Altenburg, nachdem sie zwanzig Jahre lang eine Menge dieser Thiere und laichartiger Materie ausgebrochen hatte.

In dem Berlinischen Magazine findet man die Krankheitsgeschichte eines Mädchens von sechs Jahren, welches den ganzen Winter hindurch über ein beständiges schmerzhaftes Kratzen und seltsame Bewegungen in dem aufgetriebenen Unterleibe klagte, schon seit sechs Wochen eine anhaltende Fieberhitze, Schläfrigkeit und einen rothen Ausschlag der Haut hatte. Man gab ihr Meisterwurzel (*Imperatoria Ostruthium L.*) ein, worauf sie in Gegenwart vieler Anwesenden, welche durch das Leiden des Kindes herbeygezogen waren, eine lebendige Kröte ausbrach, welche in der Stube herumzuhüpfen anfieng.

Von Kröten im Darmkanale führt *Horst* einen Fall an, wobey vier Kröten durch Purgiermittel abgetrieben worden sind. In *Schröks* Geschichte ist es aber zweifelhaft, ob die Kröte nicht zufällig unter die Ausleerungen des zwölfjährigen Knabens gekommen ist.

Sorbait erzehlt ein Beyspiel von einer Kröte in einem Abscess. Bey einem Weingärtner setzte sich nemlich nach einem starken Trunk von kaltem und schlammichten Wasser eine grosse Geschwulst äusserlich an dem Halse an. Sie wurde nach und nach erschrecklich groß. Endlich verwandelte sie sich in eine Eiterbeule, woraus eine lebendige Kröte hervorkam, die er mit seinen eigenen Augen gesehen haben will. Vielleicht, setzt er hinzu, war der Saame einer Kröte mit dem Wasser in die Häute des Halses gedrungen und hatte zur Erzeugung dieses Thiers Anlaß gegeben. Allein blos durch die Cirkulation hätte die Absetzung eines solchen Kröteneyes nicht statt finden können.

2. Frösche im Magen, Darmkanale, in den weiblichen Geburtstheilen und äusserlichen Geschwülsten.

Alexander, von Fröschen, die mit der monatlichen Reinigung abgegangen sind; in den Abh. d. k. A. der Nf. Th. XIV. S. 352.

Borelli Hist. et Obs. Cent. II. Obs. 86.

Hoechstättin, C. F. Obs. de femina per 15 annos ex ingenti copia ranarum vivarum corpore contentarum, aegrotante. Rotemburgi 1735.

Isibordus von grünen Fröschen in einer Ge-

schwulst; in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. XIV. S. 330.

Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich 1718 in den drey Wintermonaten in Schlesien begeben. Versuch III. Breslau 1719. 4. S. 695. Vers. XXII. S. 570. Von eingesoffenem Froschlaich und denen hierauf durch den Stuhl, ja per uterum abgegangenen Fröschen.

Im dritten Versuch der Breslauischen Sammlungen liest man folgende Beobachtung: Eine Frau klagte geraume Zeit über Kopfwegh, Übligkeit und saueres Auf-

stossen und brach nach einem genommenen Brechmittel eine Menge Schleim und Unreinigkeiten und mit diesen zwey lebendige Frösche mittelmässiger Grösse weg. Diese schwammen gleich anderen Fröschen, sobald sie ins Wasser geworfen wurden, blieben aber darinnen nur sechs Stunden am Leben. Die Ursache dieser Froschkrankheit wird dem häufigen Genuß der Salatkräuter zugeschrieben, mit welchen wahrscheinlich etwas Froschlaich verschluckt worden ist.

Ferner kommt im zwey und zwanzigsten Versuch eben dieser Sammlungen folgende Geschichte vor. Eine arme Witwe von sieben und sechzig Jahren gieng vor ungefehr siebenzehn bis achtzehn Jahren bey grosser Hitze zur Erndtezeit aufs Feld, um Ähren zu sammeln. Vom Durste gequält trank sie aus einer Pfütze, bemerkte aber gleich, daß sie etwas Schleimichtes mit verschluckt hatte. Sie verspürte bald Übligheit, hielt diese aber für Mutterbeschwehung und suchte sich durch einige Löffel voll Brandwein zu helfen. Nach einiger Zeit überfiel sie ein entsetzlicher Schmerz in der linken Seite, mit der Empfindung als ob alles lebendig wäre. Dieser Schmerz nam so sehr überhand, daß sie gänzlich von Sinnen kam und viele ungereimte Dinge vornam. Hierauf erfolgte Entkräftung und Todtenschwäche. Doch erhohlte sie sich nach und nach wieder, nur der Schmerz in der linken Seite hielt immer noch an, so daß sie nicht darauf liegen konnte. Auch schwoß diese Seite öfters auf und sie fühlte darinnen ein Wimmeln und Herumkriechen. Mit der Leibesöffnung gieng öfters Blut mit Drang und Brennen fort. In diesem Elende brachte sie viele Jahre zu. Endlich wurde der Schmerz so außerordentlich heftig, daß sie vor Wuth die Nägel, ja das Fleisch von den Fingern an den Wänden wegscharrete und wegrieb. Man hielt das Übel immer noch für Mutterbeschwerden, verordnete Bäder, welche viele Erleichterung zu verschaffen schienen. Nach zwey Jahren fühlte sie in der linken Seite wieder ein Geräusch, als wenn Materie daselbst verschlossen wäre, und aus den Geburtstheilen floß eine Gauche. Sie hatte dabey beständigen Durst, Kopfweh, Verstopfung und Stuhlzwang und eine so starke Heischerkeit, daß sie einige Wochen lang kein lautes Wort sprechen konnte. Man hielt sie nun für venerisch, gab zur Minderung der Heischerkeit eine Mischung von Mandelöl, Syrup etc., worauf der Schmerz im Unterleibe sich wieder vermehrte und ausser der linken Seite, auch die rechte schwoß. Der fortgesetzte Gebrauch des Mandelöls bewirkte immer Grimmen, Wimmeln und entsetzliches Nagen im Unterleibe und nach und nach eine laxirende Öffnung, wobey zwey lebendige Frösche und bald darauf noch zwey abgiengen. Nach zwey Tagen aber wurden die Schmerzen unerträglich. Es wurde nun ein Wurmmittel

mittel und darauf ein abführendes Mittel gegeben, worauf nach und nach sechs Frösche und in der Nacht noch drey aus den Geburtstheilen ihren Abgang namen. Hierauf wurde wieder Mandelöl gebraucht. Die Schmerzen vermehrten sich wieder und von dieser Zeit an wurden immer um den dritten oder vierten Tag zwey bis drey mittelmässige Frösche ausgeleeret. Ein abermals gegebenes Abführungsmittel führte wohl noch eine halbe Maas Laich ab und hierauf erst genoß sie die vollkommenste Ruhe mit der Befreyung von allen Schmerzen. Viele Menschen versicherten sich von der Gewisheit dieser Sache durch den Besuch der Kranken.

Auch *Alexander* erzählt, daß im Jahre 1203 ein Mädchen von sechzehn Jahren, welche geraume Zeit über Schmerzen in der Gebärmutter geklagt hatte, endlich durch den Abgang eilf kleiner Frösche mit der Reinigung, davon befreyet worden sey.

Beyspiele von Fröschen in Geschwülsten findet man bey *Borellus* und *Isibordus*. Der ältere Trefort, schreibt ersterer Autor, wurde zu einem Kaufmannsungen gerufen, der an einer sehr schmerzhaften und grossen Geschwulst des linken Schenkels litt. Bey Öffnung derselben kamen nebst einer Menge Eiter, auch kleine Frösche, Haare u. s. w. zum Vorschein. Und *Isibordus* meldet: im Jahre 1067 wurde Gotschalk von Wittorp von einer Geschwulst unter der linken Brustwarze sehr lange geplagt. Endlich ließ er sich dieselbe auf Befehl des Prälaten Saracho aufschneiden, und da kamen zwey kleine, vollkommen grüne Frösche, welche nacheinander auf den Tisch sprangen, an welchem der Kranke saß, nebst vieler Materie heraus.

3. Eidexen im Magen und Darmkanale.

Anino, C. Osservazione di due Lucertole aquatiche o Salamandre, uscite dal basso ventre di un Fanciullo di Tortona. Torino 1762.

Batigné, in Nouveaux Mem. de l'Acad. des Scienc. de Berl. Anno 1770. p. 40 und in den Berlinischen Sammlungen B. III. S. 269.

Brückmanns Beobachtungen von verschluckten Eidexen, in Baldingers neuen Magaz. B. VI. St. 2. S. 140.

Monti (Ignatio) dialoghi ameni e critici, Pavia 1764. Dialog. I, le Lucertole aquatiche.

Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hiezu gehörigen Kunst- und Litteraturgeschichten. Versuch XIX. S. 301. von Insekten im menschlichen Leibe, besonders von weggebrochenen Eidexen.

Vesti, Jul. Observat. IX.

Zwinger, J. R. in Act. Helv. Vol. I. Basil. 1751. 4. p. 22. Lacertum aquaticum vivum a puella quadam per alvum redditum, post gravia pathemata convulsiva.

Festi wurde zu einem Weibe gerufen, die unerträgliche Schmerzen unter den kurzen Ribben hatte, und von welcher acht Tage zuvor eine lebendige Eidexe abgegangen war. Die Schmerzen legten sich auf Wurmmittel und das Weib sah bald einen Fuß, bald ein anderes Stück eines gleichen Thiers von sich getrieben. Eben so versichert *Zwinger*, daß von einem zwölfjährigen Bauermädchen eine lebendige Wassereidexe gegangen sey.

In den Breslauischen Sammlungen findet man folgende Geschichte: Die Frau eines Zimmermanns in dem zwey Meilen von Leipzig entlegenen Marktflecken Röthe hatte die Epilepsie und klagte öfters über Kneipen im Magen und Unterleibe, welches sich auf den Genuß saurerer Speisen und Getränke verminderte. Am besten befand sie sich, wenn sie süßen Quark aß. Im Jahre 1722 trank sie junges süßes Bier und hierauf kroch ihr eine Eidexe den Hals hinauf und veranlafte durch den Kützel ein Erbrechen, womit sie auch ausgeworfen wurde. Einige Zeit hernach brach sie noch zwey Eidexen aus und behauptete, daß sie noch mehrere im Leibe haben müsse, weil sie öfters, wenn sie etwas Saures geniesse, ein Kriechen im Halse, ein Zurückfallen und Quatschen bemerke. Der Erzähler hat die weggebrochene Eidexe zugleich in einer Abbildung beygefügt.

Nach *Rösler's* Erzählung hatte ein Müller von der Zeit an, wo er Breslauer Bier getrunken, ein Reissen und Beissen im Unterleibe gespürt, gegen welches ihm Milch und andere süße Sachen zwar Erleichterung, aber keine bleibende Hülfe verschafften. Endlich nam er Theriak mit Brandwein, gab hierauf eine sehr lange Eidexe durch Erbrechen und eine andere durch den Stuhlgang von sich und wurde sodann völlig wieder gesund. Der Erzähler glaubt, daß die Fuhrleute welche das Bier über Land gefahren, von demselben getrunken und hernach das Faß mit Wasser, worinnen Eidexenbrut war, wieder aufgefüllt haben.

Monti liefert die Krankengeschichte und Leichenöffnung eines Knaben, dem zwey Salamander mit dem Stuhlgange abgegangen waren.

Zu den Ereignissen ähnlicher Art in den neusten Zeiten gehören die von *Batigné* und *Brückmann* aufgezeichneten Fälle. *Batigné*, Arzt bey der französischen Kolonie in Berlin, hatte der dasigen Königl. Akademie der Wissenschaften ein schriftliches *Memoire* überreicht, welches den sechsten Sept. 1770 in ihrer ordentlichen Versammlung vorgelesen wurde. In dieser Abhandlung wird die durch hinlängliche Zeugnisse bestätigte Geschichte eines Bauern, Namens Anton Bermond, aus dem Kirchspengel von Toulouse erzählt, der nach einem genommenen

nen Brechmittel, eine Menge Wassereidexen von verschiedener Grösse, theils lebendig, theils todt, zu verschiedenen Malen von sich gegeben hat. Er war ohngefähr fünf und dreissig Jahre alt, von Natur gesund und stark, und wußte sich zu entsinnen, daß er einige Jahre vorher, bey einem unüberwindlichen Durst, aus einem Sumpfe getrunken, wo sich Eidexen aufhielten. Diese Thiere hatten sich in seinem Magen, wo man sie oft schreyen hörte, merklich vermehrt und eine Menge Eyer gelegt. Dadurch wurde unvermerkt eine so heftige Ausdehnung des Magens verursacht, daß der Kranke oft in Ohnmacht fiel, woraus er bloß durch reines Wasser zu ermuntern war: denn die Salamander befanden sich sodann in ihrem Elemente. Alle geistige Flüssigkeiten vergrösserten seine Angst. Der arme Leidende wußte nicht, was er von seinem Zustande, der sich täglich verschlimmerte, denken sollte, und rufte daher den Wundarzt Railhol zu Auriak zu Hülfe. Dieser gab ihm ein wurmtreibendes Brechmittel, wodurch sogleich ein Theil der vorrätigen Salamander abgieng, und so wurden in einigen Monathen zu wiederholten Malen achtzig Salamander, wovon die meisten noch ganz klein waren, nebst einer Menge Laich, Unreinigkeit und Stücken Haut von oben und unten abgetrieben. *Betigné* ist selbst an dem Ort gewesen, diese ausserordentliche Begebenheit zu untersuchen und ist durch den Augenschein von ihrer Richtigkeit aufs zuverlässigste überzeugt worden. Die zwey grössten von dem Bauer ausgeworfenen Wassereidexen hat er selbst im Weingeist aufbewahrt, und was er nicht selbst gesehen, durch glaubwürdige Zeugnisse bestätigt. Er beweiset zugleich die Möglichkeit dieser merkwürdigen Geschichte durch Gründe, welche aus einer gesunden Naturlehre hergenommen sind, und zeigt, daß man Unrecht hat, diejenigen Begebenheiten für Erdichtungen zu halten, welche so nachdrücklich, als die gegenwärtige bestätigt sind. Er erinnert aber auch am Ende seiner Abhandlung, durch Anführung eines andern sonderbaren Falls, daß man nicht ohne Unterschied allen Begebenheiten Glauben beymessen kann, welche nur den Schein der Wahrheit haben und den angenommenen Gesetzen der Natur ganz zuwider sind.

Brückmanns ebenfalls das Gepräge der Wahrheit tragende Beobachtungen sind folgende: Der Compagniechirurgus Zinn zu Wolfenbüttel hatte beynahe ein Jahr lang nach geendigem Feldzuge 1762, beständig Magenbeschwerden, öftere Koliken und ausserordentliche Schmerzen in ganzem Unterleibe, nebst Heißhunger. Der natürliche Abgang durch den Stuhl war jederzeit pechschwarz. Nur selten
lies-

liessen die Schmerzen dem Patienten eine kurze Zeit Ruhe, und die beständige Klage war über ein Kratzen im Magen, welches ihn oft so marterte, daß er laut schrie und vor Angst an die Wände hinauf kriechen wollte. Das einzige Mittel, wodurch er sich einige Hülfe verschaffte, war eine starke Portion Wein. Alle Mittel gegen solche Beschwerden wurden angewandt, ausser Brechmittel. Er zehrte aber immer mehr ab und starb endlich unter vielen Schmerzen. Ein besonderer Zufall ereignete sich jezt nach des Patienten Tode. Als seine Frau ihm das Sterbehemde anziehen wollte, bemerkte sie ein Auf- und Niederbewegen des Unterleibes. Sie erschrack darüber und eilte zum D. Kaiser, welcher ebenfalls abwechselnd eine Bewegung des Unterleibes und bisweilen ein Stossen in der Gegend des Magens wahrnam. Ein Chirurgus wurde noch dazu geholt, welcher den Unterleib öffnen mußte. Sobald der Magen durchschnitten war, entdeckte man eine lebendige Eidexe von gewöhnlicher Grösse, welche der Kranke wahrseheinlich mit dem Getränke, (vermuthlich zur Zeit der Campagne aus einer Pfütze) da dieselbe noch ziemlich jung war und mithin beym Schlucken nicht bemerkt werden konnte, mit verschluckt hatte. Der Wein gab wohl deswegen auf einige Zeit Linderung, weil das Thier dadurch gleichsam betrunken gemacht wurde.

„Der zweyte Fall, welchen *Brückmann* erzehlt, betrifft einen Grenadier, der die üble Gewohnheit hatte, öfters aus dem Gliede zu treten, aus den Pfützen seinen Hut mit Wasser zu füllen und eiligst zu trinken. Eines Morgens klagte er sehr über Übligkeith und über Kriechen im Magen. Es wurden verschiedene Mittel, und endlich ein Brechmittel angewandt. Lezteres warf eine Menge Schleim aus, wobey der Kerl sehr schrie, weil er etwas Unangenehmes im Munde fühlen mochte. Wirklich kroch aus einem dicken Klumpen zähen Schleims eine Eidexe hervor. Vermuthlich war sie noch sehr jung und vielleicht erst aus dem Eye gekrochen, als sie der Patient verschluckte: denn einige Monathe hatte er beständig geklagt und nachher wurde er völlig gesund.“

4. Schlangen im Magen, Darmkanale und im Herzen.

Borelli, P. Hist. et Obs. medico-phys. Francof. 1670. Cent. I. Obs. 23. Serpens a puero per anum ejectus, et Cent. III. Obs. 31. Serpens ejectus ab ore hominis.

Frommann, J. Chr. von einer Frau, welche eine lebendige Schlange durch den Hintern von sich gab; in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. VI. S. 305.

Gesneri, C. Hist. animal. L. II. C. de Lacert.
Nov. Liter. Mar. Balt. An. 1700. April. p. 100.

Severini, M. A. de abscessuum recondita natura, p. 1281.

Wolf, J. von einer kleinen Schlange, die von einem Mädchen, durch den Stuhlgang weggegangen, nachdem sie von ungefähr Mithridat eingenommen hatte; in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. XIX. S. 152.

Conrad Gesner will im Magen einer Frau zwey lebendige junge Schlangen gefunden haben. Auch erzählt er die abentheuerliche Geschichte, daß in der Stadt Zisca in Ungarn, im Jahre 1551 bey nahe 3000 Menschen an unerträglichen Schmerzen gestorben sind, welche durch Schlangen und Eidexen in ihrem Magen erregt wurden. Wenn diese Unglücklichen an der Sonne schliefen; so krochen diese Thiere oft bis über den Kopf aus dem Munde, zogen sich aber zurück, sobald man sie ergreifen wollte.

Nach *Borellus* ist von einem Knaben, welcher ausserordentlich am Stuhlgang litte, endlich eine Fingersdicke und zehn Zoll lange Schlange abgegangen, und von einem Manne, der so heftige Koliken hatte, daß er sich auf der Erde herumkrümmte, endlich eine grosse Schlange ausgebrochen worden.

Wolfs vermeinte Schlange kroch dem Kinde von freyen Stücken aus dem After, war über eine Viertelelle lang und so dick, als zwey Spulwürmer. Seine Beschreibung ist übrigens so dunkel, daß sich nicht bestimmen läßt, ob es eine Schlange oder ein dicker Spulwurm war?

Eben so viel Ungewißheit liegt in *Frommanns* Erzählung von einer sechs und zwanzig jährigen Frau, welche mit Koliken, epileptischen Anfällen, Erbrechen, Unrichtigkeiten in der Reinigung und allerley hysterischen Beschwerden geplagt war, in ihrem gesunden Zustand öfters sehr fest auf dem Strohe mit offenem Munde schlief und die Bewegung eines kriechenden Thiers und ein Saugen im Leibe empfand. Auch wollte dieses Thier öfters zum Hals heraus und drohte Erstickung. Sie erhielt auf den wiederholten Gebrauch drastischer Laxanzen in der Nacht um ein Uhr Öffnung in der Küche mit vieler Erleichterung. Als sie nachher wieder in die Küche gieng, fühlte sie, daß sie mit den Füßen an etwas Kaltes stieß. Sie untersuchte, was es wäre, und fand eine sehr dicke und einer Ellen lange, blaue Schlange zusammengewickelt vor sich auf dem Boden, die sich aber bald verkroch, so daß sie der herbeygerufene *Frommann* nicht mehr zu Gesichte bekam.

Die *Nov. Liter. Mar. Balt.* enthalten folgende Nachricht: Einer Frau unweit Dantzig wurde zur Vertreibung des Fiebers gerathen, in den nächsten Wald zu laufen, wo sie aber gleichwohl von demselben befallen wurde, sich niederlegte

legte und einschlief. Hier soll ihr nun im Schlafe eine trächlige Schlange durch den Mund in den Magen gekrochen seyn, wogegen sie sich des Quecksilbers mit Zucker und Butter in warmen Biere bediente. Dieses bewirkte noch den Abgang von zehen jungen lebendigen Schlangen, die nachherige Anwendung des *Decocti Rad. Fraxini* aber, daß auch die alte Schlange nebst noch mehreren Jungen todt stückweis von ihr gieng.

Von Schlangen im Herzen führt *Severinus* ein Beyspiel an. Ein gewisser Doktor *May* soll nemlich in der linken Herzkammer eines Edelmanns, der im Jahre 1639 in London starb, eine Schlange gefunden haben.

5. Einige andere Thiere, welche aus dem menschlichen Körper abgegangen seyn sollen.

Baldingers neues Magaz. B. II. St. 3. S. 348.
unerwartete Wirkung des Maywurms (*Proscarabaeus*,
Meloe maialis L.)

Borelli Hist. et Obs. C. 1. Obs. 9.

Ledel, von einer lebendigen Maus in einem Menschen, in den Abh. d. k. A. d. Nf. Th. IX. S. 196.

Rayger, C. von einem Knaben, der einen jun-

gen Hund durch den Stuhl von sich gab, ebendas. Th. VIII. S. 87.

Schmid, J. von einer Frau, welche einen Maulwurf durch Erbrechen von sich gegeben, ebendas. Th. VIII. S. 137.

Thümmigs merkw. Begebenh. in der Nat. Marburg 1735. S. 206.

Die Natur der Amphibien widersprach nicht der Möglichkeit in den menschlichen Körper zugelangen und sich in denselben zu erhalten; von Fischen, Maulwürfen, Mäusen, jungen Hunden u. s. w. ist aber weder das eine, noch das andere gedenkbar, so sehr auch die Autoren sich für die Gewißheit ihrer gelieferten Beobachtungen verbürgen mögen. Die dem *Borellus* von einem Arzte mitgetheilte Geschichte gehört daher sicher unter die Erdichtungen. Eine adeliche Dame klagte nemlich lange Zeit über Magenschmerzen und konnte durch kein Mittel Linderung erhalten, bis sie endlich durchs Brechen einen vier Zoll langen Fisch auswarf. Dieses Faktum, sezt er hinzu, ist zuverlässig und von mehreren Ärzten bestätigt worden. Wahrscheinlich, glaubt er, sey dieser Fisch überaus klein mit dem Wasser verschluckt worden und erst im Magen gewachsen, da es ihm selbst begegnet, daß er einmal, als er trinken wollte, in seinem Becher kleine Fische wahrgenommen habe. Völlig lächerlich sind vollends *Thümmigs* Erzählung von einem moskowitischen Herrn, der einen jungen Hund durch den Mund, und *Raygers* noch durch ein Paar fremde Geschichten und durch eine of-

fen-

fenbar erdichtete Abbildung glaublich gemachte Wahrnehmung von einem Kna-
ben, der ebenfalls einen jungen Hund durch den After von sich gegeben haben
soll. Von gleichem Gehalt sind *Ledels* und *Schmids* Wahrnehmungen, nach wel-
chen einer Frau im Schlafe ein Maulwurf in den Hals gekrochen und erst nach
funfzehn Jahren noch lebendig ausgebrochen worden und einem Bauern eine vor
neun Monathen in den Hals gekrochene Maus, nach seinem Tode wieder aus dem
After gekrochen seyn soll. Auch die in Baldingers Magazin vorkommende neuere
Beobachtung ist nicht frey von dem Verdachte der Erdichtung. „Ein Mann,
schreibt der ungenannte Beobachter, der an heftigen Schmerzen in beyden Augen
und im Vorderkopfe litte, wobey er abzehrte, nam auf Anrathen einen halben May-
wurm. Drey Stunden hernach klagte er über einen heftigen Trieb zum Urinlas-
sen, der mit so heftigem Schmerz begleitet war, daß er alles Gefühl verlor. Als
er wieder zu sich kam, fand man, daß ein Thier von ihm gegangen, welches
wie eine neugeborne nackende Maus aussah, vier Beine und einen Schwanz, am
Kopfe zwey schwarze Tüpfchen hatte und so groß wie eine Biene gewesen ist. Bin-
nen einer Stunde giengen ihm noch vier dergleichen ab, welche dem erstern voll-
kommen gleich waren. Seine Schmerzen ließen noch demselben Tag etwas, den
folgenden aber ganz nach.“

Mehrere Nachrichten von Fischen, Spitzmäusen, Maulwürfen, jungen Hun-
den, Katzen, Fröschen, Kröten, Würmern, Raupen, Spinnen, Käfern und ande-
ren ungewöhnlichen Bewohnern des menschlichen Körpers, liefern:

Donatus, Marc. de Med. Hist. mirabil. IV. C. 26.
Grundig, Samml. von Obersachs. B. IV. S. 473.
von Erzeug. der Frösche und Insekten im menschl.
Körper.

Lentilius, R. Miscell. med. pract. P. I. p. 81.
Merklin, G. A. Tract. phys. med. de Incantamen-
tis, Norimb. 1715. Cas. 1 et 49.
Schenklius, Observat. medicinal. Lib. III. p. 416.

Ihre Glaubwürdigkeit verliert aber durch das Zeitalter, in welchem sie ge-
lebt und ihre Beobachtungen niedergeschrieben haben.

So wäre denn kein Theil des menschlichen Körpers, der nach der Zusam-
menstellung aller angeführten Beobachtungen und Erfahrungen nicht mit einhei-
mischen oder fremden, beschwerlichen und gefährlichen Gästen belästigt wor-
den wäre. Die Haut und die Haare, das Zellengewebe, das Fett, die Muskeln,
das Herz, die Blut- und Saugadern, die Augen die Ohren, die Nase, der Mund,
die Zähne, die Zunge, die Stirnhöhlen und das Gehirn, die Luftröhre und Lun-
gen, die Häute, welche die Eingeweide umkleiden und alle übrige Eingeweide
selbst

selbst, vorzüglich der Magen, Darmkanal und die Harnwege, ferner die Brüste, die männlichen und weiblichen Geschlechtstheile, verschiedene Säfte und Feuchtigkeiten, der Zahnschmutz, die Thränenfeuchtigkeit, das Ohrenschmalz, der Speichel, der männliche Saame und sogar verschiedene Geschwüre, Geschwülste und Ausschläge gaben einem Heere von den verschiedensten Insekten- und Würmerarten, und wahrscheinlich auch Amphibien, Aufenthalt und Nahrung, welches, wie mir scheint, genugsam das Unternehmen rechtfertigen kann, den Einfluß der Entomologie und Helminthologie auf den menschlichen Körper einer umständlichen Erläuterung gewürdigt zu haben.

Erklärung der Kupfertafeln des zweyten Bandes.

Tabula I.

- Fig. 1. Der Hautwurm (*Filaria medinensis*) *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende.
 — 2. Der Fadenwurm (*Gordius aquaticus*).
 — 3. Der medicinische Blutigel (*Hirudo medicinalis*) von der Rückenseite, *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende.
 — 4. Eben dieser Blutigel von der Bauchseite, *a.* der geöffnete Mund, *b.* der Absatz.
 — 5. Die geschlossenen Mundlippen desselben Blutigels.
 — 6. Der Haarschwanz (*Trichocephalus hominis*) in natürlicher Grösse, *a. b.* der dicke Theil desselben, *b. c.* das Schwanzende.
 — 7. Derselbe Wurm etwas vergrößert, *a. b.* der Saugrüssel.
 — 8. Das Kopfende dieses Wurms in einer starken Vergrößerung, *a. b.* der Saugrüssel, *c.* der Nahrungskanal, *d. e.* der Eyerstock, oder das Organ der Fortpflanzung.
 — 9. Ein durchs zusammengesetzte Mikroskop vergrößerter Haarschwanz, *a. b.* der Saugrüssel, *a. c.* der Körper, *d.* der Nahrungskanal, *f. f.* der Zeugungskanal, *c.* die gemeinschaftliche Öffnung beyder Kanäle, *c. e.* der haarförmige Schwanz.
 — 10. Das aufgeschnittene, stark vergrößerte hintere Ende des Haarschwanzkörpers, worinnen *a. b.* das Ende des Nahrungskanals und *c. d.* das Ende des Zeugungskanals sichtbar sind.
 — 11. Ein verkleinert vorgestelltes, von Spulwürmern durchbohrtes Darmstück aus dem Leichname einer alten Frau, *a.* ein Theil des gewundenen Darms (*intestinum ileum*) *b.* der Blinddarm (*intest. coecum*) *e.* der aufsteigende Grimmdarm (*intest. colon ascendens*) *d. d. e.* drey Bänder, welche die wurmförmigen Fortsätze (*Processus vermiformes*) genannt werden, *g.* ein Loch, aus welchem ein Spulwurm heraus hängt, *k.* ein anderes ebenfalls von einem Spulwurme gemachtes Loch.

Tabula II.

- Fig. 1. Ein Afterwurm (*Ascaris vermicularis*) in natürlicher Grösse, *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende.
 — 2. Der durchs Mikroskop gezeichnete weibliche Afterwurm, *a.* die drey Saugwärtchen des Kopfs, *b. c.* die zwey Backenblasen, *d.* der dickste Theil der Speiseröhre, *e.* der Magen, *f. g.* das weibliche Zeugungsorgan, *g. h.* das unter und zwischen dem weiblichen Zeugungsorgane wieder zum Vorschein kommende Ende des Nahrungskanals, *i.* die Schwanzspitze des Wurms, *l. k.* der weibliche Geschlechtsgang, *k.* die zwischen zwey kleinen Hervorragungen befindliche Mündung dieses Gangs.

- Fig. 3. Ein vergrössertes gepresstes Stückchen Haut des zerdrückten Wurms mit Gözischen Embryonen oder vielmehr Eiern.
- 4. Ein solches Ey stark vergrössert.
 - 5. Der vergrösserte männliche Afterwurm, *a.* die Saugwärzchen, *b. c.* die Backenblasen von unten, *d.* der Magen, *e. f.* eine zweyte Erweiterung des Nahrungskanals, oder ein zweyter Magen, *f. g.* das Zeugungsorgan, *g. i.* ein Ausführungsgang, *h.* die Mündung dieses Ausführungsgangs, *k. l.* die schmale Fortsetzung des Nahrungskanals, *l. m.* die Schwanzspitze.
 - 6. Ein Spulwurmweibchen (*Ascaris lumbricoides*) von einem fünfjährigen Knaben in natürlicher Grösse mit den durch seine Haut schimmernden Nahrungskanale und Geschlechtsorganen, *a.* der mit drey Wärzchen versehene Kopf, *b.* die eichelförmige Schwanzspitze, *c. d. e.* die Seitenlinien oder Bänder, von welchen hier nur drey sichtbar sind.
 - 7. Der vergrösserte Kopf nebst den ersten Ringen des Spulwurms von vorne, *a. a. a. a.* der Anfang der vier bis zum Schwanzende fortlaufenden Seitenbänder, *b.* die Kopfwärzchen.
 - 8. Das vergrösserte Schwanzende des Spulwurms, *a.* eine kleine Erhabenheit, unter welcher sich der After befindet, *b.* die Schwanzspitze.
 - 9. Der seiner ganzen Länge nach aufgeschnittene und mit Nadeln befestigte weibliche Spulwurm, *a. a. a. a.* die von beyden Seiten zurückgelegte Haut, *b. b. b.* die Ringe dieser Haut, *c.* die drey klappenförmigen Kneipzangen des Kopfs, *c. d.* der Magenschlund, *d. e.* der Magen, *e. f.* der Darmkanal, dessen mittlerer Theil, *e. g.* durch die umherliegenden Eyerleiter bedeckt ist, *h. h.* das unter dem Nahrungskanale liegende weisse Gefäß, *i.* der Anfang des Eyergangs, *k.* der Anfang des zweyhörnichten Uterus, *l.* die Verwicklungen der Eyerleiter.
 - 10. Die weiblichen Geschlechtstheile ausser ihrer Lage vergrössert vorgestellt, *a.* die Öffnung des Eyergangs oder der Mutterscheide, *b. b.* die anfangenden Hörner des Uterus, *c. c. c. c. c. c.* die verschiedenen Eyerlagen in den Hörnern des Uterus, *d. d.* die Enden dieser Hörner, *e. e.* die geschlängelten Eyerleiter, *f. f.* die feinen Fäden, in welchen sich die Enden der Eyerleiter theilen.
 - 11. Verschiedene durchs Mikroskop gezeichnete Eyer aus den Eyerlagen, *a. a.* ganz runde, *b. b.* länglichtrunde Eyer, in deren Mitte der kleine spiralförmige Faden oder Keim des künftigen Wurms sichtbar ist.
 - 12. Der aufgeschnittene männliche Spulwurm, *a.* die drey Klappen des Kopfs, *a. b.* der Magenschlund, *b. c.* der Magen, *c. d. d.* der Darmkanal, *e.* das weisse Gefäß, *f.* das männliche Glied, *g. h.* das Samenbläschen, *i. i. i.* die Samengefässe.
 - 13. Die männlichen Geschlechtsorgane des Spulwurms ausser ihrer Lage, *a. b.* das männliche Glied, *b. c.* das Samenbläschen, *c. d.* die Samengefässe.

Tabula III.

- Fig. 1. Ein Klümpchen Schleim aus dem menschlichen Darmkanale, welches einige Eyer des langgliedrichtigen Bandwurms (*Taenia Solium*) enthält, *a.* eins der kleinsten, *b.* eins der grössten dieser Eyer.
- 2. Der Kopf und eine Reihe der ersten und kleinsten Glieder desselben Bandwurms in natürlicher Grösse von der Seite, *a.* der Saugsüssel, *b. b.* die zwey Seitenwärzchen des Kopfs.

Fig.

- Fig. 3. Derselbe Kopf in natürlicher Grösse von vorne, *a.* der Saugrüssel, *b. b. b. b.* die vier Seitenwärtchen des Kopfs.
- 4. Ein Seitenwärtchen des Kopfs in natürlicher Grösse.
 - 5. Eben dieses Seitenwärtchen vergrössert, *a.* die sternförmige Mündung.
 - 6. Dasselbe Seitenwärtchen von der Seite vergrössert dargestellt, *a.* die sternförmige Mündung des Seitenkanals, *b.* das konische in den Seitenkanal übergehende Ende dieses Wärtchens.
 - 7. Der etwas vergrösserte Kopf (Fig. 3) von vorne, *b.* der Saugrüssel, *b. b. b.* die Seitenwärtchen *c. c.* die ersten sich an den Kopf anschliessenden Glieder.
 - 8. Der von der Seite stark vergrösserte Kopf *a.* der durch den Druck des Pressschiebers platt gewordene Saugrüssel mit den spitzigen Blasenenden, *b. b.* die Seitenwärtchen des Kopfs mit ihrer runzlichten Mündung, *c. c.* die Seitenkanäle, als die Fortsetzungen jener Mündungen, *d.* der vom Saugrüssel seinen Anfang nemende mittlere Kanal.
 - 9. Ein Umriss des vergrösserten Kopfs von vorne, an welchem von der einem Seite *a. a.* die an ihrem Umkreiß kurzfasrigen Seitenwärtchen, in der Mitte aber *b.* der dreyzehn Strahlen bildende Saugrüssel sichtbar sind, *c.* der innere Kreis, von welchem die strahlenförmig auslaufenden Saugröhrchen entstehen, *d.* der äussere Kreis der von dieser Seite freyen Enden der Saugröhrchen, *e. e. e.* schwarze, am Ende der weissen Zwischenräume zu bemerkende Punkte, welche die Mündungen der in diesen Zwischenräumen tiefer liegenden Saugröhrchen zu seyn scheinen, *f. f. f.* schwarze Punkte, welche wahrscheinlich Mündungen der in den schwarzen Zwischenräumen höher liegenden Saugröhrchen sind.
 - 10. Der Kopf in der Lage Fig. 2. durchs Mikroskop gezeichnet, *a.* der stumpfe hervorragende Theil des Saugrüssels, *b. b.* der vordere Kreis der spitzigen Blasenenden, *c. c.* der hintere Kreis dieser Blasenenden, *d. d.* die Seitenwärtchen des Kopfs, *e. f.* einige Halsglieder.
 - 11. Eine einzelne Blasenende oder Blasenhülle stark vergrössert, *a.* das befestigte, *b.* das freye Ende, *c.* die runde Aushöhlung, welche das Bläschen aufnimmt.
 - 12. Der vergrösserte von den Blasenenden entblößte Kopf, *a. a. a.* der freye, hervorragende Theil des Saugrüssels, *b. b.* die erste Blasenreihe mit der in der Mitte jedes Bläsgens befindlichen Mündung der Saugröhre, *c. c.* die erste Reihe der Blasenstiele, oder der in die Bläschen gehenden Saugröhrchen selbst, *d. d.* die zweyte Blasenreihe, *e. e.* die zweyte Reihe der Blasenstiele, *f. f.* die zwey Seitenwärtchen des Kopfs, *g. h.* die ersten Glieder am Halse des Bandwurms.
 - 13. Der langgliedrichte Bandwurm selbst mit seinen, aus Mangel des Raums abgekürzten Gliederreihen, *a. b.* der Kopf mit der ersten, etwann eine Elle betragenden Strecke kurzer Glieder, 1. Der Saugrüssel, 2. 2. die zwey Seitenwärtchen des Kopfs, *b. c.* die zweyte Strecke mehr entwickelter Glieder, 3. 3. der mit seinen Ästchen schon sichtbare mittlere Kanal, 4. 4. der wie eine Linie erscheinende Seitenkanal, *c. d.* die dritte Gliederreihe, in welcher die Verästungen des mittleren Kanals sich vermehren, *d. e.* die vierte Gliederreihe mit den immer zahlreicher werdenden Ästchen des mittleren Kanals, den mehr sichtbaren, bald die eine, bald die andere Seite besetzenden Randwärtchen der Glieder, und dem schreglaufenden Gang dieser Wärtchen gegen den mittleren Kanal, *e. f.* die fünfte Gliederstrecke, in welcher die Vervielfältigung der Ästchen und die

die Stärke der Seitenkanäle immer bemerkbarer wird, *f. g.* die sechste und breiteste Gliederstrecke, in welcher die verschiedenen organischen Theile jedes Glieds am meisten in die Augen fallen, 3. 3. der mittlere Kanal, 4. 4. 4. die zwey Seitenkanäle, 5. 5. die Randwärtchen der Glieder, *g. h.* die siebente, an Breite ab- und an Länge zunehmende Gliederstrecke, *h. i.* die achte Gliederstrecke, in welcher die Glieder die größte Länge erreicht haben, in Rücksicht der Breite aber sich wieder der fünften nähern, 3. 3. der mittlere Kanal, 4. 4. die Seitenkanäle, 5. 5. 5. die Randwärtchen der Glieder. 6. 6. die zahlreichsten Verästungen und Einmündungen des mittleren Kanals, 7. die Vereinigung seiner Ästchen mit den Seitenkanälen, 8. 8. 8. 8. der untere, breitere Theil jedes Glieds, welcher über das folgende Glied immer etwas vorspringt, *i. k.* die neunte, oder Endstrecke des langgliedrichten Bandwurms, 9. das ovalrund abgestumpfte Schwanzende, dessen Spitze der mittlere Kanal nicht gar erreicht.

- 14. Der bey *a.* bemerkte Zusammenhang des mittleren Kanals und der Seitenkanäle zweyer in ihrer Verbindung auseinander gezogner Glieder.
- 15. Der stark vergrößerte Seitenrand eines Glieds aus der achten Reihe (Fig. 13. *h. i.*) *a. a.* der Seitenkanal, *b. b. b. b.* dessen Spaltung und Umfassung der Randwarzenmündung, *c.* diese Mündung selbst.
- 16. Ein stark vergrößertes Stück eines Glieds aus der achten Reihe (Fig. 13. *h. i.*) mit dem schreglaufenden Gang, *a.* die Randwarze oder die Hervorragung des schreglaufenden Gangs, *b.* die Theilung dieses gemeinschaftlichen Gangs in zwey Gänge, *b. c.* der obere oder männliche Gang, *c.* dessen rundes blasenförmiges Ende, *d. e.* der untere oder weibliche Gang, *f.* dessen breites ungleiches Ende.
- 17. Ein ähnliches stark vergrößertes Stück eines Glieds, an welchem, ausser dem getheilten schreglaufenden Gang, auch der mittlere Kanal mit seinen Ästen und der eine Seitenkanal sichtbar sind, *a. a.* der Seitenkanal, *b.* der trichterförmige Rand in der Gegend der Randwarze, in welchem die Mündung des getheilten schreglaufenden Gangs hervorragt, *c.* das kugelförmige Ende des männlichen Gangs, *d. e.* der gekrümmte weibliche, mit Eyern angefüllte Gang, welcher den mittleren Kanal beynahe erreicht, *g. g.* der mit Eyern versehene mittlere Kanal selbst, *h. h. h. h.* die aus dem mittleren Kanal hervorkommenden Äste, *i. i.* die Einmündungen, oder Vereinigung verschiedener solcher Äste mit einander.

Tabula IV.

- Fig. 1. Der kurzgliedrichte Bandwurm (*Taenia vulgaris*) *a.* der Saugrüssel, *b. b.* die Seitenwärtchen des Kopfs, *c. c.* die von diesen Seitenwärtchen ihren Anfang nehmenden Seitenkanäle, *d. e.* die auf die Halsglieder folgende zweyte Gliederreihe, welche wie die vorhergehende und die folgenden Reihen eine halbe Elle lang ist, *e. f.* die dritte Gliederreihe, *f. g.* die vierte Gliederreihe, *h. h.* ein einzelnes Glied dieser Reihe mit seinen zwey Randknötchen, *g. i.* die fünfte Gliederreihe, *k. k.* zwey Randfältchen dieser fünften Gliederreihe.
- 2. Vier durchs einfache Mikroskop gezeichnete Glieder der zweyten Reihe, *a. a. a. a.* die Seitenkanäle, *b. b.* die in jedem Gliede einander gegenüberstehenden Randwärtchen, deren schreglaufenden Gänge beynahe die Mitte des Glieds erreichen, *c. c.* die kleinen Eyer, welche die schreglaufenden Gänge umgeben.

Fig.

- Fig. 3. Einige durchs einfache Mikroskop betrachtete Glieder der fünften Reihe, *a. a.* der Anfang eines solchen Glieds, *b. b.* das hervorragende Ende desselben, welches das nächste Glied wie in einer Falz aufnimmt, *c. c.* die Randwärtchen mit ihren Mündungen, *d. d. d. d.* die Seitenkanäle.
- 4. Einige durchs zusammengesetzte Mikroskop betrachtete Glieder aus der vierten Reihe, *a. a. a.* der immer über das vorhergehende Glied hervorstehende Rand des breiter gewordenen folgenden Glieds, *b.* die zellige Substanz des Wurms, *c. c. c.* die verschiedenen länglicht-runden Eyer in dieser Substanz.
- 5. Ein breiter Bandwurm (*Taenia lata*), welcher nur drey bis vier Schuh lang war, *a.* der Kopf, *a. b.* die erste Gliederreihe, *b. c.* die zweyte Gliederreihe, *c. d.* die dritte Gliederreihe, *d. e.* die vierte Gliederreihe, *f. f. f. f.* das mittlere Gefäß.
- 6. Die vier durchs Mikroskop betrachteten Kopfwärtchen des breiten Bandwurms, deren mittlerer Theil (*a.*) einwärts gezogen ist und trichterförmig erscheint.
- 7. Ein solches Wärtchen von vorne vorgestellt, *a.* der hier als ein Knöpfchen erscheinende, hervorgetriebene, mittlere Theil desselben.
- 8. Einige der größten, etwas vergrößerten Glieder, *a. b.* das mittlere Gefäß, *c. c.* die Öffnungen des Eyergangs.
- 9. Drey noch stärker vergrößerte Glieder der dritten Gliederreihe, in deren Mitte die Eyerblümchen sichtbar sind, *a.* die Öffnung des Eyergangs im Eyerblümchen, *b. b. b. b.* die Seitenkanäle, *c. c.* die körnichte oder drüsenartige Substanz zur Seite der Seitenkanäle.
- 10. Ein stark vergrößertes Eyerblümchen, nebst *a.* der Öffnung des Eyergangs.

Tabula V.

- Fig. 1. Ein wie ein Herz aussehender Blasenwurmkörper, und *a.* dessen eingezogener Hakenkranz.
- 2. Ein solcher, noch flacher zusammengezogener Körper eines Blasenwurms (*Hydatigena*), *a. b.* zwey Saugblasen und unter diesen ein schwarzer Mittelstrich oder eingezogener Hakenkranz *c.*
- 3. Ein anderer Blasenwurmkörper, den Göze mit einem Becher vergleicht, *a. b.* zwey Saugblasen.
- 4. Noch ein solcher kegelförmiger Körper, *a. b.* zwey Saugblasen, *c.* der Hakenkranz, *d.* das spitzige Ende ohne Öffnung.
- 5. Ein ähnlicher Blasenwurmkörper, *a. b.* die zwey Saugblasen, *c.* der Hakenkranz, *d.* die vertiefte Öffnung am Ende.
- 6. Der vergrößerte Körper eines Blasenwurms vom Göze unter dem Pressschieber vergrößert, *a. b. c. d.* die hier in einer Reihe liegenden vier Saugmündungen, *e.* der doppelte Hakenkranz, *f.* eine Öffnung am Hintertheile.
- 7. Drey vergrößerte, von dem Hakenkranze abgegangene Haken.
- 8. Die innere, etwas entzündete Fläche eines Stückchen mit Blasenwürmern *b. c. d. e.* besetzten Bauchfells *a. a. a.* aus einem wassersüchtigen, weiblichen Kadaver.
- 9. Das durch einen Kreutznchnitt geöffnete Involukrum eines vom Bauchfelle getrennten Eingeweideblasenwurms (*Taenia visceralis Treutleri*), in dessen Mitte der vergrößerte, drey Knötchen bildende Kopf dieses Wurms sichtbar ist.

Fig.

Fig. 10. Eben dieser Blasenwurm von der Seite und noch mehr vergrössert.

- 11. Der bis an die Grundfläche der Blase zurückgezogene Kopf dieses Wurms, welcher die Glieder seines Körpers bedeckt.
- 12. Der Muskelblasenwurm (*Taenia muscularis*) oder die menschliche Finne in ihrer natürlichen Lage zwischen den Muskelfasern, *a. a. a. a.* ein Stück des Brustmuskels, *b. b.* die äussere Blase (*Vesica vaginalis*) welche die Finne enthält, *c.* ein über die Haut der äusseren Blase sich verbreitendes Blutgefäß, *d.* die durch diese Blase durchschimmernde Finne selbst.
- 13. Der von den Muskelfasern getrennte und etwas vergrösserte Blasenwurm, *a. a.* die äussere Blase, *b.* das zu derselben gehende Blutgefäß, *c.* die Finne selbst.
- 14. Eine der grösseren Finnen, welche aus der äusseren Blase herausgenommen worden ist, *a. a.* die getheilte Innenblase (*Vesica caudata*) *b.* die knorplichte Linsenblase (*Capsa lenticularis*).
- 15. Eine Finne, aus deren Linsenblase der Wurm selbst hervorragt, *a.* die knorplichte Linsenblase, *b. b.* die getheilte Innenblase, *c.* die Stelle, wo die beyden Enden dieser Innenblase vereinigt sind, *d.* der Kopf des Wurms mit dem Saugrüssel und zwey Saugwärzchen von der Seite, *e.* die Gliederreihe des Körpers.
- 16. Der Kopf und die Glieder dieses Blasenwurms in einer mässigen Vergrösserung, *a.* der Saugrüssel, *b. b.* die den dicksten Theil des Saugrüssels umziehende doppelte Reihe von Saugbläschen, *c. c.* die zwey oberen Seitensaugwarzen, *d. d. d. d. d.* die gezackten Glieder des Körpers, *e.* der vom Saugrüssel seinen Anfang nemende mittlere Kanal, *f. f.* die von den Seitensaugwarzen entstehenden Seitenkanäle.
- 17. Ein Stückchen von der harten Hirnhaut unter dem rechten Seitenbeine, *a. a. a. a.* traubenförmig an einander hängende Wasserbläschen, *b. b. b.* kleine Schlagaderästchen.
- 18. Ein Theil von dem aus den Seitenhirnhöhlen genommenen und an einer Nadel hängenden Adergeflechte, *a. a. a. a.* birnförmige Hydatiden oder die Wohnungen des birnförmigen Blasenwurms (*Taenia piriformis*) *b. b. b.* die Blutgefässe, aus welchen jenes Adergeflechte besteht.
- 19. Der vom Adergeflechte getrennte und etwas vergrösserte birnförmige Blasenwurm, *a.* dieser Wurm selbst, welcher sich in der Blase zurückgezogen hat und als ein rundes Wärzchen sichtbar ist, *b. b.* der bauchichte Theil der Schwanzblase, *c.* der Stiel jener Blase.
- 20. Eben dieser Wurm mit seinem aus der Blase hervorgestreckten Körper in einer geringen Vergrösserung, *a. a.* der ganze Wurmkörper, *b. b. c.* die Schwanzblase.
- 21. Der stark vergrösserte Körper des birnförmigen Blasenwurms, *a.* der Saugrüssel, *b. b.* der doppelte Hakenkranz am hintern Theil des Saugrüssels, *c. c.* die Saugwärzchen, wovon nur drey in gegenwärtiger Lage des Kopfs sichtbar sind, *d. d.* die aus eben diesen Saugwärzchen entstehenden Nahrungskanäle, *e.* der Hals des Wurms, *f.* der Körper desselben, *g.* der breitere Theil der Blase, mit welchem der Wurmkörper zusammenhängt.

Tabula VI.

Fig. 1. Ein Theil des etwas vergrösserten Hirngeflechts mit den anhängenden weifs punktirten Blasenwürmern (*Taenia albo punctata*) *a. a.* die zwey grossen Blutgefässe des

des Hirngeflechts, welche mit ihren Verästungen widernatürlich ausgedehnt sind, *b. b.* grössere, mit der gemeinschaftlichen Haut umgebene Hydatiden, durch welche auch zwey widernatürlich ausgedehnte Lymphgefässe gehen, *c. c.* kleinere und, wegen der dünnen Haut, mit welcher sie umgeben sind, deutlichere Hydatiden.

Fig. 2. Der vom Hirngeflechte abgesonderte weiss-punktirte Blasenwurm in einer zehnmaligen Vergrösserung, *a.* die weiss-punktirte Schwanzblase, *b. b.* die theils vom Körper des Wurms, theils von der Schwanzblase getrennte und zurückgelegte äussere Haut, *c.* der mit sechs Häkchen versehene Rüssel des hervorgestreckten Wurmkörpers.

- 3. Ein Theil des verhärteten, aus dem Zellgewebe des in der Nachbarschaft des linken Eyerstocks genommenen Fetts, in welchem eine länglichte, mit einer dünnen Haut ausgekleidete Höhle, nebst dem darinnen wohnenden Fettblattwurme (*Hexathyridium Pinguicola*) sichtbar ist.
- 4. Dieser aus jener Höhle genommene Wurm selbst, dessen, das breitere Kopftheil umziehende Lippe so zusammengezogen ist, daß man die sechs Saugpunkte daran nicht wahrnehmen kann.
- 5. Das Kopfende desselben Wurms mit den hier sichtbaren sechs Saugporen.
- 6. Der Venenblattwurm (*Hexathyridium venarum*) von der untern Seite.
- 7. Derselbe Wurm von der Rückenseite.
- 8. Die Dicke dieses breitgedruckten Wurms in einem Durchschnitte.
- 9. Ein Theil der Luftröhre mit ihren Verästungen und widernatürlich veränderten Drüsen, *a.* die untersten Knorpel der Luftröhre, *b.* der rechte Luftröhrenast, *c.* der linke Luftröhrenast, *d. d. d. d. d.* die abgeschnittenen Bronchialäste, *e. f. g. h.* vier Drüsen, deren Lymphgefässe widernatürlich aufgetrieben, aus ihrer natürlichen Lage gebracht und ihrer Valveln beraubt sind. Die in diesen Gefässen befindlichen sehr zarten Würmer schimmerten zwar durch die zarte Haut, liessen sich aber in der Abbildung nicht deutlich machen.
- 10. Ein vergrößerter Theil der Drüse (Fig. 9. *e.*) an welchem die ihrer Klappen beraubten und aus ihrer natürlichen Lage gezogenen Lymphgefässe sichtbar sind, *a.* der durch ein solches Gefäß schimmernde Lymphgefäß-Hakenwurm (*Hamularia lymphatica*).
- 11. Dieser aus dem Lymphgefäße der Drüse genommene, achtmal vergrößerte Wurm selbst, *a.* der einwärts gekrümmte und mit zwey Häkchen versehene Kopf, *b.* das Schwanzende, *c. c. c. c.* dunkle Flecken, welche hin und wieder am Körper erscheinen.
- 12. Das noch mehr vergrößerte Kopfende desselben Wurms.
- 13. Ein vier bis fünf hundert mal vergrößerter Theil eines Samentropfens, *a.* ein menschliches Samenthierchen in horizontaler Lage, *b.* ein solches mit dem geschwänzten, oder Vordertheil seines Körpers sich fortbewegendes Thierchen mit der punktirten Spur seiner zurückgelegten geschlängelten Laufbahn, *c.* ein wieder untertauchendes Samenthierchen, *d.* ein solches tiefer im Samentropfen gehendes, *e.* ein sich wendendes und dadurch an der unteren Seite des Körpers flacher und heller erscheinendes Thierchen, *f. f. f.* geronnene Samentheilchen.
- 14. Ein Stück Häutchen, welches sich nach einigen Tagen auf der Oberfläche des
mit

mit Wasser vermischten menschlichen Samens anzusetzen pflegt, *a. a. a. a. a. a.* verschiedene überaus kleine Infusionsthierchen.

Fig. 15. Das Kreisthierchen des Zahnschmuzes (*Cercaria tenax*) durchs Mikroskop betrachtet, *a.* eins der grösseren länglich-runden Gattung dieser Thierchen, *b.* eine zweyte zahlreichere und an beyden Enden stumpfere Gattung, *b. c.* der spiralförmige Weg den letztere Gattung beschreibt, *d.* eine dritte überaus kleine, runde Art dieser Thierchen, *e.* die unter dem Mikroskope in langen, bald geraden, bald krummen Streifen erscheinende Materie des Zahnschmuzes, *f.* ein Kreisthierchen der grössten Art aus dem Zahnschmuze eines Greises.

Tabula VII.

- Fig. 1. Der sich zusammenziehende oder verkürzende Rofsigel (*Hirudo sanguisuga*) *a.* der Kopf, *b.* der Absatz.
- 2. Derselbe Blutigel von der untern oder Bauchseite, *a.* der etwas geöffnete Mund, *b.* die flache Seite des Absatzes, mit dem sich bey Anhängen an eine Fläche in der Mitte zeigenden Grübchen, *c.* das fadenförmige, hervorstehende männliche Glied, *d.* die Gegend, wo sich die Öffnung zu dem weiblichen Geschlechtstheile befindet.
- 3. Eben dieser Blutigel kriechend vorgestellt.
- 4. Der Mund dieses Blutigels mit seinen scharfen Lippen und dem sich im Rachen befindenden Zungenförmigen Theil durchs Mikroskop vorgestellt.
- 5. Das Kronenmaul (*Ascaris stephanostoma*) in natürlicher Grösse.
- 6. Dasselbe vergrössert, *a.* die Stacheln des Hakenkranzes am Kopftheil von der Seite, *b.* das gespaltene Schwanzende.
- 7. Der Kopf dieses Wurms von vorne in seiner natürlichen Grösse.
- 8. Eben derselbe mit seiner zweyhörnichten Stirnwulst und dem den geöffneten Mund umgebenden Hakenkranz in einer beträchtlichen Vergrösserung.
- 9. Der etwas gebogene Kegelwurm (*Ascaris conosoma*).
- 10. Der vergrösserte Kegelwurm, *a.* die linke Saugwarze am abgerundeten Kopfe, *b.* ein in der Mitte getheiltes Häufchen von Körnern, welches die Stirne des Kopfs umzieht und zum Theil den ersten Ring des Leibes bedeckt, *c.* die nach oben gekrümmte Schwanzspitze.
- 11. Der abgeschnittene Kopf dieses Wurms von vorne in natürlicher Grösse.
- 12. Ebenderselbe vergrössert, *a. a.* die zwey Saugwarzen des Kopfs, *b.* das Körnerhäufchen, welches sich über der Stirne zu beyden Seiten herabzieht.
- 13. Der Leberblattwurm (*Fasciola hepatica*) in natürlicher Grösse.
- 14. Dieser Wurm mit dem durchschimmernden Geflechte seiner Eingeweide durchs Mikroskop gezeichnet, *a.* das Kopfende, *b.* das Schwanzende.
- 15. Ein Blasenwurm aus dem Netze eines Schweins, *a. a.* Fetttheile des Netzes, womit die Kapselhaut oder die Blasendecke verwachsen war.
- 16. Die durch einen Querschnitt, geöffnete Kapselhaut dieses Wurms, wodurch die Schwanzblase des darinnen liegenden Wurms selbst sichtbar wird, *a. b. c. d.* die zurückgelegten Lappen der äusseren dicken Kapselhaut, *e.* die als eine Wasserblase von ungleich zarterer Haut erscheinende Schwanzblase.
- 17. Der aus der Kapsel, als aus seinem Gehäuse genommene Blasenwurm selbst, *a.* der Blasenwurmkörper, welcher aus einer Wulst, *b.* der Schwanzblase *c.* hervorsticht.

Fig.

- Fig. 18. Der hintere Theil des Blasenwurmkörpers in seiner Verbindung mit der Schwanzblase, *a.* ein kleiner Querspalt, durch welchen das hintere Ende des Wurmkörpers zwey Lippen bildet, *b.* die innere Fläche der hinten abgeschnittenen und umgekehrten Schwanzblase.
- 19. Der von der Schwanzblase abgesonderte Körper des Blasenwurms, *a.* der Vordertheil, *b.* der Hintertheil, *c. d.* der noch anhängende häutige Theil der Schwanzblase.
- 20. Eine Vergrösserung dieses von der Schwanzblase getrennten Blasenkörpers, *a.* verschiedene am Kopfende sichtbare Ringe, welche der Wurm entwickeln und wodurch er sich verlängern kann, *b.* die Vertiefung, welche die Querspalte am Hintertheile bildet, *c. d.* zwey von der Schwanzblase zurückgebliebene Spitzen.
- 21. Der Menschenvielkopf (*Polycephalus hominis*) in einer starken Vergrösserung, *a.* *b. c. d. e.* die gemeinschaftliche Blase dieser geselligen Blasenwurm-gattung, *f. g. h. i. k.* die aus der gemeinschaftlichen Blase hervorstehenden Hakenkränze der einzelnen Wurmkörper.
- 22. Zwey aus der gemeinschaftlichen Blase herausgepresste und mit einfachen Hakenkränzen versehene Blasenwurmkörper, noch stärker vergrössert, *a. b.* die Blasenwurmkörper mit ihren Hakenkränzen, *c. d.* der anhängende Theil der gemeinschaftlichen Blase.
- 23. Ein von der gemeinschaftlichen Blase gänzlich getrennter Körper des geselligen Menschenvielkopfs, mit seinem Hakenkranze und seinem birnförmig zulaufenden Ende.
- 24. Ein von einer vierzigjährigen Frau mit dem Urine abgegangener, haarichter Wurm welchen *Verbek Lumbricus pilosus* genannt hat.

Verbesserungen.

In der Vorrede ist S. IX. Zeile 3 noch übersehen worden *unschädlich* statt *unschicklich*.

Zweyter Band.

Seite	45	Zeile	2	Halbglieder statt Halsglieder.
—	70	—	20	stillen statt stillem.
—	—	—	29	ersteren statt ersterem.
—	—	—	30	lezterem statt lezteren.
—	71	—	31	waren statt wären.
—	73	—	6	ist nach Fortpflanzung <i>welche</i> ausgelassen.
—	74	Columnne 2	Zeile 20	Scriberi statt Scribonii.
—	77	Columnne 2	— 3	Helle statt Halle.
—	80	Zeile 21	um	statt nun.
—	81	—	5	hätten statt hätte.
—	84	—	9	Kopfe statt Knopfe.
—	89	—	16	ist nach hier <i>nicht</i> ausgelassen.
—	106	—	6	ihm statt ihn.
—	113	—	4	dürrem statt dünnem.
—	128	—	2	ist nach erstere <i>an</i> ausgelassen.
—	135	—	23	muß nach Kröteneyes <i>nicht</i> weggelassen werden.

